فرهنگ داروئی

259657

دکتر محمدرضا توکلی صابری

جلد اوّل



BORROWER'S NO.	ISSUE DATE	BORROWER'S NO.	ISSUE DATE

BORROWER'S NO.	ISSUE DATE	BORROWER'S NO.	ISSUE DATE

فرهنگ دارویی

PHARMACEUTICAL INDEX

دکتر محمدرضا توکلی صابری

جلد اول

KASHMIR UNIVERSITY
Iqbal Library
Acc. No. 259657
Dated 10.2.00

ــ فرهنگ داروئی
ــ دکتر توکلی صابری

مرکز پخش. انتشارات روزبهان ــ خیابان انقلاب مقابل دانشگاه تهران تلفن ۶۴۸۶۶۷
چاپخانه فاروس ایران ــ سعدی شمالی کوچه کاخ پلاک ۲۲ تلفن ۳۱۵۷۳۰

آدرس پستی : تهران صندوق پستی ۵۱/۱۸۵۵

حق چاپ محفوظ است

بها ۱۵۰۰ ریال

فهرست مطالب فرهنگ داروئی

BORROWER'S NO.	ISSUE DATE	BORROWER'S NO.	ISSUE DATE

سخن نگارنده

کتاب حاضر نتیجه تشویق ناشر محترم است که بارها لزوم چاپ مجدد این مجموعه را گوشزد میکرد. استقبالی که ظرف چند سال گذشته از چاپ های قبلی این کتاب شد و سوءاستفاده از آن نیز خود عامل دیگری بود برای دست بکارشدن. اما چاپ کتاب به همان شکل و با محتوای گذشته پاسخگوی ضرورتی نبود و لزوم اصلاح و تغییر و تبدیل وسیعی را ایجاب میکرد. بدین ترتیب بود که هربار پس از تنظیم کتاب دست نوشته کتاب تغییر کرد و مفصل‌تر شد تا بدینصورت درآمد.

با اجرای طرح ژنریک و لزوم افزودن فهرست درمانی و نیز طبقه‌بندی درمانی ـ فارماکولوژیکی داروها برحسب نام ژنریک، کتاب مفصل‌تر شده و به شکل حاضر درآمده است.

با تغییر در شیوه تولید صنایع داروسازی و نسخه‌نویسی و آغاز اجرای طرح ارزشمند ژنریک شاید ضرورتی برای چاپ مجدد این مجموعه نبود. اما تا پیاده‌شدن و اجرای کامل طرح ژنریک که نگارنده به آن دلبسته است، امیدوار است که این کتاب در همین دوره حدفاصل، همچون یک راهنما عمل کند و همین امر است که همه مشکل‌ها را سخت می‌نماید. باشد که در پایان این طرح دیگر به این کتاب و به‌شکل کنونی نیازی نباشد و داروها به نام واقعی‌شان (نام ژنریک) خوانده شوند و ازنام تجارتی داروها دیگر استفاده نشود.

تفاوت این چاپ با چاپهای قبلی در این است که دراین چاپ سعی شده‌است

که عوارض جانبی و احتیاط و موارد منع استعمال و مکانیسم و اثر متقابل داروها تا آنجا که ممکن بوده است مشروح‌تر شده و اصلاح شوند و تکیه بیشتری بر آنها شده است و تا حد امکان نیز از معادلهای ژنریک داروها استفاده شده است.

سرم‌ها ، واکسن‌ها ، صابون‌ها و آنتی‌سپتیک‌ها نیز در متن اصلی کتاب آورده شده است. در انتهای متن اصلی نیز شیرخشک‌ها که بخش جدیدی است به کتاب افزوده شده است.

در یکسالی که این مجموعه در دست تهیه و گردآوری بود از یاری وراهنمائی دوستان بسیاری سود برده‌ام که نام بردن یکایک آنها ناممکن است اما از ذکر نام چندتن نمیتوانم خودداری‌کرد چراکه کمترین سپاسگزاری ازایشان یاد نامشان است.

بسته‌بندی و بهای داروها در متن کتاب به کوشش دکتر رحیم شبستری‌ودکتر فرزین بهرامی تنظیم‌وتهیه شده است. پیداکردن معادل نام‌ژنریک نامهای‌شیمیائی داروها در متن اصلی کتاب و یا متن ترکیب داروها درجداول شماره۱و ۷ و ۸ بخش اطلاعات داروئی به یاری دکتر فرزین بهرامی ممکن شده است. از آقای دکترزمانی بخاطر اجازه برای چاپ "نام تجارتی داروها "نیز سپاسگزارم. و سرانجام‌از همسرم که بی او این کتاب مقدور نبود.

بااینهمه باید بیفزائیم که‌همانند چاپ اول کتاب این است کاری که‌توانسته‌ایم نه آنچه خواسته‌ایم.

دکتر محمدرضا توکلی صابری

دی‌ماه ۱۳۶۰

راهنمای استفاده از فرهنگ داروئی

فهرست بخش‌های کتاب در صفحه بعد آمده است . و طرز استفاده از هر بخش نیز در بالای همان بخش چاپ شده است .

فهرست الفبائی به شما کمک میکند تا نام کارخانه سازنده ، خاصیت درمانی و شماره صفحه‌ای را که اطلاعات مربوط به دارو در آن آمده است پیدا کنید . برای دریافت اطلاعات بیشتر در مورد هر دارو به صفحه مربوطه آن رجوع کنید .

برای یافتن گروه درمانی یا کد درمانی و نیز علائم اختصاری کارخانه‌ها که در فهرست الفبائی و نیز در بخش‌های دیگر کتاب به آن اشاره رفته است به صفحات ۴۰ و ۳۴ رجوع کرده و معانی این کدها را پیدا کنید .

اگر یک بیماری را می‌شناسید و دنبال یافتن داروئی برای آن هستید ویا تمام داروهای ساخت یک کارخانه را میخواهید بشناسید به فهرست درمانی داروها برحسب نام تجارتی صفحه ۷۴۹ و فهرست فارماکولوژیکی ـ درمانی برحسب ژنریک صفحه ۸۷۶ و فهرست کارخانه‌ای صفحه ۷۸۷ رجوع کنید .

برای یافتن معادلهای تجارتی یک دارو با نام ژنریک به صفحه ۸۱۹ مراجعه کنید .

آخرین بخش کتاب را اطلاعات داروئی تشکیل میدهد که اطلاعات ضروری و دانستنیهای لازم در مورد داروها را در اختیار خواننده می‌گذارد . فهرست مشروح مطالب بخش اطلاعات داروئی درصفحه ۸۹۸ آمده است .

فهرست منابع کتاب

REFERENCES

1. AMA Drug Evaluation, Third Edition, 1977, Publishing Sciences Group, inc.

2. Clinical Toxicology 3(4) pp 541–549., 1970.

3. Data Sheet Compendium 1978, the Association of British Pharmaceutical Industry.

4. A Guide to Drugs in Breast Milk, Dr. M.D. Read, W.B. Pharmaceuticals Limited May 1980.

5. Handbook of Clinical Drug Data, James E. Anoben et. al. Drug Intelligence Publication (1978).

6. FRPI Pharmaceutical Index Iran. I.M.S. AG Zug. Switzerland.

7. L'informatore Farmaceutico, 1980, 40 a edizione.

8. Martindale, the Extra-Pharmacopeia 27th Edition, 1977, The Pharmaceutical Press.

9. Medical Index (Middle East & Africa) 10th edition 1975-1976.

10. Medicine Digest, Vol. 7, No. 5, May 1981, pp. 37.

11. Merck Index, Ninth Edition, Merck & Co., Inc., 1976.

12. Middle East Meppos No.2, The Physician's Drugs Reference, Third Edition, 1975.

13. Modern Drug Encyclopedia, Lewis A.g., York Medical Books, 1979.

14. Patient's Dosage Instruction, A Guide for Pharmacists Steven Strauss I.M.S. America Ltd., Amber Pennsylvania 19002, 1975.

15. The Pharmaceutical Journal Vol. 225, No. 6098, November 8, 1980.

16. The Pharmacological Basis of Therapeutics, Louis S. Goodman and Alferd Gilman, Sixth Edition, 1980. Macmillan Publishing Company.

17. Physician's Desk Reference, 33 Edition, 1979.

18. Remington's Pharmaceutical Sciences 16th Edition, 1980, Mack Publishing Company.

19. The United State Dispensatory, A. Osol, R. Pratt, J.B. Lippincott Company, 27th Edition, 1973.

منابع فارسی

۲۰ – ارزشیابی اثرات متقابل داروئی – ۱۹۷۳، ترجمه: دکتر توکلی‌صابری

۲۱ – داروسازی صنعتی، دکتر محمود رفیع زاده، انتشارات دانشگاه تهران

۲۲ – طرح نوین داروئی ایران، جلد اول، از انتشارات وزارت بهداری جمهوری اسلامی ایران

۲۳ – فرهنگ کوچک پزشکی، دکتر حسن مرندی، کتاب فروشی تهران

۲۴ – مجموعه راهنمای داروئی ایران، جلد اول ودوم، از انتشارات سندیکای کارفرمایان داروسازی و بهداشتی ایران سال **۱۳۵۵**

۲۵ – گیاهان داروئی، دکترعلی‌زرگری، انتشارات امیرکبیر، جلداول‌ودوم‌وسوم سال ۱۳۴۷

۲۶ – مجله هفتگی طب و دارو

28 DEC 1976

Call No. ____________ Date ____________

Acc. No. ____________

CENTRAL LIBRARY
THE UNIVERSITY OF KASHMIR

This book should be returned on or before the last date stamped above. An over-due charge of 10 Paise will be levied for each day, if the book is kept beyond that date.

فهرست الفبائی داروها

در این فهرست تمام داروهای این مجموعه بر حسب الفبا تنظیم شده است حرف سمت چپ هر دارو نشانه کد درمانی داروست . ازمیان اشکال داروئی مختلف یک دارو با کدهای متفاوت فقط یک شکل داروئی با یک کد انتخاب شده است (برای یافتن شرح کدها به طبقه‌بندی درمانی صفحه ۴۰ مراجعه کنید)

در سمت راست علایم اختصاری کارخانه سازنده دارو وسپس شماره صفحه در متن کتاب آمده است (برای یافتن فهرست نام کارخانه‌ها وعلایم اختصاری آنها به صفحه ۳۴ رجوع کنید)

گروه‌درمانی	نام دارو	کارخانه	صفحه
A11B4	A B C D	FRR	53
H 1A	A C T H	CHO	58
A11C3	A + D	DOP	60
A 1A	A.M.C.	BOO	80
A 2A3	A P P	DLC	94
D 4A	A T S	THX	107
A 1A	ABCEDENT	RIA	53
A11B2	ABDEC	P.D.	54
G 3E3	ABLACTON	SHG	54
N 2B	ACEFALGINE	ACF	55
B 2B	ACETOPHEN	ABD	55
J 1A	ACHROMYCIN	LED	56
G 1A2	ACI GEL	ORT	56
D 2B	ACIDRINE	LAT	57
J 1H	ACIPEN V K	MYM	57
D 8A	ACRIFLEX	A.H.	58
A 7B	ACTAPULGITE	BEA	58
A 13A	ACTIVAROLC 500	HEP	59
A 2A3	ACTONORM	WAL	59
C 1D1	ADALAT	BAY	60
M 3B2	ADALGOR	ROU	60
C 2A	ADELPHAN	CIB	61
C 2C1	ADELPHAN ESIDREX	CIB	61
A11C3	ADEXOLINE	SLX	62
M 1A1	ADIRO	BAY	62
B 2B	ADONA	TAN	63
C 6A	ADONICOEUR	FAR	63
B 2A	ADRENOXYL	LAB	63
V 2B	ADRIBLASTINA	FIT	63
A14A1	ADROYD	P.O.	64
N 5A2	ADUMBRAN	B.I.	65
A 2A2	AEROPAX	ERC	65
N 4A1	AKINETON	KNO	66
A 6A3	ALBAGAR	MCS	66
S 1D	ALBALON	ALL	67
J 1K4	ALBAMYCIN	UPJ	67
D 4A	ALBATUM	MAX	68
B 5B1	ALCOHOL DEXT ROSE IN WATER	BAX	68
S 1D	ALCONEFRIN 14	ALC	68
S 1D	ALCONEFRIN 25	ALC	68
P 1B	ALCOPAR	WEL	69
C 3B	ALDACTONE A	SEA	69
C 2B	ALDOMET	MSD	70
A 13A	ALERTONIC	MIN	71
M 2B	ALGAPHAN	B.M.	71
M 2A	ALGESAL	LAT	72
N 2B	ALGINAL	PAR	72
R 6A	ALLERGA	DGR	72
D 8A	ALLERGAN SOAKARE	ALL	73
D 4A	ALLERGIN	A.H.	73
M 4A	ALLOPURIN	LUN	73
A 2A1	ALMACARB	D.P.	74
A 2A1	LAMAX	MAX	74
J 7A	ALMEVAX	WEL	74
M 2A	ALPHA KADOL	MID	75
A 9A	ALPHACHYMOT-RIPSYNE	CHO	75
A 2A1	AL-SI-GEL	VIR	75
N 1A1	ALTHESIN	GLX	75
A 2A1	ALUDROX	WYE	76
R 3A1	ALUPENT	B.I.	76
R 5D2	AMBENYL EXPECTORANT	P.D.	77
R 3A2	AMBEZIM	ORM	77
R 5C2	AMBEZIM BALSAMIC	ORM	78
P 1A	AMBILHAR	CIB	78
R 6A	AMBODRYL	P.D.	79
D 6A	AMBRAMYCIN	LEP	79
J 1A	AMBRAMYCIN	LEP	79
R 3A	AMBREDIN	SOL	80
J 1C	AMFIPEN	MYN	80
B 5B3	AMINOFUSIN L	PFR	81
C 1E	AMINOPHYLLINE	ABD	81
R 3A2	AMINOPHYLLINE	LEK	81
A 2B	AMINOSERYL	THE	82

گروه‌درمانی	نام دارو	کارخانه	صفحه	گروه‌درمانی	نام دارو	کارخانه	صفحه
R 3B	AMPHISOL	LUN	82	N 4A2	ARTANE	LED	99
J 1C	AMOXIL	BEN	82	M 1A2	ARTRONEURIL	MDC	100
A 2A1	AMPHOJEL	WYE	83	P 1B	ASCAPHEN	WAN	100
J 1C	AMPICIN	TOL	83	A11G1	ASCORVIT	TOL	101
J 1C	AMPICIN FORT	TOL	83	A 1A	ASCOXAL	ASR	101
J 1C	AMPICLOX	BEE	84	A1A1	ASCOXAL-N	ASR	101
J 1C	AMPICO	MIN	84	N 2B	ASKINE	ABD	102
M 4A	AMPLIVIX	LAB	84	R3A2	ASMAC	WAN	102
J 1C	AMPY-PENYL	POD	85	R 3A2	ASMAC RETARD	WAN	102
C 1C	ANACARDONE	D.P.	85	D 8A	ASEPSO	E.D.	103
A 3D	ANALGEC	IDI	86	R 3A2	ASMI	ERC	102
V 3A	ANANASE	ROE	86	A 3B	ASPASTIN	WAN	103
M 2C	ANCOFEN	D.P.	86	N 2B	ASPEGIC	EGI	104
A 2A1	ANDOSALT	AVI	87	N 2B	ASPIRINE	BAY	104
A 6A5	ANDREWS	WIN	87	N 5A2	ATARAX	UCB	105
D4A	ANETHAINE	GLX	87	C 6A	ATIPI	RIE	105
G 3G	ANETRON	SHG	88	N 5A2	ATIVAN	WYE	106
B 4A	ANGININ	BAN	88	G 1A2	ATRICAN	CHA	106
V 4A	ANGIOGRAFIN	SHG	88	B 4A	ATROMID S	ICI	106
C 6A	ANGOSEDIN	VIF	89	D 7B1	AUREOCORT	LED	107
G 1A2	ANIODOL	SCH	89	S 1A	AUREOMYCIN	LED	108
J 7A	ANNEXINE	BER	89	B 3A2	AUTRIN	LED	108
A 3B	ANTAL	OPO	90	A 3A	AVAFORTAN	AST	109
P 1B	ANTEPAR	WEL	90	N 2C	AVAMIGRAN	AST	109
A 2A1	ANTEPSIN	CGA	91	N 6A	AVENTYL	LLY	109
D 4A	ANTHISAN	M.B.	91	D 4A	AVIL	HOE	110
R 6A	ANTHISAN	M.B.	91	R 5D2	AVIPULMINE	AVI	111
A 7C	ANTIBIOPHILUS	LYO	91	A11C1	A-VIT	WAN	111
M 2A	ANTIPHLOGISTINE	DOP	92	A 4A	AVOMINE	M.B.	112
M 2A	ANTIPHLOGISTINE RUB	DOP	92	N 2B	AXAR	MCS	112
N 3A	ANTISACER	WAN	92	R 5D2	AXON	MCS	112
N 3A	ANTISACER COMPOSITIUM	WAN	92	J 1K4	AZALOMYCIN-F	SAY	112
R 6A	ANTISTINE	CIB	93	A 11D	B 300	DOP	114
R 1A2	ANTISTINE PRIVINE	CIB	93	N 5B4	BABY LIFE	MIN	114
A 3A	ANTRENYL	CIB	93	R 5A	BABY RHINOL	LEP	104
A 3A	ANTRENYL DUPLEX	CIB	94	A 7C	BACTISUBTIL	M.T.	115
N 6A	APONAL	B.M.	94	J 1E	BACTRIUM	ROC	115
C 7A	APTIN	ASR	95	A 3D	BARALGIN	HOE	116
C 1D2	APTIN DURULES	ASR	95	A 3D	BARDASE	P.D.	117
R 2A	AQUADRIN	MCS	96	C 2C1	BARONORME	KOU	117
C 2C2	AQUAMOX	LED	96	A 13A	BAYER'S TONIC	BAY	117
P 1D	ARALEN	WIN	96	M 2A	BAYOLIN	BAY	118
N 2B	ARAM	PAR	97	A11D2	B-COLEX	POO	118
N 2B	ARAMIN	D.P.	97	N 5B1	BEBEROMINE	PHR	118
M 1A	ARCOBUTINA	ARC	97	R 5C	BEBE BRONCHE	AVI	119
J 1C	ARCOCILLIN	I.C.I	98	N 5B4	BEBECALMINE	MRN	119
S 1D	ARGYROL	DOP	98	R 5A	BEBEFAZ	FAZ	120
R 1A2	ARGYROPHEDRINE	ARO	98	R 5D2	BEBESEDIN	VIO	120
M 1A1	ARLEF	P.D.	98	R 5C	BEBE TUSSIN	MAR	120
V 6C9	AROBON	NES	99	A11H2	BECILANK	SPE	121
A 11C1	AROVIT	ROC	99	R 5C2	BECOF	MCS	121
				A 11E1	BECOMARINE	MRN	121
				R 3A1	BECOTIDE	A.H.	122
				A11E1	BECOZYME	ROC	122
				A11E1	BEJECTAL C	ABT	122

گروه‌درمانی	نام دارو	کارخانه	صفحه
A11E2	BEJECTAL C WITH LIVER	ABT	122
A 3D	BELLADENAL	SDZ	123
A 3D	BELLADENAL RETARD	SDZ	123
N 5B4	BELLERGAL	SDZ	123
N 5B4	BELLERGAL RETARD	SDZ	123
P 1A	BEMARSAL	SPE	124
A11H2	BENADON	ROC	124
R 6A	BENADRYL	P.D.	124
R 5C2	BENADRYL EXPECTORANT	P.D.	125
R 5D2	BENAFED	P.D.	125
C 2C1	BENDIGON	BAY	126
J 1H	BENECIL	IBS	126
M 4A	BENEMID	MSB	127
R 1A	BENJOMIN	RAM	127
A11E1	BENUTREX B 12	ORG	127
A11E2	BENUTREX C	ORG	128
A11E3	BENUTREX ORAL	ORG	128
R 5C2	BENYLIN PEDIATRIC	P.D.	129
M 1A1	BENZOFLEX	BEZ	129
A11H3	BEPANTHENE	ROC	129
N 2B	BEPYRINE	TOL	130
J 6A	BERIGLOBIN	HOE	130
N 2B	BESEROL	WIN	130
A11D1	BESTON	TAN	130
G 1A2	BETADIN	PUR	131
H 2A2	BETANISONE	LEP	131
M1A2	BETASALYL	LEP	131
M 1B	BETNELAN INTRA ARTICULAR INJECTION	GLX	132
H2A1	BETNESOL INJECTION	GLX	133
H 2A2	BETENSOL	GLX	132
S 1B	BETNESOL	GLX	132
S 1C	BETNESOL N	GLX	133
D 7A	BETNESOL RETENTION ENEMA	GLX	133
C 5A1	BETNOVATE	GLX	134
D 7B1	BETNOVATE C	GLX	135
D 7B1	BETNOVATE N	GLX	135
A11E1	BEVIPLEX	FRR	135
N 5B4	BEVISED	MCS	135
V 6D	BEVITA	DOP	136
A11A4	BEXEL	MCS	136
A 9A	BICARNESINE	LAB	136
A 5A	BILICANTE CAPSULES	EJI	137
V 4A	BILIGRAFIN	SHG	137
V 4A	BILOPTIN	SHG	138
J 1C	BINOTAL	BAY	137
A 13A	BIOCOSTENE	ICA	139
M1A1	BIOTAMINE	BAN	139
A2A3	BISMUPAN	AVI	140
A 7C	BISMOGOL	GOL	139
A 2A1	BISMUTH MUCILAGE	DAN	140
A 2A1	BISMUTH PHARMACHIMIE	PRA	140
A 2A1	BISMUTH TULASNIE	RB	140
R 5C2	BISOLVOMICIN	B.I.	142
R 5C2	BISOLVON	B.I.	140
A11D1	BITREN	TAN	142
V 6C4	BLEDINE BANANE	JAC	
S 1A	BLEPH 10	ALL	142
S 1A	BLEPH 30	ALL	142
S 1C	BLEPHAMIDE	ALL	142
C 7A	BLOCADREN	MSD	143
B 5A	B-M SYRUP	MIN	143
A 5A	BOLDINE	HOU	144
A 6A3	BOLDOLAXINE	CHR	144
S 1D	BORAT ADRENALINE	DOP	144
A 5C	BOURGET INOSITOL	EVA	144
A 5C	BOURGET-INOSITOL TAB.	ALR	145
D 10A	BRASIVOL	SFL	145
R 3A2	BRICAN	ASR	145
C 2C1	BERINERDIN	SDZ	146
J 1A	BRISTACIN A	BRI	146
A11D1	BRIVITE	VIR	146
N 5B2	BROMARINE	MRN	147
J 7A	BRONCASMA VACCINE	BER	147
J 1H	BROXIL	BEE	
M 1A1	BRUFEN	BOO	148

گروه‌درمانی	نام دارو	کارخانه	صفحه
P 1B	BRYREL	WIN	148
A 1A	BRUCASEPTOL	MRN	148
A11D1	BUDDOUZE FORT	DOL	149
D 8A	BURNOL	BOO	149
A 3A	BUSCOPAN	B.I.	149
A 3D	BUSCOPAN COMPOSITUM	B.I.	150
N 5B3	BUTABAR SYRUP	MIN	151
N 2B	BUTAPHEN	ABD	151
M 1A1	BUTAZOLIDINE	GGY	152
M 1A1	BUTAZOLIDINE ALKA	GGY	152
A11G1	C.M.	MIN	188
N 2C	CAFERGOT	SDZ	154
N 2C	CAFERGOT P B	SDZ	154
M 1A	CAFIDON	ABD	154
D 4A	CALADRYL	P.D.	155
N 5B1	CALCIBRONAT	SDZ	155
A 12A	CALCIGRAN	D.P.	155
A 12A	CALCIMARIN	MRN	156
A 12A	CALCI-OSTELIN	GLX	156
R 6A	CALCISTIN	B.M.	158
A 12A	CALCI-OSTELIN B 12 SYRUP	GLX	157
A 12A	CALCI-OSTELIN 12 AMP.	GLX	157
A 12A	CALCI-OSTELIN 12 AMP.	GLX	157
A 12A	CALCIPARINE AMP.	CHO	157
R 6A	CALCISTINE	B.M.	158
A 12A	CALCIPEN	LEO	158
A 12A	CALCIUM CORBIEER	COR	158
A 12A	CALCIUM LEVU-LINATE	BAX	159
A 12A	CALCIUM SANDOZ	SDZ	159
A 12A	CALCIUM SANDOZ FORTE	SDZ	159
A 12A	CALCIUM SANDOZ + VITAMIN C	SDZ	160
A 12A	CALCYDIC	A.H.	161
C 6A	CALMICOR	BER	161
N 2B	CALMINA	MIN	161
N 5B2	CALMOBROM	ABD	162
N 2A	CALMYCINE	MYC	162
A 13A	CALORIT	IRA	163
D 8A	CALOX	MCS	163
D 7B1	CAMBISON	HOE	163
R 5C2	CAMPHOPNEU-MINE ADULTS	M.T.	164
R 5C2	CAMPHOPNEU-MINE ENFANT	M.T.	164
R 5C2	CAMPHOPNEU-MINE BE BE	M.T.	165
G 1A2	CANDEPTIN	PHM	165
D 1A1	CANESTEN	BAY	165
R 5A	CANTACIN	HCE	166
A 3A	CANTIL TABLET	LAK	166
B 2A	CAPRAMOL	CHO	167
N 6B	CAPTAGON	HOM	167
A 7A2	CARBANTRENE	CIB	168
C 1D3	CARDIACAP	DLC	168
C 6A	CARDIOPON	TPW	168
C 1B	CARDIOQUINE	SAE	168
C 6A	CARDOMPIN	HEU	169
A 9A	CARIPEPTIC LIQUID	UPJ	169
C 2B	CATAPRES	B.I.	169
N 6B	CATOVIT	B.I.	170
A11G1	CEBION	MCK	170
A 12A	CEBION CALCIUM	MCK	171
A 11G1	CECIL	ABD	171
C 1A1	CEDIGOXINE	SDZ	172
C 1A1	CEDILANID	SDZ	172
J 1D	CEFALIN	MIN	173
J 1D	CEFATREXYL	BRI	173
D 7A	CELESTODREM	SHC	173
H 2A1	CELESTONE	SHC	174
H 2A2	CELESTONE CHRONODOSE	SHC	175
S 1B	CELESTONE	SHC	179
S 1C	CELESTONE S	SHC	175
G 1A2	CENASERT	PRA	176
J 7A	CENDEVAX	SKF	176
B 2B	CEPEVIT K	FRA	176
J 1D	CEPHALOME X	IDI	177
J 1D	CEPORACIN	GLX	177

گروه‌درمانی	نام دارو	کارخانه	صفحه
J 1D	CEPORAN	GLX	177
J 1D	CEPOREX	GLX	178
V 6C2	CERELAC	NES	729
S 1B	CESTOCIDE	MIN	178
P 1B	CESTOCIDE	MIN	179
D11A	CETAVLON	ICI	179
A11G1	CEVILAT	BAY	179
R 5D2	CHERRY COUGH	BOO	127
S 1D	CHIBRO ANALGO ZINC	CHI	179
S 1D	CHIBRO ATROPIN	CHI	180
S 1D	CHIBRO BORALINE	CHI	180
S 1D	CHIBRO IODO CALCIQUE	CHI	180
S 1D	CHIBRO PILOCAR-PINE	CHI	180
R 3A2	CHIMIOPHYLLINE	BRN	181
R 3A2	CHIMIOPHYLLINE BUTOBARBITAL	BRN	181
S 1A	CHLORAMPHE-NICOL	DOP	181
S 1A	CHLORAMPHE-NICOL STERILL	DOP	182
S 1A	CHLORAMPHENI-COL + SULFA-CETAMIDE	DOP	182
S 1A	CHLORANSULFA	CHI	182
	CHLORO-MYCETIN	P.D.	183
S 1A	CHLOROPTIC	ALL	183
J 1B	CHLOROSTREP	P.D.	183
D 6A	CHLORTETRACY-CLINE	POS	184
A 5A	CHOLIPIN	B.I.	184
J 1A	CHYMO-CYCLAR	CIL	184
B 6A1	CHYMOSER BALSAMIQUE	SER	185
S 2D	CILOPRINE	CIL	185
S 2D	CILOPRINE ANAESTHEITCO	CIL	186
J 1C	CITOCILLIN	GRT	186
A 5C	CITRO-SEL	VIR	186
B 2B	CLAUDENE	LUI	187
S 1D	CLEAR EYES	ABT	187
J 1H	CLIACIL	HOE	187
G 3G	CLOMID	M.T.	188
B 2B	COAGULENE	CIB	188
N 2B	CODIMAL	ABD	189
N 2B	CODOPYRIN	GLX	189
N 6B	COGITUM	M.T.	189
M 4A	COLCHICIN HOUDE	HOU	189
M 4A	COLCHIMAX	HOU	190
M 4A	COLCHIPIRINE	HOU	190
A7A1	COLIMEX	DUM	190
J 1K4	COLIMEX	DUM	190
J 1K4	COLISTINE	BNW	191
A 7A2	COLISTOP	DUM	191
D 6B	COLPO-SULFANA	WAN	191
G 1A2	COLPOTROPHINE	THR	192
G 3D	COLPRONE	AYE	192
M 3A	COLTRAMYL	ROU	192
M 3B1	COLTRAMYL	ROU	192
P 1B	COMBANTRIN	PFZ	193
A11E1	COMBEX PARENTERAL	P.D.	193
A 6A2	COMBEY LAX	ROL	193
A 9A	COMBIZYM	LUI	194
V 4B	COMBUR TEST	B.M.	194
N 3A	COMITAL L	BAY	194
C 4A	COMPLAMIN	WUL	195
C 4A	COMPLAMIN RETARD	WUL	195
A11B4	CONCAVIT	WAL	196
S 1A	CONJUNCTIN	ALL	196
A 5B	COPHYTOL	ROA	196
R 6A	CO-PYRONIL	LLY	197
C 1C	CORAMINE	CIB	197
R 3B	CORAMINE EPHEDRINE	CIB	197
C 1D1	CORDARONE	LAB	198
M 1B	CORDEX FORTE	UPJ	198
R 5A	CORICIDIN	SHC	198
R 5E	CORISAN	ABD	199
R 5E	CORISAN ENFANT	ABD	200
H 2B1	CORTIPLEX	RIR	200
S 1B	CORTISONE	POS	200
H 2B	CORTOL	POS	201
S 1B	CORTRIL	PFZ	201
H 1A	CORTROSYN	ORG	

گروه‌درمانی	نام دارو	کارخانه	صفحه
	DEPOT	ORG	202
R 5A	CORYBAN D	PFZ	202
R 5D2	COSANYL DM	P.D.	202
B 1A1	COUMADIN	END	203
A 6A1	CREMAFFIN	BOO	203
A 7A2	CREMO S P K	MIN	203
D 11A	CRINAGEN CREAM	PHM	204
J 1H	CRYSTICILLIN	SOB	204
A11G1	C-TAB	LEP	205
G 3F	CUMORIT ORAL	SHG	205
M 3A	CURARIN	AST	205
H 3A	CYNOMEL	SKF	
A11F	CYTAMEN	GLX	206
A11D1	CYTAMEN B1	GLX	206
A11F	CYTATON	GLX	207
V 2A	CYTOSAR	UPJ	207
S 1D	DACRINE	CHI	208
A 3A	DACTIL	LAK	208
A 9A	DACTILASE TABLET	LAK	208
C 5C	DAFLON	SRV	209
A11E1	DARGRAVIT B COMPLEX	DAG	209
A11B4	DAGRAVIT TOTAL	DAG	209
J 1F	DALACIN C	UPJ	210
A 9A	DAMAGAL	SIE	210
P 1A	DAMETIN	MCK	211
A 10B	DAONIL	HOE	211
B 5B2	DARROW'S SOLUTION	BAX	212
N 5A1	DARTALAN	SEA	212
A 11B4	DAVITAMON I O	ORG	213
A 9A	DEANASE	DLC	213
H 2A2	DECADRON	MSD	213
A14A1	DECA DURABOLIN	ORG	214
A 5A	DECHOPHYLINE	MCK	214
A 5A	DECHOPHYLINE PENOBARBITAL	MCK	215
D 7B1	DECODERM	MCK	215
M 2A	DECONTRACTYL	R.C.	215
H 2A2	DECTANCYL	ROU	215
G 2B	DELFEN CREAM	ORT	216
A 5B	DELPHICOL	LED	216
M 1B	DELTA BUTA-		

گروه‌درمانی	نام دارو	کارخانه	صفحه
	ZOLIDINE	GGY	216
H 2A2	DELTACORTRIL	PFZ	217
M 2A	DENCORUB	DEN	217
R 5E	DENORAL	FOU	218
A 1A	DENTIFECTE	AVI	218
A 1A	DENTIGAR	VIR	219
A 1A	DENTOVAX	BTY	219
H 2A1	DEPO MEDROL	UPJ	219
G 3D	OEPO PROVER A	UPJ	220
G 3B	DEPOT TESTRON	UPJ	220
V 2B	DEPOSTAT	SHG	220
C 6A	DEPROPANEX	MSD	221
G 1A2	DEQUADIN LOZENGES	A.H.	221
R 2A	DEQUADIN PAINT	A.H.	221
D 7B1	DEQUADIN PESSARIES	A.H.	222
D 6A	DERMEX	MRN	222
D 7A	DERMOVATE	GLX	222
C 4A	DESCLIDIUM	SPR	223
D 3A	DESITIN	DET	223
H 2A1	DESOXYCORTI-COSTERON "VIFOR"	VIF	223
R 4D1	DETIGON	BAY	224
D 8A	DETTOL	REK	224
D 7B	DEVALIL CORTISONE	ICA	224
R 5F	DEVORA	TAN	225
J 1C	DEXACILLIN	SOB	225
H 2A1	DEXA SCHEROSON	SHG	225
D 7B1	DEXATOPIC	ORG	226
B 5B1	DEXTROSE IN SALINE	BAX	227
B 5B1	DEXTROSE IN SODIUM CHLORIDE	BAX	227
B 5B1	DEXTROSE IN WATER	BAX	227
A 1A	D.G. DROP	MYC	228
A 1A	D.G. POWDER	MYC	
A 10B	DIABINESE	PFZ	228

گروه‌درمانی	نام دارو	کارخانه	صفحه
A 7A2	DIACOL	IRA	229
D 7B1	DIACORTICIN	DIA	229
H 2A2	DIADRESON F	ORG	230
V 6C1	DIALAC	D.D.	730
A 10B	DIAMICRON	SRV	230
C 3B	DIAMOX	LED	231
A14A1	DIANABOL	CIB	231
A14A2	DIANAVIT	CIB	231
A 7A2	DIAREX	VIR	231
C 3A	DICHLOTRIDE	MSD	232
B 2B	DICYNONE	WAN	232
S 1A	DIDROSULFON	GRT	233
G 3C	DIENOESTROL CREAM	ORT	233
P 1B	DIETELMIN	BRN	233
C 5C	DIFRAREL E	CHI	234
C 5C	DIFRAREL 100	CHI	234
A 2A4	DI GEL	SHC	235
C 1A1	DIGITALIN NATIVELLE	NLL	235
N 2C	DIHYDERGOT	SDZ	236
N 3A	DILANTIN	P.D.	237
N 3A	DILANTIN PHENOBARBITAL	P.D.	237
C 4A	DILATOL	TPW	237
A 3A	DILOMINE	TOL	238
A 3D	DILOMINE P.B.	TOL	238
R 6A	DIMEDROL	MED	238
A 10B	DIMELOR	LLY	239
G 3D	DIMENFORMON	ORG	239
V 4A	DIMER X	GUE	240
R 6A	DIMETANE	RBS	240
R 5C2	DIMETANE EXPECTORANT	RBS	240
R 5E	DIMETAPP-EXTEN TABS	RBS	241
S 1D	DIONINE	DOP	241
V 4A	DIONOSYL	GLX	241
J 4A	DIPASIC	GEJ	242
J 6A	DIPHTHERIA ANTITOXIN	BER	242
G 3F	DIPRO OLEOSOM	ORG	243
G 3F	DIPRO EMOLTION	ORG	243

گروه‌درمانی	نام دارو	کارخانه	صفحه
A 7A1	DIREXIODE	DEL	243
J 6A	DI TE ANATOXAL	BER	244
J 6A	DI TE PER ANATOXAL	BER	244
J 7A	DI TE TAB VACCINE	BER	244
H 2A1	DOCA	ORG	245
A14A3	DOCABOLIN	ORG	245
N 5A1	DOGMATIL FORT	DGR	245
A 3D	DOLO ADAMON	AST	246
A11D2	DOLO NEURO-BION	MCK	246
N 2B	DOLOXENE COMPOUND	LLY	247
N 2B	DOLVIRAN	BAY	247
A 9A	DONAZYME	RBS	248
A 7B	DONNAGEL PG	RBS	248
A 3D	DONNATAL	RBS	248
C 2B	DOPAMET	DUM	249
R 3B	DOPRAM	RBS	249
N 5B1	DOREVANE	C.B.	250
A 2A1	DORITAL	B.M.	250
R 6A	DOXERGAN	SPE	250
C 5C	DOXIUM	OM	251
J 7A	DPT VACCINE	HOE	251
A 4A	DRAMAMINE	SEA	252
M 1A1	DROXARYL	CON	252
A 6A2	DULCOLAX	B.I.	253
A11C2	DUPHASOL MULTIVITAMIN	DUP	253
A11C1	DUPHASOL A	DUP	253
A11C3	DUPHASOL VITAMIN AD_3	DUP	254
G 3D	DUPHASTON	DUP	254
A14A1	DURABOLIN	ORG	255
V 4A	DUROLIO-PAQUE	GUE	255
C 4A	DUVADILAN	DUP	255
C 3A	DYAZIDE	SKF	256
A 5A	DYCHOLIUM	THX	256
J 1H	DYNAPEN	M.J.	256
R 3A1	DYSPNE INHAL	DYS	257

گروه‌درمانی	نام دارو	کارخانه	صفحه
D 7B1	LOCACORTENE VIOFORM	CIB	407
A 7C	LOMOTIL	SEA	407
R 6A	LONGIFENE	UCB	408
N 5B4	LONGINE	IDI	408
N 5B3	LUMINAL	BAY	409
N 5B3	LUMINALETTES	BAY	409
A 3A	LUOSTYL	UPS	409
A 3F	LUT-OVOCYCLINE	CIB	409
G 3A	LYNDIOL 2.5	ORG	410
A 1A	LYSO 6	FRA	410
R 2A	LYSOPAINE	THE	411
A 2A1	MAALOX	ROE	412
G 1A	MACMIROR	P.C.	412
G 4A2	MACRODANTIN	EAT	412
N 4A2	MADOPAR	ROC	413
J 3A	MADRIBON	EAT	413
A 2A4	MAGEL	TOL	414
A 2A1	MAGNEX	MCS	414
N 5A1	MAJEPTIL	SPE	414
R 6A	MAL HISTIN	DOP	415
N 5B2	MANDRAX	ROU	415
B 5B3	MANITOL IN WATER	BAX	416
D 8A	MANUSPET	BAC	416
D 8A	MARCIDERM	POR	416
N 6A	MARPLAN	ROC	417
D 3A	MASSE CREAM	ORT	417
V 6C1	MATERNA	M.S.	418
R 6A	MAXADRYL	MAX	418
R 5C2	MAXADRYL EXP.	MAX	418
R 3A1	MEDIHALER ISO	RIK	418
N 5B3	MEDOMINE	GGY	419
H 2A2	MEDROL	UPJ	419
H 2A2	MEDROL MEDULES	UPJ	420
D 7A	MEDROL VERIDERM	UPJ	420
J 1H	MEGACILLINE	GRT	420
J 1H	MEGACILLINE FORT	GRT	420
V 6C1	MEIJI MILK	MEI	764
D 11A	MELADENINE	PRC	421
N 5A1	MELLERIL	SDZ	421
N 5B1	MELSEDIN	BOO	422
R 5F	MENTHAN	PAR	422
R 5C2	MEPYRAL	LEP	422
R 5C2	MEPYRAL EXPECTORAN	LEP	423

گروه‌درمانی	نام دارو	کارخانه	صفحه
M 1A1	MERVAN	CON	423
A 3A	MESOPIN	END	423
A 3D	MESOPIN P B	END	423
M 1A1	METACEN	CHS	424
A 13A	METATONE	P.D.	425
A 6A2	METHALAX	MIN	425
G 2A	METHERGIN	SDZ	425
J 1E	METHOPRIM S	RUZ	426
V 2A	METHOTRAXATE	LED	427
V 2B	METHOTREXATE	LED	427
R 5D2	METORCIN	MCS	427
R 5D2	METORPAN	MIN	427
A 5B	METOVIT	ABD	428
A 7A2	MEXAFORME	CIB	428
A 9A	MEXASE	CIB	428
R 3B	MICORENE	GGY	429
G 3A	MICROGYNON 30	SHG	429
A 6A4	MICROLAX	LAB	430
M A2	MIDALGAN	MID	430
G 1A1	MIDICEL	P.D.	430
A 2C	MIDY BISMUTH GEL	MID	431
C 5A	MIDY POMMADE	ATR	431
N 2C	MIGRIL	WEL	431
N 2C	MIGRISTENE	SPE	432
V 2A	MILERAN	WEL	432
A11D2	MILGAMMA	ANK	432
P 1A	MILIBIS	WIN	433
V 6D	MILUPA	MLP	741
V 6C4	MILUPA FOOD	MLP	742
V 6C2	MILUPA MILK	MLP	742
V 6C4	MILUVIT	MLP	743
R 5C2	MINA BRONCHE ADULTS	MIN	433
R 5C2	MINA BRONCHE ENFANT	MIN	433
S 1A	MINACETAMIDE	MIN	434
A 13A	MINADEX	GLX	434
E 3A1	MINA INHALER	MIN	434
R 5A	MINALGIN ADULT	MIN	435
R 5A	MINALGIN ENFANT	MIN	435
J 1A	MINOCIN	LED	435
P 1B	MINTEZOL	MSD	436
V 6C1	MIOLAC	HOL	766
S 1D	MIOTIN	DOP	436
V 2B	MITOMYCIN	KYD	436
M 2A	MOBILAT	LUI	437
M 1A1	MOBUTAZON	BEZ	437
C 2C1	MODENOL	B.M.	437

گروه‌درمانی	نام دارو	کارخانه	صفحه
	ATROPINE		
P 1B	OXYPEL	FAR	498
P 1B	OXYSEROL	MER	497
D 6A	OXYTETRA-CYCLINE	PCS	497
S 1A	OXYTETRA-CYCLINE	PCS	498
A11E1	PABEX	MRN	499
R 5D2	PADERYL	C.B.	499
C 4A	PADUTIN	BAY	500
C 4A	PADUTIN RETARD	BAY	500
A11B2	PALADAC	P.D.	500
N 2B	PALAPRIN FORT	SHC	501
J 1D	PALITREX	BRI	501
A11E1	PANBETIN FORTE	LED	501
A 4A	PANCORTIN B6	RIE	502
A 4A	PANCORTIN PEDIATRIC	RIE	502
A 9A	PANCREFLASH	THE	502
B 3B	PANGADUINE	MRT	502
D 10A	PANOXYL	SFL	503
D 7B4	PANTOCREAM	MIN	503
A 9A	PANZYNORM	NOR	503
R 5D1	PARACODINE	KNO	504
R 6A	PARADRYL	FRR	504
M 3B1	PARAFLEX	CIL	504
A 6A2	PARAGARINE	MRN	505
N 2B	PARAMOL	RIA	505
J 1B	PARAXIN	B.M.	505
A 7A2	PARAZOLINE SUSPENSION	ABD	506
A 7A2	PAREGUAN	ABD	506
G 3C	PARLODEL	SDZ	507
R 6A	PARMAL	ABD	507
N 2B	PASSAL	LEP	508
N 5B2	PASSIBROMINE	OPO	508
N 5B2	PASSIFLORINE	SAR	508
G 3B	PASUMA FORTE	MCK	509
M 3A	PAVULON	ORG	509
N 2B	PAXIDAL	WAL	510
N 2B	PAXEDIN	BOO	510
B 3B	PCB	CHO	510
R 5D2	PECTAMED	MCK	510
R 5D1	PECTAMOL	D.P.	511
R 5C2	PECTO BE BE	LEP	511
R 5C2	PECTO BROM	FAZ	511
R 5D2	PECTOCODE	ABD	512

گروه‌درمانی	نام دارو	کارخانه	صفحه
R 5D2	PECTOGOL	GOL	513
R 5D2	PECTOMYCINE	MYC	513
R 5D2	PECTON SYRUP	MIN	513
R 5D2	PECTON TAB	MIN	514
R 5C2	PECTORMIN	RAM	514
R 5C2	PECTORAMIN ENFANT	RAM	515
A 7C	PEKA	TOL	515
A 7A2	PEKA P	TOL	515
J 1H	PENADUR L-A	WYE	516
J 1C	PENBRITIN	BEE	516
J 1H	PENICILLIN	HOE	517
J 1H	PENCILLIN G.K.	SQB	517
J 1H	PENILENT	NOV	518
J 1C	PENIMOX	LUG	518
J 1C	PENIMYCIN	IDI	518
C 1D3	PENTAERY-THRIT	EBE	519
N 1A1	PENTHRANE	ABT	519
J 1C	PENTREXYL	BRI	520
J 1C	PENTRICINE	IBS	520
A 2A1	PEPSAMAR	WIN	520
J 6A	PERBULIN	IMM	521
H 2A1	PERCORTENE	CIB	521
G 3G	PERGONAL	SER	522
R 6A	PERIACTIN	MSD	522
B 3A	PERIHEMIN	LED	522
B 5D	PERITONEAL DIALYSIS	BAX	523
N 5A1	PERMITIL CHRONOTABS	WHI	523
A 13A	PERNEXIN	SHG	524
C 1D1	PERSANTIN	B.I.	524
C 1D1	PERSUMBRAX	B.I.	525
N 5A2	PERTRANQUIL	LEP	525
C 4A	PERVIN-CAMINE	DAU	525
R 6A	PHENERGAN	SPE	526
D 4A	PHENERGAN CREAM	SPE	526
R 5C2	PHENERGAN EXPECTORANT	SPE	527
S 1A	PHENICOL	DOP	
A 6A	PHENOL-AGARINE	VIR	527

گروه‌درمانی	نام دارو	کارخانه	صفحه
A 2A1	PHILLIPS MILK OF MAGNESIA	WIN	528
D 8A	PHISOHEX	WIN	528
A 13A	PHOSELLITE B	SIE	528
A 2A	PHOSPHALUGEL	BIT	529
A 13A	PHOSVIQUINE	RAM	529
A 5B	PHYSIO HEPATOL	LEP	529
J 4A	P.I.E.M.	HEP	530
R 5F	PILKA	ZYM	530
S 1D	PILOCARPINE	POS	530
S 1D	PILOCARPINE CHIBRET	CHI	531
G 1A2	PIMAFUCIN	MYM	531
D 7B3	PIMAFUCORT	MYM	531
M 4A	PIPERAZINE MIDY	MID	533
A 3A	PIPTAL DROP	LAK	533
A 3D	PIPTAL TAB	LAK	533
R 5C2	PIRITON	A.H.	533
R 6A	PIRITON EXPECTORANT	A.H.	533
M 1A1	PLAQUINOL	WIN	533
A 4A	PLASIL	LED	534
N 5A1	PLEGICIL	C.B.	535
B 3A1	PLEXAFER	BEN	535
R 6A	PLIMASINE	CIB	535
C 3A	PLURYL K	LED	535
C 2C1	PLURYL K R	LED	535
R 6A	POLARAMINE	SHC	536
R 5C2	POLARAMINE EXPECTORANT	SHC	537
J 7A	POLIOMYELITIS VACCINE	BER	537
A11E1	POLYBION	MCK	537
A 2A4	POLYSILANE GEL	MID	538
A 2A4	POLYSILANE REGLISSE	MID	538
S 1A	POLYSPECTRIN S.O.P.	ALL	539
A11B	POLYVITAMIN "BAYER"	B BAY	539
A 8A3	PONDERAL	SRV	539
N 2B	PONSTAN	P.D.	540
C 5A2	POSITOS	MOS	540
B 5B2	POTASSIUM CHLORIDE	BAX	540
A 12B	POTASSIUM LOGIAIS	LOG	541
C 4A	PRAXILENE	OBR	541
R 3A2	PREDASMAL	ORG	542
M 1B	PREDNACYL	ORG	542
M 1B	PREDNIFLEX	CIL	542
M 1B	PREDNIMOVIRENE N	UCB	543
S 1D	PREFRIN A	ALL	543
G 3G	PREGNYL	ORG	543
B 2B	PREMARIN	AYE	544
G 2C	PREMARIN P.M.B.	AYE	544
G 3C	PREMARIN P.M.T.	AYE	544
A11A1	PRENATAL CAP	LED	545
A11A1	PRESSYL	LAT	545
N 6A	PRIADEL	DEL	545
A 14A	PRIMOBOLAN DEPOT	SHG	546
G 3E1	PRIMODIAN DEPOT	SHG	546
A11A3	PRIMOGERON	SHG	547
G 3G	PRIMOGONYL	SHG	547
G 3D	PRIMOLUT NOR	SHG	548
G 3F	PRIMOSISTON	SHG	548
A 4A	PRIMPERAN	DGR	549
A11A1	PRINCI B	LAB	549
C 4A	PRISCOL	CIB	549
N 5B4	PRISCOPHENE	CIB	550
R 1A2	PRIVINE	CIB	550
R 6A	PRO ACTIDIL	WEL	550
A 3A	PRO BANTHINE	SEA	551
A 3C	PRO BANTHINE DARTALAN	SEA	551
A11E1	PROBERON	A.H.	551
S 1D	PROCAIN ADRENALIN	POS	552
D 11A	PRODERMIDE	LAO	552
M 1A1	PRODISAN 300	SIE	552
G 4A2	PRODOXOL	W.L.	553
G 3G	PROFASI	SER	553

گروه درمانی	نام دارو	کارخانه	صفحه
G 3D	PROGESTINE	ORG	553
G 3C	PROGYNON B OLEOSUM	SHG	554
G 3C	PROGYNON C	SHG	554
G 3C	PROGYNON DEPOT PROLUTON	SHG	554
G 3C	PROGYNOVA	SHG	554
G 3D	PROLUTON	SHG	554
G 3D	PROLUTON DEPOT	SHG	554
R 6A	PROMETHAZINE	DOP	555
C 1B	PRONESTYL	SQB	555
J 1C	PROPACIN	LUG	556
D 8A	PROPAMIDINE CREAM	M.B.	556
J 1H	PROSTAPHILIN	BRJ	556
J 1H	PROSTAPHILLIN A	BRJ	556
G 3H	PROSTATIDAUSSE	DAU	557
N 7A	PROSTIGMIN	ROC	557
N 6A	PROTHIADEN	BOO	557
G 3D	PROVERA	UPJ	558
G 3B	PROVIRON	SHG	558
D 4A	PRUVIDERM H	DET	559
A 7A2	PULGIT N	TOL	559
R 5D2	PULMO BE BE	PHR	559
R 5D2	PULMO REGAL	PAR	560
R 5D2	PULMOVITE ENFANTS	VIR	560
V 2A	PURINETHOL	WEL	560
J 1K2	PYOPEN	BEE	561
R 5F	PYRADINE EXPENCTORANT	ABD	561
A 1A	PYRALVEX	BER	561
N 2B	PYRIPAN	TAN	563
R 3A2	QUIBRON	M.J.	563
R 5C2	QUILLA CODENINE	FRE	563
R 5C2	QUILLA SIMPLEX	FRR	563
C 1B	QUINICARDINE	NLL	563
A 2A1	RABRO	RAB	565
M 2A	RAMINOL	RAM	565
A 7A2	RAMOSUCCIN	RAM	566
B 3A2	RARICAL	ORT	566
A 10B	RASTINON	HOE	566

گروه درمانی	نام دارو	کارخانه	صفحه
C 2C1	RAUTRAX IMPROVED	SQB	567
N 6B	REACTIVAN	MCK	567
A 2A1	RECTER	RES	567
C 5A1	RECTOIDAL	COR	568
A 6A2	RECTOLAX	VIR	568
R 3A	RECTOSEPTOL BE BE	B.D.	568
A11G1	REDOXON	ROC	569
M 4A	REDURIC	DOP	569
R 5A	REFAGAN	BAY	569
N 5B4	REGAFLORIN	PAR	570
A 8A3	REGENON RETARD	TMM	570
A 5A	REINOCHOLINE	MYC	571
A 2A1	RENNIE	NIC	571
C 5C	REPARIL	MDS	571
P 1D	RESOCHIN	BAY	572
N 5A2	RESTENIL	KAB	572
R 5C2	RESYL	CIB	572
D 10A	RETIN A	CIL	573
J 1A	REVERIN	HOE	573
N 5B1	REVONAL	MCK	574
J 6A	RHESUMAN BERNA	BER	574
R 1A5	RHINO FAZ	FAZ	574
R 1A5	RHINO-GOUTTES	PHR	575
R 1A5	RHINOMARIN	MRN	575
R 1A2	RHINOPHENE	PAR	575
N 2B	RHONAL	SPE	575
M 2A	RHUMACALMINE	PHR	576
M 2A	RHUMACID	MRN	576
J 1K3	RIFADIN	LEP	576
S 1A	RIFOCIN	LEP	577
D 7B1	RIFODERM	LEP	577
J 1K3	RIMACTANE	CIB	578
B 5B3	RINGER'S SOLUTION	BAX	578
A 2A1	RIOPAN	A.H.	579
N 6B	RITALIN	CIB	579
M 2A	R-M	MIN	579
M 3A	ROBAXIN	RBS	580
M 3B2	ROBAXISAL	RBS	580
A 3A	ROBINUL	RBS	580
A 3D	ROBINUL PH	RBS	580

گروه‌درمانی	نام دارو	کارخانه	صفحه
A11E1	SUPER LEVURE	G.L.	634
A11A4	SUPRADYN	ROC	635
M 2A	SURIN	MCS	636
N 6A	SURMONTIL	SPE	636
G 3B	SUSTANON	ORG	636
V 7A	SWEETEX	BOO	637
B 3A1	SYBRON	P.D.	637
N 4A2	SYMMETREL	GGY	638
N 5B4	SYMPATHYL	CHA	638
C 1C	SYMPATOCARD	B.I.	638
C 1C	SYMPATOL	B.I.	639
H 1A	SYNACTHEN DEPOT	CIB	639
D 7B1	SYNALAR N	POO	640
G 3C	SYNAPAUSE	ORG	640
H 2A1	SYNCORTYL	ROU	640
R 5A	SYNEPHRICOL	WIN	641
G 3F	SYNERGON	HEP	641
A 7C	SYNERLAC	R.B.	641
B 2B	SYNKAVIT	ROC	642
R 6A	SYNOPENE	GGY	642
G 1A2	SYNTO-MYCETINE	LEP	643
G 2A	SYNTOCINON	SDZ	643
S 1C	SYNTOPHTONE	LEP	644
J 7A	TAB VACCINE	BER	645
V 3A	TADENAN	DEB	645
A 2B	TAGAMET	SKF	645
A11E3	TAKA COMBEX	P.D.	646
A 9A	TAKA DIASTASE LIQUID	P.D.	647
G 1A2	TALSUTIN	SQB	647
C 1A1	TALUSIN	KND	647
N 2B	TALWIN	WIN	647
M 1A1	TANDERIL	GGY	648
M 1A1	TANTUM	ORG	649
J 1F	TAO	PFZ	649
H 3B	TAPAZOL	LLY	649
R 6A	TAVEGYL	SDZ	650
A 1A	TEEGEL	SIG	650
N 3A	TEGRETOL	GGY	650
V 4A	TELEBRIX 38	GUE	651
V 4A	TELEPAQUE	WIN	651
P 1B	TELMEX	MYC	652
N 2B	TEMPRA	M.J.	652
P 1B	TENIAX	VIR	652
P 1B	TENICIDE	MIN	653
C 7A	TENORMIN	ICI	653
C 2C1	TERBOLAN	HOE	653
D 7B1	TERRA CORTRIL	PFZ	654
D 6A	TERRAMYCIN	PFZ	654
S 2A	TERRAMYCIN EAR, DROP	PFZ	654
J 1A	TERRAMYCIN INTRA MUSCULAR	PFZ	655
J 1A	TERRAMYCIN INTRAVENOUS	PFZ	655
S 1A	TERRAMYCIN OPH	PFZ	656
D 6A	TERRAMYCIN POM	PFZ	656
J 1A	TERRAMYCIN S F	PFZ	656
D 6A	TERRAMYCIN VAGINAL TAB	PFZ	657
R 5C1	TERRAPNEUMINE	M.T.	657
V 4B	TES TAPE	LLY	658
G 3E2	TESTOLUTON FORT	SHG	658
G 3B	TESTOSTERONE VIFOR	VIF	658
G 3B	TESTOVIRON	SHG	659
G 3B	TESTOVIRON DEPOT	SHG	659
J 6A	TETABULIN	IMM	659
J 6A	TETANUS ANTITOXIN	BER	659
J 1A	TETRA AMBEZIM	RIE	660
S 1D	TETRACAINE F	POS	660
D 6A	TETRACYCLINE	POS	660
J 1A	TETREX	BRI	661
R 5C2	THEO LITE	ABD	661
R 5C2	THEO LITE TAB	ABD	662
R 6A	THERALENE	THX	662
A11D1	THIOBANZYME	BOU	663
M1A2	THIODERAZINE	MID	663
V 2A	THIOTEPA	LED	663
H 3A	THYRANON	ORG	664
H 3A	THYROBOLIN	CHO	664
A11D1	TIAFA 300	LEP	664
J 1B	TIFOMYCINE	ROU	665
J 1H	TIKACILLIN 600,000	ASR	665

گروه‌درمانی	نام دارو	کارخانه	صفحه
J 1H	TIKACILLINE 1,000,000	ASR	665
D 1A1	TINADERM SOLUTION	SHC	665
CIE	TIOPHYLLIN	I.B.I.	666
N 6A	TOFRANIL	GGY	666
A10B	TOLINAS	UPJ	667
A11B4	TOLIVIT	TOL	667
M1A2	TOMANOL	BYK	667
A 13A	TONATONE	LUI	668
C 1C	TONICORINE	L.B.	668
N 2B	TONOPAN	SDZ	668
G 3B	TONOVAN	SHG	669
D 7B1	TOPIFRAM	ROU	670
A 4A	TORECAN	SDZ	670
S 1D	TOSMILEN 0.25	LNZ	671
J 6A	TOSUMAN	BER	671
D 8A	TOTAL	ALL	671
A 3A	TRAL GRADUMET	ABT	671
N 5A2	TRANQUINE	ABD	672
N 5A2	TRANQUIPAM	DOP	672
N 5A2	TRANQUIRIT	MDC	673
A 3C	TRANQUO ADAMON	AST	673
A 3C	TRANQUO BUSCOPAN	B.I.	673
B 2A	TRANSAMIN	DAI	674
B 5B1	TRANSFUSO-VAC	BAX	674
N 5A2	TRANXENE	C.B.	674
C 7A	TRASCIOR 80	CIB	675
V 3A	TRASYLOL	BAY	675
C 4A	TRENTAL	HOE	656
J 4A	TREVINTIX	THX	676
N 5B1	TRICLORYL	GLX	676
G 1A2	TRICOFURON VAGINAL POWDER	FAT	677
G 1A2	TRICOFURON VAGINAL SUPPO-SITORIES	EAT	677
A 11D1	TRIDOCELAN	ROU	677
A11D1	TRIDOCEMINE	ROU	678
R 5A	TRI-HISTA	ABD	678
N 5A1	TRILAFON	SHC	678
C 6A	TRINIDEX	BAX	679
C 10B	TRINITRINE RETARD	R.B.	679
B 3A2	TRINSICON	LLY	680
G 3B	TRIOLANDERN	CIB	680
J 1H	TRIPLOPEN	GLX	680
J 3B	TRI-S	ABD	681
A 2A1	TRISIBAM	DEL	681
A 9A	TRIZYMAL	B.M.	682
J 1K4	TROBICIN	UPJ	682
D 6A	TROFODERMIN	FIT	683
B 1A1	TROMEXAN	GGY	683
R 5D2	TROPHIRES	ROL	683
A 14A1	TROPHOBOLENE	SPR	684
N 6A	TRYPTIZOL	ABT	685
M 3A	TUBOCURIRINE CHLORIDE	ABT	685
R 5D2	TUSSICOF	ABD	685
R 5D1	TUSSILAR COUGH SYRUP	AVI	685
R 5C2	TUSSIPECT CODEINE	BET	686
R 1A2	TYZINE	PFZ	686
A 7B	ULTRACARBONE	MCK	687
B 7B1	ULTRACORTENOL	CIB	687
D 7A	ULTRALAN CREAM	SHG	687
D 7A	ULTRALAN OINTMENT	SHG	688
D 7A	ULTRALAN FATTY OINTMENT	SHG	688
H 2A2	ULTRALAN ORAL	SHG	688
A 7C	ULTRALEVURE	BCX	689
J 1H	ULTRAMOX	TOL	689
C 5A1	ULTRAPROCT	SHG	690
D 3A	UNGUEN TOLAN	SIE	690
A11B4	UNICAP CAP.	UPJ	691
A11A4	UNICAP THERAPEUTIC	UPJ	691
A15A	URABAMIN	K.U.	692
G 4A1	UROBIOTIC	PFZ	692
M 4A	URODAN	MED	692
M 4A	URODONAL	CHN	693
V 4A	UROGRAFIN	SHG	693
G 4A1	UROPOL	BRI	693
G 4A1	UROSPASMON	HEU	694
G 4B	UROSTOP	ZYM	694
C 1D1	USTIMON	LNZ	694
C 1D3	USTIMON COMPOSITUM	LNZ	695

گروه‌درمانی	نام دارو	کارخانه	صفحه
S 1D	UVELINE	CHI	695
P 1B	UVILON	BAY	695
B 5A1	VACOTRAN	BAX	697
G 1A2	VAGICOL OVULE	VIR	697
N 2B	VALADOL	SQB	697
D 7B1	VALISONE G	SHC	698
N 5A2	VALIUM	ROC	698
R 6A	VALLERGAN	M.B.	698
D 11A	VALY POMMAD	S.T.	698
P 1B	VANPAR	P.D.	699
P 1B	VANQUIN	P.D.	699
C 5A1	VARECORT	ZYM	699
C 4A	VASOBRIX 32	GUE	700
B 4A	VASOLEX	IDI	700
C 1D3	VASTAREL FORT	SRV	701
V 4A	VASURIX POLYVIDON	GUE	701
J 5A	V COLLYRE (JELL)	POS	701
J 1H	VEETIDS	SQB	702
V 2B	VELBE	LLY	702
J 1D	VELOSEF	SQB	702
J 1A	VENDARCIN	MYM	703
B 3B	VENEMA	FIT	703
C 5C	VENORUTON 10%	ZYM	704
R 3A	VENTILAT	MEV	704
R 3A2	VENTOLIN	A.H.	704
J 1C	VERSAPEN	M.J.	705
J 1A	VIBRAMYCIN	PFZ	705
J 1H	VICILIN	IRA	706
R 2A	VICKS	VIC	706
A11B2	VI-DAYLIN	ABT	706
A11B2	VI-DAYLIN WITH IRON	ABT	707
A11C3	VIDELTA	LED	707
A11B2	VIFORT	END	707
A11C2	VIGNATOL FORT	MCK	708
A 13A	VI-NUPHOS	A.H.	708
A11D1	VIONEURIN FORTE	CON	709
A11D1	VIONEURIN 6	CON	709
A11E1	VIPLEX	SQB	709
S 1D	VITA 3	FAU	710
A11E1	VITABEX	TOL	710
A11G1	VITA C EVA FORTE	EVA	710
N 5B4	VITABROL	FAZ	710
D 2A	VITADERM	TOL	711
S 1D	VITA-IODUROL	FAU	711
D 2A	VITAMARCIDERME	C.B.	711
A11C1	VITAMIN A		
S 1D	VITAMIN A OINTMENT	CHI	712
A11C3	VITAMIN A	POS	712
D 3A	VITAMIN A POM.	POS	712
A 5A	VITASEL	MRN	712
A11B4	VITATEN	D.P.	713
A13A	VITATHION (A.T.P.)	SRV	713
A11A4	VITERRA	PFZ	714
N 5A1	V-M	MIN	714
A 4A	VOGALENE	THX	714
R 6A	VOMYCINE	MYC	715
R 5D2	WHOOPING COUGH	BOO	716
A14A1	WINSTROL	WIN	715
C 1C	WYAMINE	WYE	717
A 6A2	X PREP	SIG	718
N 1B	XYLOCAINE HEAVY	ASR	718
N 1A2	XYLOCAINE INJECTION	ASR	718
N 1B	XYLOCAINE JELLY	ASR	719
D 4A	XYLOCAINE OINTMENT	ASR	719
N 1B	XYLOCAINE SPRAY 10	ASR	719
N 1B	XYLOCAINE SOLUTION	ASR	719
N 1B	XYLOCAINE VISCOUS	ASR	720
C 5A1	XYLOPROCT OINTMENT	ASR	720
P 1B	YOMESAN	BAY	721
N 2B	ZACTIRIN	WYE	722
N 3A	ZARONTIN	P.D.	722
S 1D	ZINCFRIN	ALC	722
M 4A	ZYLORIC	WEL	723
A 9A	ZYMET	P.D.	723

علائم اختصاری کارخانه‌های داروسازی

در سمت چپ هر ستون نام کارخانه‌های داروسازی و در سمت راست علایم اختصاری شان آمده است . در متن کتاب به علایم اختصاری سه حرفی اشاره رفته است .

ABBOTT	ABT	BEIERSDORF	BEI
ABIDI	ABD	BELP	BEP
AEROCID	AER	BENCARD	BEN
AGUETTANT	AGU	BENGER	BEG
ALCON	ALC	BENZON	BEZ
ALLARD	ALR	BERNA	BER
ALLCOCK'S	ALK	BERTHIER DEROL	B.D.
ALLEN & HANBURYS	A.H	BIO	BIO
ALLERGAN	ALL	BIO STRATH	BTH
AMERICAN APOTHEC.	A. A.	BIOBASAL	BBS
AMSTER. (A. C. F.)	ACF	BIOCHEMIE	BCH
ANA	ANA	BIOCODEX	BCX
ANKERMANN	ANK	BIOMALT	BMT
ARCHIFAR	ARF	BIOSTABILEX	BST
ARCO	ARC	BIOTHERAX	BIT
ARMOUR	ARM	BOEHRING HOECHST	B.H.
ARON	ARO	BOEHRINGER I.	B. I.
ASTA	AST	BOEHRINGER M.	B. M.
ASTRA	ASR	BOOTS	BOO
ATRA	ATR	BORDEN	BOR
AVICENNE	AVI	BOUCHARA	BOU
AYERST	AYE	BOUCHARD	BOD
BACILLOL	BAC	BOUILLET	BOI
BAKER	BAK	BOUTY	BTY
BAXTER	BAX	BRAL	BRL
BANEW	BNW	BRISSON	BRS
BANYU	BAN	BRISTOL	BRI
BAYER	BAY	BRITISH SCHERING	B.S.
BEAUFOUR	BEA	BRUNEAU	BRN
BEECHAM R.	BEE	BRYANT	BRY

BYK GULDEN	BYK
C C F	CCF
CART WRIGHT	CAR
CARTER WALLACE	C.W.
CEDONA	CED
CENTRAL PHARMACAL	C.P.
CHANTEREAU	CHA
CHARPENTIER	CHR
CHATELAIN	CHN
CHEMEDICA	CHE
CHEMIFARM	CHF
CHEMOFUX	CHM
CHIBRET	CHI
CHIESI	CHS
CHIGAII	CGA
CHIMICAL	CHC
CHOAY	CHO
CIBA	CIB
CILAG	CIL
CLAIR	CLA
CLIN BYLA	C.B.
COD LIVER	COD
COIRRE	COI
COMELCO	COM
CONTINENTAL PHARMA	CON
COPHAR	COP
CORBIERE	COR
COW & GATE	COW
DAGRA	DAG
DAIICHI	DAI
DALTAN	DLT
DANIEL BRUNET	DAN
DAROU PAKHSH	D.P.
DAUSSE	DAU
DAVIS & LAWRENCE	DAV
DEBAT	DEB
DELAGRANGE	DGR
DELALANDE	DEL
DELCON	DLC
DENVER	DEN
DERMON	DER
DESCHIENS	DES
DESITIN	DET
DIADAL	D.D
DIAMANT	DIA
DIASAN	DIN
DIEDENHOFEN	DIE
DITRAX	DTX
DIVAFARM	DIV

DOLDER	DOL
DOMO	DOO
DOMPE	DOM
DON BAXTER	BAX
DOPAR	DOP
DUCATTE	DUC
DUMEX	DUM
DUPHAR	DUP
DUTRAD	DUT
DYSPNE INHAL	DYS
EATON	EAT
EBEWE	EBE
EBI	EBI
EGIC	EGI
EJICE	EJI
ELI LILLY	LLY
ENDO	END
ERBA	ERB
ERCOPHARM	ERC
ETEPHA	ETE
EVA	EVA
EVANS	EVS
EXPORTERS	EXP
FABRIC	FBC
FALI	FAL
FAMEL	FAM
FARABI	FAR
FARLEYS	FRL
FARMAN	FAN
FARMITALIA	FIT
FAURE	FAU
FAZ	FAZ
FELANDER DIETETION	FED
FERROSAN	FRR
FISONS	FIS
FOURNIER	FOU
FRAYSSE	FRA
FREDERICK	FRE
FROMONT	FRO
GARRY LORD	G.L.
G. POHL-BOSKAMP	GPL
GEIGY	GGY
GEISTLICH	GEI
GERBER	GRB
GERDA	GER
GLAXO	GLX
GOL	GOL
GOLD LEAF	G.L.

GROSSMANN	GRM
GRUENENTHAL	GRT
GUERBET	GUE
GUIGOZ	GUI
HACO	HAC
HADENSA	HAD
HAMODERIVATE	HVT
HANKEL	HNK
HAUSER	HAU
HAUSMANN	HAN
HELTIS	HEL
HEPATROL	HEP
HERMES	HER
HEUMANN	HEU
HOCHDORF	HOC
HOECHST	HOE
HOLLAND	HOL
HOMBURG	HOM
HOR	HR.
HORLICKS	HKS
HOUDE	HOU
HOUR	HOR
I.B.I.	IBI
I.C.I.	ICI
I.D.I.	IDI
IBSA	IBS
ICAR	ICA
IFI	IFI
IMEKO	IMK
IMMUNO	IMM
INNOTHERA	INN
IRAN DRUG	IRA
ISM	ISM
J.R. FREYSSINGE	JRF
JACQUEMAIRE	JAC
JANSSEN	JAN
JOHNSON & JOHNSON	J. J.
JOULLIE	JOU
KABI	KAB
KAZEMI	KAZ
KIRBY	KIR
KLOSTERFRAU	KLF
KNOLL	KNO
KNOX	KNX
KREMERS URBAN	K.U.
KYOWA	KYO

L'EQUILIBRE BIOL.	LEQ
LABAZ	LAB
LABRANO	LAN
LACROIX	LAC
LAGAP	LAG
LAKESIDE	LAK
LALEUF	LAL
LALON	LAO
LAMBDA	LAM
LANDA	LAD
LARANOW	LAR
LATEMA	LAT
LAUSANNE	LAU
LAVRIL	LAV
LEDERLE	LED
LEK	LEK
LELONG	LEL
LEMATTE & BOINOT	L.B.
LEO	LEO
LEO SWEDEN	L.S.
LEPETIT	LEP
LEPRESTRE	LPR
LIBS	LIB
LIDANO'	LID
LIJEMPF	LJF
LIMPHE	LIM
LINZ	LNZ
LOGEAIS	LOG
LUGANO	LUG
LUITPOLD	LUI
LUNDBECK	LUN
LYOCENTRE	LYO
LYSOFORM	LYS
MACK	MAC
MADAUS	MDS
MALHE	MAL
MARCOPHARM	MAR
MARIN	MRN
MARTINET	MRT
MATERNA SULGEN	M.S.
MAUCHANT	MAU
MAX	MAX
MAX ZELLER	M.Z.
MAY & BAKER	M.B.
MCKESSON	MCS
MEAD JOHNSON	M.J.
MEDEXPORT	MED
MEDIAL	MEL
MEDICAMENTA	MDC
MEDICHEM	MEM

MEDINOVA	MEV
MEIJI	MEI
MEPHA	MEP
MERCK AG	MCK
MERCK SHARP DOHME	MSD
MERRELL TORAUDE	M.T.
MERZ	MER
METADIER	MET
MIDY	MID
MILCO	MCO
MILLOT	MIL
MILUPA	MLP
MINA	MIN
MONT BLANC	MON
MORGAN	MOR
MORINAGA	MOG
MOSACK	MOS
MURINE	MUR
MY BOY	MYB
MYCINE	MYC
MYCOFARM	MYM
MYLAN	MYL
NAPP	NAP
NATIVELLE	NLL
NATTERMANN	NAT
NEMATODIN AG.	NEM
NEO CHEMICAL	NEO
NESTLE	NES
NICHOLAS	NIC
NIMIZ	NIM
NION CORP.	NIO
NORDMARK	NOR
NORGINE	NRG
NORMA	NRM
NORWICH	NRW
NOVO	NOV
NUTRICIA	NUT
OBERLIN	OBE
OBERVAL	OBR
OM	OM-
ONO	ONO
OPOCHIMIOTHERAPIE	OPO
OPTREX	OPT
ORGANON	ORG
ORMONOTER & RICHTER	ORM
ORTHO	ORT
OTTO MULLER	OTT

PANTADYN	PAN
PARK	PAR
PARKE DAVIS	P.D.
PFIZER	PFZ
PFRIMMER	PFR
PHARABI	PHB
PHARIA	PHR
PHARMACHIMIE	PRA
PHARMACIA	PHC
PHARMACOLOGIE	PHA
PHARMASCIENCE	PHS
PHARMATON	PHT
PHARMAX	PHM
PIERREL	PIE
PINARD	PIN
PINHEIROS	PIH
PLANTIER	PLA
PLOUGH	PLO
POLI CHIMICA	P.C.
POHLBO SKAMP	P.B.
PORCHER	POR
POS	POS
PREMO	PRE
PRESTIPHARM	PST
PROBIOS	PRO
PROMEDICA	PRC
PROMONTA	PRT
PROTO	POO
PURDUE FREDERICK	PUR
RABRO	RAB
RAMIN	RAM
RAVIZZA	RAV
RAZI	RAZ
RECHERCHES	REC
RECKITT & COLMAN	REK
RECTERS	RES
REMEDIES WEBER	REM
RICHTER	RIE
RIKER	RIK
RIO CHEMICAL	RIC
RIT	RIT
RITA	RIA
ROBAPHARM	ROB
ROBERT & CARRIERE	R.C.
ROBIN	RON
ROBINS	RBS
ROC	RCO
ROCHE	ROC

ROGE	ROG
ROGER BELLON	R.B.
ROGER FOSSE	R.F.
ROHA	RHA
ROLLAND	ROL
RONCHESE	ROH
ROPHARMA	ROP
RORER	ROE
ROSA	ROA
ROSEMANN	RSM
ROTER	ROT
ROUSSEL	ROU
ROWA WAGNER	R.W.
RUZA	RUZ
S. T.	S-T
SANAIE SHIRE	S S
SANDERS	SAN
SANDOZ	SDZ
SANKYO	SAY
SANOL	SNL
SANTA	SNT
SAREP	SAR
SARGFT	SAE
SAUTER	SAU
SAV.A	SAV
SAVA PHARM	SAP
SCHERER	SCR
SCHERINGAG	SHG
SCHERING CORP.	SHC
SCHOUM	SCH
SCIENTIA	SCI
SEARLE	SEA
SECTA	SEC
SELVI	SEL
SERONO	SER
SERVIER	SRV
SERVIPHARM	SPH
SEVENAT	SEV
SIEGFRIED	SIE
SIGMA	SIG
SILBE	SIL
SINA	SIN
SIPIC	SIP
SMITH KLINE FRENCH	SKF
SMITH NEPHEW	S N
SOLCO	SOL
SOPAR	SOP
SOPHARMA	SOM
SPECIA	SPE
SPRET	SPR

SQUIBB	SQB
STEINER	STE
STERLING WINTHROP	WIN
STIEFEL	SFL
SUJAL	SUJ
SWISS MILK	SWI
T. I. G.	TIG
TANABE	TAN
TECNIPHARMA	TEC
TEDEE	TEE
TEMMLER WERKE	TMM
TEVA	TEV
THERAMEX	THR
THERAPEUTIQUE	THE
THERAPLIX	THX
THILO	THI
TISMA	TSM
TOLIDARU	TOL
TOTAL	TOT
TRITON	TRI
TROPONWERKE	TPW
U. C. B.	UCB
UNI CHEMIE	UNC
UNIDENT MANUFACTUR	UND
UNIGREG	UNG
UNILABO	UNI
UPJOHN	UPJ
UPSA	UPS
US ETHICALS	UET
VALPAN	VAL
VEVY	VEV
VEYRON	VEY
VICK INTERNATIONAL	VIC
VIFOR	VIF
VIO	VIO
VIRA	VIR
VIROL	VRL
VITAL	VIT
VITAMINS LTD	USV
VITARINE	VTR
VITAVAN	VTV
VITTEL	VTT
WALLACE	WAL
WANDER	WAN
WARNER LAMBERT	W. L.
WELLCOME	WEL

WHITE	WHI
WHITEHALL	WHL
WULFING	WUL
WYETH	WYE
ZOJA	ZOJ
ZYMA	ZYM

طبقه‌بندی درمانی

در این فهرست طبقه‌بندی فارماکولوژیک داروها برحسب دستگاه تشریحی و اعضاء مختلف انسان آمده است. حروف و اعداد سمت چپ گروه یا کد درمانی مربوط به هر عنوان است که در بخش‌های مختلف کتاب بآن اشاره رفته است.

ANATOMICAL CLASSIFICATION

A ALIMENTARY TRACT AND METABOLISM

A1		**STOMATOLOGICALS, MOUTH PREPARATIONS, MEDICINAL DENTIFRICES ETC.**
A	1A	STOMATOLOGICALS
A2		**ANTACIDS, ANTI-FLATULENTS AND ANTI-PEPTIC ULCERANTS**
A	2A	ANTACIDS, ANTI-FLATULENTS
A	2A1	PLAIN ANTACIDS
A	2A2	PLAIN ANTI-FLATULENTS
A	2A3	ANTACIDS WITH ANTI-SPASMODICS
A	2A4	ANTACIDS WITH ANTI-FLATULENTS
A	2A5	ANTACIDS WITH ANTI-FLATULENTS AND ANTI-SPASMODICS
A	2A6	ANTACIDS WITH OTHER DRUGS
A	2A7	ANTI-FLATULENTS WITH OTHER DRUGS
A	2B	ANTI-PEPTIC ULCERS
A	2C	OTHERS
A3		**GASTROINTESTINAL ANTI-SPASMODICS AND ANTI-CHOLINERGICS**
A	3A	SYNTHETICS
A	3B	BELLADONNAS AND DERIVATIVES
A	3C	ATARACTIC COMBINATIONS
A	3D	ANALGESIC COMBINATIONS
A	3E	OTHER COMBINATIONS
A4		**ANTI-EMETICS AND ANTI-NAUSEANTS**
A	4A	ANTI-EMETICS AND ANTI-NAUSEANTS
A5		**CHOLAGOGUES AND HEPATIC PROTECTORS**
A	5A	BILE THERAPY, CHOLAGOGUES AND CHOLERETICS
A	5B	HEPATIC PROTECTORS, LIPOTROPICS
A	5C	CHOLAGOGUES, LIPOTROPIC COMBINATIONS

A6		**LAXATIVES**
A	6A	LAXATIVES
A	6A1	SOFTENERS AND EMOLLIENTS
A	6A2	IRRITANTS AND STIMULANTS
A	6A3	BULK PRODUCERS
A	6A4	ENEMAS
A	6A5	ORAL SALINE PREPARATIONS
A	6A6	OTHERS, INCLUDING COMBINTIONS
A 7		**ANTI-DIARRHOEALS AND INTESTINAL DISINFECTANTS**
A	7A	INTESTINAL ANTI-INFECTIVES AND OTHER COMBINATIONS
A	7A1	PLAIN ANTI-INFECTIVES
A	7A2	COMBINATIONS
A	7B	INTESTINAL ADSORBENTS
A	7C	OTHERS, INCLUDING LACTIC FERMENTS AND YEAST
A 8		**ANTI-OBESITY PREPARATIONS EXCLUDING DIETETICS**
A	8A	ANTI-OBESITY PREPARATIONS EXCLUDING DIETECS
A	8A1	AMPHETAMINE PLAIN
A	8A2	AMPHETAMINE COMBINATIONS
A	8A3	OTHER CENTRALLY ACTING ANTI-OBESITY PRODUCTS, PLAIN
A	8A4	OTHER CENTRALLY ACTING ANTI-OBESITY, COMBINATIONS
A	8A5	OTHER ANTI-OBESITY PREPARATIONS
A 9		**DIGESTIVES, INCLUDING DIGESTIVE ENZYMES**
A	9A	DIGESTIVES, INCLUDING ENZYMES
A 10		**ANTI-DIABETIC THERAPY**
A	10A	INSULINES AND OTHER PARENTERALS
A	10B	ORAL ANTI-DIABETICS
A 11		**VITAMINS**
A	11A	MULTIVITAMINS WITH MINERALS
A	11A1	PRENATAL
A	11A2	PAEDIATRIC
A	11A3	GERIATRIC
A	11A4	OTHERS
A	11B	MULTIVITAMINS WITHOUT MINERALS
A	11B1	PRENATAL
A	11B2	PAEDIATRIC
A	11B3	GERIATRIC
A	11B4	OTHERS
A	11C	VITAMIN A AND D, INCLUDING SIMPLE COMBINATIONS
A	11C1	PLAIN A
A	11C2	PLAIN D

A 11C3 COMBINATIONS

A 11D VITAMIN B1, PLAIN AND COMBINATIONS OF B1, B6, B12
A 11D1 VITAMIN B1, PLAIN OR WITH B6 AND B12
A 11D2 VITAMIN B1, B6, B12 WITH OTHER DRUGS

A 11E VITAMIN B COMPLEX
A 11E1 B COMPLEX PLAIN
A 11E2 B COMPLEX WITH VITAMIN C
A 11E3 OTHER COMBINATIONS

A 11F VITAMIN B12 PLAIN
A 11G VITAMIN C, INCLUDING COMBINATIONS WITH MINERALS
A 11G1 PLAIN VITAMIN C
A 11G2 VITAMIN C WITH COMBINATIONS

A 11H OTHER PLAIN VITAMINS EXCLUDING K AND P
A 11H1 NICOTINIC ACID
A 11H2 VITAMIN B6
A 11H3 OTHERS

A 11J ALL OTHERS

A 12 MINERAL SUPPLEMENTS
A 12A CALCIUM
A 12B POTASSIUM
A 12C OTHER MINERAL SUPPLEMENTS

A 13 TONICS
A 13A TONICS

A 14 ANABOLICS, SYSTEMIC
A 14A ANABOLIC HORMONES
A 14A1 PLAIN ANABOLIC HORMONES
A 14A2 ANABOLIC HORMONES WITH VITAMINS ONLY
A 14A3 OTHER ANABOLIC HORMONE COMBINATIONS

A 14B OTHER ANABOLIC AGENTS

A 15 APPETITE STIMULANTS
A 15A APPETITE STIMULANTS

A 16 OTHER ALIMENTARY TRACT AND METABOLISM PRODUCTS
A 16A OTHER ALIMENTARY TRACT AND METABOLISM PRODUCTS

B BLOOD AND BLOOD FORMING ORGANS

B1 ANTI-COAGULANTS
B 1A1 ANTI-COAGULANTS ORAL

B 1A2 ANTI-COAGULANTS INJECTABLE

B 2 ANTI-HAEMMORRAGICS

B 2A ANTI-FIBRINOLYTICS
B 2B VITAMIN K AND OTHERS

B 3 ANTI-ANAEMIC PREPARATIONS

B 3A HAEMATINICS, IRON AND ALL COMBINATIONS
B 3A1 PLAIN IRON
B 3A2 COMBINATIONS

B 3B LIVER EXTRACTS AND COMBINATIONS WITH B12
B 3C OTHER, INCLUDING PLAIN FOLIC ACID

B4 CHOLESTEROL REDUCERS AND ANTI-ATHEROMA PREPARATIONS

B 4A CHOLESTEROL REDUCERS AND ANTI-ATHEROMA PREPARATIONS

B5 PLASMA SUBSTITUTES AND PERFUSION SOLUTIONS

B 5A BLOOD AND RELATED
B 5A1 PLASMA SUBSTITUTES INCLUDING DEXTRAN
B 5A2 WHOLE BLOOD AND PRODUCTS OF WHOLE BLOOD INCLUDING PLASMA AND PLASMA FRACTIONS
B 5A3 OTHERS

B 5B I.V. SOLUTIONS OVER 50 CC
B 5B1 DEXTROSE
B 5B2 ELECTROLYTES
B 5B3 NORMAL SALINE
B 5B4 OTHERS

B 5C IRRIGATING SOLUTIONS
B 5D PERITONEAL DIALYTICS
B 5E I.V. SOLUTIONS UNDER 50 CC

B 6 OTHER HAEMATOLOGICAL AGENTS, INCLUDING FIBRINOLYTICS AND HYALURONIDASE

B 6A OTHER HAEMATOLOGICAL AGENTS, INCLUDING FIBRINOLYTICS AND HYALURONIDASE
B 6A1 SYSTEMIC
B 6A2 TOPICAL

C CARDIOVASCULAR SYSTEM

C1 CARDIAC THERAPY

C 1A CARDIAC GLYCOSIDES AND COMBINATIONS
C 1A1 PLAIN CARDIAC GLYCOSIDES
C 1A2 CARDIAC GLYCOSIDES COMBINATIONS

C 1B ANTI-ARRHYTHMICS
C 1C CARDIAC STIMULANTS

C 1D MYOCARDIAL THERAPY
C 1D1 CORONARY VASODILATORS
C 1D3 NITRITES AND ANALOGOUS PRODUCTS

C 1E OTHER CARDIAC AND CORONARY PRODUCTS

C 2 HYPOTENSIVES

C 2A RAUWOLFIA ALKALOIDS AND DERIVATIVES, PLAIN AND IN COMBINATION, EXCLUDING COMBINATIONS WITH DIURETICS

C 2B SYNTHETIC HYPOTENSIVES, PLAIN AND IN COMBINATION EXCLUDING COMBINATIONS WITH DIURETICS

C 2C RAUWOLFIA DIURETIC COMBINATIONS

C 2C1 RAUWOLFIA/DIURETIC COMBINATIONS
C 2C2 SYNTHETIC HYPOTENSIVE/DIURETIC COMBINTATIONS

C 2D OTHER HYPOTENSIVES

C 3 DIURETICS

C 3A THIAZIDES PLAIN AND IN COMBINATIONS
C 3B OTHER DIURETICS

C 4 PERIPHERAL VASODILATORS

C 4A PERIPHERAL VASODILATORS

C 5 VASOPROTECTIVES

C 5A TOPICAL ANTI-HAEMORRHOIDALS
C 5A1 TOPICAL ANTI-HAEMORRHOIDALS WITH CORTICOSTEROIDS
C 5A2 TOPICAL ANTI-HAEMORRHOIDALS WITHOUT CORTICOSTEROIDS

C 5B VARICOSE THERAPY, TROPICAL
C 5C VARICOSE THERAPY, SYSTEMIC

C 6 OTHER CARDIAC AND CIRCULATORY PRODUCTS

C 6A OTHER CARDIAC AND CIRCULATORY PRODUCTS

C 7 BETA-BLOCKING AGENTS

C 7A BETA-BLOCKING AGENTS, PLAINS

C 7B BETA-BLOCKING AGENTS, COMBINATIONS
C 7B1 COMBINATIONS WITH ANTI-HYPERTENSIVES AND/OR DIURETICS
C 7B2 COMBINATIONS WITH OTHER DRUGS OF GROUP C
C 7B3 COMBINATIONS WITH ALL OTHER DRUGS

D DERMATOLOGICALS

D 1 ANTI-FUNGALS, DERMATOLOGICAL

D 1A ANTI-FUNGALS, DERMATOLOGICAL
D 1A1 TOPICAL
D 1A2 SYSTEMIC, GRISEOFULVIN-TYPE PRODUCTS

D 2 EMOLLIENTS AND PROTECTIVES

D 2A EMOLLIENTS AND PROTECTIVES

D 3 WOUND-HEALING AGENTS

D 3A CICATRISANTS, EXCLUDING MEDICATED DRESSINGS

D 4 ANTI-PRORITICS, INCLUDING TOPICAL ANTIHISTAMINES, ANAESTHETICS ETC.

D 4A ANTI-PRURITICS, INCLUDING TOPICAL ANTIHISTAMINES, ANAESTHETICS ETC.

D 5 COAL TAR, SULPHUR AND RESORCIN PREPARATIONS, NOT OTHERWISE CLASSIFIED

D 5A COAL TAR, SULPHUR AND RESORCIN PREPARATIONS

D 6 TOPICAL ANTIBIOTICS AND SULPHONAMIDES EXCLUDING COMBINATIONS WITH STEROIDS

D 6A TOPICAL ANTIBIOTICS PLAIN
D 6B TOPICAL SULPHONAMIDES PLAIN
D 6C TOPICAL ANTIBIOTICS WITH SULPHONAMIDES

D 7 TOPICAL CORTICOSTEROIDS

D 7A TOPICAL CORTICOSTEROIDS PLAIN

D 7B TOPICAL CORTICOSTEROIDS COMBINATIONS
D 7B1 COMB. OF STEROIDS WITH ANTIBACTERIALS
D 7B2 COMB. OF STEROIDS WITH ANTIFUGALS
D 7B3 COMB. OF STEROIDS WITH ANTIBACTERIALS AND ANTIFUNGALS
D 7B4 OTHER COMBINATIONS

D 8 ANTISEPTICS AND DISINFECTANTS, EXCLUDING MEDICATED DRESSINGS

D 8A ANTISEPTICS AND DISINFECTANTS, EXCLUDING MEDICATED DRESSINGS

D 9 MEDICATED DRESSINGS

D 9A MEDICATED DRESSINGS

D 10 ANTI-ACNE PREPARATIONS

D 10A ANTI-ACNE PREPARATIONS

D 11 OTHER DERMATOLOGICAL PREPARATIONS, INCLUDING MEDICATED SHAMPOOS

D 11A OTHER DERMATOLOGICAL PREPARATIONS, INCLUDING MEDICATED SHAMPOOS

G GENITO-URINARY SYSTEM AND SEX HORMONES

G 1 GYNAECOLOGICAL ANTI-INFECTIVES

G 1A GYNAECOLOGICAL ANTI-INFECTIVES
G 1A1 SYSTEMIC
G 1A2 TOPICAL

G 2 OTHER GYNAECOLOGICALS

G 2A OXYTOCICS
G 2B TOPICAL CONTRACEPTIVES
G 2C OTHER GYNAECOLOGICALS

G 3 SEX HORMONES AND STIMULANTS OF GENITAL SYSTEM

G 3A HORMONAL CONTRACEPTIVES, NOT-TOPICAL
G 3B ANDROGENS AND COMBINATIONS, EXCLUDING G 3E, G 3F
G 3C OESTROGENS AND COMBINATIONS, EXCLUDING G 3E, G 3F
G 3D PROGESTOGENS AND COMBINATIONS EXCLUDING G 3F

G 3E ANDROGEN WITH FEMALE HORMONE COMBINATIONS
G 3E1 ANDROGEN AND OESTROGEN
G 3E2 ANDROGEN AND PROGESTOGEN
G 3E3 ANDROGEN AND OESTROGEN AND PROGESTOGEN

G 3F OESTROGEN WITH PROGESTOGEN COMBINATIONS
G 3G GONADOTROPHINS INCLUDING OTHER OVULATIONS STIMULANTS-e.g. CLOMIPHENE CITRATE
G 3H OTHER SEX HORMONES

G 4 UROLOGICALS

G 4A URINARY ANTISEPTICS AND ANTI-INFECTIVES
G 4A1 SPECIFIC SULPHONAMIDES AND COMBINATIONS WITH ANTIBIOTICS
G 4A2 OTHER URINARY ANTISEPTICS

G 4B OTHER UROLOGICAL PREPARATIONS INCLUDING GENITO-URINARY TRACT ANTI-SPASMODICS

H SYSTEMIC HORMONAL PREPARATIONS EXCLUDING SEX HORMONES

H 1 ACTH

H 1A ACTH

H 2 SYSTEMIC CORTICOSTEROIDS

H 2A SYSTEMIC CORTICOSTEROIDS PLAIN
H 2A1 INJECTABLE
H 2A2 ORAL
H 2A3 OTHERS

H 2B SYSTEMIC CORTICOSTEROIDS COMBINATIONS
H 2B1 INJECTABLE
H 2B2 ORAL
H 2B3 OTHERS

H 3 THYROID THERAPY

H 3A THYROID PREPARATIONS
H 3B ANTI-THYROID PREPARATIONS
H 3C IODINE THERAPY

H 4 ALL OTHER HORMONES

H 4A ALL OTHER HORMONES INCLUDING GLUCAGON

J GENERAL ANTI-INFECTIVES, SYSTEMIC

J 1 ANTIBIOTICS, SYSTEMIC INCLUDING TRIMETHOPRIM

J 1A TETRACYCLINES AND COMBINATIONS
J 1B CHLORAMPHENICOLS AND COMBINATIONS
J 1C AMPICILLIN AND SIMILAR TYPES
J 1D CEPHALOSPORINS
J 1E TRIMETHOPRIM COMBINATIONS AND SIMILARS
J 1F MACROLIDES AND SIMILAR TYPES
J 1G STREPTOMYCINS AND COMBINATIONS BETWEEN THEMSELVES
J 1H OTHER PENICILLINS
J 1J PENICILLIN STREPTOMYCIN COMBINATIONS

J 1K ALL OTHER ANTIBIOTICS
J 1K1 AMINOGLYCOSIDES
J 1K2 CARBENICILLIN AND SIMILAR TYPES
J 1K3 RIFAMPICIN/RIFAMYCIN
J 1K4 ALL OTHER ANTIBIOTICS

J 2 SYSTEMIC AGENTS FOR FUNGAL INFECTIONS, EXCLUDING GRISEOFULVIN

J 2A SYSTEMIC AGENTS FOR FUNGAL INFECTIONS, EXCLUDING GRISEOFULVIN

J 3 SULPHONAMIDES

J 3A PLAIN SULPHONAMIDES
J 3B SULPHONAMIDE ANTIBIOTIC COMBINATIONS, EXCLUDING TRIMETHOPRIM COMBINATIONS

J 4 TUBERCULOSTATICS, EXCLUDING STREPTOMYCIN

J 4A TUBERCULOSTATICS, EXCLUDING STREPTOMYCIN

J 5 ANTIVIRALS, EXCLUDING VACCINES

J 5A ANTIVIRALS, EXCLUDING VACCINES

J 6 SERA AND GAMMA GLOBULIN

J 6A SERA AND GAMMA GLOBULIN

J 7 VACCINES

J 7A VACCINES

J 8 OTHER ANTI-INFECTIVES/ANTIBACTERIALS, INCLUDING LEPROSTATICS

J 8A OTHER ANTI-INFECTIVES/ANTIBACTERIALS, INCLUDING LEPROSTATICS

M MUSCULO-SKELETAL SYSTEM

M 1 ANTI-INFLAMMATORY AND ANTI-RHEUMATIC PRODUCTS

M 1A ANTI-RHEUMATIC NON-STEROIDS
M 1A1 PLAIN
M 1A2 COMBINATION

M 1B ANTI-RHEUMATIC CORTICOSTEROID COMBINATIONS

M 2 TOPICAL ANTI-RHEUMATICS RUBEFACIENTS

M 2A TOPICAL ANTI-RHEUMATICS RUBEFACIENTS

M 3 MUSCLE RELAXANTS

M 3A MUSCLE RELAXANTS, INJECTABLE

M 3B OTHER SYSTEMICS
M 3B1 PLAIN
M 3B2 COMBINATIONS

M 4 ANTI-GOUT PREPARATIONS

M 4A ANTI-GOUT PREPARATIONS

M 5 OTHER DRUGS FOR DISORDERS OF MUSCULO-SKELETAL SYSTEM

M 5A OTHER DRUGS FOR DISORDERS OF MUSCULO-SKELETAL SYSTEM

N CENTRAL NERVOUS SYSTEM

N1 ANAESTHETICS

N 1A ANAESTHETICS, GENERAL
N 1A1 INHALATION PREPARATIONS
N 1A2 INJECTABLE
N 1B ANAESTHETICS LOCAL, EXCEPT DERMATOLOGICALS

N 2 ANALGESICS

N 2A NARCOTICS
N 2B NON-NARCOTICS AND ANTI-PYRETICS
N 2C ANTI-MIGRAINE PREPARATIONS

N 3 ANTI-EPILEPTICS

N 3A ANTI-EPILEPTICS

N4 ANTI-PARKINSON DRUGS

N 4A ANTI-PARKINSON DRUGS
N 4A1 INTRAVENOUS
N 4A2 OTHERS

N 5 PSYCHOLEPTICS

N 5A ATARACTICS
N 5A1 NEUROLEPTICS
N 5A2 TRANQUILLISERS

N 5B HYPNOTICS AND SEDATIVES
N 5B1 NON-BARBITURATES, PLAIN
N 5B2 NON-BARBITURATE COMBINATIONS
N 5B3 BARBITURATES, PLAIN
N 5B4 BARBITURATE COMBINATIONS

N 6 PSYCHO-ANALEPTICS, EXCLUDING ANTI-OBESITY PREPARATIONS – SEE A 8A1, A 8A2, A 8A3, A8A4

N 6A ANTI-DEPRESSANTS, THYMO-ANALEPTICS
N 6B PSYCHO-STIMULANTS AND NEUROTONICS EXCLUDING AMPHETAMINES
N 6C PSYCHOLEPTIC-PSYCHO-ANALEPTIC COMBINATIONS

N 7 OTHER CNS DRUGS, INCLUDING PARA-SYMPATHETIC AGENTS

N 7A OTHER CNS DRUGS, INCLUDING PARA-SYMPATHETIC AGENTS

P PARASITOLOGY

P 1 ANTI-PARASITIC PRODUCTS

P 1A AMOEBICIDES
P 1B ANTHELMINITICS, EXCLUDING SCHISTOSOMICIDES
P 1C SCHISTOSOMICIDES
P 1D ANTI-MALARIALS
P 1E SCABICIDES
P 1F ECTOPARASITICIDES, EXCLUDING SCABICIDES
P 1G OTHER ANTI-PARASITIC AGENTS

R RESPIRATORY SYSTEM

R 1 NASAL DECONGESTANTS AND ANTI-INFECTIVES

R 1A NASAL DECONGESTANTS AND ANTI-INFECTIVES, TOPICAL
R 1A1 PLAIN CORTICOSTEROIDS
R 1A2 PLAIN NON CORTICOSTEROIDS
R 1A3 CORTICOSTEROIDS WITH ANTI-INFECTIVES
R 1A4 NON-CORTICOSTEROIDS WITH ANTI-INFECTIVES
R 1A5 OTHERS

R 2 PHARYNGEAL DECONGESTANTS AND ANTI-INFECTIVES

R 2A PHARYNGEAL DECONGESTANTS AND ANTI-INFECTIVES

R 3 ANTI-ASTHMATICS

R 3A BRONCHODILATORS AND OTHER ANTI-ASTHMATICS
R 3A1 INHALANTS
R 3A2 OTHERS

R 3B OTHER ANTI-ASTHMATICS AND RESPIRATORY STIMULANTS

R 4 CHEST RUBS AND OTHER INHALANTS

R 4A CHEST RUBS AND OTHER INHALANTS

R 5 COUGH AND COLD PREPARATIONS

R 5A COLD PREPARATIONS WITHOUT ANTI-INFECTIVES
R 5B COLD PREPARATIONS WITH ANTI-INFECTIVES

R 5C COUGH PREPARATIONS, INCLUDING BALSAMICS
R 5C1 COUGH PREPARATIONS WITH ANTI-INFECTIVES
R 5C2 EXPECTORANTS

R 5D ANTITUSSIVES
R 5D1 PLAIN ANTITUSSIVES
R 5D2 ANTITUSSIVES IN COMBINATIONS

R 5E SYSTEMIC NASAL DECONGESTANTS AND ANTI-INFECTIVES
R 5F OTHER COUGH AND COLD PREPARATIONS

R6 SYSTEMIC, ANTIHISTAMINES
R 6A SYSTEMIC, ANTIHISTAMINES

R7 OTHER RESPIRATORY SYSTEM PRODUCTS
R 7A OTHER RESPIRATORY SYSTEM PRODUCTS

S SENSORY ORGANS

S 1 OPHTHALMOLOGICALS
S 1A ANTI-INFECTIVES
S 1B CORTICOSTEROIDS,PLAIN
S 1C CORTICOSTEROID ANTI-INFECTIVE,COMBINATIONS
S 1D OTHERS

S 2 OTOLOGICALS
S 2A ANTI-INFECTIVES
S 2B CORTICOSTEROIDS PLAIN
S 2C CORTICOSTEROID ANTI-INFECTIVE COMBINATIONS
S 2D OTHERS

S 3 OPHTHALMOLOGICAL-OTOLOGICAL COMBINATIONS
S 3A ANTI-INFECTIVES
S 3B CORTICOSTEROIDS PLAIN
S 3C CORTICOSTEROIDS ANTI-INFECTIVE COMBINATIONS
S 3D OTHERS

V VARIOUS

V 1 ALLERGENS
V 1A ALLERGENS

V 2 CYTOSTATIC AND IMMUNO-SUPPRESSIVE DRUGS
V 2A ANTI-LEUKAEMICS
V 2B OTHER CYTOSTATICS
V 2C IMMUNO-SUPPRESSIVE DRUGS

V 3 ALL OTHER THERAPEUTIC PRODUCTS
V 3A ALL OTHER THERAPEUTIC PRODUCTS

V 4 DIAGNOSTIC AGENTS
V 4A RADIO CONTRAST MEDIA
V 4B URINE TESTS
V 4C OTHER DIAGNOSTIC AGENTS

V 5 SURGICAL ANTISEPTICS
V 5A SURGICAL ANTISEPTICS

V 6 GENRAL NUTRIENTS
V 6A SLIMMING PREPARATIONS
V 6B PROTEIN SUPPLEMENTS
V 6C INFANT FORMULAS
V 6C1 INFANT MILKS
V 6C2 INFANT MILKS CEREALS
V 6C3 PROTEIN CEREALS PLAIN
V 6C4 PROTEIN CEREALS W/ADDITIVES
V 6C5 CEREALS BISCUITS
V 6C6 HOMOGENISED BABY FOOD
V 6C7 SOLID BABY FOOD
V 6C8 PURIFIED VEGETABLE OILS
V 6C9 GASTRO-INTESTINAL ADSORBENTS
V 6D OTHER NUTRIENTS

V 7 ALL OTHER NON THERAPEUTIC PRODUCTS
V 7A ALL OTHER NON THERAPEUTIC PRODUCTS

ABCD
فروسان دانمارك
ـ فارمكس ایران

ترکیب: در هرقرص: ویتامین A ۵۰۰۰ واحد + ویتامین D ۶۰۰ واحد + ویتامین B_1 ۳ میلی‌گرم + ویتامین B_2 ۳ میلی‌گرم + ویتامین B_6 ۲ میلی‌گرم + ویتامین C ۷۵ میلی‌گرم + اسید پانتوتنیک ۸ میلی‌گرم + نیکوتینامید ۲۰ میلی‌گرم. در هرقاشق مرباخوری شربت: علاوه بر مقدار مواد فوق پانتنول ۸ میلی‌گرم + ویتامین E ۲/۵ میلی‌گرم.

موارد استعمال: کلیه موارد ناشی از کمبود ویتامینهای فوق

مقدار مصرف و طرز استعمال: روزی ۳ بار، هربار ۱ قرص یا یک قاشق مرباخوری شربت.

بسته بندی: قرص × ۳۰. شربت ۱۰۰ میلی‌لیتر

بها: قرص ۹۹ ریال. شربت ۶۵ ریال.

ABCEDENT
ریتا ـ ایران

ترکیب: محلول کلریدرات پروکائین ۴ درصد + فنل کریستال ۴ درصد + مانتول ۰/۲ درصد + اسانس مانت ۰/۴ درصد + کلروفرم ۴ درصد + الکل ۹۶ درجه ۵۰ درصد. گرد: گرد ریشه ختمی ۲/۵ گرم + گرد سر خشخاش ۱۰ گرم + کلریدرات پروکائین ۱/۲۵ گرم + آنتی پیرین ۱/۲۵ گرم + کلرات پتاسیم ۵ گرم + آمیدون ۳۰ گرم + ساخارین ۶/۲۵ گرم

موارد استعمال: محلول: ضدعفونی کننده دهان و لثه، بند آوردن خونریزی لثه پیش و پس از کشیدن دندان، تسکین درد دهان و گلو، رفع بوی بد دهان. گرد: ورم لثه و آبسه فک

مقدار مصرف و طرز استعمال: محلول: هرسه ساعت ۲۵ قطره را در نیمی استکان آب مخلوط کرده و غرغره میکنند. گرد: هربار نصف

محتوی جعبه را در لیوان آب خنک حل کرده جوشانیده و سپس ۴-۵ بار گرم گرم آنرا در دهان میگیرند.

بسته‌بندی: محلول ۱۵ میلی لیتر. گرد ۵۰ گرم.

بها: محلول ۳۵ ریال. گرد ۵۳ ریال

ABDEC
پارک دیویس
آمریکا ـ ایران

ترکیب: در هر ۰/۶ میلی لیتر قطره: ویتامین A ۵ هزار واحد + ویتامین B_1 ۱ میلی گرم + ویتامین B_2 ۱/۲ میلی گرم + ویتامین B_6 ۱ میلی گرم + ویتامین C ۵۰ میلی گرم + ویتامین D ۴۰۰ واحد + نیاسینامید ۱۰ میلی گرم + اسید پانتوتنیک ۵ میلی گرم

موارد استعمال: پیشگیری و درمان کمبود ویتامینی در شیرخواران، نوجوانان و بزرگسالان

مقدار مصرف و طرز استعمال: بعنوان پیشگیری کمبود ویتامینی: شیرخواران کمتر از یکسال ۰/۳ میلی لیتر در روز. بزرگسالان: روزی ۰/۶ میلی لیتر.

بسته‌بندی: قطره خوراکی ۱۵ میلی لیتر.

بها: ۷۶ ریال.

ABLACTON
شرینگ ـ آلمان

ترکیب: در هرمیلی لیتر: بنزوات استرادیول ۵ میلی گرم + والرات استرادیول ۸ میلی گرم + استات نوراتیسترون ۲۰ میلی گرم + تستوسترون اونانتات ۱۸۰ میلی گرم

موارد استعمال: بند آوردن ابتدائی شیر (پس از زایمان معمولی، پس از زایمان قبل از موعد، پس از سقط در ماههای آخر) بند آوردن ثانوی شیر (پس از شیر دادن بمدت کوتاه یا طویل).

مقدار مصرف و طرز استعمال: درمورد بندآوردن ابتدائی شیر بلافاصله پیش از خروج جفت یعنی کمی جلوتر یا بعد از کورتاژ یک آمپول عضلانی.

احتیاط: درمورد بند آوردن شیر، دیگر پستان بهیچ عنوان نباید مکیده شود

بسته بندی: آمپول ۱ میلی لیتر × ۱

بها: ۱۶۴ ریال

ACEFALGIN
آستردام کینین
فابریک- هلند

ترکیب: در هرقرص و آمپول: سدیم فنیل دی‌متیل پیرازولون متیل آمینومتان سولفونات (سولفامی پیرین) ۵۰۰ میلی‌گرم

موارد استعمال: برای رفع دردها و تب‌های روماتیسمی بهنگامی که سالیسیلات‌ها و داروهای مشابه اثری ندارند و تحمل نمیشوند

مقدار مصرف و طرز استعمال: روزی ۲ -۳ بار، هربار ۱ -۲ قرص.
آمپول: روزی ۲ -۳ بار

احتیاط: این دارو را باید فقط در موارد مخصوص بخود که داروهائی که سمیت کمتری ندارند در دسترس نیست بکار برد. استفاده کوتاه‌مدت و درازمدت آن سبب اگرانولوسیتوز کشنده شده است.

موارد منع استعمال: سابقه عدم تحمل نسبت به‌آنتی پیرین، همراه با کلرپرومازین زیرا سبب هیپوترمی شدید میشود. در دوران قاعدگی بعلت امکان ایجاد هموراژی شدید منع استعمال دارد.

عوارض‌جانبی: بند آمدن ادرار، درد و تحریک محل تزریق، آنمی همو- لیتیک، پورپورا ترومبوسیتوپنیک، آنمی‌آپلاستیک، بثورات جلدی

بسته‌بندی: قرص × ۱۰۰۰، آمپول ۲ میلی‌لیتر × ۱۰۰، آمپول ۵ میلی- لیتر × ۱۰۰

بها: قرص ۲۳۶۹ ریال، آمپول ۲ میلی‌لیتر ۱۲۰۰ ریال، آمپول ۵ میلی- لیتر ۲۱۴۶ ریال.

ACETOPHEN ۱۲۰
عبیدی- ایران

ترکیب: در هرقاشق مرباخوری: استیل پارا آمینوفنل ۱۲۰ میلی‌گرم

موارد استعمال: تب، سردرد، عفونتهای ضعیف مجاری تنفسی، سرما- خوردگی، برونشیت، فارنژیت

مقدار مصرف و طرز استعمال: خردسالان یک تا شش ساله: هرچهار ساعت یک قاشق مرباخوری. شش تا دوازده‌ساله: هرچهار ساعت دو قاشق مرباخوری

موارد منع استعمال: برای خردسالان کمتر از سه سال تجویز نشود

احتیاط: بیش از ده روز مصرف نشود مگر با نظر پزشک

بسته‌بندی: شربت ۹۰ میلی‌لیتر

بها: ۴۲ ریال

ACHROMYCIN

لدرلی آمریکا - ایران

ترکیب: کلریدرات تتراسیکلین متبلور. کپسول (۵۰، ۱۰۰، ۲۵۰ میلی‌گرم). آمپول داخل عضلانی (تتراسیکلین ۱۰۰ میلی‌گرم + پروکائین ۴۰ میلی‌گرم + کلرور منیزیم ۴۶/۸۴ میلی‌گرم + اسید اسکوربیک ۲۵۰ میلی‌گرم). آمپول داخل وریدی (۵۰۰ میلی‌گرم). قطره (تتراسیکلین ۱۰۰ میلی‌گرم + الکل ۱ درصد). پماد زخم (۳۰ میلی‌گرم). پماد چشمی (۱۰ میلی‌گرم). پماد چشمی (تتراسیکلین ۱۰ میلی‌گرم + هیدروکورتیزون ۱۵ میلی‌گرم). قطره روغنی چشم (۱ درصد). شربت (در هر ۵ میلی‌لیتر تتراسیکلین ۱۲۵ میلی‌گرم) قرص محلول (۵۰ میلی‌گرم).

مکانیسم: تتراسیکلین ها باعث جلوگیری از سنتز پلی‌پپتید ها میشوند

اثر متقابل: بدنبال بیهوشی با متوکسی فلوران استفاده از تتراسیکلین ها میتواند منجر به بروز مسمومیت گردد.

موارد استعمال: درمان ذات‌الریه، عفونتهای برونکوپولمونر، برونشیت حاد، تونسیلیت، سیاه‌سرفه، عفونت با میکربهای مختلط، مخملک، دیسانتری باسیلی، درمان زخمهای چرکی، جلوگیری از عفونت ها

مقدار مصرف و طرز استعمال: کپسول: ۱۲/۵-۲۰ میلی‌گرم برای هر کیلو وزن بدن. آمپول داخل عضلانی: روزی ۲۰۰-۳۰۰ میلی‌گرم. آمپول داخل وریدی: روزی ۵۰۰ میلی‌گرم هردوازده ساعت داخل رگ. قطره: مشابه کپسول. قطره روغنی چشم: روزی ۲-۴ بار هر بار ۱-۲ قطره در چشم چکانده میشود.

بسته بندی: کپسول ۵۰ و ۱۰۰ و ۲۵۰ میلی‌گرم × ۱۰۰. آمپول داخل عضلانی ۱۰۰ و ۲۵۰ میلی‌گرم × ۱. آمپول داخل وریدی ۵۰۰ میلی‌گرم × ۱. قطره ۱۰ میلی‌لیتر. پماد ۱۵ گرم. پماد چشم ۳/۵ گرم. قطره روغنی چشم ۶ میلی‌لیتر. قرص محلول × ۴۰.

بها: کپسول ۵۰ میلی ۳۵۱ ریال، ۱۰۰ میلی ۵۸۵ ریال، ۲۵۰ میلی ۱۲۸۷ ریال. قطره ۷۰ ریال پماد زخمی ۴۱ ریال. گوشی و چشمی ۱۶ ریال. قطره روغنی ۲۹ ریال. قرص محلول ۱۷۶

ریال. آمپول عضلانی ۱۰۰ میلی ۳۷ ریال، ۲۵۰ میلی ۷۰ ریال، آمپول وریدی ۱۲۹ ریال.

ACIDRINE
لاتما ـ فرانسه

ترکیب: لوریل سولفات دی‌اتیل آمینواتوکسی اتیل ۲ دی‌متیل ـ۶ و ۶ بی‌سیکلو ـ(۳ و ۱ و ۱) هپتن ۲ ـ نوپوگزامین سولفات: ۲/۵ میلی‌گرم + آمینواستات بازیک آلومینیم ۲۵۰ میلی‌گرم + سولفات گالاکتان ۲۰۰ میلی‌گرم

موارد استعمال: زخم معده و اثنی‌عشر، سوزش معده، احساس سنگینی در دستگاه هاضمه، ازوفاژیت

مقدار مصرف و طرز استعمال: روزی ۳ بار، هربار ۱ـ۲ قرص پیش از غذا یا در موقع درد جویده یا مکیده شود

بسته‌بندی: قرص × ۴۰

بها: ۱۵۰ ریال

ACI - GEL
ارتو ـ انگلستان

ترکیب: اسید استیک ۰/۹۲ درصد + اکسی کینولئین سولفات ۰/۲۵ درصد + اسید ریسینولئیک ۰/۷ درصد + اسید بوریک ۳ درصد + گلیسرین ۵ درصد

موارد استعمال: درمان موضعی تریکوبونا واژینالیس، تنظیم پ هاش واژن، جانشین‌شونده داروهای ضدعفونی کننده واژن، جلوگیری از عود تریکوموِنا (زیرا با استعمال مرتب آن پ هاش واژن را در محیطی برابر با ۴ نگهداری میکند).

مقدار مصرف و طرز استعمال: صبح و شب محتوی یک آپلیکاتور، استعمال شود.

بسته بندی: کرم واژینال ۸۵ گرم با آپلیکاتور

بها: ۱۳۵ ریال

ACIPEN - V - K
مایکوفارم هلند ـ آی دی آی ایران

ترکیب: پتاسیم پنی‌سیلین وی

موارد استعمال: کلیه عفونتهای حساس به پنی‌سیلین.

مقدار مصرف و طرز استعمال: خردسالان: روزی سه بار هربار ۱۲۵

میلی‌گرم. بزرگسالان: روزی سه بار هربار ۲۵۰ میلی‌گرم.
موارد منع استعمال: حساسیت به پنی‌سیلین
احتیاط و عوارض جانبی: در برخی بیماران شل شدن مدفوع دیده شده است
بسته‌بندی: کپسول ۱۲۵ × ۱۰۰ میلی‌گرم، ۲۵۰ × ۱۲ میلی‌گرم.
بها: ۱۲۵ میلی ۴۳۷ ریال، ۲۵۰ میلی ۸۲ ریال

ACRIFLEX
آلن هانبوریز
ـ انگلستان

ترکیب: کلریدرات ۵ـآمینوا کریدین
موارد استعمال: داروی آنتی‌سپتیک در کمکهای اولیه و درمان زخمها، سوختگیها و خراشیدگیها
مقدار مصرف و طرز استعمال: روزی ۳-۴ بار بطور موضعی مصرف می‌شود
بسته‌بندی: کرم ۲۵ گرم
بها: ۲۹ ریال

ACTAPULGITE
بوفور ـ فرانسه

ترکیب: آتاپولژیت فعال ۳ گرم + پکتین ۰/۳ گرم + گلوکز ۲/۷ گرم
موارد استعمال: پانسمان لوله گوارش، اسهال و گاستریت، سیگموئیدیت کولیت
مقدار مصرف و طرز استعمال: در موارد حاد: ۲۰ دقیقه قبل از هروعده غذا یک‌بسته. در موارد مزمن: ۲ بسته صبح ها در آب حل و میل شود
بسته‌بندی: گرد ۳ گرم × ۳۰
بها: ۱۹۶ ریال

A.C.T.H
شوئه ـ فرانسه

ترکیب: آدرنوکورتیکوتروپین هورمون
موارد استعمال: نارسائی غده فوق کلیه، حمله آسمی شدید، در فواصل کورتیکوتراپی، لنفوسارکوم، آلرژیهای شدید، لوپوس اریتماتو
مقدار مصرف و طرز استعمال: روزی ۱-۳ تزریق عضلانی
موارد منع استعمال: فشارخون، دیابت، اورمی
بسته‌بندی: فلاکون ۲۵ و ۵۰ واحدی ساده. فلاکون ۴۰ واحدی

رتارد

بها: ۲۵ واحدی ۸۵ ریال، ۴۰ واحدی ۱۵۰ ریال، رتارد ۱۱۰ ریال

ACTIVAROL C.500
هپاترول–فرانسه

ترکیب: در هر آمپول: ویتامین C ۰/۵ گرم + هماتو- پورفیرین ۰/۶ گرم + گلی کوکول ۰/۵ گرم + عصاره جگر غلیظ ۰/۰۲ گرم + عصاره لوور ۰/۱ گرم + اکسیپیان معطر تا ۱۰ میلی‌لیتر.

موارد استعمال: لاغری، خستگی، دوران نقاهت، بعنوان تقویت کننده عمومی

مقدار مصرف و طرز استعمال: خردسالان ۸–۱۵ ساله ۱–۲ آمپول خوراکی در روز، بزرگسالان: ۲–۳ آمپول خوراکی در روز

بسته‌بندی: آمپول ۱۰ میلی‌لیتر× ۲۴

بها: ۲۸۴ ریال

ACTONORM
والاس–آمریکا

ترکیب: در هرگرم گرد: پانکرآتین ۱۰ میلی‌گرم + ویتامین B_1 یک میلی‌گرم + سولفات آتروپین ۰/۰۱ گرم + فنوباربیتون ۰/۱ میلی‌گرم + اسانس نعنا ۰/۵ میلی‌گرم + کائولین ۵۰ میلی‌گرم + کربنات منیزیوم ۳۰۰ میلی‌گرم + تری‌سیلیکات منیزیوم ۵۰ میلی‌گرم + دیاستاز مالت ۱۰ میلی‌گرم + کلرهیدرات پاپاورین ۰/۴ میلی‌گرم + کربنات کلسیم ۱۴۵ میلی‌گرم + بی کربنات سدیم ۳۷۳ میلی‌گرم + هیدروکسید آلومینیم ۵۰ میلی‌گرم.

هر ۵ میلی لیتر ژل: هیدروکسید آلومینیم ۲۲۰ میلی‌گرم + هیدروکسید منیزیوم ۱۰۰ میلی‌گرم + متیل پلی‌سیلوکسان ۲۵ میلی‌گرم + اسانس نعنا ۰/۰۰۰۷۵ میلی لیتر.

در هرعدد قرص: تری‌سیلیکات منیزیوم ۱۰ درصد + کائولین کلوئید ۱۵ درصد + اسانس نعنا یک درصد + کربنات منیزیوم ۴۵ درصد + کربنات کلسیم ۲۱/۸ درصد + هیدروکسید آلومینیم کلوئید ۵ درصد.

موارد استعمال: افزایش اسیدیته معده، گاستریت، زخم معده، سوء

هاضمه، اسپاسم پیلور.
مقدار مصرف و طرز استعمال: گرد: یک قاشق چای‌خوری گرد را در کمی آب حل کرده بعد از غذا مینوشند.
قرص: هربار ۱-۲ قرص بعد از غذا. ژل: یک قاشق مرباخوری بعد از هر غذا
بسته‌بندی: گرد ۸۵ گرم، قرص × ۵۰، ژل ۲۰۰ میلی‌لیتر
بها: گرد ۱۱۰ ریال، قرص ۷۰ ریال، ژل ۷۰ ریال

A + D
دوپار-ایران

ترکیب: در هر قطره: ویتامین A ۴۰۰ واحد + ویتامین D ۴۰ واحد
موارد استعمال: تمام موارد کمبود ویتامین های A و D
مقدار مصرف و طرز استعمال: خردسالان: روزی ۱۰ قطره. بزرگسالان: روزی ۲۰ قطره.
بسته‌بندی: قطره خوراکی ۱۰ میلی‌لیتر
بها: ۲۳ ریال

ADALAT
بایر-آلمان

ترکیب: ۱ و ۴-دی‌هیدرو-۲، ۶-دی‌متیل -۴-(۵- نیتروفنیل)- پیریدین-۳، ۵-دی کاربن اسید دی‌متیل استر= نیفدیپین
مکانیسم: آنتاگونیست نیرومند کلسیم است.
اثر متقابل: اثر داروهای هیپوتالسوزو بتابلوکرها را تقویت میکند.
موارد استعمال: درمان و پیشگیری نارسائی‌های حاد و مزمن عروق کرونر، آنژین پکتوریس
مقدار مصرف و طرز استعمال: روزی ۳ بار هربار ۱-۲ کپسول
عوارض جانبی: سردرد، برافروختگی و خواب‌آلودگی
موارد منع استعمال: زنان باردار
بسته‌بندی: کپسول ۱۰ میلی‌گرم × ۳۰
بها: ۴۵۰ ریال

ADALGOR
روسل فرانسه
-آی دی آی ایران

ترکیب: در هرقرص: تیوکولشی کوزید ۲ میلی‌گرم + گلافنین ۲۰۰ میلی‌گرم + مپروبامات ۱۰۰ میلی‌گرم

اثر متقابل: بعلت وجود مپروبامات اثر الکل را تشدید میکند

موارد استعمال: سیاتیک، تورتیکولی، آرتروز، دردهای روماتیسمی، الومباگو، دردهای گردنی بازوئی، دیسمنوره، شکستگی‌ها، ضربه‌ها.

مقدار مصرف و طرز استعمال: روزی ۳-۴ بار، هربار ۲-۱ قرص پیش از غذا

عوارض جانبی: گاهی خواب‌آلودگی، تهوع، استفراغ، واکنش‌های آلرژیک

موارد منع استعمال: سه ماهه اول دوران بارداری، نارسائی‌های شدید کلیوی

بسته‌بندی: قرص × ۱۲

بها: ۲۰۰ ریال

ADELPHAN
سیبا ـ سویس

ترکیب: در هرقرص: رزرپین ۰/۱ میلی‌گرم + نپرزول (دی‌هیدرالازین) ۱۰ میلی‌گرم

موارد استعمال: همه اشکال زیادی فشارخون

مقدار مصرف و طرز استعمال: روزی ۲-۳ بار، هربار ۱ قرص بعد از غذا. درصورت لزوم روزی ۳ بار، هربار ۲-۳ قرص.

بسته‌بندی: قرص × ۵۰

بها: ۶۲ ریال

ADELPHAN ESIDREX
سیبا ـ سویس

ترکیب: در هرقرص: سرپازیل (رزرپین) ۰/۱ میلی‌گرم + نپرزول (دی هیدرالازین) ۱۰ میلی‌گرم + ازیدرکس (هیدروکلروتیازید) ۱۰ میلی‌گرم

موارد استعمال: همه اشکال زیادی فشارخون مخصوصاً در مواردیکه احتباس نمک موجود است.

مقدار مصرف و طرز استعمال: ابتدا: روزی ۲-۳ بار، هربار ۱-۲ قرص. دوزنگهدارنده: روزی ۲-۳ قرص

موارد منع استعمال: نارسائی‌های شدید کبدی

بسته‌بندی: قرص × ۳۰

بها: ۱۵۰ ریال

ADEXOLINE
گلاکسو انگلستان
داروپخش ایران

ترکیب: در هر کپسول: ویتامین A ۴۰۰۰ واحد + ویتامین D ۱۰۰۰ واحد. در هر میلی‌لیتر قطره: ویتامین A ۱۰۰۰۰ واحد + ویتامین D ۱۰۰۰ واحد

موارد استعمال: عفونتها، ناتوانی، بیماری سلیاك، کمبود خفیف این ویتامینها

مقدار مصرف و طرز استعمال: شیرخوارانی که از شیر مادر استفاده میکنند روزی ۱ قطره. آنهائیکه از شیرخشک استفاده میکنند روزی ۵ قطره. خردسالان: ۱۰ قطره یا یک کپسول در روز. بزرگسالان: ۱-۳ قرص در روز یا از ۲۰ قطره ببالا. حالات ناتوانی شدید: ۶ کپسول یا بیشتر در روز.

بسته‌بندی: کپسول × ۲۵. قطره ۱۴ میلی‌لیتر

بها: کپسول ۳۵ ریال. قطره ۳۹ ریال

ADIRO
بایر آلمان-ایران

ترکیب: اسید استیل سالیسیلیک ۵۰۰ میلی‌گرم

موارد استعمال: بیماریهای رماتیسمی، تب، رماتیسم، (رماتیسم حاد مفصلی)، رماتیسم عضلانی، سندروم مهره‌های گردنی و کمری، اسپوندیلیت، استئوآرتریت، آرتروز

مقدار مصرف و طرز استعمال: در بزرگسالان آغاز درمان معمولا با ۲ قرص. سپس هر ۶-۸ ساعت ۱ تا دو قرص. در تب رماتیسم (رماتیسم حاد مفصلی) دوزهای ۶ تا ۱۰ گرم در روز لازم است.

موارد منع استعمال: حساسیت به ترکیبات سالیسیلیک

احتیاط: در کسانیکه قرحه معده و اثنی‌عشر دارند.

بسته‌بندی: قرص × ۳۰

بها: ۷۶ ریال

ADONA
تانابی ژاپن
ـ فارماشیمی ایران

فارماکولوژی: بندآورنده خون در خونریزیهای مویرگی ناشی از افزایش قابلیت نفوذ آنها.
ترکیب: در هرقرص: کاربازوکروم سدیم سولفونات ۳۰ میلی‌گرم
موارد استعمال: خونریزیهای داخلی به هرعلت، خونریزی بعد از عمل جراحی، بیماریهای جدار عروق، خونریزی مغزی ناشی از فشار خون و آرتریواسکلروز، بیماریهای آلرژیک، آسم برونشیک، رینیت آلرژیک، بیماریهای عروقی ناشی از دیابت
مقدار مصرف و طرز استعمال: بطورمتوسط روزی ۳-۴ بار هربار یک قرص
بسته‌بندی: قرص × ۲۰
بها: ۱۵۸ ریال

ADONICOEUR
پارک-ایران

ترکیب: عصاره مایع آدونیس ورنالیس + عصاره مایع والریان
موارد استعمال: نارسائی‌های خفیف قلبی
مقدار مصرف و طرز استعمال: روزی ۳ بار هربار ۱۰-۲۰ قطره
بسته‌بندی: قطره خوراکی ۱۵ میلی‌لیتر
بها: ۴۲ ریال

ADRENOXYL
لاباز-فرانسه

ترکیب: منوسمی کاربازون دوآدنوکروم ۱/۵ میلی‌گرم در هر ۳/۶ میلی‌لیتر
موارد استعمال: خونریزی مویرگی در اندامهای مختلف، آماده کردن بیمار برای عمل جراحی، قاعدگی ممتد و شدید
مقدار مصرف و طرز استعمال: بزرگسالان: ۱-۳ تزریق زیرجلدی یا وریدی. خردسالان: ۰/۵ — ۲ تزریق عضلانی یا زیرجلدی.
بسته‌بندی: آمپول × ۳
بها: ۵۳ ریال

ADRIBLASTINA
فارمیتالیا-ایتالیا

فارماکولوژی: پیوند با DNA و وقفه سنتز اسید نوکلئیک
ترکیب: کلریدرات آدریمیسین (دوکسوروبی‌سین) ۱۰ میلی‌گرم
موارد استعمال: انواع مختلف نئوپلازی، لوسمی حاد و مزمن، سارکوم

بافت‌های نرم

مقدار مصرف و طرز استعمال: ۷۵-۶۰ میلی‌گرم بازاء هر کیلو وزن بدن بمدت ۳ روز یا ۰/۸ میلی‌گرم بمدت ۲ روز. این مقدار را میتوان برحسب وضعیت خونی در فواصل سه هفته‌ای تکرار کرد

موارد منع استعمال: وجود زخمهای دهانی یا کاهش فعالیت مغز استخوان

احتیاط و عوارض جانبی: در بیماران مبتلا به نارسائی قلبی با احتیاط تجویز شود. مانند سایر داروهای سیتوتوکسیک میتواند سبب طاسی، زخمهای دهانی و کاهش فعالیت مغز استخوان گردد.

بسته‌بندی: ویال + حلال (۵ میلی‌لیتر) × ۱

بها: ۹۲۸ ریال

ADROYD
پارک دیویس
آمریکا - ایران

فارماکولوژی: استروئیدی آندروژنیک است، اثر آنابولیک این دارو بیش از اثرآندروژنیک آن میباشد.

ترکیب: اُکسی متولون ۵ میلی‌گرم

اثر متقابل: شواهد بالینی نشان میدهد که اُکسی متولون نیز مانند اکثر آندروژن‌های دارای کربن ۱۷ - الکیله میتواند اثر هیپوپروترومبینمیک وارفارین را تشدید کند.

موارد استعمال: نقاهت بعد از بیماریهای عفونی، سوختگی‌ها، جراحیها، استئوپورز، تأخیر رشد در کودکان، ضعف، لاغری و سستی

مقدار مصرف و طرز استعمال: ۱-۲ قرص در روز بمدت ۱۰ الی ۲۱ روز و نباید از ۹۰ روز تجاوز کند، درمان مداوم نباید حداکثر از دوره‌های شش هفته‌ای با فواصل ۲-۴ هفته تجاوز کند

موارد منع استعمال: سرطان پروستات

عوارض جانبی: بروز صفات مردانه بویژه در زنان و خردسالان، احتباس سدیم وادم و نارسائی کبدی

بسته‌بندی: قرص × ۱۵

بها: ۸۸ ریال

ADUMBRAN
بهرینگر اینگلهایم
آلمان ـ تولیدارو ایران

ترکیب: در هر قرص ۷ ــ کلرو ـ ۱، ۳ ـ دی‌هیدرو ـ ۳ ـ هیدروکسی ـ ۵ ـ فنیل ـ H ۲ ـ ۱ ، ۴ ـ بنزودیازپین ـ ۲ ـ اون ۱۰ = ۱۰ میلی‌گرم. در هر شیاف ۳۰ میلی‌گرم.

موارد استعمال: اختلالات خواب، اختلالات قلبی عروقی، اختلالات معدی ـ روده‌ای، اختلالات پسیکوژنیک تنفسی، اختلالات دستگاه عصبی خودکار در بانوان، نوروزهای جنسی، تحریک‌پذیری عصبی، تهییج‌پذیری زیاد، حالات مربوط به خستگی‌های شدید عصبی، استرس‌های شغلی و یا زندگی خصوصی، اضطراب و تشویش، رفتارهای غیرعادی در دوران بلوغ.

مقدار مصرف و طرز استعمال: یک قرص صبح یک قرص ظهر دو قرص شب. بهتر است در ابتدای درمان، مصرف دارو را با مقدار زیاد شروع کرد. چنانکه اثرات آرامبخش بیش از اندازهٔ مطلوب بنظر رسد با نصف کردن قرصها و یا حذف مقدار ظهر میتوان بمقدار مؤثر مطلوب رسید. شیاف یک عدد صبح و یک عدد شب. برای درمان بی‌خوابی یک شیاف شب.

احتیاط: چنانکه درمورد تمام داروهای آرامبخش گفته میشود در دوره درمان باید از مصرف مشروبات الکلی زیاد خودداری شود زیرا ممکن است تحمل در قبال الکل کم شده باشد. به‌جهت اثر تسکینی دارو، مصرف زیاد آن ممکن است صلاحیت رانندگی بیمار را کاهش دهد.

بسته‌بندی: قرص ۱۰ میلی‌گرم × ۲۵ ، شیاف × ۵

بها: قرص ۹۴ ریال. شیاف ۸۴ ریال

AEROPAX
ارکوفارم دانمارک

فارماکولوژی: کشش سطحی محتویات معده و روده را کم کرده و موجب جلوگیری از تشکیل ازبین رفتن حباب گاز و کف میگردد.

ترکیب: در هرقرص ۴۰ میلی‌گرم دیمتیکون = سیمتیکون = دیمتیل پلی‌سیلوکسان.

موارد استعمال: نفخ بعلل مختلف، آئروفاژی، سوءهضم، نفخ بعد از عمل، مواردی که احتباس گاز وجود دارد.

مقدار مصرف و طرز استعمال: یک قرص سه بار در روز بعد از غذا و یک عدد موقع خواب، آماده کردن بیمار برای گاستروسکوپی و آزمایش اشعه ایکس مقدار فوق برای دو روز

بسته‌بندی: قرص × ۱۰۰

بها: ۲۰۰ ریال

AKINETON

کنول ـ آلمان

فاماکولوژی: ضد پارکینسون، آنتی کلینرژیک

ترکیب: هر قرص: ۳-۱-فنیل-۱-بی‌سیکلو هپتنیل-پروپانول = کلریدرات بی‌پیریدن ۲ میلی‌گرم. در هر آمپول بی‌پیریدن لاکتات ۵ میلی‌گرم.

اثر متقابل: وقفه دهنده‌های منوآمینوا کسیدازسبب کاهش اثرآنزیمهای میکروزومال کبدی میشود. این کار اثر آنتی کولینرژیک‌هائی را که بطور همزمان تجویز شده‌اند تقویت میکند.

موارد استعمال: بیماری پارکینسون، کاهش دهنده عوارض ناشی از تحریک اکسترا پیرامیدال، ضربه‌های مغزی، دردهای عصبی، مسمومیتهای نیکوتینی

مقدار مصرف و طرز استعمال: برحسب نوع و شدت بیماری متفاوتست

احتیاط: در بیماران مبتلا به‌گلوکوم، پروستاتیسم یا آریتمی قلبی با احتیاط تجویز شود

بسته‌بندی: قرص × ۵۰، آمپول ۱ میلی‌لیتر × ۵

بها: قرص ۳۱۸ ریال. آمپول ۱۵۷ ریال

ALBA-GAR

ماکسون آمریکا ـ تولیدارو ایران

ترکیب: در هر قاشق غذاخوری (۱۵ میلی‌لیتر) امولسیون آلباگار: روغن کانی ۷/۵ میلی‌لیتر + سدیم ساخارین ۰/۴۳ میلی‌گرم.

موارد استعمال: تنبلی و سنگینی معده، یبوست نزد بزرگسالان و خرد-سالان

مقدار مصرف و طرز استعمال: شبی ۱-۲ قاشق غذاخوری یا مرباخوری

بسته‌بندی: امولسیون ۱۷۰ میلی‌لیتر

بها: ۵۶ ریال

ALBALON
آلرگان ـ آمریکا

ترکیب: کلریدرات نافازولین ۰/۱ درصد + لیکوئی فیلم (پلی‌وینیل الکل) ۱/۴ درصد

موارد استعمال: بعنوان یک تنگ کننده موضعی عروق چشم

مقدار مصرف و طرز استعمال: هر ۳-۴ ساعت ۱-۲ قطره در هرچشم چکانده میشود.

احتیاط: مبتلایان به‌فشارخون، بی‌نظمی‌های قلبی، دیابت، هیپر-تیروئیدیسم

بسته‌بندی: قطره چشمی ۱۵ میلی‌لیتر

بها: ۱۹۰ ریال

ALBAMYCIN
آپجان ـ آمریکا

ترکیب: نوویبوسین سدیم ۲۵۰ میلی‌گرم

موارد استعمال: عفونت‌های ناشی از استافیلوکوك بخصوص درمواردی که بیمار نسبت به‌آنتی‌بیوتیک‌های دیگر حساسیت داشته باشد. یا اینکه میکرب‌ها نسبت به‌آنتی‌بیوتیک‌های دیگر مقاوم شده باشند. عفونت‌های مجاری که علت آن پروتئوس ها باشد.

مقدار مصرف و طرز استعمال: بزرگسالان: ۲۵۰ میلی‌گرم هر۶ساعت یا ۵۰۰ میلی‌گرم هر۱۲ ساعت. در موارد شدید مقدار دارو دوبرابر میگردد . خردسالان: ۱۵ میلی‌گرم بازاء هرکیلو، در موارد ضروری مقدار دارو را به ۴۵ میلی‌گرم میتوان افزایش داد.

موارد منع استعمال: اطفال کمتر ازشش ماه

عوارض جانبی: گاهی حالت تهوع خفیف و کرامپ شکمی دیده میشود، لوکوپنی و سایر اختلالات خونی بندرت دیده میشود کهیر و عوارض جلدی نیزگزارش شده است.

بسته‌بندی: کپسول × ۱۶

بها: ۳۲۰ ریال

ALBATUM
ماکسون آمریکا
ـ تولیدارو ایران

ترکیب: مانتول + کامفر + او کالیپتوس + تیم + نوتمگ

موارد استعمال: سینه‌درد و برونشیت، سرماخوردگی و ناراحتی بینی، سرماخوردگی اطفال، گزش حشرات، درد عضلات، سوختگی

مقدار مصرف و طرز استعمال: بعد از تمیز کردن دست، مقدار کمی پماد را با دست در محل مالش دهند یا با پارچه در محل قرار دهند.

بسته‌بندی: پماد ۵۰ گرم

بها: ۴۴ ریال

ALCOHOL DEXTROSE IN WATER
باکستر ـ ایران

ترکیب: الکل اتیلیک ۵ میلی‌لیتر + دکستروز ۵ گرم + آب‌مقطر مقدار کافی تا ۱۰۰ میلی لیتر.

موارد استعمال: مکمل مواد بیهوش کننده، مسکن و آرام‌بخش، اتساع رگها، کنترل بیماران الکلیک

مقدار مصرف و طرز استعمال: معمولا بین ۱-۲ لیتر در ۲۴ ساعت با سرعت ۴۰-۱۰۰ قطره در دقیقه از راه پرفوزیون وریدی.

موارد منع استعمال: نارسائی کلیوی و کبدی، اپی‌لپتیک‌ها، عفونت حاد پیشاب راه.

بسته‌بندی: محلول ۵۰۰ و ۱۰۰۰ میلی‌لیتر.

بها: ۱۱۱ ریال.

ALCON-EFRIN$_{16}$
ALCON-EFRIN$_{25}$
آلکان آمریکا
ـ تولیدارو ایران

ترکیب: ۱۶ : کلریدرات فنیل افرین ۰/۱۶ درصد
۲۵ : کلریدرات فنیل افرین ۰/۲۵ درصد

موارد استعمال: التهابات و احتقان مجاری فوقانی تنفسی ناشی از زکام و سرماخوردگی

مقدار مصرف و طرز استعمال: روزی ۳-۴ بار، هربار تا ۶ قطره برحسب احتیاج بیمار.

بسته‌بندی: قطره ۱۵ میلی‌لیتر

بها: ۱۶ : ۵۳ ریال، ۲۵ : ۵۹ ریال

ALCOPAR
بوروزولکام
ـ انگلستان

ترکیب: بفنیوم هیدروکسی نفتوات برابر با ۲/۵ گرم باز بفنیوم

موارد استعمال: درمان آنکیلوستومیاز (کرم قلابدار) و درمان توأم تریکوسترونژیلوئیدوز و آسکاریدوز.

مقدار مصرف و طرز استعمال: بزرگسالان و خردسالان بالاتر از دوسال روزی ۲ بار هربار یک بسته، خردسالان کمتر از دو سال یا زیر ۱۰ کیلو نصف مقدار فوق. مقدار بالا را میتوان ۲-۳ روز تکرار کرد

عوارض جانبی: گاهی حالت تهوع و استفراغ مشاهده میشود

بسته‌بندی: بسته ۵ گرم

بها: ۲۵ ریال

ALDACTONEA
سرل انگلستان
ـ پارس تهران

فارماکولوژی و مکانیسم: اسپرونولاکتون استروئیدی است با ساختمان بسیار نزدیک به‌آلدوسترون و بعنوان وقفه دهنده رقابتی با آن عمل میکند، درنتیجه دیورتیکی است که موجب تشدید دفع یون سدیم و تقلیل دفع یون پتاسیم میشود، اثر این دارو آهسته و طولانی است

ترکیب: درهرقرص ۲۵ میلی‌گرم اسپیرونولاکتون=۱۷ - هیدروکسی-۷ آلفا-مرکاپتو-۳-اُکسو-۱۷ آلفا-پرگن-۴-اِن-۲۱-کربوکسیلیک اسید گاما-لاکتون استات.

اثر متقابل: اسپیرونولاکتون دیورتیکی است نگهدارندهٔ پتاسیم و اغلب به‌رژیم کسانیکه به‌دیورتیک‌های دیگر مقاوم شده‌اند اضافه میشود این دیورتیک‌ها اغلب همراه پتاسیم مصرف میشوند، همراه شدن اسپیرونولاکتون با پتاسیم میتواند منجر به‌افزایش شدید پتاسیم خون گردد، بنابراین تجویز پتاسیم باید قطع شود.

موارد استعمال: نارسائی احتقانی قلب، سیروزکبدی همراه با آسیت و ورم، ورم ایدیوپاتیک، سندروم نفروتیک، افزایش فشار خون اصلی، میاستنی خطرناک.

مقدار مصرف و طرز استعمال: روزی ۴ بار، هربار یک قرص (تا ۸ قرص می‌توان افزایش داد) بطورعادی همراه با یک دیورتیک معدی

تجویز میشود. در میاستنی خطرناک با همین مقدار خوراک معمولا همراه با یک داروی آنتی کولین استراز داده میشود.

موارد منع استعمال: آنوری در بیماران با هیپر کالیمی شدید، همراه با داروهای حاوی پتاسیم، نارسائی شدید کلیه

احتیاط و عوارض جانبی: توصیه میشود که همراه با تریامترن یا آمیلوراید بکار نرود زیرا ممکن است موجب هیپر کالیمی شود. چون کانرنون که یک متابولیت اسپیرونولاکتون است از شیر نیز دفع میشود، اگر استفاده از دارو ضروری است روش دیگری برای تغذیه کودك باید انتخاب شود. ژینکوماستی، کرامپ، اسهال، سردرد، هیرسوتیسم مشاهده شده است که معمولا با قطع دارو محو میشوند.

بسته‌بندی: قرص × ۲۰

بها: ۲۶۵ ریال.

ALDOMET
مرک شارپ اند دوهم ـ ایران

ترکیب: در هرقرص: آلفامتیل دوپا = لوو-۳-(۳ و ۴ دی-ئیدروکسی فنیل)-۲-متیل آلانین ۲۵ میلی‌گرم

اثر متقابل: عمل وازودیلاتاتور الکل ممکن است اثر هیپوتانسیو این دارو را (بعلت سنیرژیسم) افزایش دهد. وقفه‌دهنده‌های منو-آمینوا کسیداز اثر این دارو را کاهش میدهد.

موارد استعمال: در تمام مراحل فشارخون.

مقدار مصرف و طرز استعمال: در ۴۸ ساعت اول روزانه ۲ قرص، پس از آن با افزودن ۱-۲ قرص در روز تا وقتیکه پاسخ کافی از طرف بیمار بدرمان داده شود، تجویز بیش از ۳ گرم در روز (۱۲ قرص) مناسب نیست.

موارد منع استعمال: بیماریهای فعال کبدی، فئوکروموسیتوم، حساسیت به متیل دوپا، دوران شیردهی

احتیاط و عوارض جانبی: درصورت بروز آنمی همولیتیک درمان باید قطع شود. گاهی سردرد و ضعف موقتی، خشکی دهان و تب دیده شده است.

بسته‌بندی: قرص × ۳۰
بها: ۱۸۷ ریال

ALERTONIC
مینا ـ ایران

ترکیب: در هر ۲۰۰ میلی‌لیتر: سیترات آمونیوم فریک ۴ گرم + ویتامین B_1 ۳۳ میلی‌گرم + ویتامین B_2 ۱۳ میلی‌گرم + نیاسینامید ۶۶ میلی‌گرم + کلسیم پانتوتنات ۱۲/۵ میلی‌گرم + الکل ۳ درصد
موارد استعمال: ضعفها، خستگی، بی‌اشتهائی، بی‌حوصلگی، کم‌خونی، اختلالات رشد و تغذیه
مقدار مصرف و طرز استعمال: بزرگسالان: روزی ۳ بار هربار یک قاشق غذاخوری، خردسالان: روزی ۳ بار هربار یک قاشق مرباخوری
موارد منع استعمال: مبتلایان به قرحه معده و روده
احتیاط: نزد افراد مبتلا به زخم‌معده با احتیاط باید مصرف شود.
بسته‌بندی: شربت ۲۰۰ میلی‌لیتر.
بها: ۸۲ ریال

ALGAPHAN
بهرینگرمانهایم آلمان
ـ تهران‌شیمی ایران

فارما کولوژی: پروپوکسی فن ضد دردی است ملایم که از نظر ساختمان شیمیایی مشابه متادون است. اگرچه خواص فارما کولوژیکی آن بطور کلی شبیه نارکوتیک‌هاست از نظر قدرت ضد دردی قابل مقایسه با آنها نیست.
ترکیب: هرآمپول: د ـ پروپوکسی فن = (آلفا ـ د ـ ۴ ـ دی متیل آمینو ـ ۱، ۲ ـ دی فنیل ـ ۳ ـ متیل ـ ۲ ـ پروپیونیل اکسی بوتان ـ هید رو ـ کلراید) ۷۵ میلی‌گرم
در هر دراژه: د ـ پروپوکسی فن ۲۵ میلی‌گرم + آمینوفنازون ۳۰۰ میلی‌گرم
موارد استعمال: دردهای قبل از زایمان و هنگام فارغ شدن، دیلاتاسیون رحم، کولیکهای سنگ کلیه و سنگ کیسه صفرا، اسپاسم‌های کوله سیستیت و کولانژیت، کرامپهای معدی ـ روده‌ای
مقدار مصرف و طرز استعمال: ۱ ـ ۲ آمپول برحسب شدت درد
موارد منع استعمال: آنمی همولیتیک، درمان همزمان با ارفنادرین

احتیاط: در بیمارانی که دچار آسیبهای گردش خون هستند یا وزن آنها از ۵۰ یا ۶۰ کیلوگرم کمتر است.

درمان مسمومیت: علایم مسمومیت شبیه علایم مسمومیت با داروهای نارکوتیک است و با استفاده از آنتاگونیست‌های نارکوتیکی نظیر نالوکسون ازبین میرود.

بسته‌بندی: آمپول × ۳، دراژه × ۲۰

بها: قرص: ۷۰ ریال، آمپول ۷۰ ریال

ALGESAL
لاتما ـ فرانسه

ترکیب: سالیسیلات دی اتیل آمین

موارد استعمال: ضد درد و ضد ورم موضعی، ضد روماتیسم، آرتریت حاد و مزمن، نورالژی، لمباگو

مقدار مصرف و طرز استعمال: بعد از تمیز کردن موضع روزی ۳ بار مالش داده شود.

بسته‌بندی: پماد ۴۰ گرم

بها: ۴۲ ریال

ALGINAL
پارک ـ ایران

ترکیب: فنوباربیتال + پیرامیدون + آنتی پیرین + بیکربنات سدیم + لاکتوز

موارد استعمال: تب، درد، بیخوابی

مقدار مصرف و طرز استعمال: برای کودکان ۶-۲ بسته در روز

بسته‌بندی: بسته ۰/۵ گرم × ۲۰

بها: ۴۱ ریال

ALLERGA
دلاگرانژ ـ فرانسه

ترکیب: دی‌فنیدرامین

موارد استعمال: حساسیت و انواع آلرژی‌ها

مقدار مصرف و طرز استعمال: شربت تا روزی ۴ قاشق. پماد روزی ۲-۳ بار بر روی محل مالیده میشود.

بسته‌بندی: شربت ۱۲۵ میلی‌لیتر. پماد ۴۰ گرم

بها: شربت ۳۴ ریال. پماد ۳۵ ریال

ALLERGAN SOAKARE
آلرگان ــ آمریکا

ترکیب: دی‌سدیم ادتات ۰/۲۵ درصد + بنزالکونیوم کلراید + کلرئیدرات دی‌متیل بنزیل آمونیوم
موارد استعمال: محلول ضد میکرب برای نگاهداری عینکهای نامرئی در محیط خارج از چشم
مقدار مصرف و طرز استعمال: قبل از استعمال عینک نامرئی باید آنرا مدت ۳۰ دقیقه در این محلول قرار داد. هنگامیکه عینک روی چشم نیست باید در این محلول نگاهداری شود.
بسته‌بندی: ظروف پلاستیکی ۱۲۰ میلی‌لیتر
بها: ۹۹ ریال

ALLERGIN
آلن هانبوریز انگلستان ــ داروپخش ایران

ترکیب: تونزیل آمین ۲ درصد + دکوادین (دکوالینیوم کلراید) ۴ درصد + کالامین ۶ درصد کرم خنثی بمقدار کافی تا ۱۰۰ درصد
موارد استعمال: کهیر، گزش و نیش حشرات، آفتاب‌سوختگی، بثورات آلرژیک، اکزما
مقدار مصرف و طرز استعمال: در درمان خارش های پوست باید ابتدا پوست را با آب گرم، ولی نه با آب داغ، شستشو داده بعد بدقت با گذاشتن حوله، بدون مالش دادن پوست، آنرا خشک کرده و ورقه‌ای از پماد آلرژین را روی آن گستراند.
بسته‌بندی: کرم ۲۵ گرم
بها: ۴۷ ریال

ALLOPURIN
لوندبک ــ دانمارک

فارماکولوژی: با اثر بر روی کاتابولیسم پورین ها تولید اسیداوریک را هم در سرم و هم در ادرار کاهش میدهد.
ترکیب: آللوپورینول = ۴-هیدروکسی پیرازولو (۳، ۴-دِ) پیریمیدن
اثر متقابل: موجب کاهش متابولیسم کومارین میشود.
موارد استعمال: درمان هیپراورمی، آرتریت های نقرسی، افزایش اورات سدیم و نفروپاتی ناشی از ازدیاد اسیداوریک خون
مقدار مصرف و طرز استعمال: شروع: روزی ۳ بار، هربار ۱ قرص سپس برحسب نیاز بیمار دوز نگاهدارنده تا ۶ قرص ممکن است تغییر

یابد.

عوارض جانبی: دل بهم خوردگی، بثورات جلدی و اسهال با مقادیر زیاد دارو

بسته‌بندی: قرص ۱۰۰ میلی‌گرم × ۱۰۰

بها: ۵۷۵ ریال

ALMACARB
بی. دی. اچ انگلستان
ـ داروپخش ایران

ترکیب: در هرقرص: ژل خشک هیدروکسید آلومینیم + کربنات منیزیم ۳۷۵ میلی‌گرم

موارد استعمال: سوء هضم گاهگاهی، سوء هضم‌های همراه با هیپراسیدیته ترش کردن، التهاب مری.

مقدار مصرف و طرز استعمال: ابتدا یک قرص بعنوان دوز اولیه جویده شود وسپس یک قرص با فواصل منظم بآهستگی مکیده شود.

بسته‌بندی: قرص × ۴۰

بها: ۴۷ ریال

ALMAX
ماکس ـ ایران

ترکیب: در هرقرص ژل هیدروکسید آلومینیم ۱۸۹ میلی‌گرم + هیدروکسید منیزیم ۶۰ میلی‌گرم

موارد استعمال: در زخم معده و روده، زیادی اسید معده

مقدار مصرف و طرز استعمال: بزرگسالان: روزی ۳ بار هربار ۱ ـ ۲ قرص

بسته‌بندی: قرص × ۵۰

بها: ۴۷ ریال

ALMEVAX
ولکام ـ انگلستان

ترکیب: سوش ویروس زنده ضعیف‌شده

موارد استعمال: برای ایجاد ایمنی فعال برضد سرخجه (سرخک آلمانی)

مقدار مصرف و طرز استعمال: ۰/۵ میلی‌لیتر از واکسن ساخته شده.

موارد منع استعمال: در زنان باردار و کسانیکه تحت درمان با استروئیدها هستند.

بسته‌بندی: جعبه محتوی ۱۰ دوز

بها: ۲۷۰ ریال

ALPHACHYMOTRYPSINE
شوئه ـ فرانسه

ترکیب: آلفا کیموتریپسین تهیه شده از پانکراس.

موارد استعمال: تمام ورمها و التهابات ضربه‌ای و عفونی مثل عفونتهای دستگاه تناسلی زنان، شکستگی‌ها و پیچ خوردگی‌ها

مقدار مصرف و طرز استعمال: روزی ۱ ـ ۲ آمپول عضلانی یا ۴ ـ ۶ قرص

بسته‌بندی: قرص ۲۵ واحدی × ۲۰، آمپول ۲۵ واحد × ۵، پماد ۳۰۰ واحدی ۲۰ گرم.

بها: قرص ۱۳۲ ریال. آمپول ۲۰۰ ریال. پماد ۱۰۹ ریال.

ALPHA-KADOL
میدی فرانسه ـ آترا ایران

ترکیب: در هر ۱۰۰ گرم کیموتریپسین ۲۵۰۰ هزار واحد + فنیل بوتازون ۵ گرم.

موارد استعمال: ناخوشی روماتیسمی، کوفتگی، رگ‌برگ شدن، عفونت‌های میکروبی، تورم بعد از ضربه‌ها.

مقدار مصرف و طرز استعمال: روزی ۲ ـ ۳ بار مقدار کمی از پماد را در محل می‌مالند

بسته‌بندی: پماد ۳۵ گرم.

بها: ۱۴۰ ریال.

AL-SI-GEL
ویرا ـ ایران

ترکیب: اکسید آلومینیم ۳۰۰ میلی‌گرم + انسترین + تری‌سیلیکات منیزیم ۱۵۰ میلی‌گرم + لاکتوز ۵۰۰ میلی‌گرم.

موارد استعمال: زخم‌معده و روده، ترشی زیاد معده، درد معده و عوارض آن

مقدار مصرف و طرز استعمال: ۲ ـ ۴ قرص بعد از غذا جویده شود.

بسته‌بندی: قرص × ۵۰

بها: ۳۵ ریال.

ALTHESIN
گلاکسو ـ انگلستان

ترکیب: آلفاکسون به نسبت ۰/۹ درصد وزن به حجم + آلفادولون به نسبت ۰/۳ درصد وزن به حجم.

موارد استعمال: بیهوشی‌های کوتاه‌مدت

مقدار مصرف و طرز استعمال: ۰/۰۵ تا ۰/۰۷۵ میلی‌لیتر برای هر کیلو وزن بدن.

موارد منع استعمال: مامائی، خردسالان کمتر از یکسال، یرقان انسدادی سابقه آلرژی شدید.

عوارض جانبی: سرخ شدن، پرش عضلات، سرفه، سکسکه جاری شدن بزاق، لرز.

بسته‌بندی: آمپول ۵ میلی‌لیتر × ۱۰، آمپول ۱۰ میلی‌لیتر × ۱۰

بها: آمپول ۵ میلی‌لیتر ۵۸۰ ریال، آمپول ۱۰ میلی‌لیتر ۱۰۷۵ ریال.

ALUDROX

وایت ـ آمریکا

ترکیب: در هر قرص: ژل خشک هیدروکسید آلومینیم ۲۳۳ میلی گرم + هیدروکسید منیزیم ۸۳ میلی‌گرم. در هر ۵ میلی‌لیتر شربت: ژل هیدروکسید آلومینیم ۳۰۷ میلی‌گرم + هیدروکسید منیزیم ۱۰۳ میلی‌گرم.

اثر متقابل: بیمارانیکه تحت درمان با یکی از تتراسیکلین‌ها هستند نباید از این دارو استفاده کنند.

موارد استعمال: خنثی کردن اسید معده، زخم‌معده، گاستریت.

مقدار مصرف و طرز استعمال: روزی ۳ بار هربار ۱-۲ قرص، یا ۲ قاشق مرباخوری (۱۰ میلی‌لیتر) هر ۴ ساعت. ۲ قرص آلودروکس ظرفیت خنثی کردن ۲۳ میلی اکی‌والان و ۱۰ میلی‌لیتر شربت ظرفیت خنثی کردن ۲۸ میلی اکی‌والان اسید را دارد.

احتیاط: در ۲۴ ساعت بیش از ۱۲ قاشق مرباخوری (۶۰ میلی لیتر) مصرف نشود

بسته‌بندی: قرص × ۱۲، شربت ۱۲ اونس (۳۶۰ میلی لیتر)

بها: قرص ۶۷ ریال، شربت ۱۳۰ ریال

ALUPENT

بهرینگر اینگلهایم
آلمان ـ تولیدارو ایران

فارماکولوژی و مکانیسم: یک محرک بتاآدرنرژیک است که با فعال کردن آدنیل سیکلاز (آنزیمی که آدنوزین تری‌فسفات را به آدنوزین منوفسفات تبدیل میکند) اثر میکند.

ترکیب: ۱-(۳،۵-دی هیدروکسی فنیل)-۲-ایزوپروپیل آمینو-

اتانول سولفات = متاپروترنول سولفات.

موارد استعمال: برونشکتازی و سل برونکواسپاسم در زمان بیهوشی، برونکوگرافی و برونکوسکپی، برونشیت، آمفیزم، سیلیکوز، مسمومیت با دیژیتال

مقدار مصرف و طرز استعمال: بر حسب نوع و شدت بیماری متفاوتست

موارد منع استعمال: بیماران مبتلا به آریتمی قلبی همراه با تاکیکاردی.

احتیاط و عوارض جانبی: تزریق دارو ممکن است بندرت موجب افزایش زودگذر تعداد ضربانات نبض گردد و معمولا این کیفیت موقعی پیش میاید که مقدار دارو بیش از اندازه مورد احتیاج بوده است.

بسته‌بندی: قرص ۲۰ میلی گرم × ۲۰، آمپول ۰/۵ میلی گرم × ۶

بها: قرص ۸۲ ریال. آمپول ۶۳ ریال.

AMBENYL Expectorant
پارک دیویس
آمریکا ـ ایران

ترکیب: در هر قاشق مرباخوری: سولفات کدئین ۱۰ میلی گرم + آمبودریل ۳/۷۵ میلی گرم + بنادریل ۸/۷۵ میلی گرم + کلرور امونیم ۸۰ میلی گرم + گایاکول سولفونات پتاسیم ۸۰ میلی گرم + مانتول ۰/۵ میلی گرم.

موارد استعمال: سرفه های سخت، سرفه های ناشی از سرماخوردگی و عفونتهای تنفسی، سرفه های اسپاسمودیک، سرفه های آلرژیک سرفه های خشک و مزمن، سرفه های معتادین به سیگار، برونشیت و تراکئوبرونشیت، لارنژیت و رینوفارنژیت.

مقدار مصرف و طرز استعمال: بزرگسالان: روزی ۴ بار، هربار ۱-۲ قاشق مرباخوری، کودکان بالاتر از یکسال روزی ۳-۴ بار، هربار نصف تا یک قاشق مرباخوری.

موارد منع استعمال: کودکان کمتر از یکسال.

بسته‌بندی: شربت ۱۲۰ میلی‌لیتر

بها: ۸۸ ریال

AMBEZIM
ربختر ـ ایتالیا

فارماکولوژی: خاصیت ضد التهابی آنزیمهای پروتئولیتیک پانکراس بطور مستقیم و غیرمستقیم بر روی بافتهای ملتهب اثر میکند.

ترکیب: در هر آمپول: تریپسین ۲/۵ میلی‌گرم + کیموتریپسین ۲/۵ میلی‌گرم. در هر قرص: از هر کدام ۲۰۰ هزار واحد.

موارد استعمال: ترومبوفلبیت، فلبوترومبوز، التهاب پرده صفاق، سلولیت لگن، التهاب قرنیه، اووئیت، ترومبوزرتین، برونشیت حاد و مزمن، سیاه‌سرفه، آبسه ریه، برونکوپنومونی، اوتیت، سینوزیت، جلوگیری و درمان چسبندگیهای بعد از اعمال جراحی و فارنژیت، کورک، کفگیرک، آبسه و فلگمون.

مقدار مصرف و طرز استعمال: در موارد حاد ۲-۳ آمپول در روز. در موارد مزمن ۱ آمپول در روز بمدت ۴-۵ روز از طریق تزریق عضلانی

موارد منع استعمال: هموفیلی، سپتی‌سمی، بیماریهای حاد کبدی، اختلال در انعقاد خون

بسته‌بندی: آمپول ۱ میلی لیتر× ۵. قرص × ۲۴

بها: آمپول ۱۲۵ ریال. قرص ۱۶۹ ریال.

AMBEZIM BALZAMIC

لپتی ایتالیا – ایران

ترکیب: تریپسین و کیموتریپسین ۲۰۰ هزار واحد. گلیسریل گایاکول ۵۰ میلی‌گرم + کلسیم کامفوسولفونات ۲۵ میلی‌گرم + هیدرات ترپین ۲۵ میلی‌گرم.

موارد استعمال: برنشیت حاد و مزمن، آبسه های ریوی، برنشکتازی، سینوزیت، لارنژیت، ترومبوفلبیت، کراتیت، اوتیت.

مقدار مصرف و طرز استعمال: هر ۶ ساعت ۲ قرص

موارد منع استعمال: سندرم های خونریزی‌دهنده، پانکراتیت حاد

بسته‌بندی: دراژه × ۲۴

بها: ۱۹۷ ریال

AMBILHAR

سیبا – سویس

ترکیب: (نیترو-۵ تیازولیل-۲) ایمیدازولیدینون-۲ = نیریدازول

اثر متقابل: نباید توأم با ایزونیازید تجویز گردد.

موارد مصرف: انواع بیلازیوز، آمیباز. دیسانتری شدید آمیبی و خارج روده‌ای، دراکونکولوز

مقدار مصرف و طرز استعمال: ۲۵ میلی گرم برای هر کیلو وزن در ۳ دز مساوی بمدت ۷ روز.

موارد منع استعمال: نارسائی کبدی، سوءتغذیه، کم خونی، صرع، بیماریهای روانی

عوارض جانبی: ادرار رنگی، گاهی تحریک پذیری، اضطراب، بهت روانی، توهم

بسته‌بندی: قرص ۵۰۰ میلی گرم × ۱۰۰۰

بها: ۱۱۰۰۰ ریال

AMBODRYL

پارک دیویس

آمریکا ـ ایران

ترکیب: در هر قاشق مرباخوری شربت: کلریدرات بروموديفن هیدرامین ۱۲/۵ میلی گرم. در هر کپسول ۲۵ میلی گرم

موارد استعمال: واکنش های آلرژیک، زکام یونجه، ادم آنژیو- نوروتیک، اکزما، درماتوزهای آلرژیک، آسم، میگرن، تظاهرات آلرژیک دستگاه گوارش.

مقدار مصرف و طرز استعمال: روزی ۳ بار، هربار ۱ تا چند کپسول شربت: روزی ۳-۴ بار، هربار نصف تا ۲ قاشق مرباخوری.

بسته‌بندی: کپسول × ۲۵. شربت ۱۲۰ میلی لیتر

بها: کپسول ۷۰ ریال. شربت ۵۹ ریال.

AMBRAMYCINE

لپتی ایتالیا ـ ایران

ترکیب: کپسول: تتراسیکلین ۲۵۰ میلی‌گرم + متافسفات سدیم ۳۰۰ میلی‌گرم، سوسپانسیون: (تتراسیکلین ۲۰ میلی‌گرم در هر میلی‌لیتر. قطره خوراکی اطفال: تتراسیکلین ۱۰۰ میلی‌گرم در هرمیلی‌لیتر. پماد جلدی: تتراسیکلین ۳۰ میلی‌گرم در هرگرم + پروپیل - پارائیدروکسی بنزوات ۶ میلی‌گرم در هر گرم + ئیدروکسی بنزوات ۲۴ میلی‌گرم در هرگرم. پماد چشمی: تتراسیکلین ۱۰ میلی‌گرم در هرگرم.

موارد استعمال: پنوموني، برونکوپنومی ریکتزیوز، بروسلوز، عفونت های ادراری و پوستی، سپتی‌سمی

مقدار مصرف و طرز استعمال: روزی ۱۵ - ۱۰ میلی گرم برای هر کیلوگرم وزن بدن در ۴ قسمت مساوی

بسته‌بندی: کپسول × ۱۲ و ۵۰۰، سوسپانسیون ۶۰ میلی‌لیتر، قطره خوراکی ۱۵ و ۱۰ میلی‌لیتر، پماد چشمی ۵ گرم، پماد جلدی ۱۵ گرم

بها: کپسول ۱۲ عددی ۸۴ ریال، ۵۰۰ عددی ۲۹۲۵ ریال. شربت و قطره ۷۶ ریال. پماد چشمی ۱۶ ریال، جلدی ۲۹ ریال.

AMBREDIN
سولکو-فرانسه

ترکیب: کلریدرات فنیل گلیسین-ان-هپتیل ۱۵ میلی گرم + ۲ - آمینو -۶- متیل هپتان فسفات ۱۰ میلی گرم + تئوفیلین ۵۰ میلی گرم.

موارد استعمال: آسم برونشیال، برونشیت اسپاستیک، آمفیزم.

مقدار مصرف و طرز استعمال: روزی ۲-۳ بار، هربار ۱ قرص

بسته‌بندی: قرص × ۲۰

بها: ۴۵ ریال

A.M.C
بوتس انگلستان
- پارس ایران

ترکیب: آمیل متاکرزول ۰/۵ درصد + اسانس نعناع ۰/۵ درصد.

موارد استعمال: دهانشویه و غرغره، آنتی‌سپتیک، جهت درمان و جلوگیری از عفونتهای گلو و دهان.

مقدار مصرف و طرز استعمال: ۲۰ قطره را با یک لیوان آب ولرم (حدود ۲۰۰ میلی‌لیتر) مخلوط کرده و روزی ۳-۴ بار غرغره می کنند.

بسته‌بندی: محلول ۲۸/۴ میلی‌لیتر

بها: ۳۲ ریال.

AMFIPEN
مایکوفارم هلند
- آی دی آی ایران

ترکیب: آمپی‌سیلین

موارد استعمال: کلیه باکتریهای گرم مثبت و گرم منفی

مقدار مصرف و طرز استعمال: برحسب نوع و شدت بیماری متفاوتست

موارد منع استعمال: حساسیت به پنی‌سیلین.

بسته‌بندی: کپسول ۵۰۰ میلی گرم × ۱۲، ۲۵۰ میلی‌گرم × ۱۲

بها: کپسول ۲۵۰ میلی‌گرم ۱۴۴ ریال،
کپسول ۵۰۰ میلی‌گرم ۲۴۰ ریال،

AMINOFUSINL
فلی‌سر ـ آلمان

ترکیب: آمینواسید + کاربوهیدرات + ویتامین + الکترولیت
موارد استعمال: بعد از خونریزی، استنوز ناشی از زخم، بعد از اعمال جراحی یا بیهوشی، سوختگی.
مقدار مصرف و طرز استعمال: برحسب نوع و شدت بیماری متفاوتست.
موارد منع استعمال: حالات شوک، هیپرکالیمی، انوری و الیگوری
بسته‌بندی: محلول فورت، ۱۰۰۰، ۶۰۰، و ۳۰۰ در شیشه ۵۰۰ میلی‌لیتر.
بها: فورت ۱۳۰۰ ریال، ۱۰۰۰-۹۸۰ ریال، ۶۰۰-۸۵۰ ریال، ۳۰۰-۶۹۰ ریال.

AMINOPHYLLIN
لک ـ یوگسلاوی

ترکیب: آمینوفیلین
مکانیسم اثر: با اثر مستقیم عضلات را منبسط، قدرت قلب را افزایش و فیلتراسیون کلیوی را زیاد میکند.
موارد استعمال: آسم برونشیال، نارسائی قلبی، ادم‌نفروتیک و قلبی، اسپاسم عروقی، آنژین صدری.
مقدار مصرف و طرز استعمال: روزی ۱-۲ تزریق عضلانی عمیق یا وریدی با سرعت حداقل ۵ دقیقه برای یک تزریق.
عوارض جانبی: گاهی سردرد، سرگیجه، تهوع، کاهش سریع فشارخون
بسته‌بندی: آمپول ۲۵۰ میلی‌گرم = ۱۰ میلی‌لیتر × ۱۰
بها: ۱۶۵ ریال

AMINOPHYLLINE
عبیدی ـ ایران

ترکیب: تئوفیلین اتیلن دیامین ۱۰۰ میلی‌گرم
موارد استعمال: ورم کلیوی، آسم برونشیال، جلوگیری و درمان آنژین صدری اسپاسم عروق کرونر
مقدار مصرف و طرز استعمال: روزی ۳ بار هربار ۱-۲ قرص
بسته‌بندی: قرص × ۲۵۰

بهاء: ۱۷۵ ریال

AMINOSERYL
روشه تراپوتیک ـ فرانسه

ترکیب: پپتون کازئین ۱۰ درصد
موارد استعمال: قرحه معده و اثنی‌عشر، عوارض آلرژی، نفس‌تنگی، میگرن، کهیر، سینوزیت مزمن، التهابات قرنیه
مقدار مصرف و طرز استعمال: برحسب نوع و شدت بیماری متفاوتست
احتیاط: تزریق را باید با نصف آمپول شروع و در روز چهارم به ۲ عدد رسانید و سپس برای مدت ۲۰-۳۰ روز ادامه داد.
بسته‌بندی: آمپول ۱ میلی‌لیتر× ۱۰
بها: ۷۲ ریال

AMPHISOL
لوندبک ـ دانمارک

ترکیب: آمینوفنیل تیازول
موارد استعمال: فلج مراکز تنفسی ناشی از مسمومیت مرفین، ذات‌الریه، خفگی نوزادان، حالات تنگی نفس مخصوصاً در موارد آسم و آمفیزم.
مقدار مصرف و طرز استعمال: برحسب شدت مسمومیت از ۵-۱۰۰ میلی گرم تغییر مینماید.
بسته‌بندی: آمپول× ۵+ ۵ عدد حلال
بها: ۹۸ ریال

AMOXIL
بنکارد انگلستان ـ ایران

فارماکولوژی: باکتریسید
ترکیب: ۶-(دی-آلفا-آمینو-آلفا-پی-هیدروکسی فنیل استامیدو) پنی‌سیلانیک اسید = آموکسی‌سیلین.
مکانیسم اثر: با وقفه آنزیم ترانس پپتیداز و رقابت با آلانین موجب ساخته نشدن جدار سلول و لیزه شدن آن میشود.
موارد استعمال: عفونتهای دستگاه تنفسی، ادراری، پوست و نسوج نرم.
مقدار مصرف و طرز استعمال: بزرگسالان: هر ۸ ساعت ۷۵۰-۵۰۰ میلی گرم. خردسالان ۱۲۵ میلی گرم
موارد منع استعمال: حساسیت به پنی‌سیلین

بسته‌بندی: کپسول ۲۵۰ و ۵۰۰ میلی گرم × ۱۰۰. شربت ۱۲۵ و ۲۵۰ میلی گرم = ۵ میلی‌لیتر × ۶۰ میلی‌لیتر.
بها: کپسول ۲۵۰ میلی ۲۱۲۸ ریال، کپسول ۵۰۰ میلی ۳۸۳۱ ریال، شربت ۱۲۵ میلی ۱۹۲ ریال شربت ۲۵۰ میلی ۳۰۹ ریال

AMPHOJEL
وایت ـ آمریکا

ترکیب: ژل هیدروکسید آلومینیوم
موارد استعمال: سوء هاضمه ناشی از هیپراسیدیته، ترش کردن
مقدار مصرف و طرز استعمال: روزی ۶ بار، هر بار ۱ ـ ۲ قاشق غذاخوری قبل از غذا
بسته‌بندی: سوسپانسیون ۱۲ اونسی
بها: ۱۰۴ ریال

AMPICIN
تولیدارو ـ ایران

ترکیب: د ـ آلفا ـ آمینوبنزیل پنی‌سیلین = آمپی‌سیلین
موارد استعمال: کلیه عفونتهای ناشی از میکربهای گرم مثبت و گرم منفی
مقدار مصرف و طرز استعمال: هر ۶ ساعت ۱ ـ ۲ کپسول قبل از غذا. شربت: هر ۶ ساعت ۱ ـ ۲ قاشق مرباخوری. قطره ۵۰ میلی گرم برای هر کیلو وزن در چهار قسمت مساوی
موارد منع استعمال: حساسیت به پنی‌سیلین
بسته‌بندی: کپسول ۲۵۰ میلی گرم × ۱۰۰، ۵۰۰ میلی گرم × ۴۸ شربت ۱۲۵ و ۲۵۰ میلی گرم = ۵ میلی‌لیتر × ۶۰ میلی‌لیتر. قطره: ۱۰۰ میلی گرم = ۱ میلی لیتر × ۱۰ میلی‌لیتر
بها: کپسول ۲۵۰ هر عدد ۱۳ریال، ۵۰۰ هر عدد ۲۲ ریال. شربت ۳ گرمی ۱۸۱ ریال، شربت ۱/۵ گرمی ۱۱۷ ریال. قطره ۱۱۷ ریال.

AMPICIN FORTE
تولیدارو ـ ایران

ترکیب: آلفا ـ آمینو بنزیل پنی‌سیلین = آمپی‌سیلین
موارد استعمال: کلیه عفونتهای حساس به آنتی‌بیوتیک فوق.
مقدار مصرف و طرز استعمال: هر ۶ ساعت یک قاشق مرباخوری.
بسته‌بندی: شربت ۲۵۰ میلی گرم = ۵ میلی‌لیتر × ۶۰ میلی‌لیتر

بها: ۱۸۱ ریال.

AMPICLOX

بیچام ــ انگلستان

ترکیب: آمپی‌سیلین + گلوکساسیلین

موارد استعمال: کلیه عفونتهای حساس به آنتی‌بیوتیک فوق.

مقدار مصرف و طرز استعمال: برحسب نوع و شدت بیماری متفاوتست.

موارد منع استعمال: حساسیت به پنی‌سیلین مصرف موضعی در چشم یا زیر ملتحمه

بسته‌بندی: کپسول حاوی ۲۵۰ میلی‌گرم از هریک از آنتی‌بیوتیک فوق × ۱۰۰. ویال حاوی ۲۵۰ میلی گرم از هر کدام. شربت ۱۲۵ میلی گرم از هر کدام = ۵ میلی‌لیتر × ۶۰ میلی‌لیتر. ویال ۷۵ میلی (۵۰ میلی گرم + ۲۵ میلی گرم). قطره خوراکی ۰/۶ میلی‌لیتر (۶۰ میلی‌گرم + ۳۰ میلی‌گرم) = ۸ میلی‌لیتر

بها: کپسول ۲۲۵۰ ریال. ویال ۵۰۰ یک جعبه ۷۹۰ ریال. شربت ۲۰۸ ریال ویال ۷۵ میلی ۴۴۰ ریال، قطره ۱۶۴ ریال.

AMPICO

مینا ــ ایران

ترکیب: آمپی‌سیلین

موارد استعمال: عفونتهای مجاری تنفسی، گوارشی و ادراری، ورم پرده صفاق، آندوکاردیت حاد و مزمن، استئومیلیت.

مقدار مصرف و طرز استعمال: خردسالان تا یکسال: هر ۶ ساعت نصف قاشق مرباخوری، ۱ ـ ۵ ساله: یک قاشق مرباخوری، ۶-۱۲ ساله ۲ قاشق مرباخوری. بزرگسالان ۱ ـ ۳ گرم در روز

بسته‌بندی: گرد: در هر ۵ میلی‌لیتر ۱۲۵ میلی گرم × ۶۰ میلی‌لیتر

بها: ۱۱۰ ریال

AMPLIVIX

لاباز ــ فرانسه

ترکیب: بنزیودارون

موارد استعمال: هیپراوریسمی اصلی و ثانوی در معالجات با دیورتیکها، نقرس رسوبی، نقرس مفصلی مزمن، آمپول: قولنج کلیوی.

مقدار مصرف و طرز استعمال: شروع درمان: روزی ۳ بار، هر بار ۱ قرص. ادامه درمان: روزی ۲ بار، هر بار نصف قرص

بسته‌بندی: قرص ۱۰۰ میلی گرم × ۶۰. آمپول ۱۵۰ میلی گرم × ۶
بها: قرص ۲۵۰ ریال. آمپول ۱۰۶ ریال

AMPY - PENYL
پروتو—سویس

ترکیب: آموکسی‌سیلین تری هیدرات
مکانیسم اثر: مانند پنی‌سیلین با وقفه آنزیم ترانس پپتیداز و رقابت با آلانین موجب ساخته نشدن جدار سلول و لیزه شدن آن میشود.
موارد مصرف: عفونتهای ناشی از هموفیلوس آنفلوآنزا، اشریشیا کلی، پروتئوس میرابیلیس، نیسریاگونوره‌آ، عفونتهای استرپتوکوکی، پنوموکوکی.
مقدار مصرف و طرز استعمال: هر ۶ ساعت ۲۵۰ میلی گرم، خردسالان: هر ۸ ساعت ۱۲۵ میلی گرم
موارد منع استعمال: حساسیت به پنی‌سیلین.
عوارض جانبی: گاهی اسهال و بثورات جلدی.
بسته‌بندی: شربت ۱۲۵ و ۲۵۰ میلی گرم = ۵ میلی‌لیتر × ۶۰ میلی‌لیتر، کپسول ۲۵۰ و ۵۰۰ میلی گرم × ۱۲
بها: شربت ۱۲۵ میلی ۱۶۰ ریال، ۲۵۰ میلی ۲۵۰ ریال، کپسول ۲۵۰ میلی ۲۶۵ ریال ۵۰۰ میلی ۳۱۲ ریال

ANACARDONE
بی.دی.اچ انگلستان
—داروپخش ایران

ترکیب: پیریدون-۳-کربوکسی دی‌اتیل آمید = نیکتامید ۲۵ درصد
موارد استعمال: محرک ملایم تنفسی و قلبی، حالات کلی کولاپس، فرسودگی و خستگی مفرط، ذات‌الریه، آنفلوآنزا، دیفتری، حصبه و مالاریا.
مقدار مصرف و طرز استعمال: بزرگسالان: ۲۰-۸۰ قطره خوراکی خردسالان: نصف مقدار فوق
بسته‌بندی: قطره خوراکی ۱۵ میلی‌لیتر
بها: ۴۱ ریال.

ANALGEC
آی دی آی ـ ایران

فارماکولوژی: آنتی اسپاسمودیک، آنالژزیک
ترکیب: متیل سولفات (هیدروکسی-۳- فنیل-۳ (تی انیل-۲) -۳ پروپیل) -متیل-۴ مورفولینوم ـ تیه‌مونیوم متیل سولفات. در هر شیاف: ۲۰ میلی‌گرم، در هر آمپول: ۵ میلی‌گرم، در هر قرص: ۵۰میلی‌گرم + آموباربیتال ۱۰ میلی‌گرم.
موارد استعمال: اسپاسم و درد دستگاه گوارشی و صفراوی، قاعدگی دردناک.
مقدار مصرف و طرز استعمال: قرص: روزی ۴-۶ عدد، شیاف ۱-۳ عدد، آمپول روزی ۱-۳ تزریق عضلانی یا وریدی
موارد منع استعمال: گلوکوم و آدنوم پروستات
بسته‌بندی: قرص × ۱۰، شیاف × ۲۰، آمپول ۲ میلی‌لیتر × ۲
بها: قرص ۷۶ ریال

ANANASE
ویلیام رورر ـ آمریکا

فارماکولوژی: کاهش دهنده التهاب و ورم و در نتیجه تسکین درد
ترکیب: آنزیمهای پروتئولیتیک حاصل از آناناس ۵۰ هزار واحد.
موارد استعمال: زخم، کوفتگی، شکستگی، سلولیت، فرونکلوز، هماتوم، دررفتگی، رگ‌به‌رگ‌شدن، پیچ خوردگی
مقدار مصرف و طرز استعمال: شروع درمان: روزی ۴ بار، هربار ۲ قرص ادامه درمان: روزی ۳ بار، هر بار ۱ قرص.
موارد منع استعمال: دوران آبستنی
احتیاط: دوران حاملگی، هموفیلی، هپاتیت.
بسته‌بندی: قرص × ۲۵
بها: ۲۲۵ ریال

ANCOFEN
بی. دی. اچ انگلستان
ـ داروپخش ایران

ترکیب: تارتارات ارگوتامین ۱ میلی‌گرم + مکلوزین هیدروکلراید ۱۰ میلی‌گرم + کافئین ۱۰۰ میلی‌گرم.
موارد استعمال: پیشگیری و درمان موقتی میگرن.
مقدار مصرف و طرز استعمال: پیشگیری: ساعتی یک قرص. درمان موقتی: ساعتی ۲ قرص.

موارد منع استعمال: مانند سایر داروهای حاوی ارگوتامین، در زنان باردار، بیماریهای عروقی و خونی فعال.
عوارض جانبی: مصرف زیاد دارو مانند سایر مشابهین باعث پارستزی انگشتان میشود.
احتیاط: روزانه بیش از ۶ قرص و در هفته بیشتر از ۱۲ قرص نباید مصرف شود
بسته‌بندی: قرص × ۱۰
بها: هرجعبه ۷۶ ریال

ANDOSALT
آویسن-ایران

ترکیب: هر بسته: اسید تارتاریک ۲ گرم+سولفات منیزیم ۰/۸۵ گرم+بی کربنات سدیم ۲/۱۵ گرم+ساخارین ۰/۰۰۲۵ گرم
موارد استعمال: ناراحتیهای معدی و صفراوی و سوءهاضمه های اسیدی
مقدار مصرف و طرز استعمال: محتوی یک بسته را در یک لیوان آب ریخته صبح ناشتا و یا آخرشب مینوشند.
بسته‌بندی: بسته ۵ گرم × ۵۰
بها: ۱۴۱ ریال

ANDREWS
وینتروپ آمریکا
-ایران

ترکیب: در هر بسته ۵ گرمی: بی کربنات سدیم ۴۲ درصد+اسید تارتریک ۴۰ درصد+سولفات منیزیم ۱۷ درصد+ساخارین ۵ درصد
موارد استعمال: بعنوان ملین، آنتی اسید، کولاگوک.
مقدار مصرف و طرز استعمال: محتوی پاکت را در یک لیوان آب ریخته صبح ناشتا مینوشند.
موارد منع استعمال: بیماریهای کلیوی.
بسته‌بندی: بسته ۵ گرم × ۵۰
بها: ۱۷۶ ریال

ANETHAINE
گلاکسوانگلستان
- داروپخش ایران

ترکیب: کلریدرات آمتوکائین
موارد استعمال: دردهای سطحی مانند سوختگیهای خفیف، آبسه،

شقاق مقعد، بواسیر، تحریکات، خارشهائی که به دنبال نیش و گزش حشرات ایجاد میشود

مقدار مصرف و طرز استعمال: با فواصل متناسب، بمقادیر کم روی بریدگیها مالیده می‌شود.

بسته‌بندی: پماد ۱ درصد ۲۵ گرم همراه با آپلیکاتور

بها: ۴۷ ریال

ANETRON
شرینگ ـ آلمان

ترکیب: سرم گونادوتروفین

موارد استعمال: نازائی زنان و عقیمی مردان، آمنوره

مقدار مصرف و طرز استعمال: برحسب نوع و شدت بیماری متفاوتست.

موارد منع استعمال: دوران بارداری

بسته‌بندی: آمپول عضلانی ۱۰۰۰ واحدی × ۳ همراه با ۳ عدد حلال ۲ میلی لیتر. آمپول عضلانی ۵۰۰۰ واحدی × ۳ همراه با ۳ عدد حلال.

بها: ۲۴۰ ریال

ANGININ
بانیو ـ ژاپن

ترکیب: در هر قرص: پیریدینول کاربامات ۲۵۰ میلی گرم

موارد استعمال: آترواسکلرز، آریتمی های قلبی، حالات پورپورائی، استئوآرتریت آنژه‌ئیت، تاکی کاردیها و بی‌نظمی بطنی و دهلیزی

مقدار مصرف و طرز استعمال: روزی سه بار هربار ۱ ـ ۳ قرص

بسته‌بندی: قرص × ۲۰

بها: ۳۵۱ ریال

ANGIOGRAFIN
شرینگ ـ آلمان

ترکیب: درهرمیلی‌لیتر: ملح متیل گلوکامین، ان، ان ـ دی‌استیل ـ ۳، ۵ ـ دی‌آمینو ـ ۲، ۴، ۶ تری‌ید و بنزوئیک اسید معادل ۳۰۶ میلی گرم ید

موارد استعمال: کلیه آزمایشهای آنژیوگرافیک مخصوصاً آنژیوگرافی اعضا (دست و پا) بدون داروی بیحسی، آنژیوگرافی مغزی، آنژیوگرافی انتخابی شکم وسینه، ارتریوگرافی لگن و اطراف، ائورتو-

گرافی شکم و سینه، اورگانو-آنژیوگرافی انتخابی شکم، انژیو-کاردیوگرافی، آنژیوگرافی کاروتید، رادیوگرافی سپرزو وریدباب

بسته‌بندی: شیشه های ۵۰ میلی‌لیتر× ۱ و ۵، آمپول ۱۰ میلی‌لیتر× ۱ و ۵

بها: ۱۰ میلی یکعددی ۱۱۰ ریال، ۵ عددی ۵۰۰ ریال، ۵۰ میلی یکعددی ۴۰۰ ریال، ۵ عددی ۱۵۱۹ ریال.

ANGOSEDINE
ویفور—سویس

ترکیب: دی‌هیدروکسی پروپیل تئوفیلین ۱۰۰ میلی‌گرم+ پریترول ۲۰ درصد ۱۲/۵ میلی‌گرم+آدیفنین ۱۵ میلی‌گرم+ عصاره والریان ۳۰ میلی‌گرم+فنوباربیتال ۱۵ میلی‌گرم+ کافئین ۵۰ میلی‌گرم.

موارد استعمال: نارسائی عروق کرونر، انفارکتوس‌میوکارد

مقدار مصرف و طرز استعمال: روزی ۳ بار، هربار یک دراژه

بسته‌بندی: دراژه × ۲۰

بها: ۷۰ ریال

ANIODOL
شوم فرانسه
—فارماشیمی ایران

ترکیب: فورمال‌دوگلیسیرین ۲۰ درصد+فورمالدئید ۰/۷۹ میلی‌گرم+ سنوول‌آلیلیک ۰/۱ میلی‌گرم+ اسید بوریک ۵۰ میلی‌گرم.

موارد استعمال: احتقان اعضاء لگن، ورم مهبل فرج و زهدان، انواع لوکوره، زخم گردن رحم.

مقدار مصرف و طرز استعمال: شبها یک اوول درعمق مهبل قرار داده و چند ساعت به پشت بخوابند.

بسته‌بندی: اوول× ۶

بها: ۵۳ ریال

ANNEXINE
برنا—سویس

ترکیب: آنتی‌ژنهای اختصاصی شامل میکروبهای گونوکوک، استرپتوکوک، استافیلوکوک وکلی باسیل، آنتی‌ژنهای غیر اختصاصی شامل لیپوپروتئین ها

موارد استعمال: درمان عفونت‌های مزمن دستگاه تناسلی زنان و ترشح

مزمن مجرای ادرار مردان مانند متریت آندومتریت، سالپنگو اواریت مزمن.

مقدار مصرف و طرز استعمال: زیر جلد یا داخل عضلانی به ترتیب شماره ۲ تا ۳ روز در میان تزریق می‌گردد.

موارد منع استعمال: سل دستگاه تناسلی زنان.

بسته‌بندی: آمپول فبل، فورت، اکسترا فورت × ۶

بها: فبل ۶۷ ریال، فورت ۷۵ ریال، اکسترا فورت ۸۰ ریال.

ANTAL
اپوشیمیوتراپی ـ فرانسه

ترکیب: در هر آمپول: سولفات آتروپین ۱ میلی گرم + برمورسدیم ۰/۵ گرم + برمور کلسیم ۰/۵ گرم + آب مقطر تا ۱۰ میلی‌لیتر

موارد استعمال: قرحه‌های معده و دوازدهه، زیادی ترشحات معده، تشنجات دستگاه گوارش، قولنج کبدی

مقدار مصرف و طرز استعمال: روزی یک آمپول بشکل تزریق آهسته داخل وریدی بمدت درمان ۱۰ ـ ۲۰ روز که فاصله هر دوره درمان یک ماه میباشد.

بسته‌بندی: آمپول × ۱۰

بها: ۹۵ ریال

ANTEPAR
ولکام ـ انگلستان

ترکیب: پی‌پرازین فسفات

موارد استعمال: درمان عفونتهای ناشی از کرمهای آسکاریس و اکسیور

مقدار مصرف و طرز استعمال: اکسیور: خردسالان ۲ ـ ۴ سال ۱/۵ قرص، ۵ ـ ۱۲ سال ۳ قرص. بزرگتر از ۱۳ سال چهار قرص در روز.

آسکاریس: ۲ ـ ۸ سال ۵ ـ ۴ قرص، ۹ ـ ۱۲ سال ۶ قرص ۱۳ ـ ۱۶ سال ۷/۵ قرص، بالاتر: ۸ قرص در روز.

موارد منع استعمال: بیماران مبتلا به صرع کوچک و بزرگ

احتیاط: در نارسائیهای کبدی باید با احتیاط مصرف شود

عوارض جانبی: گاهی سرگیجه، پاراستزی

بسته‌بندی: قرص ۵۰۰ میلی گرم × ۲۰

بها: ۴۸ ریال

ANTEPSIN
شیگائی ژاپن
ـ فارماشیمی ایران

ترکیب: اولسرمین
موارد استعمال: زخم‌معده و اثنی‌عشر، گاستریت.
مقدار مصرف و طرز استعمال: روزی سه بار هر بار ۱ قرص وسط غذا
بسته‌بندی: قرص ۲۵۰ میلی گرم × ۵۰
بها: ۱۴۱ ریال

ANTHISAN
می‌اندبیکر ـ
انگلستان

ترکیب: مپیرامین مالئات
موارد استعمال: تب یونجه، کهیر، خارش، حساسیت‌های مختلف.
مقدار مصرف و طرز استعمال: روزی ۳ ـ ۴ بار، هربار یک قرص یا یک قاشق مرباخوری شربت همراه با غذا. آمپول: روزی یک عدد کرم: مقدار کافی بطور موضعی استعمال شود
موارد منع استعمال: از کرم نباید درموارد اکزما و یا وقتیکه سطح پوست جراحات وسیعی برداشته است استفاده شود.
بسته‌بندی: قرص ۵۰ و ۱۰۰ میلی‌گرم × ۲۵. شربت ۱۲۵ میلی‌لیتر. آمپول ۲ میلی‌لیتر × ۱۰.
بها: قرص ۵۰ میلی ۳۸ ریال، ۱۰۰ میلی ۵۵ ریال، شربت ۸۸ ریال. آمپول ۱۱۵ ریال.

ANTIBIOPHILUS
لیوسانترفرانسه
ـ آی دی آی ایران

ترکیب: لاکتوباسیلوس اسیدوفیلوس.
موارد استعمال: عوارض ناشی از درمان آنتی‌بیوتیکها، اسهال بعلل مختلف.
مقدار مصرف و طرز استعمال: روزی ۲ ـ ۸ کپسول.
بسته‌بندی: کپسول × ۲۰
بها: ۱۱۷ ریال

ANTIPHLOGISTINE
ANTIPHLOGISTINE RUB
دوپار ـ ایران

ترکیب: اسید سالیسیلیک ۰/۱ درصد + اسانس اوکالیپتوس ۰/۵ درصد + مانتول ۰/۷۵ درصد + کامفر ۱ درصد + سالیسیلات‌متیل ۱۲ درصد + اکسیپیان تا ۱۰۰ درصد

موارد استعمال: دردهای سینه و گلو، دردهای عصبی، روماتیسمی، سیاتیکی، لمباگو، نورالژی، پیچ خوردگی.

مقدار مصرف و طرز استعمال: روزی چند بار بر روی محل میمالند

احتیاط: با چشمها و زخمهای باز نباید تماس پیدا کند.

بسته‌بندی: خمیر ۱۰۰ گرم، پمادراب ۶۰ گرم

بها: خمیر ۲۹ ریال. پماد ۳۵ ریال

ANTISACER
واندر ـ سویس

ترکیب: در هر دراژه: ۵ و ۵ دی‌فنیل هیدانتوئینات سدیم ۰/۱ گرم.

موارد استعمال: صرع اصلی و علامتی

مقدار مصرف و طرز استعمال: روزی ۳ - ۴ دراژه

عوارض جانبی: اختلالات عصبی، بثورات آلرژی.

بسته‌بندی: دراژه × ۲۰

بها: ۶۰ ریال

ANTISACER Compositum
واندر ـ سویس

ترکیب: آنتی‌ساسر ۱۰۰ میلی‌گرم + فنوباربیتال ۲۵ میلی‌گرم + بروموروپتاسیم ۴۰۰ میلی‌گرم + سیترات کافئین ۱۲/۵ میلی‌گرم + سولفات آتروپین ۰/۲۵ میلی‌گرم. در هر قرص اطفال: بترتیب: ۵۰ میلی‌گرم + ۲۵ میلی‌گرم + ۲۰۰ میلی‌گرم + ۱۰ میلی‌گرم + ۰/۲ میلی‌گرم.

موارد استعمال: صرع علامتی و اصلی

مقدار مصرف و طرز استعمال: روزی ۱ - ۲ دراژه.

بسته‌بندی: دراژه اطفال و بزرگسال × ۶۰

بها: دراژه اطفال ۱۰۰ ریال. دراژه بزرگسال ۱۲۰ ریال.

ANTISTINE
سیبا ـ سویس

ترکیب: فنیل ـ بنزیل ـ امینواتیل ـ ایمیدازولین. آمپول: متان سولفونات ایمیدازولین

موارد استعمال: آلرژی غذائی، تب یونجه، رینیت آلرژیک، کهیر.

مقدار مصرف و طرز استعمال: خردسالان: روزی ۱ ـ ۲ بار، هربار ۰/۵ قرص. بزرگسالان: روزی ۳ ـ ۴ بار، هربار ۱ قرص. آمپول: روزی ۱ ـ ۳ بار، هر بار یک آمپول عضلانی یا وریدی بطور آهسته.

بسته‌بندی: قرص ۱۰۰ میلی‌گرم × ۲۰. آمپول (بصورت متان‌سولفونات ۱۰۰ میلی‌گرم) ۲ میلی‌لیتر × ۵

بها: قرص ۴۰ ریال. آمپول ۷۰ ریال

ANTISTINE - PRIVINE
سیبا ـ سویس

ترکیب: سولفات آنتیستین ۰/۵ درصد + پرایوین ۰/۰۲۵ درصد

موارد استعمال: رینیت حاد، زکام یونجه، ورم ملتحمه بهاره، ورم ملتحمه تحریکی.

مقدار مصرف و طرز استعمال: روزی ۳ ـ ۴ بار، هربار ۲ ـ ۳ قطره در چشم یا بینی میچکانند.

بسته‌بندی: قطره ۱۰ میلی‌لیتر.

بها: ۸۵ ریال

ANTRENYL
سیبا ـ سویس

ترکیب: در هر قرص: استربرمومتیلات دی اتیل آمینو اتیلیک اسید فنیل ـ سیکلو هگزیل ـ گلیکولیک = برموراکسی فنونیم ۵ میلی‌گرم.

موارد استعمال: اسپاسم دستگاهها و اعضای مختلف، زخم معده و اثنی‌عشر.

مقدار مصرف و طرز استعمال: خردسالان: ۱ ـ ۳ بار در روز، هربار ربع قرص. بزرگسالان: روزی چند بار هربار ۱ ـ ۲ قرص

موارد منع استعمال: گلوکوم، انسداد مجاری ادراری

بسته‌بندی: قرص × ۳۰

بها: ۵۰ ریال

ANTRENYL Duplex
سیبا ـ سویس

ترکیب: آنترنیل ۱۰ میلی‌گرم.
موارد استعمال: اسپاسم عضلات صاف
مقدار مصرف و طرز استعمال: روزی ۲ عدد صبح و شب.

موارد منع استعمال: گلوکوم، انسداد مجاری ادراری
عوارض جانبی: خشکی دهان، اختلالات تطابق.
بسته‌بندی: دراژه× ۲۰
بها: ۶۰ ریال

APONAL
بهرینگرمانهایم ـ آلمان

ترکیب: آپونال ۲۵: کلریدرات دوگزپین ۲۸/۲۶ میلی‌گرم. آپونال ۱۰: کلریدرات دوگزپین ۱۱/۳۱ میلی‌گرم. آپونال ۵: کلریدرات دوگزپین ۵/۶۵ میلی‌گرم.
اثر متقابل: همراه با مسکن ها، ضد دردها و الکل اثرش تقویت میشود.
موارد استعمال: درمان دپرسیون، اضطراب، اختلال در خواب، بیماریهای پسیکوسوماتیک
مقدار مصرف و طرز استعمال: یک دراژه آپونال ۱۰ دو تا سه ساعت پیش از خواب میل شود. در موارد شدید دو دراژه. درمواقعی که علائم سبک است درمان را با یک آپونال ۵ شروع میکنند. در دپرسیونهای حاد بمقدار ۷۵ تا ۳۰۰ میلی‌گرم.
موارد منع استعمال: گلوکوم، هیپرترفی پروستات، مسمومیت با داروهای خواب‌آور. درمان همزمان با داروهای وقفه‌دهنده منوآمینو‌اکسیداز.
احتیاط: بیماران سرپائی نباید بیش از ۷۵ میلی‌گرم در روز مصرف کنند.
بسته‌بندی: دراژه × ۲۰
بها: آپونال ۱۰: ۱۰۰ ریال آپونال ۵: ۶۰ ریال، آپونال ۲۵: ۱۴۰ ریال.

A.P.P
دلکن ـ انگلستان

ترکیب: کربنات کلسیم ۳۷/۸۲ درصد + کربنات منیزیم ۳۷ درصد + تری سیلیکات منیزیم ۱۱/۴۸ درصد + کربنات بیسموت ۵ درصد+

ژل ئیدروکسید آلومینیم ۳ درصد + کلریدرات پاپاورین ۱ درصد + متیل برمور هوماتروپین ۰/۱ درصد + فنوباربیتال ۵ درصد

موارد استعمال: دردهای معده، بیماری حاملگی، زیادی اسیدیته معده، بیماری مسافرت

مقدار مصرف و طرز استعمال: یک قاشق غذاخوری در آب یا مایعات ریخته و موقع احساس درد میخورند.

بسته‌بندی: پودر ۱۰۰ گرم، قرص × ۵۰

بها: پودر و قرص ۹۲ ریال

APTIN
آسترا ـ سوئد

ترکیب: آلپرنولل

موارد استعمال: آنژین دوپواترین، انواع فشارخون، طپش قلب، آریتمی‌های شدید

مقدار مصرف و طرز استعمال: روزی ۴ بار هربار ۱ قرص. مقدار نگاهدارنده: روزی ۲ قرص. آمپول: روزی یک تزریق وریدی

موارد منع استعمال: بیهوشی با اتر و کلروفرم بلوک AV نوع ۲ و ۳، آسم برونشیک، اسیدوزمتابولیک.

بسته‌بندی: قرص ۵۰ میلی‌گرم × ۳۰. آمپول ۱ میلی‌گرم ـ ۱۰ میلی‌لیتر × ۵

بها: قرص ۲۲۵ ریال. آمپول ۴۰۰ ریال

APTIN DURULES
آسترا ـ سوئد

ترکیب: آلپرنولل ۲۰۰ میلی‌گرم

موارد استعمال: آنژین، طپش قلب، اریتمی و فشارخون.

مقدار مصرف و طرز استعمال: روزی ۳ بار، هربار یک قرص

موارد منع استعمال: نارسائی قلبی، آسم برونشی، بلوک AV نوع یک و دو.

بسته‌بندی: قرص × ۱۰۰

بها: ۱۲۰۰ ریال

AQUA - DRIN
ماکسون آمریکا
ـ تولیدارو ایران

ترکیب: کلریدرات فنیل افرین ۰/۲۵ درصد + سدیم اتیل مرکوری تیوسالیسیلات ۰/۰۰۴ درصد

موارد استعمال: قطره: رفع گرفتگی بینی. قرص: گلودرد، ورم حلق و لوزه‌ها.

مقدار مصرف و طرز استعمال: هر ۳ ساعت ۱ قرص مکیده شود. قطره بینی: روزی ۳ بار، هربار ۳ قطره در بینی چکانده شود

بسته‌بندی: قطره بینی ۲۸ میلی‌لیتر، قرص مکیدنی × ۴

بها: ۴۷ ریال. قرص هرعدد ۸ ریال

AQUAMOX
لدرلی آمریکا
ـ ایران

ترکیب: در هرقرص کینتازون ۵۰ میلی‌گرم

موارد استعمال: درمان انواع اِدم‌های ناشی از احتباس نمک ازقبیل ادم همراه با نارسائی قلب، سندرم نفروتیک، ورمهای بارداری، سندرم قبل ازقاعدگی.

مقدار مصرف و طرز استعمال: یک تا دو قرص صبحها مصرف میگردد

احتیاط: وقتیکه با سایر داروهای ضد فشارخون مصرف میشود مقدار خوراك آن بعلت ازدیاد قدرت باید تقلیل یابد.

بسته‌بندی: قرص × ۱۰۰

بها: ۶۰۰ ریال

ARALEN
وینتروپ آمریکا
ـ ایران

فارما کولوژی: مؤثر بر اشکال اریتروسیتیک پلاسمودیوم ویواکس و بیشترسوشهای پلاسمودیوم فالسیپاروم.

ترکیب: در هر قرص: دی‌فسفات کلروکین ۲۵۰ میلی‌گرم.

موارد استعمال: پیشگیری و درمان مالاریا، آمیبیاز خارج روده‌ای، بیماریهای کولاژن، آرتریت روماتوئید

مقدار مصرف و طرز استعمال: خردسالان: نصف مقدار بزرگسالان. بزرگسالان: ابتدا ۴ قرص، بعد از ۸ ساعت ۲ قرص و دو روز بعد ۲ قرص

موارد منع استعمال: آرتریت روماتوئید و لوپوس اریتماتوز

احتیاط: درصورت بروز کوچکترین عارضه درکودکان مصرف دارو باید

قطع شود.
بسته‌بندی: قرص × ۱۰
بها: ۲۹ ریال

ARAM
پارک ـ ایران

ترکیب: اسید استیل سالیسیلیک + استانیلید + کافئین + فنوباربیتال
موارد استعمال: مسکن، تب‌بر، ضد روماتیسم
مقدار مصرف و طرز استعمال: روزی ۱ ـ ۶ قرص
موارد منع استعمال: زخم معده و اثنی‌عشر، ناراحتی های قلبی.
بسته‌بندی: قرص × ۱۰۰
بها: ۵۹ ریال

ARAMIN
داروپخش ـ ایران

ترکیب: هر قرص: پاراستامل ۲۲۵ میلی‌گرم + سالیسیلامید ۲۲۵ میلی‌گرم + مفنزین ۷۵ میلی‌گرم
موارد استعمال: بعنوان مسکن درد و تب، ضد اسپاسم
مقدار مصرف و طرز استعمال: یک یا دو قرص هرسه یا چهار ساعت یکبار یا در مواقع شروع درد
بسته‌بندی: قرص × ۱۰۰
بها: ۱۷۶ ریال

ARCOBUTINA
آرکو ـ سویس

ترکیب: ۲ ـ منوفنیل ـ ۳، ۵ دی اکسو ـ ۴ ـ ان ـ بوتیل پیرازولیدین ۳۰۰ میلی‌گرم + پیرامیدون ۱۲۵ میلی‌گرم
موارد استعمال: روماتیسم، آرتریت
مقدار مصرف و طرز استعمال: روزی ۴ـ۸ بار، هربار ۱ قرص همراه با غذا.
موارد منع استعمال: سه‌ماهه اول بارداری
بسته‌بندی: قرص × ۲۰
بها: ۹۰ ریال

ARCOCILLIN
آی‌سی ان آرکو- ایتالیا

ترکیب: آمپی‌سیلین
موارد استعمال: عفونتهای ناشی از میکربهای گرم مثبت و گرم منفی
مقدار مصرف و طرز استعمال: هر ۶ ساعت یک کپسول میل شود.
موارد منع استعمال: حساسیت به پنی‌سیلین
بسته‌بندی: کپسول ۲۵۰ میلی‌گرمی × ۱۶ و ۱۰۰۰
بها: ۱۶ عددی ۹۰ ریال، ۱۰۰۰ عددی ۴۶۰۰ ریال

ARGYROL
دوپار- ایران

ترکیب: در هر ۱۰۰ میلی‌لیتر آرژیرول ۵ گرم
موارد استعمال: جهت ضدعفونی چشم
مقدار مصرف و طرز استعمال: روزی ۳ بار، هربار دو قطره در چشم می‌چکانند.
بسته‌بندی: قطره چشمی ۱۰ میلی‌لیتر
بها: ۲۷ ریال

ARGYROPHEDRINE
آرون- فرانسه

ترکیب: پروتئینات نقره + لوولینات افدرین + کلسیم
موارد استعمال: درمان و پیشگیری کلیه عفونتهای حلق و بینی، سینوزیت، استوماتیت، اوتیت.
مقدار مصرف و طرز استعمال: روزی ۳-۴ بار، هربار ۱-۲ قطره در بینی می‌چکانند.
بسته‌بندی: قطره بینی ۱۰ میلی‌لیتر
بها: ۳۱ ریال

ARLEF
پارک دیویس - انگلستان

ترکیب: اسید فلوفنامیک
موارد استعمال: آرتریت روماتوئید، استئوآرتریت، بورسیت، تاندوسینوویت اسپوندیلیت، فیبروزیت، ترومبوفلبیت، سایر حالات روماتیسمی، التهابات لگنی، پارامتریت‌ها، آنکسیت‌ها، تسکین و رفع التهاب و درد پس از اعمال جراحی.
مقدار مصرف و طرز استعمال: شروع درمان: روزی ۳ بار، هربار ۲ کپسول همراه غذا. ادامه: پس از ۴ هفته روزی ۴ کپسول، افراد کمتر از ۴۵ کیلوگرم: روزی ۱۰ میلی‌گرم برای هر کیلووزن

موارد منع استعمال: آبستنی، شیردهی، قرحه‌های دستگاه گوارش
عوارض جانبی: گاهی تهوع، استفراغ و اسهال
بسته‌بندی: کپسول ۱۰۰ میلی‌گرم × ۳۰
بها: ۱۶۰ ریال

AROBON
نستله ـ سویس

ترکیب: مغز میوه خرنوب (سراتونیاسیلیکا) + نشاسته + کاکائو
موارد استعمال: جلوگیری از اسهالهای ناشی از گرما و مسمومیت، سوء‌هاضمه‌های حاد یا مزمن، اسهال خونی، آنتریت، کولیت، بیماری سلیاک
مقدار مصرف و طرز استعمال: برطبق سن و بیماری مقداری ازگرد را با آب جوشیده یا شیر مخلوط کرده میل نمایند.
بسته‌بندی: گرد ۱۵۰ گرم.
بها: ۶۵ ریال

AROVIT
روش ـ سویس

ترکیب: در هرآمپول: ویتامین A ۳۰۰ هزار واحد، در هردراژه: ۵۰ هزار واحد.
موارد استعمال: تمام موارد کمبود این ویتامین در بیماریهای داخلی، زنان، کودکان، گوش و حلق و بینی، چشم‌پزشکی، بیماریهای جلدی.
مقدار مصرف و طرز استعمال: روزی ۱-۳ قرص جویدنی هنگام غذا یا بعد از آن. آمپول: هفته‌ای ۱-۲ تزریق عضلانی عمیق
بسته‌بندی: آمپول ۱ میلی‌لیتر × ۳. دراژه × ۳۰
بها: قرص ۱۷۰ ریال، آمپول ۱۶۰ ریال

ARTANE
لدرلی آمریکا ـ ایران

فارماکولوژی و مکانیسم: وقفه‌دهندهٔ مستقیم دستگاه اعصاب پاراسمپاتیک
ترکیب: در هرقرص: کلریدرات تری هگزی فنیدیل ۲ میلی‌گرم
موارد استعمال: بعنوان داروی ملازم در تمام اشکال پارکینسونیسم.
مقدار مصرف و طرز استعمال: در ابتدا درمان با ۲ میلی‌گرم در روز شروع

میگردد و سپس هر روز ۲ میلی‌گرم افزوده میشود تا به ۶ الی ۱۰ میلی‌گرم برسد.

عوارض جانبی: در برخی بیماران خشکی دهان، تاری دید دیده میشود. اگر تهوع و یا اختلالات چشمی دیده شود دارو را باید موقتاً قطع کرده و مجددا با مقدار کم شروع نمود.

بسته‌بندی: قرص × ۱۰۰

بها: ۱۴۶ ریال

ARTRONEURIL
انستیتومدیکامنتا ـ ایتالیا

ترکیب: در هر قرص: ویتامین B_{12} ۲۰۰ میکروگرم + ویتامین B_1 ۱۵۰ میلی‌گرم + آدنوزین منوفسفریک اسید ۵ میلی‌گرم + ۱ و ۴ ـ دی‌فنیل ۳، ۵ ـ دی‌اکسو ـ پیرازولیدین ۱۰۰ میلی‌گرم + دی‌متیل آمینوفنازول ۱۰۰ میلی‌گرم. در هر آمپول خشک: ویتامین B_{12} ۱۰۰۰ میلی‌گرم + ویتامین B_1 ۱۰۰ میلی‌گرم + آدنوزین فسفات سدیم ۱۵ میلی‌گرم + کلریدرات لیدوکائین ۸ میلی‌گرم، در هر آمپول محلول: متیل آمینوفنازون‌ـ متان سولفونات سدیم ۴۰۰ میلی‌گرم.

موارد استعمال: نورآلژی و میالژی، نوریت پلی نوریت، آرترالژی، هرپس پلی آرتریت حاد و مزمن، آرتریت روماتوئید، اسپوندیلوز، فیبروزیت، لومباگو.

مقدار مصرف و طرز استعمال: قرص: روزی ۱ ـ ۴ عدد. آمپول: یکروزـ درمیان یک تزریق عضلانی ۲ ـ ۳ دوره متوالی بفاصله ۴ ـ ۵ روز.

موارد منع استعمال: سه‌ماهه اول آبستنی.

بسته‌بندی: قرص × ۲۰ آمپول خشک × ۵ + حلال ۴ میلی‌لیتر × ۵

بها: قرص ۱۶۵ ریال آمپول ۲۰۰ ریال

ASCAPHEN
واندر ـ سویس

ترکیب: سانتونین ۰/۰۵ گرم + فنل‌فتالئین ۰/۱ گرم، خردسالان: ۰/۰۲۵ گرم + فنل‌فتالئین ۰/۰۵ گرم.

موارد استعمال: آسکاریدوز

مقدار مصرف و طرز استعمال: بزرگسالان: روزی ۱ ـ ۳ دراژه. خردسالان:

۲-۳ ساله، یک دراژه، ۴-۶ ساله ۲ دراژه، ۷-۹ ساله: ۳ دراژه در دفعات متعدد.

احتیاط: قبل و در مدت درمان چربی باید از غذا حذف شود.

بسته‌بندی: دراژه اطفال و بزرگسالان × ۹

بها: دراژه اطفال ۴۰ ریال، دراژه بزرگسالان ۵۰ ریال.

ASCORVIT
تولیدارو-ایران

ترکیب: ویتامین C با عصاره طبیعی پرتقال

موارد استعمال: کلیه موارد ناشی از کمبود ویتامین C ، ازدیاد مقاومت بدن در مقابل بیماریهای عفونی.

مقدار مصرف و طرز استعمال: روزی ۱-۲ بسته را در آب حل کرده میل شود.

بسته‌بندی: بسته ۵۰۰ و ۱۰۰۰ میلی‌گرم × ۱۰

بها: ۵۰ میلی‌گرم ۷۸ ریال، ۱۰ گرمی ۸۴ ریال

ASCOXAL
آسترا-سوئد

ترکیب: در هر قرص: اسید اسکوربیک + پر کربنات سدیم + سولفات مس

موارد استعمال: ژنژیویت، استوماتیت حاد و مزمن، عفونت‌های قارچی دهان، قبل و بعد از عمل جراحی.

مقدار مصرف و طرز استعمال: ۱ یا چند قرص را در ۲۵ میلی‌لیتر آب گرم حل نموده و ۱-۲ دقیقه دهان را با آن میشویند.

بسته‌بندی: قرص × ۲۴

بها: ۱۲۵ ریال

ASCXAL-N
آسترا-سوئد

ترکیب: ویتامین C ۱۰۰ میلی‌گرم + پر کربنات سدیم ۷۰ میلی‌گرم + سولفات مس ۰/۲ میلی‌گرم.

موارد استعمال: ژنژیویت، استوماتیت قارچی، پروفیلاکسی بیماریهای دهان و دندان، رفع بوی بد دهان.

مقدار مصرف و طرز استعمال: مانند قرص ساده

بسته‌بندی: قرص × ۱۵

بها: ۷۵ ریال

ASEPSO
ادوارد کوک ـ انگلستان

ترکیب: محلول ۳ درصد بی یدور مر کوریک
موارد استعمال: جلوگیری از عفونت، ضدعفونی عمومی، بیماریهای انگلی خارش دار پوست.
مقدار مصرف و طرز استعمال: پوست و مو را با آن میشویند.
بسته‌بندی: صابون ۹۰ گرم.
بها: ۵۰ ریال

ASKINE
عبیدی ـ ایران

ترکیب: کافئین ۴۰ میلی‌گرم + استیل ـ پارا آمینوفنل ۰/۲۵ گرم + اسید استیل سالیسیلیک ۰/۴ گرم + فنورباربیتال ۱۵ میلی‌گرم.
موارد استعمال: سردرد، دردهای عضلانی، روماتیسم مفصلی، دردهای ناشی ازسرماخوردگی
مقدار مصرف و طرز استعمال: بزرگسالان: روزی ۴ بار، هربار ۱ ـ۲ قرص. خردسالان: نصف مقدار فوق
بسته‌بندی: قرص × ۲۰۰
بها: ۳۵۱ ریال

ASMAC
واندر ـ سویس

ترکیب: آللوباربیتال ۳۰ میلی‌گرم + کلریدرات افدرین ۱۵ میلی‌گرم + کافئین ۱۰۰ میلی‌گرم + تئوفیلین اتیلن دیامین ۱۵۰ میلی‌گرم + عصاره ایپکا ۲۰ میلی‌گرم
موارد استعمال: آسم‌های برونشیک
مقدار مصرف و طرز استعمال: روزی ۰/۵ ـ ۱ قرص
موارد منع استعمال: دوران آبستنی.
بسته‌بندی: قرص × ۲۰
بها: ۶۴ ریال

ASMAC Retard
واندر ـ سویس

ترکیب: کلریدرات افدرین ۲/۵ میلی‌گرم + تئوفیلین ۷۵ میلی‌گرم + آللوباربیتال ۱۵ میلی‌گرم + کافئین ۲۵ میلی‌گرم +

کلریدرات امتین ۰/۲ میلی‌گرم

موارد استعمال: آسم‌های برونشیک و عوارض طولانی ناشی از آن

مقدار مصرف و طرز استعمال: روزی ۲ ـ ۳ بار. هربار ۱ ـ ۲ قرص

موارد منع استعمال: دوران بارداری.

بسته‌بندی: قرص دولایه × ۳۰

بها: ۸۵ ریال

ASMI

آرکوفارم ـ دانمارک

ترکیب: در هر قرص متوکسی‌فنادین ۱۰۰ میلی‌گرم

موارد استعمال: اسپاسم و آسم برونشها. رینیت آلرژیک

مقدار مصرف و طرز استعمال: بزرگسالان: هنگام حمله آسم: هر ۳ ـ ۴ ساعت ۰/۵ ـ ۱ قرص. بطور معمول: روزی ۲ ـ ۴ بار، هربار یک قرص: خردسالان: نصف مقدار بزرگسالان

بسته‌بندی: قرص × ۲۵

بها: ۸۰ ریال.

ASPASTIN

برنا ـ سویس

ترکیب: در هر قرص: بنزیل‌سوکسینیک + کلریدرات پاپاورین + متیل‌برومات آتروپین + اکسیپیان. در هر آمپول: کلریدرات پاپاورین + متیل‌برومات آتروپین + کلریدرات آمیلوکائین + آب مقطر.

موارد استعمال: کولیک‌های کلیوی، کولیک‌های صفراوی، اسپاسمهای دردناک شکمی، اسپاسمهای شبانه، آنژین صدری انفارکتوس میوکارد، میگرن، عدم کفایت و اسپاسم کرونر، اسپاسم گردن رحم، دردهای ماهانه زنان.

مقدار مصرف و طرز استعمال: روزی ۳ بار، هربار ۱ قرص، آمپول داخل عضلانی یا زیرجلدی: روزی ۲ بار هربار یک آمپول.

بسته‌بندی: قرص × ۱۲. آمپول × ۵

بها: قرص ۴۵ ریال. آمپول ۶۰ ریال.

ASPEGIC
ازبک ـ فرانسه

ترکیب: استیل سالیسیلات لیزین ۰/۹ گرم + گلیسین ۰/۱ گرم
موارد استعمال: ناراحتی های روماتیسمی
مقدار مصرف و طرز استعمال: روزی ۱ ـ ۴ تزریق عضلانی یا وریدی.
موارد منع استعمال: زخم اثنی عشر و حساسیت به آسپیرین
بسته‌بندی: آمپول ۵ میلی لیتر × ۶
بها: ۲۶۴ ریال

ASPIRIN
بایر آلمان ـ ایران

ترکیب: اسید استیل سالیسیلیک
اثر متقابل: الکل سبب افزایش خونریزی مخاط معدی حاصل از آسپیرین میشود. آسپیرین کومارین ها را از محل پیوندشان با پروتئین های پلاسما جدا کرده و بدین ترتیب اثر ضد انعقادی آنها را تشدید میکند. کورتیکوستروئید غلظت سالیسیلات های خونی را با افزایش میزان تصفیه گلومرولی کاهش میدهد. آسپیرین با اثر اوریکوزوریک سولفین پیرازون آنتاگونیسم دارد و نباید با همدیگر تجویز شوند. سالیسیلات ها اثر اوریکوزوریک سولفین پیرازون را وقفه میدهند.
موارد استعمال: سردرد، دندان درد، نورالژی، تب، بیماریهای عفونی، رماتیسم مفصلی و عضلانی، آرتریت روماتوئید.
مقدار مصرف و طرز استعمال: بزرگسالان: هر دفعه ۱ تا ۲ قرص جمعاً ۶ قرص در روز. خردسالان: روزی نصف تا ۴ قرص، بر حسب سن و مورد تجویز
موارد منع استعمال: حساسیت به ترکیبات سالیسیله.
احتیاط: کسانیکه بمدت طولانی و یا مقدار زیاد میخواهند آسپیرین بخورند و معده حساس دارند و در اشخاص مبتلا به قرحه معده و اثنی عشر باید با احتیاط مصرف شود.
بسته‌بندی: قرص ۵۰۰ میلی گرم × ۲۰ و ۲۰۰ قرص ۱۰۰ میلی گرم × ۳۰
بها: ۲۰۰ عددی ۱۷۶ ریال، ۲۰ عددی ۱۵ ریال، آسپیرین بچه ۲۹ ریال.

ATARAX
یو.سی.بی ـ بلژیک

ترکیب: دی کلریدرات ۱-(پاراکلربنز هیدریل) ۴-(۲-۲-ئیدروکسی استوکسی) اتیل دی‌اتیلن دیامین = کلریدرات ئیدروکسی‌زین

اثر متقابل: ئیدروکسی‌زین باعث کاهش اثر داروهای ضدانعقاد میگردد.

موارد استعمال: هیپرتانسیون، اسپاسم عصبی و گاستروانتستینال، آسم، کهیر، اکزماآتی‌پیک، درماتیتهای عصبی و آلرژی، قی، تحریکات پسیکوموتور

مقدار مصرف و طرز استعمال: روزی ۱ میلی‌گرم برای هر کیلو از راه خوراکی، ۲۵-۵۰ میلی‌گرم تزریق عضلانی حداکثر تا ۴ بار، ۵۰-۱۰۰ میلی‌گرم تزریق وریدی حداکثر ۶ بار

موارد منع استعمال: همراه با الکل در سه ماه اول آبستنی و در افراد حساس بآن

بسته‌بندی: دراژه ۱۰ و ۲۵ میلی‌گرم × ۲۵. شربت ۲ در هزار ۱۵۰ میلی‌لیتر. آمپول ۱۰۰ میلی‌گرم = ۲ میلی‌لیتر × ۶. شربت ۹۰ میلی‌لیتر.

بها: قرص ۲۵ میلی‌گرم ۱۰۵ ریال، قرص ۱۰ میلی‌گرم ۵۹ ریال، شربت ۱۳۵ ریال. آمپول ۸۲ ریال.

ATIPI
ریختر ـ ایتالیا

ترکیب: ملح سدیم ادنوزین تری فسفریک اسید ۱۵ میلی‌گرم

موارد استعمال: نارسائی میوکارد، اسکلروزمیوکارد، انفارکتوس میوکارد، نارسائی کورونر، آنژین دوپواترین، ترومبوزکورونر، اسپاسم شریان مغزی، اسپاسم عروق محیطی، تاکی کاردی، آریتمی.

مقدار مصرف و طرز استعمال: ۱-۲ آمپول در روز یا یک روز در میان داخل عضله یا ورید

بسته‌بندی: آمپول ۲ میلی‌لیتر × ۵

بها: ۲۱۰ ریال

ATIVAN
وایت ـ آمریکا

فارما کولوژی و مکانیسم: بر روی دستگاه اعصاب مرکزی اثر آرامبخش دارد.

ترکیب: لورازپام

موارد استعمال: درمان علامتی اضطراب، تحریک‌پذیری، هیجان

مقدار مصرف و طرز استعمال: روزی ۲ ـ ۳ میلی‌گرم به‌دفعات منقسم

موارد منع استعمال: بیماران حساس به بنزودیازپین‌ها یا گلوکوم حاد در دوران آبستنی.

احتیاط: مصرف این دارو مقدار تحمل الکل و سایر داروهای کند کننده عمل دستگاه اعصاب مرکزی را کاهش میدهد.

بسته‌بندی: قرص ۱ و ۲ میلی‌گرم × ۲۰

بها: ۱ میلی ۱۰۰ ریال، ۲ میلی ۱۵۰ ریال

ATRICAN
شانترو ـ فرانسه

ترکیب: در هر قرص خوراکی: الفا ـ تئونیل آمینو ـ ۲ نیترو ـ ۵ تیازول ۱۰ سانتیگرم، در هر قرص ژینکولوژیک جوشان ۱۰ سانتیگرم.

موارد استعمال: تریکومونا واژینالیس همراه با قارچهای مختلف

مقدار مصرف و طرز استعمال: معالجه مردان: سه روز پیاپی در سه نوبت هنگام صرف غذا دو قرص (جمعاً ۱۸ قرص) معالجه زنان: ۱ ـ درمان خوراکی: ۱۸ قرص بمدت سه روز ۲ ـ درمان موضعی: روزی ۲ قرص ژینکولوژیک بمدت ۱۰ روز حتی در موقع عادت ماهانه درعمق مهبل قرار داده میشود (جمعاً ۲۰ قرص)

احتیاط: درطول درمان از مقاربت خودداری شود.

بسته‌بندی: قرص خوراکی و ژینکولوژیک × ۲۰

بها: ۱۶۵ ریال.

ATROMID - S
آی.سی.آی ـ انگلستان

ترکیب: در هر کپسول، اتیل ـ ۲ ـ (پاراکلروفنوکسی) ـ ۲ ـ متیل پروپیونات = کلوفیبریت

موارد استعمال: پیشگیری و درمان آترواسکلروز، هیپرکلسترولمی خانوادگی، گزانتماتوز، رتینوپاتی دیابتیک.

مقدار مصرف و طرز استعمال: جمعاً در روز بمیزان ۱/۵ تا ۲ گرم که به دو یا چند دوزمنقسم بعد از غذا داده میشود.

موارد منع استعمال: بیماران مبتلا به عیب شدید کارکلیه ها، زنان آبستن و مبتلایان به نارسائی های کبدی

عوارض جانبی: اثر داروهای ضد انعقاد را تشدید میکند.

بسته‌بندی: کپسول ۲۵۰ میلی گرم × ۵۰

بها: ۳۰۰ ریال

A.T.S.
تراپلیکس ـ فرانسه

ترکیب: اسید تری کلرواستیک ۳ گرم + اسید سالیسیلیک ۰/۵ گرم+ اکسیپیان تا ۱۰۰ گرم

موارد استعمال: زخمهای عفونی، گانگرن، سوختگی، اسکار، زونا، ژنژیویت

مقدار مصرف و طرز استعمال: روزی ۱ ـ ۲ بار استعمال شود

بسته‌بندی: محلول ۴۵ میلی لیتر

بها: ۳۰ ریال

AUREOCORT
لدرلی آمریکا ـ ایران

ترکیب: پماد موضعی: تریامسینولون‌استونایدِ ۰/۱ درصد + کلر- تتراسیکلین ۳ درصد + لانولین و پارافین

موارد استعمال: اشکال چرکی درماتیتهای تماسی، درماتیت اتوپیک، نورودرماتیتها و اکزماها

مقدار مصرف و طرز استعمال: روزی ۲ ـ ۳ بار بر روی پوست میمالند.

موارد منع استعمال: ضایعات جلدی سلی، قارچی و ویروسی، تبخال، آبله و آبله‌مرغان

احتیاط: در صورت ظهور عوارض ایدیوسنکرازی لازم است استعمال آن قطع شود.

بسته‌بندی: پماد موضعی ۵ گرم.

بها: ۸۸ ریال

AUROMYCIN
لدرلی آمریکا
ـ ایران

ترکیب: کلریدرات کلر تتراسیکلین کپسول (۵۰ و ۲۵۰ میلی‌گرم). هرگرم پماد زخم (کلریدرات کلرتتراسیکلین ۳۰ میلی‌گرم) پماد چشمی (کلریدرات کلرتتراسیکلین ۱۰ میلی‌گرم).

موارد استعمال: عفونتهای ریکتزیائی، تب‌دانه‌دار، تیفوس، عفونتهای ناشی از استرپتوکوک بتاهمولیتیک، عفونتهای دستگاه ادراری، عفونت‌های چشمی، عفونت‌های دهان و گلو.

مقدار مصرف و طرز استعمال: کپسول ۱ گرم در روز. پماد چشمی: هردوساعت یا بیشتر بر حسب وضعیت کلینیکی باید استعمال شود.

احتیاط: مصرف تمام تتراسیکلین‌ها بهنگام آخرین ماههای آبستنی در نوزادان و خردسالان تا ۸ساله ممکنست سبب رنگین کردن دائمی دندانها گردند.

بسته‌بندی: کپسول ۵۰ و ۲۵۰ میلی‌گرم × ۱۰۰ پماد زخمی ۱۵ گرم. پماد چشمی ۳/۵ گرم.

بها: کپسول ۵۰ میلی ۳۰۰ ریال، ۲۵۰ میلی ۱۲۸۷ ریال. پماد چشمی ۱۶ ریال، زخمی ۴۱ ریال.

AUTRIN
لدرلی آمریکا
ـ ایران

ترکیب: در هرکپسول: ویتامین B_{12} با فاکتور انترنسک کنسانتره لدرلی یا اوترینیک فاکتور ۱/۵ واحد خوراکی (N.F) + فومارات آهن ۱۵۰ میلی‌گرم + اسیداسکوربیک ۱۵۰ میلی‌گرم + اسید فولیک ۲ میلی‌گرم.

موارد استعمال: درمان کم‌خونیهای قابل درمان، کم‌خونیهای مگالو بلاستیک، حاملگی، کم‌خونی کودکان، پلاگر

مقدار مصرف و طرز استعمال: روزی یک کپسول با غذا یا پس از آن

بسته‌بندی: کپسول × ۱۰۰

بها: ۱۰۰ عددی ۱۰۵۳ ریال.

AVAFORTAN
آستا ــ آلمان

ترکیب: در هر قرص: آواپیرازون ۶۰ میلی‌گرم + نورآمیدازوفن ۲۱۰ میلی‌گرم. در هر ۱ میلی‌لیتر آمپول: آواپیرازون ۲۴ میلی‌گرم + نورآمیدازوفن ۲۴۰ میلی‌گرم. در هر شیاف: آواپیرازون ۴۰ میلی‌گرم + نورآمیدازوفن ۵۰۰ میلی‌گرم.

موارد استعمال: اسپاسم دستگاه گوارش، میگرن، کولیک صفراوی، کولیک نفروتیک.

مقدار مصرف و طرز استعمال: هنگام اسپاسم یک آمپول باهستگی (۱ میلی‌لیتر در دقیقه) داخل ورید یا عضله تزریق میشود. از شیاف و قرص بعنوان نگهدارنده میتوان استفاده کرد.

موارد منع استعمال: در سه ماه اول آبستنی.

بسته‌بندی: آمپول ۵ میلی‌لیتر × ۵۰. شیاف × ۶. قرص × ۲۰ و ۲۰۰

بها: آمپول ۱۷۱۵ ریال. شیاف ۸۰ ریال. قرص ۲۰ عددی ۱۰۰ ریال، ۲۰۰ عددی ۷۸۰ ریال.

AVAMIGRAN
آستا ــ آلمان

ترکیب: در هر قرص: تارترات ارگوتامین ۰/۷۵ میلی‌گرم + مکلوکسامین ۲۰ میلی‌گرم + کامیلوفین ۲۵ میلی‌گرم + کافئین ۸۰ میلی‌گرم + آمینوفنازون ۱۲۵ میلی‌گرم.

موارد استعمال: سردردهای عروقی، میگرن، سندرم هورتون.

مقدار مصرف و طرز استعمال: در شروع حمله ۲ قرص سپس هر یکساعت یک قرص.

موارد منع استعمال: دوره حاملگی و شیردهی، بیماریهای عروقی، عوارض کلیوی و کبدی، آنژین دوپوآترین، فشارخون، گلوکوم تیروتوکسیکوز، هیپرتروفی پروستات

احتیاط: از ۴ قرص در روز و ۱۰ قرص در هفته نباید تجاوز کرد.

بسته‌بندی: قرص × ۲۰

بها: ۱۷۰ ریال

AVENTYL
لی‌لی ــ آمریکا

فارماکولوژی و مکانیسم: کلریدرات نورتریپتیلین فعالیت ترکیباتی مانند هیستامین، ۵ ـ هیدروکسی تریپتامین و استیل کولین را

وقفه میدهد. هم‌چنین اثر بالابرنده فشارخون نورآدرنالین را افزایش میدهد.

ترکیب: کلریدرات نورتریپتیلین.

اثر متقابل: سایر داروهای اعصاب و الکل عوارض ثانوی آنرا تشدید میکنند.

موارد استعمال: اشکال مختلف افسردگی‌ها، اضطراب، فشار روحی و ناراحتیهای پسیکوسوماتیک.

مقدار مصرف و طرز استعمال: بزرگسالان: روزی ۲۰ تا ۱۰۰ میلی‌گرم خردسالان: روزی ۱ ـ ۲ میلی‌گرم برای هر کیلوگرم وزن یا ۱۰ تا ۷۵ میلی‌گرم

موارد منع استعمال: استعمال دارو با سایر داروهای ضدافسردگی سه حلقه‌ای و همراه با وقفه‌دهنده‌های منوآمینواکسیداز ممنوع است. حساسیت بدارو.

احتیاط: بخاطر خواص آنتی کولینرژیک لازم است دارو در بیماران مبتلا به گلوکوم و احتباس ادرار با احتیاط مصرف شود.

بسته‌بندی: کپسول ۲۵ میلی‌گرم × ۲۵ کپسول ۱۰ میلی‌گرم × ۲۵

بها: کپسول ۱۰ میلی ۴۷ ریال، ۲۵ میلی ۸۰ ریال.

AVIL
هوخست آلمان
ـ ایران

ترکیب: نمک پارا آمینوسالیسیلات ـ ۱ ـ فنیل ـ ۱ ـ پیریدیل (۲) ۳ ـ دی‌متیل آمینوپروپان. در هر قرص ۵۰ میلی‌گرم، در هر آمپول ۵۰ میلی‌گرم، پماد ۱/۵ درصد. در هر دراژه رتارد ۷۵ میلی‌گرم، در هر میلی‌لیتر شربت ۲ میلی‌گرم، در هر قرص آویلت ۱۰ میلی‌گرم.

موارد استعمال: کلیه بیماریهای آلرژیک کهیر، ادم کوئینک، برونشیت آلرژیک برونشیت آسماتوئید، رینیت‌های وازوموتور، تب یونجه، اکزما،

مقدار مصرف و طرز استعمال: خردسالان: آویلت روزی ۳ ـ ۶ عدد شربت ۲ ـ ۳ بار هربار نیم تا یک قاشق چایخوری. آمپول ۱ ـ ۲ بار هربار ربع یا نصف آمپول در عضله. بزرگسالان: قرص ۱ ـ ۳

عدد در روز. شربت ۲ - ۳ بار هربار ۱/۵ تا ۳ قاشق چایخوری. آمپول ۱ - ۲ بار هربار نیم الی یک آمپول. قرص روتارد ۱ - ۲ عدد در روز.

بسته‌بندی: قرص ۵۰ میلی‌گرم × ۱۰ و ۲۵۰ ، قرص روتارد ۷۵ میلی‌گرم × ۳۰. آمپول ۵ میلی‌گرم = ۲ میلی‌لیتر × ۵ ، قرص آویلت ۱۰ میلی‌گرم × ۲۰ ، شربت ۲ میلی‌گرم = ۲ میلی‌لیتر × ۱۰۰ میلی‌لیتر، پماد ۱/۵ درصد ۱۰ گرم.

بها: قرص ۱۰ عددی ۲۰ ریال، ۲۵۰ عددی ۳۷۵ ریال، روتارد ۱۲۰ ریال. آمپول ۲ میلی ۶۴ ریال. آویلت ۲۳ ریال. شربت ۵۵ ریال. پماد ۲۳ ریال.

AVIPUL MINE
آویسن - ایران

ترکیب: سولفات گایاکول ۲/۳ گرم + بنزوات سدیم ۲/۸ گرم + فسفات کدئین ۰/۰۸ گرم + شربت تلو ۲۵ گرم + تنطور آکونیت ۰/۶ گرم + تنطور بلادون ۰/۶ گرم + اکسیپیان و شربت ساده مقدار کافی تا ۱۲۰ میلی‌لیتر

موارد استعمال: گریپ، ذات‌الریه، تنگی نفس، لارنژیت، سیاه‌سرفه و سایر ناراحتیهای دستگاه تنفسی.

مقدار مصرف و طرز استعمال: خردسالان: روزی ۲ - ۴ قاشق مرباخوری بزرگسالان: روزی ۴ - ۶ قاشق سوپخوری.

بسته‌بندی: شربت ۱۲۰ میلی‌لیتر

بها: ۴۷ ریال

A - VIT
واندر - سویس

ترکیب: در هر پرل: ویتامین A ۵۰ هزار واحد

موارد استعمال: سوء تغذیه شیرخواران، در مواردیکه بدن به ویتامین A احتیاج دارد. درمان بیماریهای چشم، کمبود ویتامین A در کودکان.

مقدار مصرف و طرز استعمال: روزی ۱ - ۳ پرل

بسته‌بندی: پرل ۵۰۰۰۰ واحد × ۳۰

بها: ۹۰ ریال

AVOMINE
می اندبیکر
ـ انگلستان

ترکیب: پرومتازین تئوکلات
موارد استعمال: دل‌بهم‌خوردگی ناشی از مسافرت با اتومبیل، کشتی، هواپیما، استفراغ و تهوع بارداری.
مقدار مصرف و طرز استعمال: یک قرص یکساعت قبل از حرکت و یا در موقع بروز دل‌بهم‌خوردگی و تهوع.
احتیاط: دور از دسترس اطفال باشد.
بسته‌بندی: قرص × ۱۰
بها: ۴۷ ریال

AXAR
ما کسون آمریکا
ـ تولیدارو ایران

ترکیب: ویتامین C + آسپیرین
موارد استعمال: تب، سرماخوردگی، سردرد
مقدار مصرف و طرز استعمال: روزی ۱ ـ ۴ قرص
بسته‌بندی: پاکت ۴ قرصی × ۲۰
بها: ۱۸۷ ریال.

AXON
ما کسون آمریکا
ـ تولیدارو ایران

ترکیب: در هر اونس: پیریلامین مالئات ۵۰ میلی‌گرم + فسفات کدئین ۳۲/۴ میلی‌گرم + پتاسیم گایاکوسولفونات ۰/۵۸ گرم + کلرور آمونیوم ۰/۲۵۹۲ گرم + اسید سیتریک ۰/۲۵۹۲ گرم + الکل ۶ درصد.
موارد استعمال: تسکین انواع سرفه‌ها و تسهیل خروج خلط
مقدار مصرف و طرز استعمال: هر ۳ ـ ۴ ساعت ۲ قاشق مرباخوری.
بسته‌بندی: شربت ۱۱۴ میلی‌لیتر.
بها: ۵۳ ریال.

AZALOMYCIN - F
سانکیو ـ ژاپن

ترکیب: در هر قرص: آنتی‌بیوتیک حاصل از استرپتومیسس آزالومای ستیکوس ۵۰ میلی‌گرم.
موارد استعمال: عفونتهای ناشی از تریکوموناو کاندیدا آلبیکانس، واژنیت، لوکوره.
مقدار مصرف و طرز استعمال: ۰/۵ ـ ۱ قرص را شب موقع خواب در

واژن قرار می‌دهند.
بسته‌بندی: قرص واژینال × ۱۰
بها: ۱۲۰ ریال

B 300
دوپار ـ ایران

ترکیب: ویتامین B_1 ۳۲۵ میلی‌گرم
موارد استعمال: انواع دردهای روماتیسمی و عصبی، اختلالات مقاومت بدن، تمام موارد کمبود ویتامین فوق
مقدار مصرف و طرز استعمال: روزی ۲ ـ ۶ قرص
بسته‌بندی: قرص × ۲۰
بها: ۷۰ ریال

BABY LIFE
مینا ـ ایران

ترکیب: برمورسدیم + برمور کلسیم + فنوباربیتال سدیک.
موارد استعمال: بعنوان مسکن، تب‌بر، خواب‌آور.
مقدار مصرف و طرز استعمال: روزی ۳ ـ ۶ بار، هربار ۰/۵ ـ ۲ قاشق مرباخوری.
عوارض جانبی: برومیسم، دپرسیون.
بسته‌بندی: شربت ۶۰ میلی‌لیتر
بها: ۲۹ ریال.

BABY RHINOL
لپتی ایتالیا ـ ایران

ترکیب: کلریدرات فنیل پروپانولامین ۰/۲ گرم + استیل ـ پارا ـ آمینوفنل ۲/۴ گرم + مالئات کلرفنیرامین ۰/۰۱۵ گرم
موارد استعمال: بیماریهای تب‌دار مجاری تنفسی فوقانی، سرماخوردگی عادی وگرفتگی مجاری تنفسی ناشی از آن، رینیت وازوموتور، تب یونجه
مقدار مصرف و طرز استعمال: خردسالان تا ۱۰ کیلوگرم: هر ۴ ـ ۶ ساعت نیم‌پیمانه. ده کیلوگرم ببالا: هر ۴ ـ ۶ ساعت یک پیمانه
بسته‌بندی: شربت ۲۰ میلی‌لیتر

بها: ۷۰ ریال

BACTISUBTIL
مرل نرود فرانسه
ـ دوپا را ایران

ترکیب: در هر کپسول: سوش زنده باسیلوس ۸۵۳۲ بیش از یک میلیارد

موارد استعمال: انواع اسهالها، همراه با آنتی‌بیوتیک‌ها، انژیت، کلوپاتی فونکسیونل، کولیت

مقدار مصرف و طرز استعمال: شیرخواران و کودکان، روزی ۳ـ۴ کپسول. نوجوانان و بزرگسالان روزی ۴ـ۶ کپسول

بسته‌بندی: کپسول × ۲۰

بها: ۱۷۶ ریال

BACTRIM
روش ـ سویس

ترکیب: قرص بزرگسالان: تریمتوپریم ۸۰ میلی‌گرم + سولفامتوکسازول ۴۰۰ میلی‌گرم. قرص خردسالان: تریمتوپریم ۲۰ میلی گرم + سولفامتوکسازول ۱۰۰ میلی‌گرم. در هر میلی‌لیتر شربت: تریمتوپریم ۴۰ میلی‌گرم + سولفامتوکسازول ۲۰۰ میلی‌گرم

موارد استعمال: باکتریسید با طیف وسیع و عمل مؤثر روی ارگانیسمهای گرم مثبت و گرم منفی، عفونتهای دستگاه تنفسی فوقانی و تحتانی، عفونتهای دستگاه ادراری ـ تناسلی، عفونتهای دستگاه گوارش و عفونتهای پوستی.

مقدار مصرف و طرز استعمال: بزرگسالان روزی ۲ بار، هربار ۲ قرص بعد از غذا. خردسالان: برحسب نوع و شدت بیماری متفاوتست. شربت: روزی ۲ بار هربار نیم تا یک پیمانه

موارد منع استعمال: در ضایعات شدید پارانشیم کبدی و نارسائی شدید کلیوی

عوارض جانبی: بثورات پوستی و احتمالا درصورت تجویز بمدت طولانی. تغییر قابل برگشت فرمول خونی.

بسته‌بندی: قرص بزرگسالان و خردسالان × ۲۰. شربت ۱۰۰ میلی‌لیتر

بها: قرص بزرگسالان: ۳۲۰ ریال، قرص خردسالان: ۸۰ ریال شربت: ۲۲۰ ریال

BARALGIN
هوخست آلمان
ـ ایران

ترکیب: در هر آمپول ۵ میلی‌لیتر: فنیل دی‌متیل پیرازولن ـ متیل ـ آمینومتان سولفونات سدیم (نوالژین) ۲/۵ گرم + پی پریدینو اتوکسی ـ ارتوکاربواتوکسی بنزوفنون کلریدرات ۰/۱ گرم + دی فنیل ـ پی پرینواتیل ـ استامید برم متیلات ۰/۱ میلی‌گرم، در هر آمپول ۲ میلی‌لیتر: بترتیب ۱ گرم + ۴ میلی‌گرم + ۰/۰۴۲ میلی‌گرم. در هر قرص بترتیب ۰/۵ گرم + ۵ میلی‌گرم + ۰/۱ میلی‌گرم، در هر میلی‌لیتر قطره بترتیب ۰/۵ میلی‌گرم + ۵ میلی گرم + ۰/۱ میلی‌گرم در هرشیاف بزرگسالان بترتیب ۱ گرم + ۱۰ میلی‌گرم + ۰/۱ میلی‌گرم، در هرشیاف خردسالان به ترتیب ۰/۳ گرم + ۳ میلی‌گرم + ۰/۰۳ میلی‌گرم.

موارد استعمال: کولیک‌های کلیوی و صفراوی اسپاسم مجاری ادرار، دیسمنوره، اسپاسم معده و روده، پیچشهای حالب، دردهای شدید بعلل مختلف، میگرن.

مقدار مصرف و طرز استعمال: خردسالان: قطره با توجه به سن طفل ۳ تا ۴ بار، هربار ۵ تا ۱۰ قطره، آمپول ۲ میلی ۱ ـ ۲ بار، هربار ۱ آمپول وریدی، شیاف بر حسب سن روزی ۱ تا ۲ شیاف بزرگسالان: قطره روزی ۳ بار، هربار ۲۰ ـ ۴۰ قطره، قرص روزی ۳ بار، هربار ۱ ـ ۲ عدد، آمپول ۵ میلی‌لیتر روزی یک تزریق وریدی، آمپول ۲ میلی‌لیتر روزی ۱ ـ ۳ تزریق عضلانی، شیاف ۱ ـ ۳ بار، هربار یک شیاف.

عوارض جانبی: ممکن است پس از استعمال دارو ناراحتی آلرژیک ظاهر شود.

بسته‌بندی: قرص ۲۵۰ عددی، آمپول ۲ میلی‌لیتر × ۱۰۰، آمپول ۲ و ۵ میلی‌لیتر × ۲۵، شیاف بزرگسالان × ۵، شیاف خردسالان × ۵، قطره ۱۰ میلی‌لیتر.

بها: قرص ۲۵۰ عددی ۸۷۷ ریال، آمپول ۲ میلی‌لیتری ۱۰۰ عددی ۱۲۸۸ ریال، آمپول ۵ میلی‌لیتری ۲۵ عددی ۶۷۳ ریال، شیاف بزرگسالان ۵۹ ریال، شیاف خردسالان ۴۹ ریال، قطره ۶۴ ریال.

BARDASE
پارک دیویس
آمریکا ـ ایران

ترکیب: در هر قرص یا هر قاشق مرباخوری شربت: فنوباربیتال ۱۵ میلی‌گرم + هیوسیامین ۰/۱ میلی‌گرم + اسکوپولامین هیدروبروماید ۰/۰۰۷ میلی‌گرم + سولفات آتروپین ۰/۰۲ میلی‌گرم.

موارد استعمال: اسپاسم عضلات صاف، کولون ایریتابل، کولیت‌اولسروز، اولسرهای گاستریت و گاسترودوئودنال.

مقدار مصرف و طرز استعمال: روزی ۳ بار، هربار ۱ ـ ۲ قرص و یا ۱ ـ ۲ قاشق مرباخوری شربت

بسته‌بندی: قرص × ۲۵. شربت ۱۲۰ میلی‌لیتر

بها: قرص ۵۹ ریال. شربت ۶۴ ریال.

BARONORME
روسل ـ فرانسه

ترکیب: سیکلوتیازید ۴ میلی گرم + متورزپیدین ۲۰ میلی گرم + دیپروفیلین ۵۰ میلی گرم

موارد استعمال: فشارخون اصلی، هیپوتانسیون شریانی جوانان و مقاوم با فشار دیاستولیک بالا

مقدار مصرف و طرز استعمال: شروع: روزی ۱ ـ ۲ قرص بمدت ۶ هفته.
ادامه درمان: یکروز درمیان یک قرص بمدت ۶ هفته.

موارد منع استعمال: آنوری.

بسته‌بندی: قرص × ۱۲

بها: ۲۰۰ ریال.

BAYER'S TONIC
بایر آلمان ـ ایران

ترکیب: در هر ۲۰۰ میلی‌لیتر: سولفات سدیم ۶/۷۵ گرم ویتامین C ۰/۰۱۳۵ گرم + نیترات استریکنین ۰/۰۰۱۷ گرم + استو آرسنیات سدیک ۰/۰۱۱۵ گرم + عصاره جگر خالص ۰/۱۶۲ گرم + عصاره محتوی ویتامین B ۲/۵۳۸ گرم + شراب معطر مالاگا ۰/۲ گرم + شراب معطر سوت ۰/۲ گرم + عصاره آنگوستورابارک ۰/۸ گرم + قند ۷۰ گرم

موارد استعمال: حالات ضعف و سستی، کم‌خونی، بی‌اشتهائی، سوءهاضمه، ضعف اعصاب، خستگی.

مقدار مصرف و طرز استعمال: بزرگسالان: روزی ۲ ـ ۳ قاشق غذا-

خوری. خردسالان: برحسب سن روزی ۲-۳ بار، هربار ۱-۲ قاشق مرباخوری.

بسته‌بندی: شربت ۲۰۰ میلی‌لیتر

بها: ۷۶ ریال

BAYOLIN
بایر-آلمان

ترکیب: در هر ۱۰۰ گرم پماد: هپارینوئید ۰/۵ گرم + منوگلیکول سالیسیلات ۱۰ گرم + استربنزیل نیکوتینیک اسید ۲/۵ گرم

موارد استعمال: آرتریت، آرتروز، سیاتیک، دردهای عضلانی، درد مفاصل و اعصاب.

مقدار مصرف و طرز استعمال: مقدارکمی از پماد را در محل درد میمالند.

بسته‌بندی: پماد ۳۵ گرم

بها: ۱۶۶ ریال.

B-COLEX
پروتو-سویس

ترکیب: ویتامین B_1 ۲۰۰ میلی‌گرم + ویتامین B_2 ۲۰ میلی‌گرم + نیکوتینامید ۵۰۰ میلی‌گرم + ویتامین B_6 ۲۰ میلی‌گرم + کلسیم پانتوتنات ۲۰ میلی‌گرم + ویتامین B_{12} ۱۰۰۰۰ میکروگرم.

موارد استعمال: کلیه موارد ناشی از کمبود ویتامینهای فوق

مقدار مصرف و طرز استعمال: هفته‌ای ۲ بار، هربار یک تزریق عضلانی.

احتیاط: تزریق داخل وریدی باید با رعایت احتیاط انجام شود.

بسته‌بندی: ویال + ۱۰ میلی‌لیتر محلول.

بها: ۱۳۲ ریال.

BEBE-BROMINE
فاریا-ایران

ترکیب: تری‌برمور + لومینال + سیترات سدیم

موارد استعمال: بیخوابی نوزادان، تسکین و دردهای احشائی، عوارض عصبی و اسپاسم، دردهای هنگام بیرون آمدن دندان در کودکان

مقدار مصرف و طرز استعمال: نوزادان ۲-۴ ماهه: روزی نصف قاشق مرباخوری، کودکان ۴-۶ ماهه: روزی ۱ قاشق مرباخوری،

کودکان ۶ـ۱۲ ماهه: روزی ۱ـ۲ قاشق مرباخوری،
کودکان ۱ـ۳ ساله: روزی ۲ـ۳ قاشق مرباخوری

بسته‌بندی: شربت ۹۰ میلی‌لیتر

بها: ۴۱ ریال.

BEBE BRONCHE
آویسن ـ ایران

ترکیب: تنطور او کالیپتوس ۰/۴ گرم + تنطور دروزرا ۱/۵ گرم + برمورسدیم ۱/۶ گرم + بنزوات سدیم ۰/۸ گرم + تیوکول ۰/۸ گرم + شربت پلی‌گالا ۳۰ گرم + اکسیپیان مقدار کافی تا ۱۰۰ میلی‌لیتر.

موارد استعمال: ذات‌الریه، سرفه، گریپ، برونشیت، عوارض حاصله از سرخک و مخملک، سرفه های تشنجی و سایر ناراحتیهای ریوی ـ تنفسی کودکان

مقدار مصرف و طرز استعمال: خردسالان کوچکتر از یک‌سال: روزی ۲ بار، هربار یک قاشق مرباخوری، ۱ـ۲ ساله: روزی ۲ قاشق مرباخوری، ۶ـ۳ ساله: روزی ۳ قاشق مرباخوری.

بسته‌بندی: شربت ۱۰۰ میلی‌لیتر

بها: ۴۱ ریال.

BEBE CALMINE
مارین ـ ایران

ترکیب: برومورسدیم + برومور کلسیم + برومور آمونیوم + کلرال هیدراته

موارد استعمال: تحریکات عصبی، بیخوابی، حساسیت‌های عصبی و اسپاسمودیکی

مقدار مصرف و طرز استعمال: شیرخواران تا شش ماهه: ربع قاشق مرباخوری، کودکان ۶ـ۱۲ ماهه: نصف قاشق مرباخوری، کودکان یکساله تا ۱۲ ساله: ۱ـ۲ قاشق مرباخوری ۲ـ۳ بار در شبانه‌روز.

بسته‌بندی: شربت ۵۰ میلی‌لیتر

بها: ۴۱ ریال.

BE.BE.FAZ
فاز ـ ایران

ترکیب: در هر قاشق مرباخوری: دکسترومتورفان ۷/۵ میلی‌گرم + فنیل پروپانولامین ۸/۷۵ میلی‌گرم + گلیسیریل گایاکولات ۳۷/۵ میلی‌گرم.

موارد استعمال: سرماخوردگی، سرفه‌ها و تحریکات جهاز تنفسی

مقدار مصرف و طرز استعمال: خردسالان ۲ ـ ۶ ساله: روزی ۴ بار هربار یک قاشق مرباخوری، ۶ ـ ۱۲ ساله ۲ قاشق مرباخوری

بسته‌بندی: شربت ۹۰ میلی‌لیتر

بها: ۴۴ ریال

BE.BE.Sedin
ویوـ ایران

ترکیب: برمور کلسیم + برمور سدیم + برمور آمونیوم + کلرات هیدراته + تنطور بلادون + تنطور پاسیفلور + شربت بهارنارنج.

موارد استعمال: جهت تسکین اطفال و نوزادان و بعنوان خواب‌آور، و ضد تشنج

مقدار مصرف و طرز استعمال: از شش ماهه تا یکساله: یک قاشق چایخوری، ۲ ساله: دو قاشق چایخوری. ۳ ـ ۶ ساله: دو قاشق مرباخوری.

بسته‌بندی: شربت ۱۰۰ میلی‌لیتر

بها: ۳۵ ریال

BE.BE.TUSSIN
مارین ـ ایران

ترکیب: تیوکل + آنتی‌پرین + برومور سدیم + بنزوات سدیم + سنا + سرپوله + کوکلیکو.

موارد استعمال: سرفه، سرماخوردگی، برونشیت، سرخک، سیاه‌سرفه کودکان

مقدار مصرف: شیرخواران: روزی ۳ بار، هربار نصف قاشق مرباخوری.
خردسالان: روزی ۴ ـ ۶ بار، هربار یک قاشق مرباخوری

بسته‌بندی: شربت ۹۰ میلی‌لیتر

بها: ۴۱ ریال.

BECILAN
اسپسیا ــ فرانسه

ترکیب: ویتامین B_6

موارد استعمال: بیماری کره، اسکلروز، اختلالات مغزی، قی و استفراغ بعلل مختلف، بیماری پارکینسون، پلی‌نوریت ناشی از مصرف داروها، مسمومیت‌های الکلی حاد، نارسائی قلبی.

مقدار مصرف و طرز استعمال: روزی ۱۰ میلی‌گرم تا ۱ گرم از راه تزریق عضلانی یا وریدی و یا ۱ ـ ۴ قرص

بسته‌بندی: قرص ۲۵۰ میلی‌گرم × ۴۰، آمپول ۵۰ میلی‌گرم = ۲ میلی‌لیتر × ۵، آمپول ۲۵۰ میلی‌گرم = ۵ میلی‌لیتر × ۱۰

بها: قرص ۲۳۴ ریال، آمپول ۵۰ میلی ۴۷ ریال، آمپول ۲۵۰ میلی ۱۲۰ ریال.

BECOF
تولیدارو ــ ایران

ترکیب: کولی‌لانا ۱۰/۵ میلی‌گرم + شربت افوربیا ۲۷ میلی‌گرم + محلول گرینولیا ۵ میلی‌گرم + سنا ۲/۵ میلی‌گرم + تلوبالزام ۱۳۳ میلی‌گرم + بنزوات سدیم ۱۰۰ میلی‌گرم.

موارد استعمال: مسکن سرفه، نرم کننده ترشحات برونش ها و سرفه های ناشی از زکام و سرماخوردگی.

مقدار مصرف و طرز استعمال: کودکان ۱ ـ ۳ سال $\frac{1}{2}$ قاشق مرباخوری هرسه تا چهار ساعت. کودکان ۳ تا ۵ سال یک قاشق مرباخوری هر ۳ تا ۴ ساعت یکبار.

بسته‌بندی: شربت ۱۲۰ میلی‌لیتری

بها: ۵۳ ریال

BECOMARINE
مارین ــ ایران

ترکیب: ویتامین B_1 + ویتامین B_2 + نیکوتینامید + ویتامین B_6

موارد استعمال: در تمام مواردی که ویتامین ب کمپلکس مورد نیاز است.

مقدار مصرف و طرز استعمال: روزی ۳ ـ ۴ بار هر بار ۱ ـ ۲ قرص.

بسته‌بندی: قرص × ۱۰۰۰

بها: ۲۵۰ ریال

BECOTIDE
آلن هانبوریز ـ انگلستان

ترکیب: بکلومتازون دی پروپیونات

موارد استعمال: آسم آلرژیک، انسداد برگشت‌پذیر مجاری تنفسی، آسم برنش ها.

مقدار مصرف و طرز استعمال: روزی ۳ ـ ۴ بار هر بار ۱ ـ ۲ استنشاق

موارد منع استعمال: سل ریوی

بسته‌بندی: آئروسل جهت ۲۰۰ بار استنشاق

بها: ۵۸۳ ریال

BECOZYME
روش ـ سویس

ترکیب: در هرقرص: ویتامین B_1 ۱۵ میلی‌گرم + ویتامین B_2 ۱۵ میلی‌گرم + نیکوتینامید ۵۰ میلی‌گرم + ویتامین B_6 ۱۰ میلی‌گرم + پانتوتنات کلسیم ۲۵ میلی‌گرم + بیوتین ۰/۱۵ میلی‌گرم + ویتامین B_{12} ۱۰ گاما، در هرآمپول: ویتامین B_1 ۱۰ میلی‌گرم + ویتامین B_2 ۴ میلی‌گرم + نیکوتینامید ۴۰ میلی‌گرم + ویتامین B_6 ۴ میلی‌گرم + پانتنول ۶ میلی‌گرم + بیوتین ۰/۵ میلی‌گرم + ویتامین B_{12} ۸ گاما. در هر ۵ میلی‌لیتر شربت: ویتامین B_1 ۵ میلی‌گرم + ویتامین B_2 ۲ میلی‌گرم + نیکوتینامید ۲۰ میلی‌گرم + ویتامین B_6 ۲ میلی‌گرم + پانتنول ۳ میلی‌گرم.

موارد استعمال: اختلالات عروقی، بیماریهای داخلی و زنان، مامائی، بری بری، پلی نوریت، بیماریهای کودکان، چشم پزشکی، بیماریهای پوستی، کمبود همه ویتامین های فوق.

مقدار مصرف و طرز استعمال: قرص: روزی ۲ـ۳ عدد. آمپول: روزی ۱ـ۲ تزریق عضلانی. شربت: روزی ۲ـ۳ بار، هربار یک قاشق مرباخوری.

بسته‌بندی: قرص × ۲۰، آمپول ۲ میلی‌لیتر×۶، شربت ۱۰۰ میلی‌لیتر.

بها: قرص ۹۶ ریال. آمپول ۱۳۲ ریال. شربت ۱۱۵ ریال.

BEJECTAL C
BEJECTAL C With LIVER
ابوت ـ آمریکا

ترکیب: در هرآمپول ویتامین B کمپلکس لیوفیلیزه + ویتامین C. در هرآمپول لیور: ویتامین B کمپلکس + عصاره جگر

موارد استعمال: تمام موارد کمبودهای ویتامین B کمپلکس، نقاهت، ضعف و درکسانیکه نمیتوانند ویتامین خوراکی مصرف کنند.

مقدار مصرف و طرز استعمال: حداقل روزی ۱ میلی‌لیتر داخل وریدی یا داخل عضلانی یا پرفوزیون.

بسته‌بندی: ویال لیوفیلیزه زیرین + محلول ۱۰ میلی‌لیتر فوقانی.

بها: آمپول ساده ۲۰۰ ریال. آمپول لیور ۲۰۰ ریال.

BELLADENAL
BELLADENAL Retard
ساندوز سویس - پارس ایران

ترکیب: در هر قرص ساده و روتارد: مجموعه آلکالوئیدهای بلادون: ۰/۲۵ میلی‌گرم + فنوباربیتال ۵۰ میلی‌گرم.

موارد استعمال: زخم معده، زیاد شدن ترشحات معدی، اسپاسمهای احشائی و دستگاه ادراری تناسلی، افزایش حرکات معدی، استفراغهای آبستنی، ادرارهای بی‌اختیار شبانه، هیجانات عصبی در فواصل حملات آنژین صدری.

مقدار مصرف و طرز استعمال: بزرگسالان: روزی ۱-۴ قرص یا روزی ۲ قرص روتارد. خردسالان: ربع تا نصف مقدار بزرگسالان (در خردسالان استفاده از قرص روتارد مناسب‌تر است).

بسته‌بندی: قرص ساده و روتارد × ۲۰

بها: ساده ۸۰ ریال، روتارد ۵۲ ریال

BELLERGAL
BELLERGAL Retard
ساندوز سویس - پارس ایران

ترکیب: مجموعه آلکالوئیدهای بلادون ۰/۱ میلی‌گرم + تارترات ارگوتامین ۰/۳ میلی‌گرم + فنوباربیتال ۲۰ میلی‌گرم، قرص روتارد: دوبرابر مقادیر فوق.

موارد استعمال: دیستونی دستگاه گوارش مانند قرحه یا استعداد ابتلاء به قرحه، اختلالات عملی معدی، روده‌ای، دیستونی سیستم قلبی عروقی یا دیستونی بیماریهای عفونی و دورهٔ نقاهت، اختلالات نورووژ تاتیف حاصل از بهم خوردن تعادل ترشحات غدد داخلی مانند یائسگی، قاعدگی دردناک، ازدیاد ترشح غده تیروئید، تظاهرات نورووژ تاتیف همراه با ضربه‌های روحی و شوک‌های

هیجانی، نوراستنی، سندرم منیر، زمینه‌های میگرنی، عوارض متعاقب ضربه‌های مغزی.

مقدار مصرف و طرز استعمال: بزرگسالان: روزی ۳ بار، هربار ۱-۲ قرص، خردسالان: برحسب سن روزی ۱-۳ قرص، روتارد: بزرگسالان: روزی ۲ قرص صبح و عصر. خردسالان: ربع تا نصف قرص صبح و عصر.

بسته‌بندی: قرص × ۲۵، قرص روتارد × ۲۰

بها: ساده ۵۴ ریال. روتارد ۷۸ ریال.

BEMARSAL
اسپسیا ـ فرانسه

ترکیب: سدیم ۱، ۲ دی-(۴-آرسنوفنیل آمینو) اتان = دیفتارسون

موارد استعمال: انواع آمیبیازهای روده‌ای حاد یا مزمن، تریکومونازیس

مقدار مصرف و طرز استعمال: بزرگسالان روزی ۲-۳ بار، هربار ۴ قرص همراه با غذا. خردسالان روزی ۲-۳ بار، هربار ۳ قرص همراه با غذا.

بسته‌بندی: قرص ۵۰۰ میلی‌گرم × ۲۰

بها: ۹۹ ریال.

BENADON
روش ـ سویس

ترکیب: کلریدرات پیریدوکسین = ویتامین B_6

موارد استعمال: تهوع و استفراغ دوران حاملگی، مسمومیت حاد ناشی از الکل، اختلالات عصبی، آگرانولوسیتوز، لوکوپنی، کم‌خونی هیپوکروم.

مقدار مصرف و طرز استعمال: روزی ۲-۵ قرص یا ۱-۲ آمپول

بسته‌بندی: قرص ۴۰ میلی‌گرم × ۲۰، آمپول ۱۰۰ و ۳۰۰ میلی‌گرم = ۲ میلی‌لیتر × ۲

بها: قرص ۸۰ ریال. آمپول ۱۰۰ میلی ۱۰۸ ریال، ۳۰۰ میلی ۱۹۵ ریال

BENADRYL
پارک دیویس
آمریکا ـ ایران

فارماکولوژی: یک آنتی هیستامینیک قوی که دارای خواص آنتی کلینرژیک، ضدسرفه و مسکن است.

ترکیب: کلریدرات دیفن هیدرامین

موارد استعمال: تظاهرات آلرژیک، زکام، کهیر، رینیت‌های وازو- موتور، ادم‌آنژیونوروتیک، اکزما، خارش، واکنش های آلرژیک داروئی، بیماری پارکینسون.

مقدار مصرف و طرز استعمال: بزرگسالان ۲۵-۵۰ میلی‌گرم سه تا چهار بار در روز. شیرخواران و کودکان تا ۱۲ سال: روزی ۳-۴ بار، هربار ۱-۲ قاشق مرباخوری.

عوارض جانبی: مانند سایر آنتی‌هیستامین‌ها اندکی خواب‌آلودگی تولید میکند.

بسته‌بندی: کپسول ۲۵ و ۵۰ میلی‌گرم × ۵۰. شربت ۱۲/۵ میلی‌گرم= ۵ میلی‌لیتر × ۱۲۰ میلی‌لیتر

بها: کپسول ۲۵ میلی ۵۹ ریال. کپسول ۵۰ میلی ۸۲ ریال. شربت ۵۳ ریال.

BENADRYL Expectorant

پارک دیویس
آمریکا ـ ایران

ترکیب در هر ۵ میلی‌لیتر: بنادریل ۱۲/۵ میلی‌گرم + کلرورآمونیم ۱۳۵ میلی‌گرم + سیترات سدیم ۵۰ میلی‌گرم + کلروفرم ۲۰ میلی‌گرم + مانتول ۱ میلی‌گرم.

موارد استعمال: تسکین سرفه بعلت آلرژی و سرماخوردگی، برطرف نمودن علائم گرفتگی بینی، عطسه، اشکریزش و احتقان برونشها

مقدار مصرف و طرز استعمال: بزرگسالان: هر ۲-۳ ساعت ۱ تا ۲ قاشق مرباخوری، خردسالان: هر ۲-۳ ساعت نصف تا یک قاشق مرباخوری.

بسته‌بندی: شربت ۱۲۰ میلی‌لیتر

بها: ۶۴ ریال

BENAFED

پارک دیویس
آمریکا ـ ایران

ترکیب: بنادریل ۱۲/۵ میلی‌گرم + دکسترومتورفان ۱۵ میلی‌گرم + پسودوافدرین ۳۰ میلی‌گرم + کلرور آمونیوم ۱۲۵ میلی‌گرم + نیترات سدیم ۵۷ میلی‌گرم + کلروفرم ۲۰ میلی‌گرم + مانتول ۱ میلی‌گرم.

موارد استعمال: تسکین سرفه و برطرف کردن علائم احتقان.

مقدار مصرف و طرز استعمال: بزرگسالان: هر ۴-۶ ساعت یک قاشق مرباخوری. خردسالان: نصف قاشق مرباخوری.

بسته‌بندی: شربت ۱۲۰ میلی‌لیتر

بها: ۱۱۱ ریال.

BENDIGON
بایر – آلمان

ترکیب: رزرپین ۰/۱۵ میلی‌گرم + ان- (۴- کلرو-۳-سولفاموئیل بنزن سولفونیل)-ان-متیل-۲-آمینومتیل-۲-متیل تتراهیدروفوران = بایکارون ۱۵ میلی‌گرم + اینوزیتول- هگزانیکو تینات ۱۵۰ میلی‌گرم.

موارد استعمال: درمان مقدماتی و مداوم انواع فشارخونهای سیستولی و دیاستولی

مقدار مصرف و طرز استعمال: یک کپسول در روز همراه یا بعد از صبحانه بمدت یکهفته کامل ادامه داده میشود. درصورت لزوم از هفته دوم میتوان روزی ۲ کپسول یکی با صبحانه و یکی با ناهار تجویز نمود.

موارد منع استعمال: حساسیت شدید به‌سولفونامیدها، نارسائی بسیار شدید کلیه‌ها، هیپوکالمی شدید، کوما هپاتیک، دوران آبستنی.

بسته‌بندی: کپسول × ۳۰

بها: ۲۱۰ ریال

BENECIL
ایبسا – سویس

ترکیب: گلوکساسیلین

موارد استعمال: عفونتهای ناشی از میکربهای گرم مثبت ازقبیل استرپتوکوك، استافیلوکوك.

مقدار مصرف و طرز استعمال: هر ۶ ساعت ۲۵۰ - ۵۰۰ میلی‌گرم.

بسته‌بندی: کپسول ۲۵۰ میلی‌گرم × ۱۲، ۵۰۰ میلی‌گرم × ۱۰۰. شربت ۶۰ میلی‌لیتر

بها: کپسول ۲۵۰ میلی ۲۲۴ ریال، ۵۰۰ میلی ۳۵۱۰ ریال. شربت ۱۴۰ ریال.

BENEMID مرک شارپ‌اندد‌وهم آمریکا ـ ایران

فارماکولوژی: جذب مجدد توبولی اورات‌ها را کاهش میدهد و بنابراین دفع ادراری اسید اوریک را افزایش داده و غلظت سرومی اورات‌ها را کاهش میدهد. بطور انتخابی دفع ادراری پنی‌سیلین ها و برخی سفالوسپورین ها را کاهش میدهد.

ترکیب: پارا (دی‌پروپیل‌سولفامیل) بنزوئیک اسید = پروبنسید ۰/۵ گرم.

موارد استعمال: درمان هیپراوریکوزوری همراه با نقرس یا آرتریت نقرسی، کمک درمانی با پنی‌سیلین.

مقدار مصرف و طرز استعمال: در نقرس: هفته اول روزی ۱ قرص، از هفته دوم روزی ۲ قرص. در پنی‌سیلین درمانی: ۴ قرص در روز، در دوزهای منقسم.

موارد منع استعمال: کودکان کمتر از ۲ سال، سنگ کلیه، مبتلایان به اختلالات گلوبولی.

احتیاط: در موارد عیب کلیه همراه پنی‌سیلین تجویز نمی‌شود.

عوارض جانبی: سردرد مختصر

بسته‌بندی: قرص × ۲۰

بها: قرص ۱۹۹ ریال.

BENJOMIN رامین ـ ایران

ترکیب: در هر ۱۰۰ میلی‌لیتر: مانتول ۱ گرم + تنطور بنژوان ۲۰ میلی‌لیتر + تیمول ۰/۲ گرم + تنطور اوکالیپتوس ۲۰ میلی‌لیتر.

موارد استعمال: بخور برای ضدعفونی بیماری‌های تنفسی و کمک به درمان گریپ و سرماخوردگی.

مقدار مصرف و طرز استعمال: کمی از محلول را در آبجوش ریخته بخار گرم معطر را استنشاق می‌کنند.

بسته‌بندی: محلول ۵۰ میلی‌لیتر

بها: ۲۹ ریال

BENUTREX B_{12} ارگانون ـ هلند

ترکیب: در هر ویال خشک: ویتامین B_1 ۲۰۰ میلی‌گرم + ویتامین B_2 ۵۰ میلی‌گرم + ویتامین B_6 ۵۰ میلی‌گرم + ویتامین B_{12}

۳۰ میکروگرم + نیکوتینامید ۴۰۰ میلی‌گرم + پانتوتنول ۵۰ میلی گرم در هر آمپول حلال: ویتامین B_{12} ۱۰۰۰ میلی‌گرم. در هر ۱۰ میلی‌لیتر قطره بترتیب: ۱۰۰ میلی‌گرم + ۵۰ میلی‌گرم + ۲۰ میلی‌گرم + ۲۰۰ میلی‌گرم + ۵۰ میلی‌گرم + ۵۰۰ میلی‌گرم + حلال ۱۰ میلی‌لیتر.

موارد استعمال: نوریت و نورالژی، دوران نقاهت، بی‌حالی و خستگی، همراه با آنتی‌بیوتیکها، بیماریهای عفونی، کم‌خونیها، حالاتیکه ضعف عمومی وجود دارد.

مقدار مصرف و طرز استعمال: با اضافه نمودن حلال به‌گرد روزانه یا یکروزدرمیان ۲ میلی‌لیتر داخل عضله، داخل ورید یا زیرجلد تزریق می‌شود. قطره: روزی ۱۵ قطره.

عوارض جانبی: ممکن است اثرات ضد پارکینسونی ال-دوپا را کاهش دهد.

بسته‌بندی: قطره و ویال گرد خشک + ویال حلال ۱۰ میلی‌لیتر × ۱

بها: آمپول ۱۷۶ ریال. قطره ۷۰ ریال

BENUTREX C
ارگانون ـ هلند

ترکیب: در هر ویال: ویتامین B_1 ۱۰۰ میلی‌گرم + ویتامین B_2 ۵۰ میلی‌گرم + ویتامین B_6 ۲۰ میلی‌گرم + نیکوتینامید ۲۰۰ میلی گرم + پانتوتنول ۵۰ میلی‌گرم. در هر آمپول حلال: ویتامین C ۲۵۰۰ میلی‌گرم.

موارد استعمال: کمبود ویتامین های فوق، ضایعات مخاطی دهان و حلق، در دوران رشد سریع، بی‌اشتهائی اطفال، ضعف، لاغری.

مقدار مصرف و طرز استعمال: بعد از مخلوط نمودن حلال و گرد روزی ۳ بار، هربار ۱۰ قطره میل شود.

بسته‌بندی: ویال گرد خشک + ویال حلال بصورت لیوفیلیزه

بها: ۱۰۰ ریال

BENUTREX Oral
ارگانون هلند ـ ایران

ترکیب: ویتامین C ۲۵۰ میلی‌گرم + ویتامین B_1 ۱۵ میلی‌گرم + ویتامین B_2 ۱۰ میلی‌گرم + ویتامین B_6 ۱۰ میلی‌گرم +

نیکوتینامید ۵۰ میلی‌گرم + پانتوتنات کلسیم ۱۰ میلی‌گرم + ویتامین B_{12} ۱ میکروگرم + فاکتورانترنسیک بمقدار کافی.

موارد استعمال: بی‌اشتهائی، کم شدن مقاومت، بیحالی، خستگی، دپرسیون همراه با آنتی‌بیوتیکها، بری‌بری، پلاگر، کم‌خونی، ضعف عمومی.

مقدار مصرف و طرز استعمال: روزی ۴ تا ۸ قرص

بسته‌بندی: قرص × ۲۰

بها: ۱۰۵ ریال

BENYLIN Pediatric
پارک دیویس
آمریکا ـ ایران

ترکیب: بنادریل ۷ میلی‌گرم + سدیم سیترات ۲۸/۵ میلی‌گرم + کلروفرم ۱۱/۲۵ میلی‌گرم + مانتول ۰/۵۵ میلی‌گرم.

موارد استعمال: تسکین سرفه و برطرف کردن احتقان.

مقدار مصرف و طرز استعمال: هر ۳ ساعت ۱-۲ قاشق مرباخوری

بسته‌بندی: شربت خردسالان ۱۲۰ میلی‌لیتر

بها: ۵۹ ریال

BENZOFLEX
بنزون ـ دانمارک

ترکیب: کلرزوکساوزن

موارد استعمال: بعنوان شل کننده عضلانی برای تسکین دردهای شدید

مقدار مصرف و طرز استعمال: روزی ۳ ـ ۴ بار هر بار ۳ ـ ۱ قرص

بسته‌بندی: قرص ۲۵۰ میلی‌گرم × ۱۰۰

بها: ۲۸۰ ریال

BEPANTHEN
روش ـ سویس

ترکیب: پانتوتنول

موارد استعمال: درمان ضایعات اپی‌تلیال (التیام زخمها و سوختگی‌ها، التهاب مخاط). ضایعات دهانه زهدان، ریزش مو.

مقدار مصرف و طرز استعمال: روزی ۲-۶ قرص مکیده شود، آمپول روزانه یا چند بار در هفته. پماد برای ترمیم زخمهای موضعی

بسته‌بندی: قرص مکیدنی ۱۰۰ میلی‌گرم × ۲۰، آمپول ۵۰۰ میلی‌گرم = ۲ میلی‌لیتر × ۳، پماد ۵ درصد ۳۰ گرم.

بها: قرص و پماد ۸۵ ریال، آمپول ۱۲۰ ریال.

BEPYRINE
تولیدارو ـ ایران

ترکیب: در هرقرص اسید استیل سالیسیلیک ۸۱ میلی‌گرم
موارد استعمال: مسکن درد و تب خردسالان
مقدار مصرف و طرز استعمال: ۱ قرص در موقع درد
بسته‌بندی: قرص × ۳۰
بها: ۲۹ ریال

BERIGLOBIN
هوخست ـ آلمان

ترکیب: در هر میلی‌لیتر: گاماگلوبولین ۰/۱ میلی‌گرم
موارد استعمال: پیشگیری و کمک به درمان در تمام بیماریهای ویروسی
مقدار مصرف و طرز استعمال: یک تزریق عضلانی
موارد منع استعمال: دوران بارداری، تزریق داخل وریدی
بسته‌بندی: آمپول ۲ و ۵ میلی‌لیتر × ۱
بها: ۲ میلی‌لیتر ۳۵۰ ریال ۵ میلی‌لیتر ۷۰۰ ریال

BESEROL
وینتروپ آمریکا ـ ایران

فارماکولوژی: ضد درد و شل کننده عضلانی
ترکیب: پانادول ۴۵۰ میلی‌گرم + تران کوپال ۱۰۰ میلی‌گرم
مکانیسم: در ارتباطات بین نرونها اثر کرده مانع تشدید امواجی که باعث درد میگردند شده از انتشار این امواج در راههای حسی و حرکتی جلوگیری می کند.
موارد استعمال: فیبروزیت، میوزیت، بورسیت، تورتیکولی، لمباگو، دردهای وازوموتورعصبی
مقدار مصرف و طرز استعمال: روزی ۳ـ۴ بار، هربار ۱ـ۲ قرص. خردسالان ۰/۵ـ۱ قرص
عوارض جانبی: گاهی باعث بثورات جلدی، سرگیجه، تهوع، خواب‌آلودگی، دپرسیون و ورم میگردد.
بسته‌بندی: قرص × ۵۰
بها: ۱۴۰ ریال

BESTON
تانابی ژاپن
ـ فارماشیمی ایران

ترکیب: بنزوئیل تیامین دی‌سولفید
موارد استعمال: در کلیه موارد کمبود ویتامین B_1
مقدار مصرف و طرز استعمال: روزی ۳ بار هر بار ۲ ـ ۳ قرص
بسته‌بندی: قرص × ۲۰
بها: ۷۶ ریال.

BETADINE
پوردوفریک ـ کانادا

ترکیب: ژل‌واژینال پماد و محلول جراحی: یدور پاویدون ۱۰ درصد. محلول صابونی ۷/۵ درصد + ۰/۷۵ درصد ید
موارد استعمال: ضد باکتری، ویروس کش، ضد تریکوموناً، ضد قارچ،
مقدار مصرف و طرز استعمال: با اپلیکاتور در محل می‌مالند
احتیاط: درصورت حساسیت به این دارو باید درمان قطع شود.
بسته‌بندی: ژل‌واژینال ۱۰۰ گرم. محلول صابونی و محلول جراحی ۲۵۰ میلی‌لیتر. پماد جلدی ۲۰ گرم
بها: ژل‌واژینال ۳۵۰ ریال، محلول صابونی ۲۷۶ ریال، محلول جراحی ۳۰۰ ریال پماد جلدی ۱۲۰ ریال

BETANISONE
لپتی ایتالیا ـ ایران

ترکیب: ۱۶ ـ بتا ـ متیل پردنیزون ۴ میلی‌گرم
موارد استعمال: بیماریهای رماتیسمی، کولاژن، آلرژیهای مختلف (تنفسی، پوستی، عمومی)
مقدار مصرف و طرز استعمال: خردسالان: برحسب سن. بزرگسالان در حالات شدید: روزی ۱۲ ـ ۳۲ میلی‌گرم، در حالات خفیف: روزی ۴ ـ ۱۲ میلی‌گرم.
بسته‌بندی: قرص × ۲۰
بها: ۸۰ ریال.

BETASALYL
پتی ایتالیا ـ ایران

ترکیب: در هر دراژه: سالیسیلات سدیم ۵۰۰ میلی‌گرم + ویتامین B_1 ۰/۵ میلی‌گرم + ویتامین K_3 ۰/۵ میلی‌گرم.
موارد استعمال: دردهای عصبی، مفصلی و رماتیسمی
مقدار مصرف و طرز استعمال: بزرگسالان: روزی ۴ ـ ۱۴ دراژه.

بسته‌بندی: دراژه × ۱۰۰۰
بها: ۲۵۰ ریال

BETNELAN Intra Articular Injection
گلاکسو انگلستان
ـ داروپخش ایران

ترکیب: در هر میلی‌لیتر: الکل بتامتازون ۴ میلی‌گرم + فسفات دی‌سدیک بتامتازون ۱ میلی‌گرم.
موارد استعمال: پولی‌آرتریت مزمن پیشرونده، استئوآرتریت‌ها، آرتریت‌های ضربه‌ای، نقرس حاد مفصلی، بورسیت‌ها، آرتریت‌های چرکی
مقدار مصرف و طرز استعمال: برحسب مفصل مورد درمان فرق میکند برای مفصل زانو یک سانتیمتر مکعب کافی است.
بسته‌بندی: آمپول ۱ میلی‌لیتر
بها: ۲۶۵ ریال

BETNESOL
گلاکسو انگلستان
ـ داروپخش ایران

ترکیب: قطره: فسفات دی‌سدیک بتامتازون در محلول استریل و ایزوتونیک ۱ درصد. پماد چشمی: ۰/۱ درصد. قرص: ۰/۵ میلی‌گرم.
موارد استعمال: بیماریهای چشمی ناشی از ضربه، یا مواد محرک. بیماریهای گوشی: التهاب گوش خارجی. قرص: آسم، تب یونجه‌ای، کهیر، درماتوز، اکزما، آلرژی.
مقدار مصرف و طرز استعمال: قطره: هر ۱ ـ ۲ ساعت ۱ ـ ۲ قطره در هر چشم چکانده شود، گوش: ۲ ـ ۳ بار، هر بار ۲ ـ ۳ قطره در هر گوش. پماد: هر ۳ ـ ۴ ساعت یکبار در چشم کشیده شود. قرص: برحسب نوع و شدت بیماری متفاوت است
موارد منع استعمال: تبخال ساده، آبله، آبله‌مرغان و سایر بیماریهای ویروسی قرنیه و ملتحمه.
بسته‌بندی: قطره ۵ میلی‌لیتر، پماد چشمی ۳ گرم. قرص × ۱۰۰.
بها: قطره ۸۲ ریال. پماد ۲۸ ریال. قرص ۳۰۰ ریال

BETNESOL Injection
گلاکسو انگلستان ـ داروپخش

ترکیب: در هر میلی‌لیتر: ۴ میلی‌گرم بتامتازون بشکل فسفات دی‌سدیک محلول.

موارد استعمال: آسم و حالات آلرژیک حاد، واکنش های آنافیلاکتیک نسبت به‌داروها، شوک‌های شدید حاصل از ضربه‌ها، اعمال جراحی یا عفونت‌ها، ضایعات بافت‌های نرم

مقدار مصرف و طرز استعمال: بر حسب نوع و شدت بیماری روزی ۳ ـ ۴ بار، هر بار ۱ ـ ۵ آمپول.

موارد منع استعمال: عفونتهای قارچی، سل پوستی سل فعال، بیماری‌های ویروسی قرنیه، آبله و آبله مرغان، اولسرپپتیک

عوارض جانبی: تشدید دیابت. عدم تعادل الکترولیتی

بسته‌بندی: آمپول ۱ میلی‌لیتر

بها: ۹۴ ریال

BETNESOL-N
گلاکسو انگلستان
ـ داروپخش ایران

ترکیب: قطره: بتامتازون ۰/۱ درصد + سولفات نئومایسین ۰/۵ درصد درمحلول استریل. پماد. چشمی: بتامتازون ۰/۱ درصد + سولفات نئومایسین ۰/۵ درصد.

موارد استعمال: مانند بتنزول ساده و در مواقعیکه احتمال عفونت میکروبی وجود دارد

مقدار مصرف و طرز استعمال: مانند بتنزول ساده

موارد منع استعمال: مانند بتنزول ساده

بسته‌بندی: قطره ۵ میلی‌لیتر. پماد چشمی ۳ گرم

بها: قطره ۸۲ ریال. پماد ۳۰ ریال.

BETNESOL Retention Enema
گلاکسو انگلستان
ـ داروپخش ایران

ترکیب: کیسه پلاستیکی یکبار مصرف دارای ۵ میلی‌گرم بتامتازون بشکل فسفات دی‌سدیک محلول تامپونه

موارد استعمال: برای درمان موضعی کولیت اولسروز بوسیله تنقیه نگهداشتنی

مقدار مصرف و طرز استعمال: بیمار که روی تخت است به پهلوی چپ

خوابیده زانوهایش را تا می کند. بعد سرپوش لوله را برداشته سر لوله را با وازلین چرب میکند و آن را تقریباً تا نصفه در کیسه را آهسته، مانند لوله خمیردندان، روی خودش لوله میکند. ورود محلول در رکتوم باید یک تا دو دقیقه طول بکشد. سپس لوله را به آهستگی باید بیرون کشید و مواظب بود که محلول در لوله پس نزند. بیمار باید در حدود ۳ تا ۵ دقیقه روی شکم بخوابد وسپس درحالت معمولی خود بخواب میرود و بطور کلی تنقیه بتنزول هر شب بمدت ۲ تا ۴ هفته باید استعمال شود.

موارد منع استعمال: سل فعال، عفونتهای ویروسی و قارچی

احتیاط و عوارض جانبی: هنگام استرس های سخت عمل جراحی، بیماری های حاد و غیر آن گاه لازم میشود که بتنزول را در دوره درمان یا مدتی پس از درمان از راه خوراکی تجویز نمود. نارسائی شدید کلیه، بالا رفتن فشارخون از عوارض آن است.

بسته‌بندی: کیسه پلاستیکی ۱۰۰ میلی‌لیتر.

بها: ۱۳۵ ریال.

BETNOVATE

گلاکسو انگلستان ـ داروپخش ایران

ترکیب: کرم و پماد: ۱۷ ـ والرات بتامتازون ۰/۱ درصد. در هر شیاف: ۱۷ ـ والرات بتامتازون ۰/۵ میلی‌گرم + کلریدرات فنیل‌افرین ۲ میلی‌گرم + کلریدرات لینوکائین ۴۰ میلی‌گرم. در هر لوله پماد رکتال: به ترتیب: ۰/۰۵ درصد + ۰/۱ درصد + ۲/۵ درصد.

موارد استعمال: پسوریازیس، لیکن پلان، اکزما، درماتیت آتوپیک، نورودرماتوزها پماد و شیاف: خونریزی در شقاق مقعد و هموروئید.

مقدار مصرف و طرز استعمال: روزی ۱ ـ ۲ بار بطور موضعی استعمال شود شیاف: روزی ۲ عدد صبح و شب.

بسته‌بندی: کرم ۵ گرم، پماد ۵ و ۱۵ گرم، لوسیون ۲۰ میلی‌لیتری

بها: ۵ گرمی ۶۴ ریال، ۱۵ گرمی ۱۴۱ ریال لوسیون ۱۷۵ ریال

BETNOVATE-C
گلاکسو انگلستان ـ داروپخش ایران

ترکیب: ۱۷ ـ والرات بتامتازون ۰/۱ درصد + یدوکلروئید- روکسی کینولئین (کینوفرم) ۳ درصد.

موارد استعمال: مانند بتنویت ساده بعلاوه مواردی که عفونت نیز وجود دارد

مقدار مصرف و طرز استعمال: مانند بتنویت ساده

بسته‌بندی: کرم ۵ گرم، پماد ۵ و ۱۵ گرم

بها: ۵ گرمی ۶۷ ریال، ۱۵ گرمی ۱۳۵ ریال.

BETNOVATE-N
گلاکسو انگلستان
ـ داروپخش ایران

ترکیب: ۱۷ ـ والرات بتامتازون ۰/۱ درصد + سولفات- نئومایسین ۰/۵ درصد

موارد استعمال: مانند بتنویت ساده بعلاوه مواردی که عفونت نیز وجود دارد.

مقدار مصرف و طرز استعمال: مانند بتنویت ساده.

بسته‌بندی: کرم ۵ گرم، پماد ۵ و ۱۵ گرم

بها: ۵ گرمی ۶۷ ریال، ۱۵ گرمی ۱۴۱ ریال.

BEVIPLEX
فروسان سوئد
ـ فارمکس ایران

ترکیب: ویتامین B_1 ۵۰ میلی‌گرم + ویتامین B_2 ۷۰ میلی‌گرم + ویتامین B_6 ۳۰ میلی‌گرم + پانتنول ۷۰ میلی‌گرم + نیاسینامید ۵۰۰ میلی‌گرم

موارد استعمال: تمام موارد کمبود ویتامین های فوق، خستگیهای روحی و جسمی، کم‌شدن وزن بدن، بیخوابی، انواع نورالژی.

مقدار مصرف و طرز استعمال: روزی ۱ ـ ۳ بار هربار یک قاشق مربا- خوری

بسته‌بندی: شربت ۱۰۰ میلی‌لیتر

بها: ۵۶ ریال.

BEVISED
ماکسون آمریکا
ـ تولیدارو ایران

ترکیب: در هر ۵ میلی‌لیتر ۲۰ میلی گرم فنوباربیتال.

موارد استعمال: برای رفع بیخوابی و حالات عصبانیت، تشنج ها، و سیاه- سرفه و ناراحتیهای مربوط به درآوردن دندان، برای ایجاد آرامش

و خواب در کودکان
مقدار مصرف و طرز استعمال: یک قاشق مرباخوری یک تا سه بار درروز.
احتیاط: از مصرف این دارو بدون نسخه پزشک و بطور مداوم خودداری شود.
بسته‌بندی: ۶۰ میلی‌لیتر
بها: ۴۱ ریال.

BEVITA
دوپار ــ ایران

ترکیب: مواد آلبومینوئیدی + لسیتین + اسیدهای آمینه + مواد معدنی + ویتامین ب کمپلکس
موارد استعمال: دوران شیردهی مادران، رشد استخوانها در کودکان، تقویت اعصاب.
مقدار مصرف و طرز استعمال: بزرگسالان روزی ۲ قاشق سوپخوری.
خردسالان روزی ۱ قاشق سوپخوری
بسته‌بندی: گرد ۲۰۰ گرم
بها: ۱۷۲ ریال.

BEXEL
ماکسون آمریکا
ــ تولیدارو ایران

ترکیب: ویتامین A ۵۰۰۰ واحد + ویتامین D ۱۰۰۰ واحد + ویتامین B_1 ۵ میلی‌گرم + ویتامین B_2 ۲ میلی‌گرم + ویتامین B_6 ۱ میلی‌گرم + ویتامین B_{12} ۱ میکروگرم + پانتنول ۱۰ میلی‌گرم + نیاسینامید ۱۰ میلی‌گرم + سیترات فریک آمونیاکال ۶۰ میلی‌گرم
موارد استعمال: کلیه عوارض و ناراحتیهای ناشی از کمبود ویتامینهای فوق.
مقدار مصرف و طرز استعمال: روزی ۳ بار هربار یک قاشق مرباخوری.
بسته‌بندی: شربت ۱۱۰ میلی‌لیتر
بها: ۷۶ ریال.

BICARNESINE
لاباز ــ فرانسه

ترکیب: در هر قطره: اسید گامادی‌متیل آمینوبتاهیدروکسی بوتیریک ۱۰ میلی‌گرم
موارد استعمال: کم‌وزنی اطفال، بی‌اشتهائی اساسی، کمبود ترشحات

هاضمه، کمبود ترشحات عادی.
مقدار مصرف و طرز استعمال: بزرگسالان: روزی ۴ـ۶ پیمانه، خردسالان: ۲ـ۴ پیمانه، شیرخواران: ۱۰ قطره برای هر کیلو وزن قبل از غذا
موارد منع استعمال: زخم‌معده، گاستر کتومی ناقص.
بسته‌بندی: ۳۰ میلی‌لیتر و ۹۰ میلی‌لیتر
بها: ۳۰ میلی ۱۰۹ ریال، ۹۰ میلی ۳۰۷ ریال.

BILICANT CAPSULES
اژبس ـ بلژیک

ترکیب: هیدروکسی ـ ۷ متیل ـ ۴ اوکسو ـ ۲ کرومن ـ ۳ ـ ۲۰۰ میلی‌گرم.
موارد استعمال: تقویت کننده اعمال کبدی، کلرتیک، کوله‌پتیک، ضد اسپاسم مجاری صفراوی و اسپاسمولیتیک اختصاصی
مقدار مصرف و طرز استعمال: بزرگسالان: روزی ۴ تا ۶ کپسول. کودکان از ۷ سال ببالا: روزی ۱ تا ۳ کپسول
بسته‌بندی: کپسول × ۳۰
بها: ۲۲۰ ریال

BILIGRAFIN
شرینگ ـ آلمان

ترکیب: ملح متیل گلوتامینات اِن، اِن ـ آدی پیک ـ (۳ـ آمینو ـ ۲، ۴، ۶، ـ تری یدو ـ) بنزوئیک اسید.
موارد استعمال: ماده حاجب برای رادیوگرافی کیسه صفرا و مجاری صفراوی مخصوصاً برای اشخاص چاق و آنهائیکه کیسه صفرایشان را بیرون آورده‌اند.
بسته‌بندی: آمپول ۵۰ درصد ۲۰ میلی‌لیتر × ۵
بها: ۱۳۵۰ ریال

BINOTAL
بایر آلمان ـ ایران

ترکیب: د ـ آلفا ـ آمینوبنزیل پنی‌سیلین (آمپی‌سیلین)
موارد استعمال: عفونتهای حاد و مزمن مجاری تنفسی، مجاری ادراری و تناسلی، جهاز صفراوی، مننژیت، سپتی‌سمی، اندوکاردیت و درناقلین سالمونلا.

مقدار مصرف و طرز استعمال: در بزرگسالان و خردسالان دوز متوسط در عفونتهای مجاری تنفسی: ۱/۵ تا ۳ گرم و در عفونتهای مجاری ادراری و صفراوی ۳-۶ گرم در روز. آمپول: روزی یک تزریق عضلانی یا وریدی. در کودکان از سوسپانسیون ۳ گرمی بینوتال استفاده میشود: کودکان ۲-۶ساله هر۸ساعت ۱/۵ قاشق بزرگ. کودکان ۱ تا ۲ ساله هر۸ساعت یک قاشق بزرگ. شیرخواران ۳-۱۲ ماهه ۴ قاشق کوچک. شیرخواران تا ۳ ماهگی هر هشت ساعت ۵۰ میلی‌گرم بازاء هر کیلو خوراکی یا ۲۰ میلی‌گرم بازاء هر کیلو تزریقی.

موارد منع استعمال: حساسیت به پنی‌سیلین

بسته‌بندی: کپسول ۲۵۰ میلی‌گرم × ۱۰۰، قرص ۵۰۰ میلی‌گرم × ۱۰۰، آمپول ۵۰۰ میلی‌گرم × ۵ آمپول ۱ گرمی و ۲ گرمی × ۱۰، شربت ۶۰ میلی‌لیتر

بها: کپسول ۱۳۲۰ ریال. قرص ۲۴۰۰ ریال آمپول ۰/۵ گرمی ۱۴۲۰ ریال. آمپول ۱ گرمی ۱۴۴۰ ریال آمپول ۲ گرمی ۲۴۰۰ ریال. شربت ۱۸۷ ریال.

BILOPTIN

شرینگ ـ آلمان

ترکیب: ملح سدیم بتا-(۳-دی متیل آمینومتیلن ـ آمینو-۲، ۴، ۶- تری یدوفنیل)-پروپیونیک اسید (سدیم ایپودیت) ۵۰۰ میلی‌گرم

موارد استعمال: ماده حاجب تری یده خوراکی برای رادیوگرافی کیسه صفرا و مجاری صفراوی

مقدار مصرف و طرز استعمال: طبق دستور سازنده عمل شود.

موارد منع استعمال: افراد حساس به ترکیبات یددار، تیروتوکسیکوز، نارسائی شدید کبد یا کلیه

بسته‌بندی: کپسول × ۶

بها: ۱۴۰ ریال

BIOCOSITENE
ایکارایتالیا
ـ آترا ایران

ترکیب: در هر ۱۰۰ گرم شربت: سوربیتول ۲۲ گرم + پارا ـ دی‌متیل فنیل ـ فسفی نیت اسید سدیم ۰/۱۵ گرم + گلیسروفسفات منگنز ۰/۰۰۶ گرم + آلفا ـ اتیل ـ فنیل ـ گلوتاریمید ۰/۰۶۵ گرم + ویتامین B_1 ۰/۰۱۵ گرم + ویتامین B_2 ۰/۰۰۷ گرم + ویتامین B_6 ۰/۰۰۰۱۵ گرم + ویتامین B_{12} ۰/۰۰۰۰۰۸۶ گرم + ویتامین PP ۰/۰۹ گرم + شربت ۲۶ گرم + الکل اتیلیک معطر ۸ گرم + آب مقطر بمقدار کافی تا ۱۰۰ گرم.

موارد استعمال: خستگی‌های روحی و جسمی، دوران بارداری، فشارهای عصبی، رفع نقاهت پس از بیماریهای طولانی، زایمان.

مقدار مصرف و طرز استعمال: روزی ۱ـ۳ قاشق سوپخوری. خردسالان کوچکتر از سه سال روزی ۲ـ۳ قاشق مرباخوری.

بسته‌بندی: شربت ۲۳۰ گرم.

بها: ۸۸ ریال.

BIOTAMINE
بانیو ژاپن
ـ فارماشیمی ایران

ترکیب: بنزوئیل تیامین منوفسفات

موارد استعمال: نوریت، نورالژی، فلجهای سطحی، دردهای عضلانی.

مقدار مصرف و طرز استعمال: روزی ۳ بار هربار ۰/۵ تا یک قرص.

بسته‌بندی: قرص ۵۰ میلی‌گرم × ۲۰

بها: ۱۱۰ ریال

BISMOGOL
گل ـ ایران

ترکیب: سالیسیلات بیسموت ۳/۱ درصد + فنل سولفونات روی ۰/۱۵ درصد + سالل ۰/۳۰ درصد + اسید سالیسیلیک ۰/۰۶ درصد + گم‌آدراگانت ۰/۶ درصد.

موارد استعمال: اسهال، ترشی معده، استفراغ، عوارض ناشی از مصرف مشروبات الکلی.

مقدار مصرف و طرز استعمال: خردسالان: روزی ۳ـ۴ قاشق مرباخوری
بزرگسالان: روزی ۳ـ۴ قاشق سوپخوری

بسته‌بندی: شربت ۱۲۰ میلی‌لیتر

بها: ۴۵ ریال

BISMUPAN
آویسن ـ ایران

ترکیب: سونیترات بیسموت ۶/۵ گرم + کائولن طبی ۳/۵ گرم
موارد استعمال: گاستریت، دیس پپسی و رفع ضایعات مخاطی معده، اسهال، کولیت.
مقدار مصرف و طرز استعمال: در گاستریت ها و سوء هاضمه ها: یک بسته قبل از هروعده غذا، در اسهالها: نصف بسته پیش از هرغذا، در کولیت ها: یک بسته صبح ناشتا.
بسته‌بندی: بسته ۱۰ گرم × ۱۰
بها: ۱۹۹ ریال

BISMUTH MUCILAG
دانیل برونت ـ فرانسه

ترکیب: هربسته: نیترات بیسموت ۵ گرم + موسیلاژ ۲ گرم + نشاسته ۳ گرم
موارد استعمال: ناراحتیهای معده و اثنی‌عشر
مقدار مصرف و طرز استعمال: روزی ۱-۳ بسته
بسته‌بندی: بسته ۱۰ گرم × ۱۰
بها: ۱۸۰ ریال

BISMUTH - PHARMACHIMIE
فارماشیمی ـ ایران

ترکیب: سونیترات بیسموت ۷ گرم + کائولن ۳ گرم
موارد استعمال: زخم معده و اثنی‌عشر، گاستریت، سوء هاضمه، اسهال، آنترو کولیت
مقدار مصرف و طرز استعمال: روزی ۱-۳ بسته را در آب حل کرده مینوشند.
موارد منع استعمال: خردسالان کوچکتر از ۱۰ سال
بسته‌بندی: بسته ۱۰ گرم × ۳۰
بها: ۷۰۲ ریال

BISMUTH TULASNE
روژه‌بلون فرانسه ـ فارماشیمی ایران

ترکیب: در هربسته سونیترات بیسموت ۶/۵ گرم + کائولن ۳/۵ گرم
موارد استعمال: زخم‌معده و اثنی‌عشر، اسهال، گاستریت، سوء هاضمه،

آنترو کولیت.

مقدار مصرف و طرز استعمال: بزرگسالان: روزی ۱-۳ بسته. خردسالان بالاتر از ۱۰ سال: ۰/۵-۱ بسته

موارد منع استعمال: خردسالان کمتر از ۱۰ سال

بسته‌بندی: بسته ۱۰ گرم × ۳۰

بها: ۶۴۳ ریال

BISOLVOMYCIN

بهرینگر اینگلهایم آلمان ـ تولیدارو ایران

ترکیب: بیسولون (کلریدرات برم هگزین) ۴ میلی‌گرم + اکسی تتراسیکلین ۲۵۰ میلی‌گرم.

موارد استعمال: برنشیتهای عفونی و مزمن برونکوپنومونی، پنومونی و برنشکتازی.

مقدار مصرف و طرز استعمال: هر ۶ ساعت ۱-۲ کپسول

موارد منع استعمال: بیماریهای شدید کلیوی و کبدی

احتیاط: در زنان آبستن، مبتلایان به بیماریهای کلیوی و کبدی

بسته‌بندی: کپسول × ۱۶

بها: ۲۰۶ ریال.

BISOLVON

بهرینگر اینگلهایم آلمان ـ تولیدارو ایران

ترکیب: کلریدرات برم هگزین

موارد استعمال: تراکئوبرونشیت، آمفیزم، بیماریهای مزمن ریه، برنشکتازی.

مقدار مصرف و طرز استعمال: خردسالان: برحسب سن روزی ۳ بار، هربار ۱۰ ـ ۳۰ قطره. بزرگسالان: روزی ۳ بار هربار ۱ تزریق عضلانی یا ۱ قرص یا ۴ میلی‌لیتر قطره.

بسته‌بندی: قرص ۸ میلی‌گرم × ۲۰ الگزیر (در هر پنج میلی‌لیتر ۴ میلی‌گرم) × ۳۰ میلی‌لیتر. آمپول ۴ میلی‌گرم در هر ۲ میلی‌لیتر × ۵

بها: قرص ۸۲ ریال. محلول ۵۹ ریال آمپول ۱۰۵ ریال.

BITREN
تانابی ژاپن – فارماشیمی ایران

ترکیب: بستن ۲۵ میلی‌گرم + ویتامین B_6 ۲۵ میلی‌گرم + ویتامین B_{12} ۰/۲۵ میلی‌گرم.
موارد استعمال: کمبود ویتامین های بدن، فلجها، نوریت، نورالژی.
مقدار مصرف و طرز استعمال: روزی ۱-۴ قرص
بسته‌بندی: قرص × ۲۰
بها: ۸۸ ریال

BLEPH$_{10}$
BLEPH$_{30}$
آلرگان–آمریکا

ترکیب: بلف ۱۰: سولفاستامید سدیم ۱۰ درصد + لیکوئی فیلم (پلی وینیل الکل) ۱/۴ درصد. بلف ۳۰: سولفاستامید ۳۰ درصد + لیکوئی فیلم (پلی‌وینیل الکل) ۱/۴ درصد.
موارد استعمال: بیشتر عفونت‌های چشمی، بلفاریت، بلفاروکونژو-نکتیویت زخم قرنیه، داکریوسیستیت های عفونی، سوختگیهای حرارتی و شیمیائی قرنیه.
مقدار مصرف و طرز استعمال: هر ۲-۳ ساعت ۱-۲ قطره در چشم می‌چکانند.
موارد منع استعمال: حساسیت بدارو
بسته‌بندی: قطره چشمی ۱۵ میلی‌لیتر
بها: (بلف ۱۰) ۷۶ ریال، (بلف ۳۰) ۹۴ ریال

BLEPHAMIDE
آلرگان–آمریکا

ترکیب: سولفاستامید سدیم ۱۰ درصد + استات پردنیزولون ۰/۲ درصد + کلریدرات فنیل افرین ۰/۱۲ درصد + لیکوئی‌فیلم (پلی-وینیل الکل) ۱/۴ درصد
موارد استعمال: بلفاریت غیرچرکی، بلفاروکونژونکتیویت، (استافیلو-کوکسی، سبوریک، آلرژیک) کونژونکتیویت غیرچرکی (آلرژیک و باکتریائی)
مقدار مصرف و طرز استعمال: روزی ۳-۶ بار، هربار ۲ قطره در هرچشم می‌چکانند
موارد منع استعمال: هرپس سمپلکس حاد، بیماریهای ویروسی چشم، سل کره چشم

بسته‌بندی: قطره چشمی ۱۰ میلی‌لیتر
بها: ۲۰۰ ریال

BLOCADREN
سرک شارپ‌اند دوهم ـ آمریکا

فارماکولوژی: بلوکه کننده گیرنده‌های بتا
ترکیب: تیمولول مالئات
موارد مصرف: آنژین صدری ناشی از ایسکمی قلبی، درمان فشار خون اصلی
مقدار مصرف و طرز استعمال: درمان با روزی ۲ تا ۳ بار، هربار ۰/۵ قرص شروع شده و تا حداکثر ۱/۵ قرص افزایش داده میشود.
موارد منع استعمال: نارسائی قلبی، بزرگی قلب، برادیکاردی، شوک کاردیوژنیک، رینیت آلرژیک، برونکو اسپاسم، دوران بارداری
عوارض جانبی: گاهی عوارض معدی، روده‌ای، سرگیجه، بیحالی، سردرد دیس پنه، برادیکاردی، خواب‌آلودگی
احتیاط: در بیماران باسابقه بیماریهای قلبی و بیماران دیابتیک باید بااحتیاط مصرف شود.
بسته‌بندی: قرص ۱۰ میلی‌گرم × ۱۰۰
بها: ۱۳۴۵ ریال

B-M SYRUP
مینا ـ ایران

ترکیب: در هر ۱۰۰ میلی‌لیتر: کلریدرات دی‌فنیدرامین ۰/۲۷ گرم + کلرور آلومینیوم ۲/۶۳ گرم + سیترات سدیم ۱/۱۰ گرم + کلروفرم ۰/۳۰ میلی‌لیتر + مانتول ۰/۰۲ گرم + الکل ۵ درصد
موارد استعمال: سرفه‌های آلرژیک، سرفه، سرماخوردگی، بیماریهای ریوی، بعنوان نرم کننده سینه.
مقدار مصرف و طرز استعمال: روزی ۳-۴ بار، هربار ۱-۲ قاشق مرباخوری.
بسته‌بندی: شربت ۱۲۰ میلی‌لیتر
بها: ۵۳ ریال

BOLDINE
هوده ـ فرانسه

ترکیب: بولدین ۱ میلی‌گرم + آلوئین متبلور ۴ میلی‌گرم.
موارد استعمال: در بیماریهای کبدی و صفراوی، بعنوان افزاینده ترشح صفرا و صفراآور، انواع یبوستها.
مقدار مصرف و طرز استعمال: روزی ۲ ـ ۳ قرص قبل از هر غذا
بسته بندی: قرص × ۵۰
بها: ۲۴ ریال

BOLDOLAXINE
امیل شارپانتیه ـ فرانسه

ترکیب: در هر قرص: گرد بولدو ۰/۰۷ + عصاره بلادون ۰/۰۰۳ گرم + فنل فتالئین ۰/۰۷۵ + لیکن ۰/۰۱
موارد استعمال: معالجه یبوست مزاج
مقدار مصرف و طرز استعمال: خردسالان: نصف قرص. بزرگسالان: یک قرص نیمساعت قبل از غذای شب.
بسته بندی: قرص × ۳۰.
بها: ۴۰ ریال

BORATE Adrenaline
دوپار ـ ایران

ترکیب: در هرصد میلی‌لیتر: بورات سدیم یک گرم + اپی نفرین ۲۰ گرم.
موارد استعمال: تحریکات ملتحمه و ضمائم ناشی از عوامل محیطی.
مقدار مصرف و طرز استعمال: یک یا دو قطره چند بار در روز در چشم می‌چکانند.
بسته بندی: قطره ۱۰ میلی‌لیتر.
بها: ۴۱ ریال

BOURGET-INOSITOL
اوا ـ ایران

ترکیب: در هربسته: بیکربنات سدیم ۰/۳ گرم + فسفات ۰/۱ گرم + سولفات سدیم ۰/۰۵ گرم + اینوزیتول ۰/۲ گرم.
موارد استعمال: صفراآور (کلرتیک)، عدم کفایت اعمال کبد، یرقان، گاسترین.
مقدار مصرف و طرز استعمال: روزی ۱ ـ ۳ بسته قبل یا کمی بعد از هرغذا

در آب حل کرده میل شود.
بسته‌بندی: بسته × ۲۰
بها: ۵۳ ریال.

BOURGET-INOSITOL Tab.
آلارد ـ فرانسه

ترکیب: در هر قرص: بیکربنات سدیم ۰/۳ گرم + فسفات سدیم انیدر ۰/۱ گرم + سولفات سدیم انیدر ۰/۰۵ گرم + اینوزیتول ۰/۲ گرم.
موارد استعمال: عدم کفایت اعمال کبد، یرقان، گاستریت، آزوفاژی.
مقدار مصرف و طرز استعمال: روزی سه قرص صبح ناشتا و قبل یا بعد از نهار و شام در نصف لیوان آب سرد یا نیم‌گرم میل شود.
بسته‌بندی: قرص جوشان × ۲۰
بها: ۵۶ ریال

BRASIVOL
استی‌فل ـ آمریکا

ترکیب: پلی‌اکسی اتیلن لوریل اتر + اکسید آلومینیوم ۳۸ درصد از نوع نرم و ۵۲ درصد از نوع متوسط
موارد مصرف: کف صابون تمیز کننده برای برطرف کردن جوشهای صورت
مقدار مصرف و طرز استعمال: شبها قبل از خواب جوشهای صورت را با محلول می‌شویند.
موارد منع استعمال: حساسیت بدارو
احتیاط: نباید دارو با چشم یا مخاط تماس پیدا کند.
بسته‌بندی: خمیر شستشو دهنده در قوطی ۶ انسی
بها: ۱۹۵ ریال

BRICAN
آسترا ـ سوئد

فارماکولوژی: برونکودیلاتاتور
ترکیب: در هر قرص تربوتالین ۵ میلی‌گرم، در هر آمپول ۰/۵ میلی‌گرم
موارد استعمال: آسم ریوی، برونشیت مزمن، آمفیزم
مقدار مصرف و طرز استعمال: روزی ۳ بار، هر بار نیم تا یک قرص.
موارد منع استعمال: تیروتوکسیوز، سه ماهه اول آبستنی، نارسائی میوکارد.

بسته‌بندی: قرص × ۱۰۰، آمپول ۱ میلی‌لیتر × ۱۰
بها: قرص ۴۲۷ ریال. آمپول ۲۰۰ ریال

BRINERDIN
ساندوز-سویس

ترکیب: در هرقرص دی هیدروارگو کریستین ۰/۵ میلی‌گرم + کلوپامید ۵ میلی‌گرم + رزرپین ۰/۱ میلی‌گرم.
موارد استعمال: پائین آوردن فشار سرخرگی با هرمنشأ (اساسی، کلیوی، آرتریواسکلروز)
مقدار مصرف و طرز استعمال: روزی یک قرص (در موارد شدید درمان با روزی ۲-۳ قرص شروع می‌شود و به روزی ۱ قرص ختم می‌شود)
موارد منع استعمال: هیپوکالمی مداوم که به درمان مقاوم باشد، حساسیت به سولفونامیدها. بیماری های شدید کلیوی.
بسته‌بندی: قرص × ۳۰
بها: ۲۲۴ ریال

BRISTACIN - A
بریستول-آمریکا

ترکیب: نیترات پیرولیدینومتیل تتراسیکلین
موارد استعمال: عفونتهای ناشی از میکرب‌های حساس به تتراسیکلین ها
مقدار مصرف و طرز استعمال: خردسالان: ۱۰-۱۵ میلی‌گرم. بزرگسالان ۳۵۰ میلی‌گرم روزی ۱-۲ بار بطور تزریق عضلانی یا وریدی
بسته‌بندی: آمپول عضلانی ویال ۱۵۰ و ۳۵۰ میلی‌گرم، آمپول وریدی ویال ۳۵۰ و ۷۰۰ میلی‌گرم.
بها: آمپول ۱۵۰ میلی ۷۰ ریال، ۳۵۰ میلی ۷۶ ریال، ۳۵۰ میلی وریدی ۸۵ ریال، ۷۰۰ میلی وریدی ۱۳۵ ریال.

BRIVITE
ویرا-ایران

ترکیب: در هرقرص: ویتامین B_1 ۲۵۰ میلی‌گرم
موارد استعمال: انواع دردهای روماتیسمی و عصبی، تمام موارد کمبود ویتامین فوق.
مقدار مصرف و طرز استعمال: روزی ۲ قرص.
بسته‌بندی: قرص × ۲۰

بها: ۴۷ ریال

BROMARINE
مارین ـ ایران

ترکیب: در هر صد گرم: برمور کلسیم ۳ گرم + برمورسدیم ۶ گرم + فنوباربیتال ۰/۱۵ گرم + آمینوپیرین ۰/۳۱ گرم

موارد استعمال: بیخوابیهای عصبی، ترس و اضطراب، اختلالات روحی و حملات قلبی هیستری.

مقدار مصرف و طرز استعمال: روزی ۳ بار، هربار ۱ قاشق مرباخوری.
بیخوابی: شب قبل از خواب ۲ قاشق مرباخوری.

بسته‌بندی: شربت ۱۲۰ میلی‌لیتر

بها: ۵۹ ریال

BRONCASMA Vaccine
برنا ـ سویس

ترکیب: برای یک میلی‌لیتر: واکسن پلی‌والان یک هزارمیلیون + فنل ۰/۴ درصد

موارد استعمال: برونشیت مزمن و عوارض آن، آسم عفونی.

مقدار مصرف و طرز استعمال: اولین تا پنجمین تزریق به‌ترتیب زیر انجام می‌شود ۰/۵-۰/۷-۱-۱-۱ میلی‌لیتر و بعد از یکهفته فاصله، پنج مرتبه دیگر هرمرتبه ۱ میلی‌لیتر تزریق می‌شود. درکودکان نصف میزان فوق تجویز می‌گردد. تزریق بصورت زیرجلدی یا داخل عضلانی بفاصله ۳ تا ۵ روز انجام می‌شود.

موارد منع استعمال: تب شدید

بسته‌بندی: آمپول ۱ میلی‌لیتر × ۱۰

بها: ۱۲۰ ریال

BROXIL
بیچام ـ انگلستان

ترکیب: پتاسیم آلفافنوکسی اتیل پنی‌سیلین = فنه‌تی‌سیلین.

موارد استعمال: درمان سریع عفونتهای ناشی از باکتریهای گرم مثبت.

مقدار مصرف و طرز استعمال: کپسول ـ بزرگسالان: روزی ۴ بار، هربار ۲۵۰ میلی‌گرم یکساعت قبل از غذا. خردسالان: روزی ۴ بار، هربار ۶۲/۵-۱۲۵ میلی‌گرم، در موارد پیشگیری همین مقدار ۲ بار در روز. شربت: مشابه قرص.

موارد منع استعمال: حساسیت به پنی‌سیلین.
بسته‌بندی: قرص ۲۵۰ میلی‌گرم× ۱۲ . شربت ۱۲۵ میلی‌گرم = ۵ میلی‌لیتر× ۶۰ میلی‌لیتر
بها: قرص ۷۸ ریال. شربت ۵۶ ریال

BRUFEN
بوتس ـ انگلستان

ترکیب: ۲ -(۴ ایزوبوتیل فنیل) پروپیونیک اسید = ایبوپروفن ۲۰۰ میلی‌گرم
موارد استعمال: آرتریت روماتوئید، استئوارتریت، روماتیسم بافتهای نرم و سایر ناراحتی‌های عضلانی ـ استخوانی.
مقدار مصرف و طرز استعمال: شروع درمان: روزی ۳ بار، هربار ۲ قرص ادامه درمان: روزی ۴-۳ بار، هربار ۱ قرص.
عوارض جانبی: بندرت سوء هاضمه و عدم تحمل
درمان مسمومیت: درصورت لزوم شستشوی معده، تنظیم الکترولیت‌های خون.
بسته‌بندی: قرص × ۱۰۰
بها: ۵۳۳ ریال

BRYREL
وینتروپ آمریکا ـ ایران

ترکیب: در هر قاشق مرباخوری: سیترات هگزائیدروپی‌پرازین معادل ۵۰۰ میلی‌گرم + هگزئیدرات پی‌پرازین.
موارد استعمال: اکسیوروز، آسکاریدوز.
مقدار مصرف و طرز استعمال: خردسالان: ۱-۵ سال یک قاشق غذاخوری بزرگتر از ۵ سال ۲ قاشق غذاخوری بعد ازشام. بزرگسالان: ۳ قاشق غذاخوری بعد از شام
بسته‌بندی: شربت ۶۰ و ۱۲۰ میلی‌لیتر
بها: ۶۰ میلی ۵۹ ریال، ۱۲۰ میلی ۸۸ ریال

BUCASEPTOL
مارین ـ ایران

ترکیب: هرصد میلی‌لیتر: اسید تانیک ۵ گرم + فنول ۰/۵ گرم + مانتول ۰/۲۵ گرم + گلیسرین ۳ گرم + فنیل سالیسیلات ۱ گرم.
موارد استعمال: پیوره، ژنژیویت، استوماتیت، فارنژیت، لارنژیت

مقدار مصرف و طرز استعمال: یک قاشق سوپخوری را در یک لیوان آب مخلوط کرده و دهان یا حلق را میشویند.
بسته‌بندی: محلول ۳۰ میلی‌لیتر
بها: ۳۵ ریال

BUDODOUZE FORT
دولدر-سویس

ترکیب: ویتامین B_1 ۲۵۰ میلی‌گرم + ویتامین B_6 ۱۰۰ میلی‌گرم + ویتامین B_{12} ۱۰۰۰ گاما
موارد استعمال: کم‌خونی خطیر (آنمی پرینسیوز)، هیپرکرومیک و مگالوبلاستیک، آنمی پلاستیک، نوریت و پلی نوریت، نورالژی، عکسبرداری با اشعه ایکس
مقدار مصرف و طرز استعمال: روزی یک تزریق عضلانی.
بسته‌بندی: آمپول ۲ میلی‌لیتر × ۶
بها: ۱۶۰ ریال

BURNOL
بوتس انگلستان
– پارس ایران

ترکیب: در هر صد گرم: آکریفلاوین ۰/۱ گرم + تیمول ۰/۰۰۴۸ گرم.
موارد استعمال: عفونت‌های پوستی، سوختگی‌ها، بریدگی‌ها، نیش حشرات، سوختگی پای کودکان در اثر ادرار.
مقدار مصرف و طرز استعمال: در زخم‌های کوچک بطور موضعی استعمال می‌شود. در زخمهای شدید پماد را روی باند مالیده روی زخم میگذارند.
بسته‌بندی: پماد ۲۵ گرم
بها: ۲۹ ریال

BUSCOPAN
بهرینگراینگلهایم آلمان– تولیدارو ایران

فارماکولوژی: ماده آنتی اسپاسمودیکی است که عضلات صاف اعضاء توخالی شکم و لگن را منبسط میکند. تصور میشود که بیشتر روی عقده‌های پاراسمپاتیک داخل جداری این اعضاء اثر میکند.
ترکیب: هیوسین-اِن-بوتیل بروماید

موارد استعمال: اسپاسم و اختلالات حرکتی لوله هاضمه، اسپاسم و دیسکنزی مجاری صفراوی، اسپاسم مجاری ادراری، اسپاسم اعضاء تناسلی زنان، اسپاسم در بیماریهای اطفال.

مقدار مصرف و طرز استعمال: بزرگسالان: روزی ۳ تا ۵ بار، هربار ۱-۲ قرص یا شیاف در موارد حاد و خیلی دردناک تزریق داخل عضلانی یا داخل وریدی یا زیرجلدی آمپول چند بار در روز تجویز میگردد. نوزادان: روزی ۳ بار هربار یک شیاف. خردسالان: روزی ۳ بار هربار ۱ دراژه، در موارد شدید روزی ۳ بار هربار ربع آمپول تزریق می‌شود.

موارد منع استعمال: در موارد گلوکوم حاد نبایستی بطور تزریقی مورد استفاده قرار گیرد.

احتیاط: سه ماهه اول دوران بارداری با احتیاط مصرف شود.

عوارض جانبی: خشکی دهان، از دست دادن موقتی تطابق و تند شدن ضربان.

بسته‌بندی: دراژه ۱۰ میلی‌گرم × ۲۰. شیاف بزرگسال ۱۰ میلی‌گرم × ۶، شیاف خردسال ۷/۵ میلی‌گرم × ۶، آمپول ۲۰ میلی‌گرم × ۶

بها: دراژه ۷۰ ریال. شیاف خردسال ۴۲ ریال. شیاف بزرگسال ۵۶ ریال، آمپول ۸۲ ریال.

BUSCOPAN COMPOSITUM

بهرینگرا ینگلهایم
آلمان- تولیدا رو
ایران

فارما کولوژی: آنتی اسپاسمودیک و ضد درد.

ترکیب: دراژه: بوسکوپان + سدیم فنیل دی‌متیل - پیرازولون متیل آمینومتان سولفونات (دی‌پیرون) ۲۵۰ میلی‌گرم، آمپول بترتیب: ۲۰ میلی‌گرم + ۲/۵ گرم. شیاف خردسال: بترتیب ۷/۵ میلی‌گرم + ۳۰۰ میلی‌گرم. شیاف بزرگسال: بترتیب ۱۰ میلی‌گرم + ۱ گرم.

موارد استعمال: قولنج های صفراوی، قولنج های کلیوی و کلیه، دردهای جهاز هاضمه که بعلت اسپاسم باشند، دردهای زنانه، قاعدگی دردناک.

مقدار مصرف و طرز استعمال: بزرگسالان: روزی ۳ بار، هربار ۱-۲ قرص یا یک شیاف در فواصل هر۲ تا ۴ساعت آمپول: یک آمپول بطور آهسته داخل وریدی یا عمیقاً داخل عضله.

خردسالان: بیش از یکسال: روزی ۳ بار، هر بار یک شیاف.

موارد منع استعمال: در موارد حساسیت نسبت به آمینو فنازن

احتیاط: در موارد وجود گلوکوم حاد بایستی حتی‌المقدور سعی گرد که بوسکوپان کمپوزیتوم از طریق خوراکی یا بصورت شیاف مصرف گردد نه از طریق تزریقی.

بسته‌بندی: دراژه × ۲۰ ، آمپول ۵ میلی‌لیتر × ۳ شیاف بزرگسال × ۶، شیاف خردسال × ۶.

بها: دراژه ۸۲ ریال، شیاف خردسال ۵۶ ریال، شیاف بزرگسال ۷۰ ریال. آمپول ۸۲ ریال.

BUTABAR SYRUP

ترکیب: در هر۵ میلی‌لیترشربت: بوتاباربیتال ۳۰ میلی‌گرم

موارد استعمال: بعنوان آرام بخش و خواب‌آور.

مقدار مصرف و طرز استعمال: بعنوان آرامبخش: ربع تا یک قاشق مرباخوری چهاربار در روز. بعنوان خواب‌آور: نیم تا دو قاشق مرباخوری نیم ساعت پیش از خواب.

بسته‌بندی: شربت ۹۰ میلی‌لیتر.

بها: ۶۴ ریال

BUTAPHEN

عبیدی ـ ایران

ترکیب: در هر قاشق چایخوری: استامینوفن ۱۲۰ میلی‌گرم سدیم بوتاباربیتال ۱۵ میلی‌گرم.

موارد استعمال: تب اطفال

مقدار مصرف و طرز استعمال: نوزادان، هر۴ساعت نصف قاشق مربا-خوری. خردسالان ۱-۱۲ سال: نصف تا دو قاشق مرباخوری در هر۴ساعت. بزرگسالان: یک قاشق سوپخوری هر۴ساعت یکمرتبه.

بسته‌بندی: شربت ۹۰ میلی‌لیتر

بها: ۴۸ ریال.

BUTAZOLIDINE
گایکی-سویس

فارما کولوژی: ضد روماتیسم و التهاب.

ترکیب: در هر دراژه: ۱ و ۲-دی‌فنیل-۳ و ۵-دی اکسو-۳-ان-بوتیل پیرازولیدین ۲۰۰ میلی‌گرم. شیاف ۲۵۰ میلی‌گرم. پماد (۵ درصد). آمپول ۳ میلی‌لیتر (نمک سدیم جسم فوق ۶۰۰ میلی‌گرم) + سنکوکائین ۶ میلی‌گرم.

موارد استعمال: رماتیسم حاد مفصلی، پلی‌آرتریت پیش رونده مزمن، اسپوندیلوآرتریت آنکیلوزان، ترمبوفلبیت سطحی، حمله نقرس.

مقدار مصرف و طرز استعمال: ۶-۱۲ میلی‌گرم بازای هر کیلوگرم وزن بدن. مقدار نگهدارنده: ۳-۶ میلی‌گرم برحسب هر کیلوگرم وزن بدن.

موارد منع استعمال: ورم یا افزایش فشار خون، تمام موارد قرحه‌های معده و اثنی‌عشر، لوکوپنی و دیاتزهای هموراژی و حساسیت به پیرازول‌ها. بیماران مبتلا به نارسائی کلیوی و کبدی.

عوارض جانبی: ناراحتیهای معدی و روده‌ای، بثورات پوستی ورم موقتی.

بسته‌بندی: آمپول × ۵، دراژه × ۲۰، شیاف × ۵، پماد ۳۰ گرم.

بها: آمپول ۱۹۰ ریال. دراژه ۱۱۰ ریال. شیاف ۱۰۰ ریال. پماد ۵۸ ریال.

BUTAZOLIDINE - ALKA
گایکی-سویس

ترکیب: بوتازولیدین ۱۰۰ میلی‌گرم + ژل نیدروکسید آلومینیم خشک ۱۰۰ میلی‌گرم + تری‌سیلیکات منیزیم ۱۵۰ میلی‌گرم.

موارد استعمال: ضد روماتیسم برای بیماران روماتیسمی مبتلا به ناراحتیهای معده.

مقدار مصرف و طرز استعمال: مقدار اولیه: روزی ۴-۸ قرص. مقدار نگهدارنده: روزی ۲-۴ قرص همراه با غذا.

موارد منع استعمال: ورم با افزایش فشارخون

عوارض جانبی: درحالیکه ناراحتی‌های معده‌ای و روده‌ای این دارو

C

مقدار زیادی کمتر از بوتازولیدین است اما بقیه عوارض شبیه آن است.

بسته‌بندی: قرص × ۳۰

بها: ۱۶۰ ریال

CAFERGOT
CAFERGOT - P.B
ساندوز-سویس

ترکیب: در هر قرص ساده: تارترات ارگوتامین ۱ میلی‌گرم + کافئین ۱۰۰ میلی‌گرم، در هر قرص P.B. علاوه بر ترکیبات فوق، مجموعه آلکالوئیدهای بلادون ۰/۱۲۵ میلی‌گرم + بوتال‌بیتال ۵۰ میلی‌گرم.

موارد استعمال: حملات میگرن و سایر اشکال سردردهای عروقی. قرص P.B. مخصوص بیمارانی است که همراه با میگرن از تهوع و استفراغ نیز رنج میبرند.

مقدار مصرف و طرز استعمال: ۲ قرص در شروع اولین علامت حمله، و اگر در طی نیم‌ساعت بهبودی مشاهده نشد میتوان یک قرص دیگر مصرف کرد و این عمل را بفواصل هر نیم‌ساعت یکبار حداکثر تا ۶ قرص در روز ادامه داد.

موارد منع استعمال: بیماریهای کورونر و عروق محیطی، اختلالات کبدی، کلیوی و آبستنی.

بسته‌بندی: قرص ساده و P.B. × ۲۰

بها: قرص ساده ۱۵۰ ریال. قرص P.B. ۱۸۰ ریال.

CAFIDON
عبیدی-ایران

ترکیب: اسید ایزوبوتیل‌آلیل باربیتوریک ۵۰ میلی‌گرم + دی‌متیل آمینوفنیل دی‌متیل پیرازولون ۱۲۵ میلی‌گرم + تری‌متیل گزانتین ۲۵ میلی‌گرم.

موارد استعمال: استخوان درد، رماتیسم، سردرد، نورالژی

مقدار مصرف و طرز استعمال: روزی ۱ - ۲ دراژه میل شود.

احتیاط: در روز نباید بیش از ۶ دراژه مصرف شود.

موارد منع استعمال: سه ماهه اول آبستنی.

بسته‌بندی: دراژه × ۲۰۰
بها: ۳۰۰ ریال

CALADRYL
پارک دیویس
آمریکا ـ ایران

ترکیب: ترکیبی از ۱ درصد بنادریل مخلوط با کالامین و کامفر
موارد استعمال: برای تسکین تحریکات پوستی، سوختگیهای خفیف پوستی ناشی از آفتاب‌سوختگی و عرق‌سوز، کهیر، گزش حشرات، تحریکات پوستی ناشی از سرخک و آبله‌مرغان، تحریکات پوستی ناشی از تماس با گیاهان سمی
مقدار مصرف و طرز استعمال: بطور موضعی استعمال می‌شود.
موارد منع استعمال: در محل تاول‌زده، بریدگی و ترک پوست نباید مالیده شود.
احتیاط: اگر در حین مصرف سوزش احساس گردد از مصرف خودداری شود.
بسته‌بندی: محلول ۸۰ میلی‌لیتر
بها: ۵۹ ریال.

CALCIBRONAT
ساندوز سویس ـ
پارس ایران

ترکیب: کلسیم برومیدو گالاکتو گلوکونات: در هر ۵ میلی‌لیتر شربت ۱ گرم، در هرقرص جوشان ۳ گرم. در هر میلی‌لیتر آمپول ۱۲۴ میلی‌گرم.
موارد استعمال: تحریکات عصبی، ضربه های مغزی، خستگی، اختلالات آلرژیکی جلدی، اضطراب، بیخوابی.
مقدار مصرف و طرز استعمال: روزی ۱ ـ ۳ قاشق غذاخوری شربت. روزی ۱ ـ ۳ قرص جوشان یا ۱ آمپول وریدی آهسته یا عضلانی
بسته‌بندی: شربت ۲۰۰ میلی‌لیتر، قرص × ۱۰، آمپول ۵ × ۵
بها: شربت ۷۵ ریال، قرص ۴۹ ریال، آمپول ۶۸ ریال.

CALCIGRAN
داروپخش ـ ایران

ترکیب: در هر بسته: ویتامین D_2 ۱۰۰ واحد + ویتامین C ۵۰۰ میلی‌گرم + فسفات و کربنات کلسیم ۲۵۷ میلی‌گرم.
موارد استعمال: تمام موارد کمبود ویتامین ها و املاح فوق، زنان باردار

مادران شیرده، خردسالان و سالمندان، راشی‌تیسم.
بسته‌بندی: گرانول ۵ گرم × ۱۰
بها: ۷۵ ریال.

CALCIMARINE
مارین ـ ایران

ترکیب: کلسیم‌گلوکوهپتونات + ویتامینD_2 + ویتامین B_{12}
موارد استعمال: راشی‌تیسم، خونریزی‌ها، اختلال رشد، زیاد کننده شیرمادران و تحکیم کننده استخوان‌بندی کودکان
مقدار مصرف و طرز استعمال: بزرگسالان: روزی ۲ ـ ۳ بار، هربار یک قاشق غذاخوری. خردسالان: روزی ۲ ـ ۳ بار، هربار یک قاشق مرباخوری.
بسته‌بندی: شربت ۱۷۰ میلی‌لیتر.
بها: ۵۹ ریال.

CALCI - OSTELIN
گلاکسو انگلستان ـ داروپخش ایران

ترکیب: در هر میلی‌لیتر محلول کلوئیدال استریل: کلسیم کلوئیدال ۰/۵ میلی‌گرم + ویتامین D ۵۰۰۰ واحد
موارد استعمال: کهیر، سرمازدگی و حالات آلرژیک، بعضی بیماریهای پوست، آسم، میگرن.
مقدار مصرف و طرز استعمال: کهیر یا ادم آنژیونوروتیک: درموارد حاد سه تا چهار تزریق یک‌سانتیمترمکعبی با فواصل سه روزه. در موارد مزمن: یک‌سانتیمترمکعب با فاصله یک هفته تا دو هفته. درمان سرمازدگی: ۲ ـ ۳ تزریق یک‌سانتیمترمکعبی با فواصل سه روزه. رینیت وازوموتور: ۲ ـ ۳ تزریق یک‌سانتیمتر‌مکعبی. آسم: تزریق یک‌سانتیمترمکعبی هر ۶ ـ ۱۲ هفته میگرن: تزریق یک‌سانتیمترمکعبی هر ۴ ـ ۸ هفته.
بسته‌بندی: آمپول یک میلی‌لیتری × ۵
بها: ۵۳ ریال.

CALCI-OSTELIN B_{12} Syrup
گلاکسو انگلستان ـ داروپخش ایران

ترکیب: در هر صد میلی‌لیتر شربت فسفات کلسیم تریبازیک ۴/۲ گرم + سیانوکوبالامین یک میلی‌گرم ارگوکالسیفرول ۷۱۰۰ واحد.

موارد استعمال: اختلالات وازوموتور مویرگی، سرمازدگی، کهیر، ادم‌آنژیرنوروتیک، درمان خونریزی مویرگی بعد از عمل جراحی، نورآستنی و کمی رشد کودکان.

مقدار مصرف و طرز استعمال: بزرگسالان: روزی ۳ بار هربار ۲ قاشق چایخوری. خردسالان روزی ۳ بار هربار ۰/۵ تا ۲ قاشق چایخوری.

بسته‌بندی: شربت ۱۷۰ میلی‌لیتری.

بها: ۷۱ ریال.

CALCI-OSTELIN B_{12} Amp.
گلاکسو انگلستان ـ داروپخش ایران

ترکیب: هر میلی‌لیتر ۰/۵ میلی‌گرم کلرور کلسیم + ارگوکالسیفرول ۵۰۰۰ واحد + سیانوکوبالامین ۵۰ میکروگرم.

موارد استعمال: اختلالات وازوموتور مویرگی، سرمازدگی، کهیر، ادم‌آنژیونوروتیک و در بعضی موارد آسم و میگرن و واکنش‌های شدید در برابر گزش حشرات، نورآستنی، طول کشیدن نقاهت و کمی رشد کودکان.

مقدار مصرف و طرز استعمال: یک آمپول هر روز یا یک روز در میان یا کمتر بر حسب شدت بیماری و پاسخ بیمار به درمان تزریق از راه داخل عضلانی یا زیرجلدی انجام شود

بسته‌بندی: آمپول یک میلی‌لیتر × ۵

بها: ۵۹ ریال.

CALCIPARINE Amp.
شونه فرانسه ـ ایباک ایران

ترکیب: در هر صد میلی‌لیتر: ۲۵۰۰۰۰۰ واحد کلسیم هپارین.

موارد استعمال: برای پیشگیری و معالجه انواع ترومبوآمبولیک‌ها، در معالجه بیماران انفارکتوس میوکارد و آمبولی ریوی و آمبولی-

ها و ترومبو زهای حاد شریانی.
مقدار مصرف و طرز استعمال: طبق دستور پزشک بطریق زیرجلدی مصرف میشود.
بسته‌بندی: ۲ آمپول + ۲ حلال یک میلی لیتری
بها:

CALCISTINE
بهرینگرمانهایم
آلمان – تهران شیمی ایران

ترکیب: گلوکونات کلسیم + لوولسیتن
موارد استعمال: اکزما، کهیر، ادم آلرژیک، درماتیتهای عصبی، گزیدگی حشرات.
مقدار مصرف و طرز استعمال: روزی ۲ – ۳ بار، هربار ۱ –۲ دراژه
بسته‌بندی: دراژه × ۲۰
بها: ۴۷ ریال.

CALCIPEN
لئو – دانمارک

ترکیب: در هر قرص: فنوکسی‌متیل – پنی‌سیلین کالسیک۳۳۳ میلی‌گرم. در هر ۵ میلی‌لیتر. شربت: ۱۰۰ میلی‌گرم.
موارد استعمال: درمان عفونتهای حاصل از ارگانیسم‌های حساس به پنی‌سیلین.
مقدار مصرف و طرز استعمال: خردسالان: نصف خوراک بزرگسالان.
بزرگسالان: روزی ۳ –۴ بار، هربار ۱ قرص، یا یک قاشق مرباخوری شربت.
بسته‌بندی: قرص × ۶. شربت ۵۰ میلی‌لیتر.
بها: قرص ۵۴ ریال. شربت ۵۹ ریال.

CALCIUM CORBIERE
کوربیر فرانسه
– فارماشیمی ایران

ترکیب: در هر آمپول: گلوکوهپتوگلوکونات کلسیم ۱/۱۰ گرم + ویتامین C ۵۰۰ میلی‌گرم + ویتامین PP ۱۰۰ میلی‌گرم + ویتامین D_2 ۰/۰۵ میلی‌گرم + اسید هیپوفسفرو ۰/۰۳ گرم. در هر قرص: کلسیم ۱ گرم + ویتامین C ۱ گرم + ویتامین D_2 ۰/۰۵ میلی‌گرم + ویتامین PP ۱۰۰ میلی‌گرم.
موارد استعمال: شکستگی‌ها، دوران رشد، حاملگی و شیردهی، خستگی

فکری و جسمی، نقاهت پس از بیماری، خونریزیها.
مقدار مصرف و طرز استعمال: بزرگسالان: آمپول: روزی ۱-۳ عدد.
قرص: روزی ۱-۳ عدد. خردسالان: روزی ۱ آمپول.
بسته‌بندی: آمپول ۱۰ میلی‌لیتر × ۶. قرص جوشان × ۱۰
بها: آمپول ۱۱۷ ریال، قرص ۷۵ ریال.

CALCIUM LEVULINATE
باکستر-ایران

ترکیب: لوولینات کلسیم ۲ گرم + آب مقطر مقدار کافی تا ۲۰ میلی‌لیتر.
موارد استعمال: تشنج عضلات دست و پا، تتانی پاراتیروئیدی، قولنج روده، مثانه و کبد، دردهای شکمی، پلورزی، حالات آلرژیکی.
مقدار مصرف و طرز استعمال: بزرگسالان: روزی ۱۰-۲۰ میلی‌لیتر تزریق وریدی، عضلانی یا زیر جلدی بطور خیلی آهسته.
خردسالان: ۲-۵ میلی‌لیتر تزریق وریدی.
موارد منع استعمال: تجویز توأم با دیژیتال، آتروپین و پیلوکارپین
بسته‌بندی: ویال ۱۰ درصد در آمپول ۲۰ میلی‌لیتر.
بها: ۷۹/۵ ریال.

CALCIUM - SANDOZ
ساندوز سویس - پارس ایران

ترکیب: در هر ۱۰۰ میلی‌لیتر شربت: گلوکونوگالاکتوگلوکونات کلسیم ۲۸/۷۵ گرم + کلسیم‌گالاکتوگلوکونات ۵/۹ گرم. در هر آمپول: کلسیم گلوکونوگالاکتوگلوکونات ۱/۳۷۵ گرم
موارد استعمال: دوران آبستنی، شیردهی. اختلالات مربوط به متابولیسم کلسیم مانند پوک‌شدن استخوانها، نرم شدن استخوانها، اسپاسموفیلی، راشی‌تیسم، کزاز، بثورات جلدی ناشی از داروها، نیش حشرات، بیماریهای ترشحی و التهابی (درمان تکمیلی)، قولنج ها و اسپاسمها و خونریزیها.
مقدار مصرف و طرز استعمال: شربت: روزی ۲-۳ قاشق غذاخوری.
آمپول: ۱ آمپول ۱۰ میلی‌لیتر از راه تزریق داخل وریدی و یا عضلانی روزی یکبار یا یکروز در میان. خردسالان: نصف مقدار

بزرگسالان (تزریق داخل وریدی مناسب تر است).
بسته‌بندی: شربت ۲۰۰ میلی‌لیتر. آمپول ۱۰ میلی‌لیتر × ۵.
بها: شربت ۷۶ ریال. آمپول هر عدد ۱۳ ریال.

CALCIUM - SANDOZ - Forte
ساندوز سویس - پارس ایران

ترکیب: در هر قرص جوشان: لاکتات - گلوکونات کلسیم ۲/۹۴۰ گرم + کربنات کلسیم ۳۰۰ میلی‌گرم معادل ۵۰۰ میلی‌گرم یون کلسیم.
موارد استعمال: اوستئوپورز بعد از یائسگی، اوستئوپورزسالمندان، اوستئوپورز بعد از درمان با کورتون، اوستئوپورز بعلت عدم تحرک دوران آبستنی و شیردهی، دوران رشد.
مقدار مصرف و طرز استعمال: در اوستئوپورز: شروع درمان: روزی ۳ بار، هربار ۲ قرص بمدت ۲ ماه. ادامه درمان: روزی ۲ بار، هربار ۱ قرص. درسایر موارد: روزی ۳ قرص.
موارد منع استعمال: نارسائی‌های شدید کلیوی
بسته‌بندی: قرص جوشان × ۲۰
بها: ۱۲۳ ریال.

CALCIUM - SANDOZ +Vitamine C
ساندوز سویس - پارس ایران

ترکیب: قرص جوشان: لاکتات - گلوکونات کلسیم ۱۰۰۰ میلی‌گرم + کربنات کلسیم ۳۲۷ میلی‌گرم + اسید اسکوربیک ۱۰۰۰ میلی‌گرم درهر آمپول ۱۰ میلی‌لیتر: گلوکونوگالاکتو گلوکونات کلسیم ۱۳۷۵ میلی‌گرم + اسید اسکوربیک ۵۰۰ میلی‌گرم.
موارد استعمال: دوران آبستنی، شیردهی، رشد، بیماریهای توأم با تب، دوران نقاهت، خستگی‌های عمومی و بیحالی و تحلیل قوا بعلت کار و فعالیت زیاد، پوکی استخوانها، شکستگی‌ها، بیماریهای نزله‌ای، عودکنندهٔ مجاری تنفسی و خونریزی.
مقدار مصرف و طرز استعمال: قرص جوشان بزرگسالان: روزی ۱ ـ ۳ قرص. قرص جوشان خردسالان: روزی ۱ ـ ۲ قرص. آمپول: بزرگسالان روزی ۱ ـ ۲ بار، هربار ۱۰ میلی‌لیتر تزریق وریدی یا

عضلانی. خردسالان: روزی ۲ ـ ۵ میلی‌لیتر تزریق وریدی یا عضلانی.
بسته‌بندی: قرص جوشان × ۱۰. آمپول × ۵
بها: قرص ۶۸ ریال. آمپول ۶۴ ریال

CALCYDIC
آلن هانبوریز انگلستان
ـ داروپخش ایران

ترکیب: در هر قرص: فسفات کلسیم انیدر ۰/۱۷ گرم + مونوئیدرات دکستروز ۰/۶ گرم + ویتامین D ۵۰۰ واحد.
موارد استعمال: کمبود کلسیم، برای رشد کودکان، راشی‌تیسم، کزاز، سوء تغذیه، نرم استخوانی.
مقدار مصرف و طرز استعمال: خردسالان: روزی ۳ بار، هربار ۱ ـ ۲ قرص بزرگسالان: روزی ۳ بار، هربار ۲ ـ ۳ قرص. قرص‌ها را میتوان بلعید یا جوید.
بسته‌بندی: قرص × ۵۰ و ۵۰۰
بها: ۵۰ عددی ۴۱ ریال، ۵۰۰ عددی ۲۳۴ ریال.

CALMICOR
برنا ـ سویس

ترکیب: آتروپین متیل برومات + استریکنین + فنوباربیتال + عصاره کراتگوس + عصاره پاسیفلور + کینین.
موارد استعمال: اسپاسم و دردهای قلبی، فشار قلبی، تاکیکاردی، اکستراسیستولها، عصبانیت.
مقدار مصرف و طرز استعمال: روزی ۳ بار، هربار ۱ قرص بعد از غذا
بسته‌بندی: قرص × ۳۰
بها: ۸۰ ریال

CALMINA
مینا ـ ایران

ترکیب: فناستین ۱۰۰ میلی‌گرم + اسید استیل سالیسیلیک ۱۰۰ میلی‌گرم + فسفات کدئین ۲/۵ میلی‌گرم + کافئین ۲/۵ میلی‌گرم + لومینال ۳ میلی‌گرم.
موارد استعمال: سردرد و نورآلژی، دردهای قاعدگی، بیخوابی‌های ناشی از درد، دردهای بعد از عمل جراحی، دندان‌درد، روماتیسم.

مقدار مصرف و طرز استعمال: روزی ۲ – ۳ قرص.
بسته‌بندی: قرص × ۲۰۰
بها: ۱۸۷ ریال.

CALMOBROM
عبیدی – ایران

ترکیب: در هر ۱۵ میلی‌لیتر: بوتوباربیتال ۴۸ میلی‌گرم + پنتوباربیتال ۴۸ میلی‌گرم + برمورسدیم ۰/۹ گرم + کلریدرات تیامین ۲۴ میلی‌گرم + ریبوفلاوین ۳ میلی‌گرم + کلریدرات پیریدوکسین ۹ میلی‌گرم + نیکوتینامید ۱۵ میلی‌گرم + پانتو-تنات کلسیم ۱۵ میلی‌گرم + عصاره مایع والریان ۰/۶ گرم + عصاره مایع کراتاگوس ۰/۷۵ گرم + عصاره مایع پاسیفلور ۰/۷۵ گرم.
موارد استعمال: اختلالات پسیکونوروتیک، اختلالات خواب، بیماری-های پسیکوموتور، تحریک‌پذیری و هیجان‌زدگی.
مقدار مصرف و طرز استعمال: خردسالان: یک قاشق چایخوری. بعنوان خواب‌آور ۱ – ۲ قاشق غذاخوری نیمساعت قبل از خواب.
بزرگسالان: روزی ۲ – ۳ بار، هربار ۱ قاشق مرباخوری.
موارد منع استعمال: بمدت طولانی در دوران بارداری
بسته بندی: شربت ۱۲۰ میلی‌لیتر
بها: ۹۵ ریال.

CALMYCINE
میسین – ایران

ترکیب: مانتول ۰/۵ گرم + سالیسیلات متیل ۳ گرم + کامفر ۱ گرم + اکالیپتول ۱۰ گرم + مانت ۱۰ گرم.
موارد استعمال: دردهای عضلانی، رماتیسمی، لمباگو، دردهای مفصلی، دردهای ناشی از انفلوانزا.
مقدار مصرف و طرز استعمال: بطور موضعی استعمال می‌شود.
بسته‌بندی: پماد ۲۰ گرم.
بها: ۲۳ ریال.

C

CALORIT
ایران دراگ ـ
ایران

ترکیب: در هر پیمانه: سدیم ۲۵ میلی‌اکی‌والان + پتاسیم ۲۵ میلی‌اکی‌والان + کلسیم ۵ میلی‌اکی‌والان + منیزیم ۴ میلی‌اکی‌والان + کلرور ۲۹ میلی‌اکی‌والان + سیترات ۱۵ میلی‌اکی‌والان + فسفات ۶ میلی‌اکی‌والان + لاکتات ۵ میلی‌اکی‌والان + سولفات ۴ میلی‌اکی‌والان + دکستروز ۸ درصد.

موارد استعمال: اسهالهای مختلف، بیماریهای عفونی، مسمومیت‌های غذائی، گرمازدگی، سوختگی.

مقدار مصرف و طرز استعمال: خردسالان: روزی ۱ ـ ۲ لیتر. بزرگسالان: ۲ ـ ۳ لیتر. هر پیمانه در یک لیوان (۲۰۰ میلی‌لیتر) حل میشود.

بسته‌بندی: گرد ۸۰ گرم.

بها: ۵۳ ریال.

CALOX
ماکسون آمریکا
ـ تولیدارو ایران

ترکیب: آمیل فنل + هپتیل فنل + اکتیل فنل + اسیدبنزوئیک + کلرور سدیم + اتیل الکل.

موارد استعمال: بوی بد دهان، گلودرد، التهاب و ورم لوزه‌ها.

مقدار مصرف و طرز استعمال: ۱ قسمت از محلول را با ۲ ـ ۳ قسمت آب مخلوط کرده دهان را میشویند یا غرغره می‌کنند.

بسته‌بندی: دهانشویه ۱۱۰ میلی‌لیتر.

بها: ۴۲ ریال.

CAMBISON
هوخست آلمان
ـ ایران

ترکیب: در هرگرم پماد پوستی: پردنیزولون ۲/۵ میلی‌گرم + باز کلریدرات نئومایسین ۲ میلی‌گرم + (۴ متیل ـ ۴ ـ آمینو کینولئیل ـ ۶) کاربامید ۳ میلی‌گرم. در هرگرم پماد چشمی: بترتیب ۲/۵ میلی‌گرم + ۲ میلی‌گرم + ۳ میلی‌گرم. در هرمیلی‌لیتر قطره: پردنیزولون ۱/۱۲ میلی‌گرم + (۴ متیل ـ ۴ ـ آمینو کینولئیل ـ ۵) کاربامید ۳ میلی‌گرم.

موارد استعمال: التهاب، آلرژی و خارش، اکزما و درماتیت‌های حاد و تحت حاد، کلیه اختلالات التهابی و آلرژیک پوست، چشم و

گوش.

مقدار مصرف و طرز استعمال: پماد: روزی ۱ ـ ۳ بار روی موضع میمالند قطره: ۴ تا ۵ قطره در مجرای گوش خارجی میچکانند یا بصورت تامپون مصرف میشود.

بسته‌بندی: پماد پوستی ۰/۲۵ درصد ۵ گرم، پماد چشمی ۰/۲۵ درصد ۲ گرم، قطرهٔ گوشی ۸ میلی‌لیتر.

بها: پماد جلدی ۵۳ ریال. پماد چشمی ۵۹ ریال. قطره ۶۴ ریال.

CAMPHOPNEUMINE Adults

مرل‌تورود فرانسه ـ دوپار ایران

ترکیب: کدئین ۰/۱۰ گرم + تنتوربلادن ۲ گرم + تنتور آکونیت ۱/۵ گرم + پوسیون‌دوتند ۳۰ گرم + برموفرم ۰/۱ گرم + کامفوسولفونات سدیم ۱/۴ گرم + بنزوات سدیم ۲ گرم + دی کامفوتیامین ۰/۱۲ گرم + سولفوگایاکولات پتاسیم ۱/۵ گرم + شربت اکالیپتوس ۵ گرم + شربت دزسارتز ۳۰ گرم + شربت تولو ۲۱/۲۵ گرم + آمینوفیلین ۰/۱ گرم + شربت معطر ۱۰۰ میلی‌لیتر.

موارد استعمال: برنشیتهای حاد و مزمن.

مقدار مصرف و طرز استعمال: هر شش ساعت یک قاشق مرباخوری.

عوارض جانبی: در اثر مصرف مقدار زیاد امکان خشک شدن دهان می‌رود.

بسته‌بندی: شربت ۹۰ میلی‌لیتر.

بها: ۵۶ ریال.

CAMPHOPNEUMINE Enfant

مرل‌تورود فرانسه ـ دوپار ایران

ترکیب: کدئین ۰/۰۴ گرم + تنتوربلادن ۱ گرم + تنتورد روزرا ۱ گرم + تنتورگرندلیا ۰/۲۵ گرم + تنتورژلسمیوم ۰/۲۵ گرم + کامفوسولفونات‌سدیم ۰/۳۸ گرم + بنزوات‌سدیم ۱ گرم + دی کامفوتیامین ۰/۱۲ گرم + سولفوگایاکولات پتاسیم ۱ گرم + شربت دزسارتز ۶۰ گرم + شربت تولو ۳۵ گرم + آمینو-فیلین ۰/۰۴ گرم + شربت معطر تا ۱۰۰ میلی‌لیتر.

موارد استعمال: برونشیتهای حاد و مزمن.

مقدار مصرف و طرز استعمال: هر شش ساعت یک قاشق مرباخوری.
احتیاط و عوارض جانبی: در اثر مصرف مقدار زیاد امکان خشک شدن دهان میرود.
بسته‌بندی: شربت ۹۰ میلی‌لیتر
بها: ۵۶ ریال.

CAMPHOPNEUMINE Bé Bé
مرل تورود فرانسه ـ ایران

ترکیب: شربت دیاکد ۵ گرم + کامفو سولفونات سدیم ۰/۲۰ گرم + بنزوات سدیم ۰/۷۵ گرم + برمورسدیم ۰/۵ گرم + دی کامفوتیامین ۰/۰۸ گرم + سولفوگایاکولات پتاسیم ۰/۷۵ گرم + شربت پرسیاوش ۱۰ گرم + شربت تولو ۳۸/۷۵ گرم + آمینوفیلین ۰/۰۲ گرم + شربت معطر تا ۱۰۰ میلی‌لیتر.
موارد استعمال: برونشیت‌های حاد و مزمن.
مقدار مصرف و طرز استعمال: هر شش ساعت یک قاشق مرباخوری.
بسته‌بندی: شربت ۹۰ میلی‌لیتر.
بها: ۴۵ ریال.

CANDEPTIN
فارماکس ـ انگلستان

ترکیب: کاندیسیدین
موارد استعمال: درمان عفونتهای قارچی، کاندیدیاز.
مقدار مصرف و طرز استعمال: قرص: روزی ۲ بار هربار یک قرص به مدت دو هفته. پماد: روزی ۲ بار بمدت دو هفته.
موارد منع استعمال: اشخاص حساس به کاندیسیدین.
بسته‌بندی: پماد واژینال (۰/۰۶ درصد) ۷۵ گرم همراه با آپلیکاتور. قرص واژینال × ۲۸.
بها: پماد ۳۶۷ ریال. قرص ۲۸۰ ریال.

CANESTEN
بایر آلمان ـ ایران

ترکیب: کلوتریمازول.
موارد استعمال: تمام عفونتهای پوستی حاصل از درموفیت‌ها و مخمرها و قارچها.

مقدار مصرف و طرز استعمال: قرص واژینال: یک قرص بمدت ۶ شب.
در بیماریهای پوستی: روزی ۲ـ۳ بار، هربار کمی از پماد با محلول را در محل میمالند.
بسته‌بندی: قرص واژینال ۰/۱ گرم × ۶. پماد و محلول ۱ درصد ۲۰ گرمی.
بها: قرص واژینال ۱۹۸ ریال. پماد و محلول ۱۶۰ ریال.

CANTACIN
هوخست آلمان
ـ ایران

ترکیب: ویتامین C ۸۰ میلی‌گرم + هسپریدین ۲۰ میلی‌گرم + فنیل دی‌متیل پیرازولون متیل‌آمینومتان ـ سولفونات کلسیم ۱۰۰ میلی گرم + فنیل دی‌متیل پیرازولون‌متیل‌آمینو سولفونات کینین ۵۰ میلی‌گرم
موارد استعمال: پیشگیری و معالجه گریپ و سرماخوردگی.
مقدار مصرف و طرز استعمال: جهت پیشگیری: روزی ۳ بار، هربار ۱ دراژه. جهت درمان بیماری: روزی ۳ بار، هربار ۲ دراژه.
بسته‌بندی: دراژه × ۲۵۰
بها: ۶۷۳ ریال.

CANTIL Tablet
لیک‌ساید ـ آمریکا

فارماکولوژی و مکانیسم: وقفه‌دهنده پاراسمپاتیک پس عقده‌ای است که ترشح اسید معده را کاهش داده و انقباضهای خودبخود و اسپاسم کولون را کم میکند.
ترکیب: در هر قرص بروموربنزولات ۲۵ میلی‌گرم.
موارد استعمال: کولیت‌اولسراتیو، کولیت مخاطی، کولیت اسپاستیک، دیورتیکولیت دیورتیکولوزها، رکتواسپاسم و اسهال همراه با درد و پیچ.
مقدار مصرف و طرز استعمال: یک یا دوقرص در روز با هر وعده غذا و شب یک تا دو قرص موقع خواب.
موارد منع استعمال: گلوگوم و هیپرتروفی پروستات.
عوارض جانبی: برافروختگی صورت که با کم کردن مقدار دارو از بین میرود.

بسته‌بندی: قرص × ۲۵
بها: ۱۰۸ ریال

CAPRAMOL
شونه-فرانسه

ترکیب: اسید اپسیلون آمینو کاپروئیک
موارد استعمال: خونریزی بعد از اعمال جراحی، خونریزی بعد از کشیدن دندان، خونریزی بعلت عفونت (سیستیت و متریت هموراژیک)، خونریزی در بیماران مبتلا به بیماریها و سرطانهای خون، هموفیلی.
مقدار مصرف و طرز استعمال: بر حسب شدت بیماری تا روزی ۲۵ گرم تجویز میگردد.
عوارض جانبی: گاهی سرگیجه و حالت تهوع.
بسته‌بندی: آمپول وریدی ۱۰ میلی‌لیتر= ۲/۵ گرم × ۱۰، آمپول خوراکی ۲۰ میلی‌لیتر= ۵ گرم × ۱۰، آمپول خوراکی ۵ میلی لیتر= ۱/۲۵ گرم × ۵.
بها: تزریقی ۲۲۸ ریال، خوراکی ۲۰ میلی ۳۰۰ ریال، ۵ میلی ۷۲ ریال.

CAPTAGON
هامبورگ-آلمان

ترکیب: ۷-۲ (آلفا-متیل-فن اتیل-آمینو) -اتیل تئوفیلین کلریدرات.
موارد استعمال: بعنوان محرک برای درمان بی‌حالی و بی‌تفاوتی، لکنت زبان ناشی از خجالت.
مقدار مصرف و طرز استعمال: روزی ۲ بار، هربار نصف تا یک قرص.
موارد منع استعمال: هیپرتیروز، بی‌تابی و تحریکات
عوارض جانبی و احتیاط: پائین آمدن فشار خون، سرگیجه، خاصیت خفیف دیورتیک. برای جلوگیری در اختلال خواب بهتر است عصر یا شب میل نشود
بسته‌بندی: قرص ۵۰ میلی‌گرم × ۲۰
بها: ۱۲۰ ریال.

CARBANTREN
سیبا ـ سویس

ترکیب: در هر قرص: ذغال طبی فعال ۷۰ درصد + پکتین ۲۰ درصد + یدو کلروئیدروکسی کینولئین بیسموته ۱۰ درصد.

موارد استعمال: اسهالها، سوءهضم، فرمانتاسیون و پوترفاکسیون، گاستروآنتریت.

مقدار مصرف و طرز استعمال: خردسالان: روزی ۲ ـ ۳ بار، هربار ۱ ـ ۳ قرص. بزرگسالان: روزی ۲ ـ ۳ بار هربار ۳ ـ ۵ قرص.

بسته‌بندی: قرص × ۲۰

بها: ۳۲ ریال.

CARDIACAP
دلکن ـ انگلستان

ترکیب: پنتااریتریتول ـ تترانیترات ۳۰ میلی‌گرم + آمیلوباربیتال ۵۰ میلی‌گرم

موارد استعمال: آنژین دوپوآترین.

مقدار مصرف و طرز استعمال: هر ۱۲ ساعت یک کپسول.

موارد منع استعمال: گلوکوم.

بسته‌بندی: کپسول × ۳۰

بها: ۱۲۰ ریال.

CARDIOPON
تروپون ـ آلمان

ترکیب: گلوکوزید کونوالاریا ۷/۵ میلی‌گرم + بوفنین ۱/۵ میلی‌گرم + ۷ (بتاهیدروکسی اتیل تئوفیلین) ۴۰ میلی‌گرم.

موارد استعمال: ناراحتی شدید قلبی، نارسائی عروقی

مقدار مصرف و طرز استعمال: روزی ۳ بار، هرباز ۱ ـ ۳ قرص.

بسته‌بندی: دراژه × ۵۰

بها: ۱۶۰ ریال.

CARDIOQUINE
سارژه ـ فرانسه

ترکیب: پلی‌گالاکتورونات کینیدین.

موارد استعمال: فیبریلاسیون دهلیزی، فلوترد هلیزی، تاکی‌کاردی پاروکسیستیک اکستراسیستول دهلیزی و بطنی.

مقدار مصرف و طرز استعمال: برحسب نوع و شدت بیماری متفاوت است.

بسته‌بندی: قرص × ۲۰
بها: ۲۵۰ ریال.

CARDOMPIN
هومن ـ آلمان

ترکیب: عصاره کونوالاریا ۰/۲۵ گرم + عصاره آدونیس ۰/۵ گرم + عصاره کراتاگوس و والریان بمقدار کافی تا ۲۰ گرم + ساپونین ۱/۵ گرم.
موارد استعمال: نوروز، نارسائی قلبی، عدم کفایت کرونر
مقدار مصرف و طرز استعمال: صبح و ظهر ۱۲ ـ ۱۵ قطره، شب ۲۰ ـ ۲۵ قطره.
بسته‌بندی: قطره ۲۵ میلی‌لیتر
بها: ۹۰ ریال.

CARIPEPTIC Liquid
آپجان ـ آمریکا

ترکیب: مخلوط انزیم‌ها ۱۹۸ میلی‌گرم + بنزوات سدیم ۱۱ میلی‌گرم + سوکروز ۵۳۹ میلی‌گرم + گلیسیرین ۰/۴۸ میلی‌لیتر + الکل ۰/۹ میلی‌لیتر.
موارد استعمال: کمک کننده به هضم غذا، تقویت کننده اعمال معدی، برطرف کننده نفخ، سوء هضم هائیکه ضایعه عضوی ندارند.
مقدار مصرف و طرز استعمال: بزرگسالان: نصف تا یک قاشق سوپخوری همراه یا بلافاصله بعد از غذا. خردسالان: روزی ۱ ـ ۲ قاشق مرباخوری.
بسته‌بندی: شربت ۱۸۰ میلی‌لیتر
بها: ۱۰۵ ریال.

CATAPRES
بهرینگر اینگلهایم آلمان
ـ تولیدارو ایران

ترکیب: ۲ ـ (۲، ۶ دی کلروفنیل آمینو) ۲ ـ ایمیدازولین کلریدرات = کلونیدین ۰/۱۵ میلی‌گرم.
موارد استعمال: انواع مختلف فشارخون.
مقدار مصرف و طرز استعمال: با روزی سه بار هربار نصف قرص شروع و بتدریج تا یک قرص افزایش داده میشود.
عوارض جانبی: خواب‌آلودگی و خستگی، خشکی دهان.

بسته‌بندی: قرص × ۳۰.
بها: ۱۷۶ ریال.

CATOVIT
بهرینگرا اینگلهایم
آلمان ـ تولیدارو
ایران

ترکیب: هرقاشق مرباخوری: کلریدرات ـ ۲ ـ پیرولیدینوپنتان ـ ۳ ۷۵ میلی‌گرم + ویتامین B_1 ۱/۶۷ میلی‌گرم + ویتامین B_2 ۱ میلی‌گرم + ویتامین B_6 ۰/۵ میلی‌گرم + نیکوتینامید ۵ میلی‌گرم.
موارد استعمال: خستگی روحی و جسمی توأم با نقصان تمرکز فکری، بیحالی، خستگی مفرط، در دوره نقاهت، بعد از بیماریها و اعمال جراحی، بعد از زایمان، تظاهرات عمومی کهولت در افراد مسن هیپوتانسیون ارتواستاتیک.
مقدار مصرف و طرز استعمال: بزرگسالان: روزی ۲ بار، هربار ۲ قاشق مرباخوری. خردسالان: روزی ۲ بار، هربار ۰/۵ ـ ۱ قاشق مرباخوری.
موارد منع استعمال: تیروتوکسیکوز.
بسته‌بندی: شربت ۱۲۰ میلی‌لیتر.
بها: ۷۰ ریال.

CEBION
مرک آلمان
ـ ایران

ترکیب: در هر قرص: اسید ال ـ آسکوربیک.
موارد استعمال: تمام موارد کمبود ویتامین C، ازدیاد خطر عفونت، خستگی.
مقدار مصرف و طرز استعمال: روزی ۱ ـ ۲ گرم.
بسته‌بندی: قرص ۲۰۰ و ۵۰۰ میلی‌گرم × ۱۰۰، قرص جوشان ۱ گرم × ۱۰، آمپول ۱۰۰ میلی‌گرم و ۵۰۰ میلی‌گرم × ۱۰۰. آمپول ۱ گرم × ۵
بها: قرص ۲۰۰ میلی ۱۵۰ ریال، ۵۰۰ میلی ۲۳۴ ریال، قرص جوشان یک گرم ۸۲ ریال، آمپول ۱۰۰ میلی‌گرم ۳۵۱ ریال، ۵۰۰ میلی‌گرم ۷۰۲ ریال، آمپول یک گرم ۹۰ ریال.

CETAVLON
آی سی آی
انگلستان ـ ایران

ترکیب: ستیل تری متیل آمونیوم بروماید = ستریمید ۱۷/۵ درصد.
موارد استعمال: درمان و پیشگیری سبوره، درماتیت سبوریک پوست سر که باعث ریزش مو میشود..
مقدار مصرف و طرز استعمال: موی سر را با آب گرم خوب خیس نموده در حدود یک قاشق مرباخوری شامپو را در کف دست ریخته و خوب به مو و پوست سر می‌مالند و با انگشتان چنگ زده سپس مو را با آب گرم آب کشیده و همین کار دوباره تکرار می‌شود.
بسته‌بندی: شامپو ۱۱۴ میلی‌لیتر.
بها: ۱۲۵ ریال.

CEBION - CALCIUM
مرک آلمان ـ ایران

ترکیب: کربنات کلسیم ۶۰۰ میلی‌گرم + ویتامین C ۱۰۰۰ میلی‌گرم + ویتامین D_3 ۴۰۰ میلی‌گرم + روتین ۴۰ میلی‌گرم + اسیدسیتریک ۱۳۰۰ میلی‌گرم.
موارد استعمال: دوران رشد، بارداری، شیردادن، راشی‌تیسم، استئوپوروز، ترمیم شکستگی استخوان، نقاهت و ضعف.
مقدار مصرف و طرز استعمال: روزی ۱ ــ ۳ بار، هر بار یک قرص جوشان را در آب حل کرده و میل می کنند.
موارد منع استعمال: نارسائی شدید کلیوی.
بسته‌بندی: قرص × ۱۰
بها: ۹۰ ریال.

CECIL
عبیدی ـ ایران

ترکیب: اسید آسکوربیک ۱۰۰۰ میلی‌گرم.
موارد استعمال: تمام موارد کمبود ویتامین C و ازدیاد مقاومت بدن در مقابل بیماری‌های عفونی و سرماخوردگی.
مقدار مصرف و طرز استعمال: روزی ۱-۲ قرص را در یک لیوان آب حل کرده مینوشند.
بسته‌بندی: قرص جوشان × ۱۰
بها: ۷۰ ریال.

CEDIGOCINE
ساندوز–سویس

ترکیب: در هرقرص: استیل دیگوکسین یا دزگلوکولاناتوزید C ۰/۲۵ میلی‌گرم.
موارد استعمال: کلیه نارسائی‌های قلبی.
مقدار مصرف و طرز استعمال: شروع: روزی ۳–۴ قرص بمدت ۳–۵ روز. ادامهٔ درمان: روزی ۱–۳ قرص.
بسته‌بندی: قرص × ۵۰
بها: ۱۵۰ ریال.

CEDILANID
ساندوزسویس
– پارس ایران

ترکیب: قطره: لاناتوزید C هر ۳۰ قطره = ۱ میلی‌لیتر = ۱ میلی‌گرم آمپول: دزاستیل لاناتوزید C ۰/۴ میلی‌گرم. قرص: لاناتوزید C ۰/۲۵ میلی‌گرم.
موارد استعمال: کنترول سریع تاکیکاردی پاروکسیستیک فوق بطنی درمان بطنی و ادامه درمان در مبتلایان به نارسائی‌های قلبی، عدم کفایت قلبی با ضربان نبض کند یا طبیعی.
مقدار مصرف و طرز استعمال: درمان سریع (۲۴ ساعته): بزرگسالان: روزی ۲–۴ آمپول داخل وریدی. خردسالان: روزی ۱–۲ بار، هربار ۰/۰۲ میلی‌گرم برای هرکیلو وزن بدن داخل وریدی یا عضلانی ۰/۰۶ میلی‌گرم برای هرکیلو در ۳ نوبت از راه خوراکی درمان بطئی (۳ تا ۵ روزه). بزرگسالان: ۱/۵ تا ۲ آمپول در روز بطور داخل وریدی یا ۶–۸ قرص یا ۴۵ تا ۶۰ قطره در روز. خردسالان: ۰/۰۰۸ تا ۰/۰۱۶ میلی‌گرم بازای هرکیلو وزن در روز از راه داخل وریدی یا عضلانی ۰/۰۲–۰/۰۴۰ میلی‌گرم بازای هرکیلو در روز (در سه نوبت) از راه خوراکی ادامهٔ درمان: بزرگسالان: یک آمپول از راه تزریق داخل وریدی در روز یا ۲–۶ قرص یا ۱۵–۴۵ قطره خوراکی در روز. خردسالان: ۰/۰۱ تا ۰/۰۲۵ میلی‌گرم بازای هرکیلو وزن در روز (در سه نوبت) از راه خوراکی.
بسته‌بندی: قطره ۲۰ میلی‌لیتر. آمپول × ۳.
بها: قطره ۵۷ ریال، آمپول ۲۹ ریال.

CEFALIN
مینا ـ ایران

فارماکولوژی مکانیسم: با وقفه اثر آنزیم ترانس‌پپتیداز و رقابت با آلانین موجب ساخته نشدن جدار سلول و پاره‌شدن آن میشود.

ترکیب: ۷ـ (د ـ آلفا ـ آمینو ـ فنیل استامیدو) ۳ـ متیل ۳ـ سفن ۴ـ کربوکسیلیک اسید منوهیدرات = سفالکسین منوهیدرات.

موارد مصرف: عفونتهای دستگاه تنفسی، پوستی و نسوج نرم، مجاری ادراری و تناسلی، استومیلیت، سپتی‌سمی، پریتونیت.

مقدار مصرف: بزرگسالان: ۱ ـ ۴ گرم در ۴ دوز مساوی، خردسالان: ۲۵ ـ ۵۰ میلی‌گرم برای هر کیلو.

موارد منع استعمال: حساسیت بدارو، نارسائی شدید کلیوی.

بسته‌بندی: کپسول ۲۵۰ و ۵۰۰ میلی‌گرم × ۱۲، شربت ۱/۵ و ۳ گرم × ۶۰ میلی لیتر.

بها: شربت ۱/۵ گرم ۲۰۰ ریال، ۳ گرم ۳۸۰ ریال.

CEFATREXYL
بریستول ـ آمریکا

ترکیب: سفالوپیرین‌سدیم.

موارد استعمال: عفونتهای حساس به آنتی‌بیوتیک فوق

مقدار مصرف: خردسالان: ۴۰ـ ۸۰ میلی‌گرم بازاء هر کیلو وزن بدن.
بزرگسالان: روزی یک تزریق وریدی.

بسته‌بندی: ویال ۱ گرم × ۱

بها: ۲۸۰ ریال.

CELESTODERM - V
شرینگ آلمان ـ ایران

ترکیب: هرگرم پماد ساده: بتامتازون ۱۷ والرات ۱ میلی‌گرم. هرگرم پماد با نئومایسین: بتامتازون ۱۷ والرات ۱ میلی‌گرم + سولفات نئومایسین ۵ میلی‌گرم.

موارد استعمال: اکزمای اتوپیک، اکزمای کودکان، اکزمای نومولر خارش مقعد و دستگاه تناسلی، خارش در سالمندان، درماتیت تماسی، درماتیت سبورئیک، نورودرماتیت، انترتریگو، درماتیت اگسفولیاتیو، درماتیت ناشی از آفتاب، درماتیت استازیس و پسوریازیس.

مقدار مصرف و طرز استعمال: روزی ۲ ـ ۳ بار بطور موضعی استعمال

می‌شود.

موارد منع استعمال: مانند سایر کورتیکو ستروئیدهای موضعی نباید در سل پوستی یا ضایعات پوستی همراه با عفونت‌های ویروسی از قبیل تبخال ساده و آبله‌مرغان مصرف شود.

بسته‌بندی و بها: کرم سلستودرم‌وی ۵ و ۱۵ گرمی ۹۲ و ۱۵۲ ریال. کرم سلستودرم‌وی + نئومایسین ۵ و ۱۵ گرمی ۸۸ و ۱۶۴ ریال. پماد سلستودرم‌وی ۵ و ۱۵ گرمی ۹۲ و ۱۵۲ ریال. پماد سلستودرم‌وی با نئومایسین ۵ و ۱۵ گرمی ۸۸ و ۱۶۴ ریال.

CELESTON

شرینگ آمریکا
- ایران

فارماکولوژی و مکانیسم: استروئید آدرنوکورتیکالی است مشتق از پردنیزولون که یک گروه متیل روی کربن ۱۶ - بتا دارد که قدرت ضد التهابی ملکول را افزایش میدهد و خواص احتباس آب و سدیم مربوط به اتم فلوئور را روی کربن ۵ کم میکند.

ترکیب: در هر قرص: بتامتازون ۰/۵ میلی‌گرم. آمپول: دی‌سدیم فسفات بتامتازون ۵/۳ میلی‌گرم.

موارد استعمال: آرتریت‌روماتوئید، تب حاد روماتیسمی، لوپوس-اریتماتوزمنتشر، اسکارودرم، درماتومیوزیت، آسم برونشیال (آسم حمله‌ای) رینیت آلرژیک، انژیوادم، واکنش های مربوط به‌انتقال خون، واکنشهای سرم و دارو، درماتیت تماسی، نورو-درماتیت، اکزماآلرژیک، درماتیت اکسفولیاتیو، کهیر، درماتیت تبخالی‌شکل، اووئیت، کوریورتینیت، بورسیت، سینوویت، تنوسینویت و غیره.

مقدار مصرف و طرز استعمال: روزی ۰/۵ تا ۴/۵ میلی‌گرم نسبت به احتیاج بیمار.

موارد منع استعمال: در بیماران مبتلا به‌آبله‌مرغان و یا بیماریهای اگزانتماتیک، در تبخال ساده چشمی.

احتیاط: در بیماران مبتلا به‌استئوپورز، اختلالات روانی، اولسرپپتیک، سل و عفونتهای حاد و مزمن بایستی با احتیاط مصرف شود.

بسته‌بندی: قرص × ۱۰۰ آمپول: ۱ میلی‌لیتر × ۱

بها: قرص ۴۱۰ ریال آمپول ۸۸ ریال.

CELESTON
CELESTON - S
شرینگ آمریکا ـ ایران

ترکیب: سلستون ساده: دی‌سدیم فسفات بتامتازون ۰/۱ درصد در محلول تامپون. سلستون اس کلوئیدال: هر میلی‌لیتر= ۱ میلی گرم. بتامتازون+ ۱۰۰ میلیگرم سدیم سولفاستامید ۱۰ درصد.

موارد استعمال: بلفاریت، کونژنکتیویت کراتیت اینترستیسیل، تبخال چشمی، کراتو کونژنکتیویت، اسکلریت، اپی اسکلریت، ایریتیس، ایریدوسیکلیت، اوتیت خارجی، درماتیت سبورئیک موضعی و اکزمای اطراف گوش و بینی.

مقدار مصرف و طرز استعمال: سلستون ساده: هر ۱ ـ ۲ ساعت ۲ ـ ۳ قطره در چشم چکانده می‌شود. سلستون اس کلوئیدال: هر ۱ ـ ۴ ساعت ۱ ـ ۲ قطره.

موارد منع استعمال: تبخال ساده چشمی، اولسر داندریتیک قرنیه.

بسته‌بندی: قطره چشمی ۵ میلی‌لیتر

بها: قطره ساده ۱۰۲ ریال. قطره سلستون اس کلوئیدال ۱۱۱ ریال.

CELESTON Chronodose
شرینگ آمریکا ـ ایران

ترکیب در هر یک میلی‌لیتر: دی‌سدیم فسفات بتامتازون ۳ میلی‌گرم + استات بتامتازون ۳ میلی‌گرم.

موارد استعمال: بیماریهای کلاژن، عوارض پوستی، عوارض آلرژیک، سندرم ادرنوژنیتال، کولیت‌اولسراتیو، رادیکولیت، عوارض مختلف در پا و کنترل بیماران قبل و بعد از جراحی.

مقدار مصرف و طرز استعمال: ۱ میلی‌لیتر تزریق داخل عضلانی، داخل مفصلی، داخل بورسی، داخل جلدی و داخل ضایعه‌ای.

موارد منع استعمال: وجود عفونت موضعی

بسته‌بندی: آمپول ۱ میلی‌لیتر× ۱

بها: ۱۵۲ ریال.

CENASERT
فارماشیمی ـ ایران

ترکیب: در هر قرص ۹ ـ آمینواسیدرین اندسیلینات ۱ میلی‌گرم + N میریستیل ۱ میلی‌گرم + متیل بنزتونیوم ۱/۸ میلی‌گرم + اسید سوکسی نیک ۱۲/۵ میلی‌گرم.

موارد استعمال: واژینیت‌تریکومونا، مونیلیا و باکتریهای توأم و نامشخص.

مقدار مصرف و طرز استعمال: شبی ۱ ـ ۲ قرص را در آب نم زده استعمال می کنند.

بسته‌بندی: قرص × ۳۰

بها: ۲۴۶ ریال.

CENDEVAX
اسکالف ـ انگلستان

ترکیب: واکسن سرخجه.

موارد استعمال: ایجاد مصونیت در ابتلای بیماری سرخجه.

مقدار مصرف و طرز استعمال: یک دوز از طریق زیرجلدی.

احتیاط: حداقل تا ۶ هفته پس از درمان با گاماگلوبین یا ترانسفوزیون خون باید واکسیناسیون را به تأخیر انداخت.

موارد منع استعمال: در دوران بارداری مصرف این دارو مطلقاً ممنوع است.

بسته‌بندی: ده بسته + حلال ۰/۵ میلی‌لیتری × ۱

بها: ۲۷۰ ریال.

CEPEVIT - K
فریس ـ فرانسه

ترکیب: در هر آمپول: اسید آسکوربیک ۳۰۰ میلی‌گرم + متیل- چالکن هسپریدین ۱۰۰ میلی‌گرم + اسکولوزید ۱۰ میلی‌گرم + متیل روتین ۵۰ میلی‌گرم + ویتامین K_3 ۱۵ میلی‌گرم در هر قرص به ترتیب : ۱۰۰ میلی‌گرم + ۲۰ میلی‌گرم + ۲ میلی‌گرم + ۲۵ میلی‌گرم + ۵ میلی‌گرم + چالکن هسپریدین ۲۰ میلی‌گرم (بجای متیل چالکن هسپریدین آمپول).

موارد استعمال: پیشگیری و درمان انواع خونریزی‌ها، جراحی و زنان ضایعات و اختلالات عروقی.

مقدار مصرف و طرز استعمال: آمپول : روزی ۱ ـ ۴ ویال تزریق داخل

وریدی و یا بصورت پرفوزیون همراه با مایعات نمکی، قندی و یا خون. در موارد خونریزی‌های شدید تا ۱۰ فلاکن در روز.
قرص: خردسالان روزی ۱ـ۳ قرص. بزرگسالان: روزی ۳ـ۶ قرص.
بسته‌بندی: قرص × ۲۵. آمپول × ۱.
بها: قرص ۸۴ ریال آمپول ۸۲ ریال.

CEPHALOMEX
آی دی آی ـ ایران

ترکیب: سفالکسین منوهیدرات
موارد استعمال: کلیه عفونتهای حساس به سفالوسپورین ها
مقدار مصرف و طرز استعمال: هر شش ساعت ۲۵۰ میلی‌گرم
بسته‌بندی: کپسول: ۲۵۰ و ۵۰۰ میلی‌گرم ×۱۲. شربت ۱۲۵ و ۲۵۰ = ۵ میلی‌لیتر × ۶۰ میلی‌لیتر، قطره خوراکی ۱۰۰ میلی‌گرم = ۱ میلی‌لیتر × ۱۰ میلی‌لیتر.
بها: کپسول ۲۵۰ میلی ۵۴۰ ریال ۵۰۰ میلی ۸۹۲ ریال. شربت ۱۲۵، ۲۳۴ ریال، ۲۵۰ میلی ۴۶۳ ریال، قطره ۱۴۴ ریال.

CEPORACIN
گلاکسو ـ انگلستان

ترکیب: سفالوتین سدیم.
موارد استعمال: عفونتهای ناشی از میکربهای گرم مثبت و گرم منفی بجز پسودوموناس.
مقدار مصرف و طرز استعمال: خردسالان: روزی ۴۰ـ۸۰ میلی‌گرم در چند قسمت. بزرگسالان روزی ۲ـ۶ گرم تزریق بصورت پرفوزیون یکمرتبه یا در چند قسمت.
موارد منع استعمال: حساسیت به آنتی‌بیوتیک‌های گروه سفالوسپورین
بسته‌بندی: آمپول ۱ گرم × ۱
بها: ۲۵۸ ریال.

CEPORAN
گلاکسو ـ انگلستان

ترکیب: سفالوریدین
موارد استعمال: کلیه عفونتهای حساس به آنتی‌بیوتیک مانند عفونتهای مجاری تنفسی، ادراری، تناسلی، استئومیلیت سپتی‌سمی، مننژیت

آندوکاردیت.

مقدار مصرف و طرز استعمال: روزی ۱ ــ ۴ گرم منقسم به ۲ ــ ۳ دوز تزریقی عضلانی یا وریدی.

موارد منع استعمال: حساسیت به آنتی‌بیوتیک فوق.

بسته‌بندی: آمپول ۲۵۰ و ۵۰۰ میلی‌گرم.

بها: ۲۵۰ میلی ۸۸ ریال، ۵۰۰ میلی ۱۶۵ ریال

CEPOREX

گلاکسو انگلستان

ــ داروپخش ایران

ترکیب: سفالکسین

موارد استعمال: تمام عفونت‌های گرم مثبت بویژه عفونت‌های حاصل از استافیلوکوک‌های مقاوم به پنی‌سیلین‌ها.

مقدار مصرف و طرز استعمال: بر حسب شدت و نوع عفونت روزی ۱ ــ ۴ گرم.

عوارض جانبی: ناراحتیهای گوارشی نظیر تهوع، استفراغ، اسهال.

موارد منع استعمال: افراد حساس به سفالوسپورین‌ها.

بسته‌بندی: کپسول ۲۵۰ و ۵۰۰ میلی‌گرم × ۱۲. شربت ۱۲۵ میلی‌گرم = ۵ میلی‌لیتر × ۶۰ میلی‌لیتر.

بها: کپسول ۲۵۰ میلی‌گرم ۴۶۰ ریال، کپسول ۵۰۰ میلی‌گرم ۸۵۰ ریال، شربت ۱۲۵ میلی‌گرم ۲۰۲ ریال.

CERUMENEX

سیگما ــ کانادا

ترکیب: اولئات پلی‌پپتید تری اتانولامین ۱۰ درصد + کلروبوتانل ۵ درصد.

موارد استعمال: حل کننده بوشن دوسرومن

مقدار مصرف و طرز استعمال: مجرای خارجی گوش را از قطره پرمیکنند و سپس ۲۰ تا ۳۰ دقیقه بعد با آب ولرم میشویند.

موارد منع استعمال: پارگی پرده‌گوش، زخمهای شدید داخل گوش و عفونتهای گوش میانی، حساسیت به دارو.

بسته‌بندی: محلول ۸ میلی‌لیتر.

بها: ۱۳۰ ریال.

CETAVLON
آی سی آی
ـ انگلستان

ترکیب: ستیل تری متیل آمونیوم بروماید ـ ستریمید ۱۷/۵ درصد
موارد استعمال: درمان و پیشگیری سبوره موی سر، درماتیت سبوریک پوست سر که باعث ریزش مو میشود.
مقدار مصرف و طرز استعمال: موی سر را با آب گرم خوب خیس نموده در حدود یک قاشق مرباخوری شامپو را در کف دست ریخته و خوب به مو و پوست سر می‌مالند و با انگشتان چنگ زده سپس مو را با آب گرم آب کشیده و همین کار را دوبار تکرار میکنند.
بسته‌بندی: شامپو ۲۸ میلی‌لیتر و ۱۱۴ میلی‌لیتر.
بها: کوچک ۲۰ ریال، بزرگ ۶۰ ریال.

CHERRY COUGH
بوتس انگلستان
ـ پارس ایران

ترکیب: کلریدرات مرفین ۰/۰۲ درصد + کلریدرات افدرین ۰/۱۱۴ درصد + شربت سیل ۸/۳ درصد + اسید استیک ۲ درصد + اسید کلریدریک ۰/۳ درصد.
موارد استعمال: برای تسکین سرفه، و باز کردن برونش ها و خلط‌آور
مقدار مصرف و طرز استعمال: بزرگسالان: روزی ۳ ـ ۴ بار هربار ۱ ـ ۲ قاشق مرباخوری. خردسالان ۵ـ ۱۲ سال: روزی ۳ قاشق مرباخوری.
موارد منع استعمال: خردسالان کمتر از ۵ سال.
بسته‌بندی: شربت ۱۱۲ میلی‌لیتر.
بها: ۲۹ ریال.

CHIBRO-ANALGOZINC
شیبره ـ فرانسه
داروپخش ایران

ترکیب: پارائیدروکسی بنزوات متیل ۰/۰۵۱ گرم + سولفات روی متبلور ۱ گرم + کلریدرات تتراکائین ۰/۲۵ گرم + محلول تامپون ایزوتونیک تا ۱۰۰ میلی‌لیتر.
موارد استعمال: بلفاریت، کونژنکتیویت کاتارال حاد و نیمه حاد.
مقدار مصرف و طرز استعمال: روزی ۳ ـ ۷ بار، هربار ۱ ـ ۲ قطره.
بسته‌بندی: قطره ۱۰ میلی‌لیتر.
بها: ۳۵ ریال.

CHIBRO - ATROPINE
شیبره ـ فرانسه

ترکیب: سولفات آتروپین ۱ درصد
موارد استعمال: التهاب عنبیه، التهاب عنبیه و جسم مژگانی، برای گشاد کردن مردمک، معاینه عیوب انکسار و از بین بردن تطابق، برای استراحت دادن چشم.
مقدار مصرف و طرز استعمال: بر حسب نوع و شدت بیماری متفاوتست
موارد منع استعمال: گلوکوم.
احتیاط: در مورد کودکان باید از غلظتهای کمتر آتروپین یعنی غلظت‌های ۰/۳ درصد و یا ۰/۵ درصد استفاده کرد.
بسته‌بندی: قطره چشمی ۱۰ میلی‌لیتر.
بها: ۴۱ ریال.

CHIBRO - BORALINE
شیبره ـ فرانسه

ترکیب: تارترات سینفرین + اسید بوریک + بورات سدیم + پاراوکسی بنزوات متیل.
موارد استعمال: شستشو و ضدعفونی کردن چشم، رفع خستگی چشم.
مقدار مصرف و طرز استعمال: روزی ۲ ـ ۳ بار شستشو شود.
بسته‌بندی: قطره چشمی ۱۰ میلی‌لیتر.
بها: ۳۵ ریال.

CHIBRO - IODOCALCIQUE
شیبره ـ فرانسه

ترکیب: قطره چشمی: یدور پتاسیم ۰/۵ گرم + کلرور کلسیم ۰/۵ گرم + محلول ایزوتونیک تا ۱۰۰ میلی‌لیتر.
موارد استعمال: کاتاراکت ارثی و پیری
مقدار مصرف و طرز استعمال: روزی ۲ ـ ۳ بار در هر چشم چکانده شود.
بسته‌بندی: قطره ۱۰ میلی‌لیتر.
بها: ۲۹ ریال.

CHIBRO - PILOCARPINE
شیبره ـ فرانسه

ترکیب: نیترات پیلوکارپین.
موارد استعمال: برای پائین آوردن فشار داخلی کره چشم
مقدار مصرف و طرز استعمال: بر طبق دستور پزشک.

C

احتیاط: همیشه پس از مصرف در شیشه را محکم ببندید. این شیشه فقط برای یک دوره درمان کافی است و پس از آن نباید مصرف شود.

بسته‌بندی: شیشه های قطره‌چکان‌دار ۱۰ میلی‌لیتر حاوی ۱ درصد و ۲ درصد نیترات پیلو کارپین.

بها: یک درصد ۴۱ ریال. ۲ درصد ۳۵ ریال.

CHIMIOPHYLLINE

برونوفرانسه ـ فارماشیمی ایران

ترکیب: تئوفیلین

موارد استعمال: آسم برونش ها، آمفیـزم، بیماریهای قلبی، آسم.

مقدار مصرف و طرز استعمال: روزی ۴ بار هربار ۲ قرص. روزی ۳ ـ ۴ قاشق غذاخوری شربت، روزی ۱ ـ ۲ عدد شیاف.

بسته‌بندی: قرص ۱۰۰ میلی‌گرم × ۳۰. شربت (۳ سانتی‌گرم در هر ۵ میلی‌لیتر) × ۱۲۰ میلی‌لیتر. شیاف بزرگسالان (۳۵۰ میلی‌گرم) × ۱۲. شیاف خردسالان ۱۰۰ میلی‌گرم × ۶

بها: قرص ۴۵ ریال. شیاف بزرگسالان ۵۴ ریال. شیاف خردسالان ۲۴ ریال.

CHIMIOPHYLINE Butobarbital

برونو فرانسه ـ فارماشیمی ایران

ترکیب: در هر قرص: تئوفیلین ۵ سانتی‌گرم + بوتوباربیتال ۱ سانتی‌گرم. در هر شیاف بزرگسالان بترتیب: ۰/۳۵ سانتی‌گرم + ۷ سانتی‌گرم. شیاف خردسالان: بترتیب: ۱۰ سانتی‌گرم + ۳ سانتی‌گرم.

موارد استعمال: انواع آسم، تنگی نفس.

مقدار مصرف و طرز استعمال: روزی ۳ ـ ۴ قرص. روزی ۲ ـ ۳ شیاف بزرگسالان. روزی ۱ ـ ۲ شیاف خردسالان.

بسته‌بندی: قرص × ۳۰. شیاف بزرگسالان × ۱۲. شیاف خردسالان × ۶

بها: قرص ۴۵ ریال. شیاف بزرگسالان ۶۰ ریال. خردسالان ۲۷ ریال.

CHLORAMPHENICOL

دوپار ـ ایران

ترکیب: کلرامفنیکل ۵ گرم + پروپیلن گلیکول + مقدار کافی تا ۱۰۰ میلی‌لیتر.

موارد استعمال: عفونتهای گوشی حساس به کلرامفنیکل.
مقدار مصرف و طرز استعمال: روزانه ۳ ـ ۴ بار هربار ۱ ـ ۳ قطره در هر گوش میچکانند.
بسته‌بندی: قطره گوشی ۱۰ میلی‌لیتر.
بها: ۴۱ ریال.

CHLORAMPHENICOL Sterille
دوپار ـ ایران

ترکیب: قطره: کلرامفنیکل ۱ گرم + محلول ایزوتونیک تا ۱۰۰ میلی‌لیتر، پماد: کلرامفنیکل ۱ گرم + اکسیپیان تا ۱۰۰ گرم.
موارد استعمال: عفونتهای چشمی حساس به کلرامفنیکل.
مقدار مصرف و طرز استعمال: قطره: در موارد شدید هر ساعت ۱ ـ ۲ قطره و در موارد خفیف روزی ۴ بار، هربار ۱ ـ ۲ قطره، پماد: روزی ۱ ـ ۳ بار روی موضع مالیده میشود.
بسته‌بندی: قطره چشمی ۱۰ میلی‌لیتر. پماد چشمی ۵ گرم.
بها: قطره ۴۱ ریال، پماد ۱۶ ریال.

CHLORAMPHENICOL + SULFACETA MIDE
پ او اس فرانسه ـ دوپار ایران

ترکیب: در هر ۱۰۰ میلی‌لیتر: کلرامفنیکل ۱ میلی‌لیتر + سولفاستامید ۱۰ میلی‌لیتر.
موارد استعمال: پیشگیری و درمان عفونتهای چشمی
مقدار مصرف: روزی ۳ـ۴ بار، هربار ۱ ـ۲ قطره در هرچشم می‌چکانند.
بسته‌بندی: قطره چشمی ۱۰ میلی‌لیتر.
بها: ۵۲ ریال

CHLORANSULFA
شیره ـ فرانسه

ترکیب: کلرامفنیکل ۰/۵ گرم + سولفاستامید سدیم ۱۰ گرم + محلول ایزوتونیک تا ۱۰۰ میلی‌لیتر.
موارد استعمال: کونژنکتیویت، کرآتیت، تراخم، پیشگیری ازعفونتهای چشمی.
مقدار مصرف و طرز استعمال: روزی ۳ـ۶ بار، هربار ۱ ـ۲ قطره.
بسته‌بندی: قطره ۱۰ میلی‌لیتر.

بها: ۷۰ ریال

CHLOROMYCETIN
پارک دیویس
آمریکا ـ ایران

ترکیب: کلرامفنیکل

موارد استعمال: ذات‌الریه میکربی، کولیت اولسروز، گرانولوم مغبنی، لنفوگرانولوم ونرئوم، عفونتهای گونوکسیک، روده‌ای و دیسانتری، تب مالت، تبهای باسیلی کوکسیک، عفونتهای مجاری ادراری، پنومونی، تب حصبه، تب تیفوسی و سایر عفونتهای ریکتزیائی

مقدار مصرف و طرز استعمال: ۵۰ میلی‌گرم بازاء هر کیلوگرم وزن بدن هر ۶ ساعت

موارد منع استعمال: حساسیت بدارو

احتیاط: توصیه شده است که کلرامفنیکل فقط با دستور پزشک مصرف شود و برای درمان عفونتهای جزئی پیشنهاد نمیگردد.

بسته‌بندی: کپسول ۲۵۰ میلی‌گرم × ۱۰۰۰. شربت ۱۲۵ میلی‌گرم = ۵ میلی‌لیتر × ۶۰ میلی‌لیتر. ویال تزریقی ۱ گرم. پماد ۱۰ درصد

بها: ۱۰۰۰ عددی ۷۰۰۰ ریال، شربت (پالمیتات کلرامفنیکل) ۱۱۷ ریال، ویال تزریقی ۱۱۰ ریال، پماد ۵۹ ریال.

CHLOROPTIC
آلرگان ـ آمریکا

ترکیب: در هرمیلی‌لیتر: کلرامفنیکل ۵ میلی‌گرم

موارد استعمال: عفونتهای قرنیه حساس به کلرامفنیکل.

مقدار مصرف و طرز استعمال: روزی ۴ـ۶ بار، هربار ۱ـ۲ قطره در هرچشم می‌چکانند.

عوارض جانبی: گاهی خارش، سوزش، کهیر و درماتیت

بسته‌بندی: قطره چشمی ۱۰ میلی‌لیتر

بها: ۸۰ ریال

CHLOROSTREP
پارک دیویس ـ آمریکا

ترکیب: در هر کپسول یا هرقاشق مرباخوری شربت: کلرومایستین ۱۲۵ میلی‌گرم + استرپتومایسین ۱۲۵ میلی‌گرم

موارد استعمال: عفونتهای حساس به‌آنتی‌بیوتیکهای فوق، دیسانتری

باسیلی و عفونتهای روده‌ای.
مقدار مصرف و طرز استعمال: بزرگسالان: هر ۶ ساعت ۲-۴ کپسول یا ۵-۲۰ میلی‌لیتر شربت. خردسالان: ۵-۱۰ میلی‌لیتر شربت.
بسته‌بندی: سوسپانسیون ۶۰ میلی‌لیتر. کپسول × ۱۲
بها: شربت ۱۴۵ ریال. کپسول ۱۲۹ ریال.

CHLORTETRACYCLINE
پ. او. اس فرانسه ـ دوپار ایران

ترکیب: در هر ۱۰۰ گرم پماد: کلریدرات تتراسیکلین (چشمی ۱ گرم، جلدی ۳ گرم).
موارد استعمال: تمام عفونت‌های حساس به کلر تتراسیکلین
مقدار مصرف و طرز استعمال: روزی دوبار بر روی موضع میمالند.
بسته‌بندی: پماد چشمی ۵ گرم، پماد جلدی ۱۵ گرم.
بها: چشمی ۱۶ ریال. جلدی ۳۵ ریال

CHOLIPIN
بهرینگر اینگلهایم آلمان ـ تولیدارو ایران

ترکیب: ۱-فنیل-۱-هیدروکسی-ان-پنتان ۱۰۰ میلی‌گرم + بنزیلیک اسید بتا دی‌متیل-ان-اکتیل-آمونیوم-اتیل استر بروماید ۱۰ میلی‌گرم
موارد استعمال: در اختلالات هاضمه، احساس سنگینی و پری بعد از غذا، ناراحتی‌های بعد از خوردن غذاهای چرب و دیرهضم، نفخ، عفونتهای مجاری صفراوی و کبدی، دردهای اسپاستیک کیسه صفرا و همچنین بعنوان پروفیلاکتیک در تمام موارد فوق
مقدار مصرف و طرز استعمال: روزی ۳ بار، هربار ۱-۲ قرص میل شود.
بسته‌بندی: قرص × ۲۰
بها: ۵۹ ریال

CHYMOCYCLAR ۲۵۰
سیلاگ شمی ـ سویس

ترکیب: در هر کپسول: کلریدرات تتراسیکلین ۲۵۰ میلی‌گرم + آنزیم (شامل تریپسین و کیموتریپسین به نسبت ۶ به ۱) با فعالیت ۵۰ هزار واحد
موارد استعمال: کلیه عفونتهای ناشی از میکروبهای حساس به‌آنتی‌بیوتیک فوق

مقدار مصرف و طرز استعمال: ۱-۲ کپسول چهار بار در روز نیمساعت پیش از غذا

موارد منع استعمال: ناراحتیهای کلیوی، کبدی، خردسالان کوچکتر از ۱۰ سال

بسته‌بندی: کپسول × ۳۰

بها: ۲۵۰ ریال

CHYMOSER Balsamique
سرونو-ایتالیا

ترکیب: آلفا کیموتریپسین و تریپسین کریستالیزه ۵۰ هزار واحد + سولفوگایاکولات پتاسیم ۵۰ میلی‌گرم + ترپین ۵۰ میلی‌گرم + اترگایاکول گلیسیرین ۵۰ میلی‌گرم + بنزوات سدیم ۲۵ میلی‌گرم + کامفوسولفونات کلسیم ۲۰ میلی‌گرم + آمیدون ۳۰ میلی‌گرم + لاکتوز ۲۵ میلی‌گرم + استئارات منیزیم ۵ میلی‌گرم.

موارد استعمال: التهابات حاد و مزمن، التهابات موضعی، برونشیت، برونشیت آسماتیک، لارنژوتراکئوبرونشیت، آبسه ریوی

مقدار مصرف و طرز استعمال: روزی ۱-۲ دراژه ۲ تا ۳ بار در روز بلعیده میشود.

بسته‌بندی: دراژه × ۲۴

بها: ۲۲۰ ریال

CILOPRINE
سیلاگ شمی- سویس

ترکیب: سدیم-۴-(۴َ-آمینوفنیل سولفونیل)-فنیل گلیسینات ۰/۸۳ درصد + دی هیدروکسی متیل کاربامید ۰/۴۲ درصد در یک محلول گلیسیرینی

موارد استعمال: اوتیت حاد و مزمن گوش میانی، عفونت مجرای شنوائی

مقدار مصرف و طرز استعمال: هر ۳-۵ ساعت ۸ قطره در هرگوش می‌چکانند.

بسته‌بندی: قطره گوشی ۱۲ گرم

بها: ۱۰۰ ریال

CILOPRINE ANAESTHETICO
سیلاگ شمی ـ سویس

ترکیب: سینوکائین ـ ۴ ـ (۴َ ـ آمینو ـ فنیل سولفونیل) ـ فنیل گلیسینات ۱/۸ درصد + دی هیدروکسی متیل کاربامید ۰/۴۲ درصد در یک محلول گلیسیرینی

موارد استعمال: اوتیت حاد و مزمن گوش میانی، عفونت مجرای شنوائی

مقدار مصرف و طرز استعمال: هر ۳ ـ ۵ ساعت ۸ قطره در گوش می‌چکانند

بسته‌بندی: قطره گوشی ۱۲ گرم

بها: ۱۱۰ ریال

CITOCILLIN
شمی گروننتال آلمان ـ تهران شیمی ایران

ترکیب: سیکلاسیلین

مکانیسم: با رقابت با اسید آمینه آلانین موجب جلوگیری از ساخته شدن جدار سلول و درنتیجه لیزه شدن آن میشود.

موارد استعمال: عفونتهای تنفسی، گوش و حلق و بینی، صفراوی، کلیوی، پوستی، ژینکولوژی

مقدار مصرف و طرز استعمال: هر ۸ ساعت یک قرص. سوسپانسیون: برحسب نوع و شدت بیماری متفاوتست.

موارد منع استعمال: حساسیت به پنی‌سیلین

بسته‌بندی: قرص ۵۰۰ میلی‌گرم × ۱۲، سوسپانسیون ۲۵۰ میلی‌گرم = ۵ میلی‌لیتر × ۶۰ میلی‌لیتر

بها: قرص ۳۱۴ ریال، شربت ۱۹۶ ریال.

CITRO - SEL
ویرا ـ ایران

ترکیب: در هر ۱۰۰ گرم: هیدرات پیپرازین ۴ گرم + کربنات لیتیم ۱۵۰ میلی‌گرم + ساکارینات سدیم ۲۰۰ میلی‌گرم + تارترات پتاسیم ۳۰ گرم + سیترات سدیم ۱۵ گرم + سولفات منیزیم ۶ گرم + اسید سیتریک ۱۷ گرم

موارد استعمال: روماتیسم، نقرس، سیاتیک، زیاد کننده ترشح کبد، برطرف کننده یبوست.

مقدار مصرف و طرز استعمال: روزی ۳ بار، هربار ۱ ـ ۲ قاشق مرباخوری قبل از غذا در آب حل کرده میل شود.

بسته‌بندی: گرانول ۷۵ گرم

بها: ۳۵ ریال

CLAUDENE
لوئیت‌پولد ـ آلمان

ترکیب: ترمبوکیناز جدا شده از بافت ریوی حیوانات
موارد استعمال: خونریزی‌های داخلی و خارجی
مقدار مصرف و طرز استعمال: آمپول: ۱-۲ آمپول، در موارد شدید چندین بار در روز تزریق داخل وریدی، عضلانی زیرجلدی و بطور خوراکی. پودر: روی زخمها و داخل حفره‌ها پاشیده میشود. قرص روزی ۳-۴ بار، هربار ۱-۲ قرص همراه با غذا
احتیاط: حداکثر تا ۵ آمپول در روز میتوان مصرف کرد.
بسته‌بندی: آمپول ۱۰ میلی‌لیتر × ۱ و ۵، قرص ۰/۲۵ گرم × ۳۰
بها: آمپول هرعدد ۱۵ ریال. قرص ۳۹ ریال

CLEAR EYES
ابوت ـ آمریکا

ترکیب: کلریدرات نفتازولین + اسید بوریک + بورات سدیم + متیل سلولز + دی‌سدیم‌ادتات + کلرور بنزالکونیم
موارد استعمال: سوزش و قرمزی چشم ناشی ازگرد و غبار و خستگی
مقدار مصرف و طرز استعمال: روزی ۲-۳ بار، هربار ۱-۲ قطره در هر چشم می‌چکانند.
بسته‌بندی: قطره چشمی ۱۵ میلی‌لیتر
بها: ۵۰ ریال

CLIACIL
هوخست ـ آلمان

ترکیب: فنوکسی متیل پنی‌سیلین پتاسیم
موارد استعمال: برونشیت، التهاب لوزتین، برونکوپنومونی، التهاب گوش میانی، فورونکل، آبسه، فلگمون، بادسرخ و پیشگیری از عفونت و بیماریهای حفره دهان
مقدار مصرف و طرز استعمال: کودکان شیرخوار و بچه‌های کوچک: روزی ۲ تا ۴ بار، هربار ۳۰۰ هزار واحد. خردسالان ۶-۱۲ ساله: روزی ۲-۴ بار، هربار ۶۰۰ هزار واحد. بزرگسالان: روزی ۲-۳ بار، هربار ۱،۲۰۰،۰۰۰ واحد
موارد منع استعمال: حساسیت به پنی‌سیلین

بسته‌بندی: قرص ۶۰۰ هزار و ۱/۲ مگاواحد × ۱۰، شربت ۵۰ میلی‌لیتر.
بها: ۶۰۰ هزار واحد ۱۱۸ ریال، ۱/۲ مگا ۱۷۸ ریال. شربت ۱۰۸ ریال.

CLOMID
مرل ترود ـ فرانسه

ترکیب: کلرو ۲ (دی‌اتیل آمینو ـ ۲ اتوکسی) ـ ۴ فنیل ۱ ـ دی‌فنیل ـ ۱، ۲ اتیلن = سیترات کلومی‌فن.
موارد استعمال: عدم تخمک‌گذاری، آمنوره
مقدار مصرف و طرز استعمال: برحسب نوع بیماری متفاوت است.
موارد منع استعمال: هموراژی، عفونت تناسلی، کیست تخمدان، آتروفی
بسته‌بندی: قرص × ۱۰
بها: ۴۳۸ ریال

C-M
مینا ـ ایران

ترکیب: هرقرص: ویتامین C ۱ گرم
موارد استعمال: تمام موارد استعمال ویتامین C
مقدار مصرف و طرز استعمال: یک قرص را در نصف لیوان آب حل کرده میل می‌کنند.
بسته‌بندی: قرص جوشان ۱ گرمی × ۱۰
بها: ۵۹ ریال

COAGULENE
سیبا ـ سویس

ترکیب: فرآورده‌ای از خون حیوانات
موارد استعمال: خونریزیهای داخلی و خارجی
مقدار مصرف و طرز استعمال: ۱۰ ـ ۲۰ میلی‌لیتر از راه زیرجلدی یا عضلانی در موارد نیاز چند بار در روز.
در موارد شدید ۳، ۵، ۱۰ و احیاناً ۲۰ میلی‌لیتر از راه وریدی باهستگی تزریق میشود (محلول را به‌دمای بدن میرسانند و سپس تزریق میکنند)
بسته‌بندی: آمپول ۰/۲۵ درصد ۵ میلی‌لیتر × ۵۰
بها: ۱۰۰۰ ریال

CODIMAL
عبیدی ـ ایران

ترکیب: هر دراژه: فسفات کدئین ۳۰ میلی‌گرم + فنوباربیتال ۱۶ میلی‌گرم + اسید استیل سالیسیلیک ۳۰۰ میلی‌گرم + ۱، ۳، ۷ تری‌متیل گزانتین ۳۰ میلی‌گرم

موارد استعمال: درمان سردرد و دردهای رماتیسمی، دردهای با منشأ عصبی، دردهای عضلانی، خستگی و کوفتگی و بیخوابی ناشی از سرماخوردگی و گریپ

مقدار مصرف و طرز استعمال: خردسالان: نصف مقدار بزرگسالان.
بزرگسالان: روزی ۳ بار، هربار یک تا دو قرص

بسته‌بندی: بسته ۶ عددی × ۲۴

بها: ۴۵ ریال

CODOPYRIN
گلاکسو انگلستان ـ داروپخش ایران

ترکیب: در هر قرص: اسید استیل سالیسیلیک ۰/۲۶ گرم + فناستین ۰/۲۶ گرم + فسفات کدئین ۰/۰۰۸ گرم

موارد استعمال: رفع درد در نوریت‌ها، دیسمنوره، دندان‌درد، سردرد

مقدار مصرف و طرز استعمال: روزی ۱ ـ ۲ قرص

بسته‌بندی: قرص × ۲۰ و ۲۵۰

بها: ۲۰ عددی ۲۹ ریال، ۲۵۰ عددی ۸۳۲ ریال

COGITUM
مرل ترود فرانسه ـ دوپار ایران

ترکیب: در هر ۱۰۰ میلی‌لیتر استیل آمینوسوکسینات بی‌پتاسیک ۲/۵ گرم + لوولز ۱۰ گرم

موارد استعمال: کندذهنی و عقب‌ماندگی، خستگی، فعالیت شدید فکری، اختلالات فکری و ادراکی، بیخوابی.

مقدار مصرف و طرز استعمال: بزرگسالان: هر ۱۲ ساعت ۲ قاشق مرباخوری. خردسالان: یک قاشق مرباخوری.

بسته‌بندی: شربت ۲۰۰ میلی‌لیتر

بها: ۲۱۵ ریال

COLCHICINE HOUDE
هوده ـ فرانسه

ترکیب: کلشی‌سین کریستالیزه

موارد استعمال: نقرس

مقدار مصرف و طرز استعمال: برحسب شدت بیماری متفاوت است.
موارد منع استعمال: ناراحتی‌های قلبی و کلیوی
بسته‌بندی: قرص × ۴۰
بها: ۷۷ ریال

COLCHIMAX
هوده ــ فرانسه

ترکیب: در هرقرص: کلشی‌سین ۱ میلی‌گرم + یدور دوتیمونیوم ۵۰ میلی‌گرم + فنوباربیتال ۱۵ میلی‌گرم
موارد استعمال: نقرس
مقدار مصرف و طرز استعمال: برحسب شدت بیماری متفاوت است.
بسته‌بندی: قرص × ۲۰
بها: ۱۷۰ ریال.

COLCHIPIRINE
هوده ــ فرانسه

ترکیب: کلشی‌سین + اسید استیل سالیسیلیک ۳۰۰ میلی‌گرم + ویتامین B_1 ۸ میلی‌گرم
موارد استعمال: نقرس، روماتیسم، نورالژی، لومباگو، لومباتروز.
مقدار مصرف و طرز استعمال: برحسب نوع بیماری روزی ۴ تا ۱۵ قرص
بسته‌بندی: قرص × ۶۰
بها: ۸۸ ریال

COLIMEX
دومکس ــ دانمارک

ترکیب: کلی‌ستین
موارد استعمال: گاستروآنتریت، آنتروکولیت، دیسانتری باسیلی، عفونتهای ادراری.
مقدار مصرف و طرز استعمال: ۱۵۰ هزار واحد بازاء هرکیلو وزن در ۳ـ۴ دوز منقسم در ۲۴ ساعت
بسته‌بندی: قرص ۲۵۰ هزار واحد × ۱۶، قرص ۱،۵۰۰،۰۰۰ واحد × ۱۰
بها: ۲۵۰ هزار واحد ۳۴۷ ریال، ۱/۵ میلیون واحد ۷۱۷ ریال

COLISTINE
بانیو ژاپن ـ فارماشیمی ایران

ترکیب: سولفات کلی‌ستین
موارد استعمال: درمان عفونتهای دستگاه گوارش، پیش‌گیری از عفونتهای پس از اعمال جراحی روده
مقدار مصرف و طرز استعمال: روزی ۳ـ۴ قرص. در موارد شدید بار اول دو قرص سپس هرچهارساعت یک قرص
موارد منع استعمال: نارسائی‌های شدید کلیوی
بسته‌بندی: قرص ۵۰۰ هزار واحد × ۳۰
بها: ۱۹۳ ریال

COLISTOP
دومکس ـ دانمارک

ترکیب: در هرشیشه شربت: سولفات کلی‌ستین ۳ میلیون واحد + دی هیدرواسترپتومایسین ۳۷۵ میلی‌گرم + سوکسینیل سولفاتیازول ۶ گرم + کائولن ۶ گرم
موارد استعمال: اسهالهای عفونی خردسالان و بالغین، عفونتهای معدی‌روده‌ای ناشی از دیسانتری باسیلر، آنتروکولیت
مقدار مصرف و طرز استعمال: بزرگسالان: روزی ۳ـ۴ بار، هربار ۰/۵ـ۱ قاشق مرباخوری، خردسالان: روزی ۳ـ۴ بار هربار ۰/۵ـ۱ قاشق چایخوری.
احتیاط: قبل از مصرف شیشه را تکان دهید، محلول تهیه‌شده نباید بیشتر از یک ماه نگهداری شود.
بسته‌بندی: پودر جهت تهیه ۶۰ میلی‌لیتر محلول
بها: ۲۸۰ ریال

COLPO - SULFANA
واندر ـ سویس

ترکیب: هر قرص واژینال: سولفانیلامید ۰/۰۸۳ گرم + سولفات اکسی کینولئین ۰/۰۱۷ گرم + تیمول ۰/۰۰۱ گرم + اسیدلاکتیک ۰/۰۱۷ گرم + منوپلی‌ساکارید ۰/۲۴۸ گرم + تارترات بوریکوپتاسیک ۰/۱۶ گرم + بیکربنات سدیم ۰/۱۶ گرم + اسیدتارتریک ۰/۱۵ گرم.
موارد استعمال: ترشحات زنانه ناشی از انواع باکتریها، عفونتهای ثانوی مهبل و عفونتهای ناشی از تریکوموناواژینالیس

مقدار مصرف و طرز استعمال: شبی ۱-۲ قرص را بسرعت در آب فرو کرده و در عمق مهبل وارد مینمایند. این عمل ۱-۲ هفته باید ادامه یابد.
موارد منع استعمال: دوران قاعدگی
بسته‌بندی: قرصهای ۱ گرمی × ۲۴
بها: ۱۱۵ ریال.

COLPOTROPHINE
ترامکس ـ فرانسه

ترکیب: پرومسترین
موارد استعمال: بیماریهای زنان ناشی از اختلالات تروفیک دستگاه تناسلی.
مقدار مصرف و طرز استعمال: برحسب نوع و شدت بیماری متفاوت است
بسته‌بندی: قرص واژینال ۱۰ میلی‌گرم × ۱۰
بها: ۲۴۰ ریال

COLPRONE
ایرست ـ آمریکا

ترکیب: در هرقرص: مد روژسترون ۵ میلی‌گرم
موارد استعمال: درمان خونریزیهای فونکسیونل رحم و بی‌نظمی در قاعدگی.
مقدار مصرف و طرز استعمال: روزی ۵-۱۰ میلی‌گرم از روز پانزدهم تا روز بیست و پنجم عادت ماهانه
بسته‌بندی: قرص ۵ میلی‌گرم × ۲۵
بها: ۲۵۰ ریال

COLTRAMYL
روسل ـ فرانسه

ترکیب: در هرقرص یا آمپول ۲ میلی‌لیتری: کولشی کوزید ۴ میلی‌گرم
موارد استعمال: لومباگو، تورتیکولی، لومبوسیاتیک، لوکساسیون، همی پلژی و پاراپلژی هیپرتونی رحم هنگام زایمان، دیسمنوره
مقدار مصرف و طرز استعمال: روزی ۳-۴ بار، هربار یک قرص. آمپول: روزی ۲ تزریق عضلانی یا ۱ تزریق وریدی. خردسالان نصف مقادیر فوق

احتیاط: بهتر است تزریق بین دو وعده غذای بیمار انجام گیرد.
بسته‌بندی: قرص × ۱۲ آمپول ۲ میلی‌لیتر × ۶
بها: قرص ۲۸۱ ریال. آمپول ۲۲۲ ریال

COMBANTRIN
فایزر-ایران

ترکیب: ترانس-۱، ۴، ۵، ۶، تترا هیدرو-۱-متیل-۲ [۲-(۲-تینیل)]-وینیل پیریمیدین هیدروژن پاموآت = پیرانتل پاموآت.
موارد استعمال: آسکاریدوز، اکسیوروز، انکیلوستوموز، نکاتوریاز.
مقدار مصرف و طرز استعمال: بزرگسالان: ۳ قرص جویدنی یا ۳ قاشق سوسپانسیون. خردسالان: ۱۰ میلی‌گرم بازاء هر کیلوگرم وزن بدن.
بسته‌بندی: قرص جویدنی ۲۵۰ میلی‌گرم × ۳. سوسپانسیون خوراکی ۱۵ میلی‌لیتر.
بها: قرص و شربت ۱۰۵ ریال

COMBEX Parenteral
پارک دیویس - آمریکا

ترکیب: در هر میلی‌لیتر: ویتامین B_1 ۱۰ میلی‌گرم + ویتامین B_2 ۰/۳۳ میلی‌گرم + نیکوتینامید ۱۰ میلی‌گرم + اسید-پانتوتنیک ۴ میلی‌گرم + ویتامین B_{12} ۱۰ میکروگرم.
موارد استعمال: پیشگیری و درمان کمبود ویتامین‌های ب کمپلکس، کم‌خونی، بی‌اشتهائی، دوران نقاهت، بری‌بری، پولی نوریت.
مقدار مصرف و طرز استعمال: ۱-۲ میلی‌لیتر یا بیشتر بطریق داخل عضلانی
بسته‌بندی: ویال ۱۰ میلی‌لیتر
بها: ۵۴ ریال

COMBEY - LAX
رومن ماری فرانسه - فارمکس ایران

ترکیب: عصاره کوریاندر ۱/۶ گرم + فنوئیل ۱/۶ گرم + انیس سبز ۱/۶ گرم + بوراش ۱/۶ گرم + عصاره برگ سنا ۱۲ گرم + عصاره رینت ۶ گرم.
موارد استعمال: یبوست‌های اطفال شیرخوار و بالغین در اثر بیماریهای

عفونی یا کولیت

مقدار مصرف: خردسالان: روزی ۱-۲ قاشق چایخوری. بزرگسالان: روزی یک قاشق سوپخوری.

بسته‌بندی: ۱۲۵ میلی‌لیتری

بها: ۱۰۵ ریال

COMBIZYME
لوئیت‌پولد ـ آلمان

ترکیب: در هرقرص: سلولاز + همی‌سلولاز + آمیلاز + پروئتاز + لیپاز + تریپسین + استراز

موارد استعمال: اختلالات تخمیری، سوء هاضمه های مختلف، نارسائی لوزالمعده، نارسائی در هضم آلبومین ها و چربیها.

مقدار مصرف و طرز استعمال: روزی ۱-۲ قرص همراه غذا. در حالات شدید ۲-۳ قرص

بسته‌بندی: قرص × ۵۰

بها: ۲۱۵ ریال

COMBUR TEST
بهرینگرمانهایم ـ آلمان

ترکیب: تست آنزیمی بصورت نوار برای تشخیص و اندازه‌گیری قند و آلبومین ادرار و برای اندازه‌گیری pH ادرار.

موارد استعمال: تشخیص بیماری دیابت و بیماریهای کلیه و کنترل درمان.

مقدار مصرف و طرز استعمال: یک نوار را چند ثانیه در ادرار فرو کرده و بلافاصله میتوان تغییر رنگ خانه های مختلف نوار را با جدول رنگی روی لوله بسته‌بندی مقایسه کرد.

بسته‌بندی: نوار تست آنزیمی در لوله های فلزی × ۵۰

بها: ۱۵۵ ریال

COMITAL - L
بایر آلمان ـ ایران

ترکیب: دی‌فنیل هیدانتوئین ۵۰ میلی‌گرم + پرومینال (ان-متیل اتیل فنیل مالونیل اوره) ۵۰ میلی‌گرم + لومینال ۵۰ میلی‌گرم.

موارد استعمال: کلیه انواع صرع، حالات پسیکوموتور

مقدار مصرف و طرز استعمال: بزرگسالان: از ۳ نصف قرص تا ۵ قرص

در روز. خردسالان: از ۲ نصف قرص تا ۳ قرص در روز. شیر-خواران: از ۲ ربع قرص تا ۲ نصف قرص در روز.

موارد منع استعمال: لکوپنی، موارد مسمومیت حاد ناشی از الکل، خواب‌آورها، مسکن ها، پورفیری، در نارسائی شدید کلیه و کبد، ضایعات میوکارد.

احتیاط: بهتر است قرصها بعد از غذا میل شود. هنگام مصرف دارو از مصرف الکل و نمک خودداری شود.

بسته‌بندی: قرص ۱۵۰ میلی‌گرم × ۱۰۰

بها: ۱۵۲ ریال

COMPLAMIN
وولفینگ ـ آلمان

ترکیب: در هرقرص یا هرمیلی‌لیتر آمپول: گزانتینول نیکو-تینات ۱۵۰ میلی‌گرم.

موارد استعمال: آرتریوسکلروز، دیابت پس از ترومبوز، اختلالات عروق محیطی، سنگینی پاها، زخمهای واریسی، سرمازدگی.

مقدار مصرف و طرز استعمال: روزی سه بار، هربار ۱ ـ۳ قرص.

موارد منع استعمال: انفارکتوس قلبی، خونریزیهای حاد. نارسائی قلبی.

عوارض جانبی: احساس گرما و سرخ شدن.

بسته‌بندی: قرص × ۳۰ . آمپول ۲ میلی‌لیتر × ۵

بها: قرص ۱۱۰ ریال. آمپول ۷۵ ریال.

COMPLAMIN Retard
وولفینگ ـ آلمان

ترکیب: در هرقرص: گزانتینول نیکوتینات ۵۰۰ میلی گرم

موارد استعمال: ترومبوز. عدم کفایت مغزی زودرس یا پیری که موجب بی‌خوابی و اختلال حافظه میشود. اختلالات بینائی، شنوائی، عوارض ناشی از تومورهای مغزی، اسکلروزکرونر همراه با آنژین دوپواترین.

مقدار مصرف و طرز استعمال: غیر از مواردی که پزشک دستور خاصی بدهد میتوان هر۱۲ ساعت ۱ تا ۲ قرص مصرف کرد با کمی از

مایعات.

عوارض جانبی: قرمزی پوست همراه با احساس گرما

بسته‌بندی: قرص × ۲۰

بها: ۲۵۰ ریال

CONCAVIT
والاس ـ انگلستان

ترکیب: در هر ۲ میلی‌لیتر: ویتامین A ۱۰ هزار واحد + ویتامین D_2 ۲۵۰۰ واحد + ویتامین C ۵۰ میلی‌گرم + ویتامین B_1 ۱۵ میلی‌گرم + ویتامین B_2 ۱/۵ میلی‌گرم + ویتامین B_6 ۱ میلی‌گرم + نیکوتینامید ۵۰ میلی‌گرم + پانتنول ۲ میلی‌گرم.

موارد استعمال: بعنوان ویتامین درمانی در موارد ضعف، کمی رشد، دوران نقاهت، خستگی فکری و جسمی.

مقدار مصرف و طرز استعمال: روزی ۱-۲ تزریق داخل عضلانی.

بسته‌بندی: آمپول × ۶

بها: ۸۰ ریال

CONJUNCTIN B
آلرگان ـ آمریکا

ترکیب: سولفات نئومایسین ۰/۵ درصد + سولفات پلی میکسین ۵۰۰۰ واحد + تیمروسال ۱ درصد هزار + پلی‌وینیل الکل ۱/۴ درصد.

موارد استعمال: کراتوکونژونکتیویت، اولسر قرنیه، اسکلریت، بلفاریت

مقدار مصرف و طرز استعمال: هر ۳-۴ ساعت ۱-۲ قطره در هر چشم می‌چکانند.

موارد منع استعمال: حساسیت به دارو

بسته‌بندی: قطره چشمی ۱۰ میلی‌لیتری

بها: ۱۰ میلی ۸۲ ریال

COPHYTOL
روزا فرانسه ـ آی دی آی ایران

ترکیب: عصاره آرتیشو ـ (سینارا اسکولنیوس)

موارد استعمال: درمان بیماریهای کلیه و کبدی

مقدار مصرف و طرز استعمال: روزی ۳ بار هربار ۳۰-۴۰ قطره بعد از غذا. قرص: روزی ۳ بار، هربار ۲-۴ قرص

بسته‌بندی: قطره ۴۰ میلی‌لیتر. قرص × ۶
بها: قرص ۴۷ ریال و قطره ۴۷ ریال

CO - PYRONIL
لی‌لی آمریکا ـ
آی دی آی ایران

ترکیب: هیستادیل ۲۵ میلی‌گرم + پیرونیل ۱۵ میلی‌گرم + کلریدرات کلوپان ۱۲/۵ میلی‌گرم.
موارد استعمال: تب یونجه، رینیت‌های آلرژیک، کونژونکتیویت‌های آلرژیک، کهیر، ادم آنژیونوروتیک.
مقدار مصرف و طرز استعمال: هر ۸ ساعت ۱ ـ ۲ کپسول.
احتیاط: درصورت وجود پروستاتیسم مانند دیگر سمپاتومی‌متیک‌ها ممکن است موجب احتباس ادرار شود.
بسته‌بندی: کپسول × ۲۴
بها: ۹۴ ریال

CORAMINE
سیبا ـ سویس

ترکیب: دی اتیل آمید دو اسید پیریدین کربوکسیلیک = نیکتامید ۲۵ درصد
موارد استعمال: بعنوان محرك عمومی مانند حالات کولاپس، شوك، اختلالات جریان خون در طول بیماریهای عفونی حاد، خفگی نوزادان، مسمومیتها.
مقدار مصرف و طرز استعمال: خردسالان: برحسب سن ۱۰ ـ ۳۰ قطره چند بار در روز یا ۰/۵ ـ ۱ میلی‌لیتر از آمپول ۳ بار در روز از راه عضلانی یا زیرجلدی. بزرگسالان: ۳۰ ـ ۶۰ قطره چند بار در روز، درموارد نیاز یک آمپول ۱/۵ میلی‌لیتر از راه زیرجلدی وریدی یا عضلانی در مسمومیت‌های شدید و در فوریت‌ها ۵ ـ ۱۵ میلی‌لیتر از راه وریدی و بدنبال آن ۵ ـ ۱۰ میلی‌لیتر داخل عضلانی.
بسته‌بندی: قطره ۱۵ میلی‌لیتر، آمپول ۱/۵ میلی‌لیتر × ۵
بها: قطره ۵۰ ریال. آمپول ۱۰۰ ریال

CORAMINE EPHEDRINE
سیبا ـ سویس

فارماکولوژی: برونکولیتیک و محرك دستگاه گردش خون

ترکیب: در هرمیلی‌لیتر قطره: کورامین ۲۵۰ میلی‌گرم + کلریدرات افدرین ۱۵ میلی‌گرم

موارد استعمال: آسم برونشیک، برونشیت آسماتیک، حالات کمی فشار خون، در دوره نقاهت، امراض عفونی.

مقدار مصرف و طرز استعمال: خردسالان: روزی ۲-۳ بار، هربار ۵-۱۵ قطره، بزرگسالان: در حملات آسم ۱-۲ آمپول عضلانی

بسته‌بندی: قطره ۱۵ میلی‌لیتر

بها: ۵۰ ریال

CORDARONE

لاباز ـ فرانسه

ترکیب: در هرقرص: آمیودارون ۲۰۰ میلی‌گرم

موارد استعمال: بیماری آنگور، در حالات آنژین مزمن همراه‌با اختلالات و یا بدون اختلالات، در الکترو کاردیوگرافی، عدم کفایت کرونر

مقدار مصرف و طرز استعمال: شروع درمان: روزی ۳ قرص تا ۱۰ روز. ادامه درمان: روزی ۱-۲ قرص در ۲۰ روز بعدی

موارد منع استعمال: بیماریهای تیروئید، برادیکاردی.

بسته‌بندی: قرص × ۳۰

بها: ۲۵۵ ریال

CORDEX Forte

آپجان ـ آمریکا

ترکیب: مدرول = متیل پردنیزولون ۱/۵ میلی‌گرم + اسید- استیل سالیسیلیک ۳۰۰ میلی‌گرم.

موارد استعمال: آرتریت روماتوئید، درمان روماتیسم‌های خفیف و شدید، بورسیت، تنوسینوویت، فیبروزیت.

مقدار مصرف و طرز استعمال: روزی ۴ بار، هربار ۱-۲ قرص

موارد منع استعمال: مانند کورتیکوستروئیدها

بسته‌بندی: قرص × ۱۰۰

بها: ۳۱۷ ریال

CORICIDIN

شرینگ آمریکا ـ ایران

ترکیب: در هرقرص کریسیدین مدیلتس: کلرتریمتون مالئات ۰/۷۵ میلی‌گرم + اسید استیل سالیسیلیک ۸۰ میلی‌گرم + فناستین

۰/۱۶ میلی‌گرم. در هر قرص کریسیدین D : کلرتریمتون مالئات ۲ میلی‌گرم + اسید استیل سالیسیلیک ۲۳۰ میلی‌گرم + فناستین ۱۶۰ میلی‌گرم + کافئین ۳۰ میلی‌گرم + فنیل افرین ۱۰ میلی‌گرم

موارد استعمال: درمان علامتی احتقان بینی و سایر ناراحتیهائی که همراه با سینوزیت، سرماخوردگی، آلرژی یا رینیت وازوموتور همراهست. مدیلتس : درمان علامتی سرماخوردگی در کودکان

مقدار مصرف و طرز استعمال: کریسیدین D : بزرگسالان و کودکان، بزرگتر از ۱۲ سال هر ۴ ساعت ۱ قرص. خردسالان بین ۶ تا ۱۲ سال نصف مقدار بزرگسالان. مدیلتس : کودکان بزرگتر از ۶ سال ۱ تا ۲ قرص هر ۳ تا ۴ ساعت یکبار. کودکان کوچکتر از ۶ سال یک‌چهارم تا ۱ قرص هر ۳ تا ۴ ساعت یکبار.

احتیاط: از ۴ قرص در روز نباید تجاوز کند.

بسته‌بندی: بسته ۶ عددی × ۲۴

بها: بسته ۶ عددی کریسیدین D ۲۱ ریال. بسته ۶ عددی مدیلتس ۱۵ ریال

CORISAN
عبیدی ـ ایران

ترکیب: پیریلامین مالئات ۳۰ میلی‌گرم + کلریدرات فنیل افرین ۱۵ میلی‌گرم + ۱، ۳، ۷ تری‌متیل گزانتین ۳۰ میلی‌گرم + ان ـ استیل ـ پارا ـ آمینوفنل ۲۵۰ میلی‌گرم + کلرفنیرامین مالئات ۲ میلی‌گرم

موارد استعمال: احتقان بینی، آبریزش از بینی و چشم، عطسه، رینیت آلرژیک، سینوزیت، دردهای عضلانی و بطور کلی درمان کلیه علائم سرماخوردگی

مقدار مصرف و طرز استعمال: خردسالان: هر ۶ ساعت یک دراژه. بزرگسالان: هر ۴ ساعت یک دراژه

بسته‌بندی: بسته ۶ عددی × ۲۴

بها: بسته ۶ عددی ۲۴ ریال

CORISAN Enfant
عبیدی ـ ایران

ترکیب: کلرفنیرامین مالئات ۰/۵ میلی‌گرم + کلریدرات فنیل افرین ۲/۵ میلی‌گرم + اسید استیل سالیسیلیک ۸۰ میلی‌گرم.

موارد استعمال: سرماخوردگی، التهاب سینوسها، تب یونجه، آلرژی مجاری تنفسی، گریپ، خارش چشم، عطسه

مقدار مصرف و طرز استعمال: روزی ۴ بار هربار ۱-۲ قرص

بسته‌بندی: قرص × ۱۸۰

بها: ۳۲۰ ریال

CORTIPLEX

ریختر ـ ایتالیا

ترکیب: عصاره طبیعی قسمت قشری غدد فوق کلیوی (بدون آدرنالین) ۱۲ واحد + ویتامین C ۱۰۰ میلی‌گرم + ویتامین B۶ ۲۵ میلی‌گرم + کوکربوکسیلاز ۱۰ میلی‌گرم + پانتوتنات سدیم ۱۰ میلی‌گرم.

موارد استعمال: بی‌حالی مفرط، آستنی، سقوط ناگهانی فشار خون، گرمازدگی، دوران نقاهت در اعمال جراحی، نارسائی غدد فوق کلیوی.

مقدار مصرف و طرز استعمال: یک تزریق عضلانی هرروز یا یک‌روز درمیان.

بسته‌بندی: آمپول لیوفیلیزه × ۵ + ۲ میلی‌لیتر حلال محتوی هورمون × ۵

بها: ۱۸۰ ریال

CORTISONE

پ. او. اس فرانسه ـ دوپار ایران

ترکیب: استات کورتیزون.

موارد استعمال: در موارد کورتن درمانی

مقدار مصرف و طرز استعمال: برحسب نوع و شدت بیماری متفاوتست.

موارد منع استعمال: در عفونتهای ویروسی قرنیه و ملتحمه، عفونتهای قارچی چشم، عفونتهای میکربی ناشناخته، زخمهای تازه جوش‌خورده چشم، عفونتهای سلی چشم.

احتیاط و عوارض جانبی: نباید بمدت طولانی مصرف شود.

بسته‌بندی: قطره ۱ درصد و ۲ درصد ۵ میلی‌لیتر. پماد ۵ گرم.

بها: قطره یک درصد ۶۴ ریال، ۲/۵ درصد ۷۰ ریال. پماد یک درصد ۵۹ ریال. ۵ درصد ۵۳ ریال

C

CORTOL
پ. او. اس فرانسه ـ دوپار ایران

ترکیب: در هر یک‌صد میلی لیتر پردنیزولون سدیم سولفوبنزوات ۵۰۰ میلی‌گرم + کلرامفنیکل ۳۰۰ میلی‌گرم.

موارد استعمال: کونژنکتیویتها، کرآتیت سطحی غیراختصاصی، کرآتیت انترستی‌سیل، کرآتیت، آکنه روزاسه، اولسر مارژینال عودکننده، کرآتوکنژنکتیویت‌فلیکتنولر، اکزماهای پلکی، ایریتیس حاد.

مقدار مصرف و طرز استعمال: در مراحل حاد هر نیم تا یک ساعت ۱-۲ قطره در هرچشم می‌چکانند و بعد از شروع بهبودی بتدریج فاصله چکاندن قطرات را زیاد میکنند تا به یک قطره ۳-۴ بار در روز برسد.

موارد منع استعمال: عفونتهای ویروسی ملتحمه و قرنیه، توبرکولوز چشم، عفونت‌های قارچی چشم، افتالمی حاد چرکی.

احتیاط و عوارض جانبی: استعمال مداوم آن مانند تمام فرآورده‌های کورتن‌دار حاوی آنتی‌بیوتیک امکان بروز این عوارض را دارد: رشد قارچها و باکتریهای غیرحساس به‌آنتی‌بیوتیک مربوطه، کرآتیت نقطه‌ای‌شکل، پرفوراسیون قرنیه در بیماریهای نازک‌کننده قرنیه.

بسته‌بندی: شیشه محتوی پودر + آمپول حلال ۵ میلی‌لیتر.

بها: ۸۲ ریال.

CORTRIL
فایزر آمریکا ـ ایران

ترکیب: استات ئیدروکورتیزون

موارد استعمال: درماتیت‌آتوپیک، درماتیت تماسی، خارش غیراختصاصی

مقدار مصرف و طرز استعمال: بعد از تمیزکردن موضع، مقدارکمی از پماد را ۲-۳ مرتبه در روز روی ناحیه مبتلا میمالند.

بسته‌بندی: پماد جلدی ۱ درصد × ۵ گرم. پماد چشمی ۰/۵ درصد ۳/۵ گرم.

بها: جلدی ۷۰ ریال. چشمی ۲۳ ریال.

C

CORTROSYN DEPOT
ارگانون هلند ـ ایران

ترکیب: در هرمیلی‌لیتر دپوتترا کوسا کتاید = (تترا- کوزا کترین) ۰/۵ میلی‌گرم (این پلی پپتید صناعی حاوی ۲۴ اسید آمینه اولیه **ACTH** طبیعی انسان است.

موارد استعمال: کلیه موارد استعمال گلیکو کورتیکوستروئید ها

مقدار مصرف و طرز استعمال: اطفال کمتر از ۶ سال: ۰/۵ میلی‌لیتر، بین ۶-۱۲ سال ۱ میلی‌لیتر.

موارد منع استعمال: سندرم کوشینگ، بیماری های ویروسی.

عوارض جانبی: مانند سایر کورتیکوستروئید ها خیز، استئوپورز، هیپر- گلیسمی و هیپوکالیمی.

بسته‌بندی: قطره اطفال × ۱۰ میلی‌لیتر

بها: ۲۳۴ ریال

CORYBAN - D
فایزر آمریکا ـ ایران

ترکیب: سالیسیلامید ۲۳۰ میلی‌گرم + فناستین ۱۶۰ میلی‌گرم + کافئین ۳۰ میلی‌گرم + ویتامین C ۲۵ میلی‌گرم + کلرفنیرامین ۲ میلی‌گرم + کلریدرات فنیل پروپانولامین ۲۵ میلی‌گرم.

موارد استعمال: بعنوان ضد درد، ضد تب، ضد احتقان، آنتی هیستامینیک، محرك سلسله عصبی مرکزی، ضد سرفه، خلط‌آور.

مقدار مصرف و طرز استعمال: روزی ۶ کپسول. یا هر ۴ ساعت ۲ قاشق مرباخوری.

بسته‌بندی: کپسول × ۱۰. شربت ۱۲۰ میلی‌لیتر.

بها: کپسول هربسته ده‌عددی ۳۵ ریال. شربت ۶۴ ریال

COSANYL DM
پارك دیویس ـ آمریکا

ترکیب: در هر ۵ میلی‌لیتر: برم ئیدرات دکسترومتورفان ۱۵ میلی‌گرم + پسودوافدرین ۳۰ میلی‌گرم.

موارد استعمال: تسکین سرفه‌های خشك و مزمن، تسکین سرفه و برطرف کردن احتقان بینی بعلت سرماخوردگی و تحریکات گلو.

مقدار مصرف و طرز استعمال: خردسالان: برحسب سن روزی ۳-۴ بار هربار ربع قاشق مرباخوری. بزرگسالان: روزی ۳-۴ بار، هربار ۱-۲ قاشق مرباخوری.

بسته‌بندی: شربت ۱۲۰ میلی‌لیتر.
بها: ۸۲ ریال

COUMADIN
اندو ـ آمریکا

ترکیب: ۳ ـ (آلفا ـ استونیل ـ بنزیل) ۴ ـ هیدروکسی کومارین = وارفارین
موارد استعمال: پیشگیری انفارکتوس، ترومبوآمبولی
مقدار مصرف و طرز استعمال: روزی ۴۰ـ۶۰ میلی‌گرم از راه خوراکی یا عضلانی. دوز نگهدارنده: روزی ۲/۵ ـ ۶۰ میلی‌گرم
موارد منع استعمال: بیماران مبتلا به اختلالات خونی، خونریزی مغزی، نارسائی کبدی یا کلیوی، هیپرتانسیون.
احتیاط: قطع دارو نبایستی ناگهانی باشد بلکه بایستی بتدریج و درطی ۴ هفته انجام گیرد.
بسته بندی: قرص ۵ و ۱۰ میلی‌گرم × ۱۰۰
بها: ۵ میلی ۵۶۰ ریال، ۱۰ میلی ۸۱۰ ریال

CREMAFFIN
بوتس انگلستان ـ پارس ایران

ترکیب: در هرشیشه شربت: پارافین مایع ۵۶ میلی‌لیتر + اکسید منیزیم ۹/۴ گرم + سولفات منیزیم ۰/۱۱۷ گرم
موارد استعمال: یبوست‌ها و هیپراسیدیته، اختلالات هاضمه.
مقدار مصرف و طرز استعمال: بزرگسالان: روزی ۲ـ۱ قاشق غذاخوری خردسالان ۶-۱۲ سال: روزی ۲ ـ ۱ قاشق مرباخوری. خردسالان تا ۶ سال: روزی ۲ ـ ۱ قاشق چایخوری. مقادیر فوق هرشب قبل از خواب و درصورت لزوم همین مقدار هم صبح ناشتا میل می‌شود.
بسته‌بندی: امولسیون ۲۲۴ میلی‌لیتر
بها: ۴۷ ریال

CREMO-S.P.K
مینا ـ ایران

ترکیب: در هرصد میلی‌لیتر: سوکسینل سولفاتیازول ۱۰ گرم + پاراگوریک ۱/۵ میلی‌لیتر + پکتین ۱ گرم + کائولین ۱۰ گرم
موارد استعمال: اسهال، آنتریت، کلیت‌های حاد، دیسانتری باسیلی،

اسهال نوزادان.
مقدار مصرف و طرز استعمال: شیرخواران - روزی ۳ بار هربار یک قاشق چایخوری. خردسالان - روزی ۴ بار هربار یک قاشق مرباخوری. بزرگسالان - روزی ۳-۴ بار هربار یک قاشق آش خوری.
بسته‌بندی: شربت ۶۰ میلی‌لیتری
بها: ۴۵ ریال

CRINAGEN Cream
فارما کس - انگلستان

ترکیب: در هرصد گرم: تری کلرو کاربانیلید ۰/۵ گرم + اسید سالیسیلیک ۰/۵ گرم + آلانتوئین ۰/۲۵ گرم + تیمول ۰/۱۰ گرم.
موارد استعمال: درماتیت‌های سبوریک، فولیکولیت و عفونتهای قارچی سر، پسوریازین سر، عفونتهای ثانوی در برخی از اشکال آلوپسی.
مقدار مصرف و طرز استعمال: بعد از تمیز کردن موها ۲-۳ دقیقه موها را با دارو مالش داده بعد از ده دقیقه می‌شویند.
بسته‌بندی: کرم ۵۰ گرمی
بها: ۷۰ ریال

CRYSTICILLIN
اسکوئیب آمریکا - ایران

ترکیب: ویال ۴۰۰ هزار واحد = پنی‌سیلین ژ کریستال ۱۰۰ هزار واحد + پنی‌سیلین پرو کائینه ۳۰۰ هزار واحد. ویال ۸۰۰ هزار واحد = پنی‌سیلین ژ کریستال ۲۰۰ هزار واحد + پنی-سیلین پرو کائینه ۶۰۰ هزار واحد.
موارد استعمال: عفونتهای ناشی از استرپتو کک، گونو کک، پنومو کک دیفتری، سیاه‌زخم، کزاز، ترپونم پالیدوم، ترپونم کارانتوم، ترپونم پرتنو، مننگو کک، استافیلو کک طلائی و سفید، باسیل نووی.
مقدار مصرف و طرز استعمال: روزی ۲-۱ آمپول عضلانی.
موارد منع استعمال: حساسیت به پنی‌سیلین
عوارض جانبی: گاهی شوك آنافیلاکسی
بسته‌بندی: ویال ۴۰۰ هزار و ۸۰۰ هزار واحدی × ۱

بها: ۴۰۰ هزارواحدی ۱۱ ریال، ۸۰۰ هزارواحدی ۱۸ ریال

C-TAB
لپتی ایتالیا ـ ایران

ترکیب: در هر قرص: ویتامین C ۱ گرم
موارد استعمال: اسکوربوت، بیماریهای عفونی، خون‌ریزی از لثه‌ها، دوران رشد و نمو، دوران آبستنی و شیر دادن، کمبود ویتامین فوق.
مقدار مصرف و طرز استعمال: خردسالان: روزی ۱ـ۲ قرص
بزرگسالان: روزی ۲ـ۳ قرص.
بسته‌بندی: قرص × ۱۰
بها: ۵۹ ریال.

CUMORIT Oral
شرینگ ـ آلمان

ترکیب: در هرقرص: استات نوراتیسترون ۱۰ میلی‌گرم + اتینیل استرادیول ۰/۰۲ میلی‌گرم.
موارد استعمال: آمنوره ثانویه کوتاه‌مدت.
مقدار مصرف و طرز استعمال: روزی یک قرص با مقدار کمی مایع بمدت دو روز متوالی.
موارد منع استعمال: آبستنی، سابقه هرپس در دوران بارداری.
بسته‌بندی: قرص × ۲
بها: ۵۹ ریال.

CURARIN
آستا ـ آلمان

ترکیب: د-توبوکورآرین کلراید.
موارد استعمال: شل کننده عضلانی در اعمال جراحی شکم و قفسه صدری، بیماری کزاز، لوله‌گذاری درداخل نای، ترمیم شکستگی‌ها و جاانداختن دررفتگی‌ها.
مقدار مصرف و طرز استعمال: بزرگسالان ۰/۱۵ میلی‌گرم برای هر کیلو. خردسالان نصف مقدار فوق. بالاتر از ۶۵ سال دوسوم مقدار بزرگسالان.
موارد منع استعمال: میاستنی وخیم، مبتلایان به نارسائیهای کبدی و کلیوی، نوزادان، افراد مبتلا به آسم و آلرژی، تزریق وریدی

توأم با باربیتوریک‌ها.

احتیاط: در بیهوشی با هالوتان باید با احتیاط کامل مصرف شود.

بسته‌بندی: ویال ۱۰ میلی‌لیتر= ۳۰ میلی‌گرم × ۱۰. آمپول ۱/۵ میلی‌لیتر= ۱۵ میلی‌گرم × ۲۰.

بها: ۱۰ میلی ۹۰۰ ریال، ۱/۵ میلی ۵۰۰ ریال.

CYNOMEL
اسکالاف ـ انگلستان

ترکیب: ال‌تری‌یدوتیرونین (هورمون هیپوفیز ـ محرک ترشح غده تیروئید).

موارد استعمال: در حالات خفیف هیپوتیروئیدیسم تا میکزودم، کرتینیسم، گواتر ساده (غیرسمی)، اختلالات تولید مثل مربوط به هیپوتیروئیدیسم و هنگامیکه درمان جایگزین هورمون تیروئید لازم باشد.

مقدار مصرف و طرز استعمال: برحسب شدت بیماری متفاوت است.

موارد منع استعمال: نارسائی درمان نشده آدرنال، بیماریهای قلبی و عروقی.

عوارض جانبی: تاکیکاردی، تهییج، سردرد، عرق کردن زیاد (علامت افزایش دارد).

بسته‌بندی: قرص ۵ و ۲۵ میکروگرمی × ۳۰

بها: ۵ میکروگرمی ۵۵ ریال. ۲۵ میکروگرمی ۹۰ ریال.

CYTAMEN 1000 With B_1
گلاکسو انگلستان ـ داروپخش ایران

ترکیب: در هر میلی‌لیتر محلول پایدار تزریقی ویتامین B_{12} ۱۰۰۰ میکروگرم + ویتامین B_1 ۱۰۰ میکروگرم.

موارد استعمال: عواقب عصبی، کم‌خونیهای ماکروسیتر، نورالژی عصب سه قلو، میگرن، نوروپاتیهای همراه با سوءتغذیه، دیابت، آبستنی و الکلیسم، تمام موارد کمبود ویتامین های فوق.

مقدار مصرف و طرز استعمال: برحسب شدت بیماری هر روز یا چند روز درمیان یک آمپول تزریق زیرجلدی یا داخل عضلانی.

بسته‌بندی: آمپول ۱ میلی‌لیتر × ۵

بها: ۵۳ ریال.

CYTATON
گلاکسو انگلستان
ـ داروپخش ایران

ترکیب: در هر قرص ویتامین B_{12} ۵۰ میکروگرم. در هر ۳/۵ میلی‌لیتر شربت: ویتامین B_{12} ۲۵ میکروگرم.
موارد استعمال: برای بهبود اشتها، افزایش وزن، افزایش میزان رشد معمولی، بی‌اشتهائی، نقاهت طولانی.
مقدار مصرف و طرز استعمال: روزی ۳ بار، هربار ۱ ـ ۲ قاشق مرباخوری
بسته‌بندی: شربت ۱۷۰ میلی‌لیتر.
بها: ۶۴ ریال.

CYTOSAR
آپجان ـ آمریکا

ترکیب: سیتارابین ۱۰۰ میلی‌گرم.
موارد استعمال: در درجه اول برای ایجاد توقف در لوسمی‌های گرانو-لوسیتیک افراد بالغ و در درجه دوم برای انواع لوسمی‌های حاد در خردسالان و بزرگسالان.
مقدار مصرف و طرز استعمال: بصورت تزریق داخل وریدی ۲ میلی‌گرم بازای هر کیلو وزن بدن برای شروع درمان مناسب است. این مقدار برای ۱۰ روز تجویز میشود.
احتیاط و عوارض جانبی: بمجرد مشاهده دپرسیون مغز استخوان و در نتیجه تقلیل تعداد پلاکت‌ها و گرانولوسیت‌های پولی‌مورفونو-کلئر میزان دارو باید کاهش داده شود و یا قطع گردد.
بسته‌بندی: ویال × ۱
بها: ۳۳۷ ریال.

C

DACRINE
شیره ـ فرانسه

ترکیب: هیدراستی‌نین ۰/۰۵ گرم + سینفرین ۰/۵ گرم + کلرهگزیدین ۰/۰۳ گرم.
موارد استعمال: کونژونکتیویت آلرژیک و عفونی.
مقدار مصرف و طرز استعمال: روزی ۲ ـ ۶ بار، هربار ۲ قطره در چشم می‌چکانند.
بسته‌بندی: قطره ۱۰ میلی‌لیتر.
بها: ۷۰ ریال.

DACTIL
لیک‌ساید ـ آمریکا

ترکیب: در هر قرص: کلریدرات پی‌پریدولات ۵۰ میلی‌گرم.
موارد استعمال: درد و اسپاسم قسمت فوقانی جهازگوارش، درد و اسپاسم و انقباضهای رحم.
مقدار مصرف و طرز استعمال: روزی ۴ ـ ۶ قرص.
موارد منع استعمال: گلوکوم، هیپرتروفی پروستات.
عوارض جانبی: مشابه عوارض آنتی کلینرژیک‌ها.
بسته‌بندی: قرص × ۲۵
بها: ۱۱۷ ریال.

DACTILAS Tablet
لیک‌ساید ـ آمریکا

ترکیب: در هر قرص: قرص داکتیل ۵۰ میلی‌گرم + آمیلاز ۱۵ میلی‌گرم + پروتئاز ۱۰ میلی‌گرم + پانکراتین 3X که بوسیله ۱۵ میلی‌گرم اسید تروکولیک کمک میشود (پانکراتین 3X سه برابر پانکراتین قدرت عمل دارد) ۱۰ میلی‌گرم.
موارد استعمال: سوءهاضمه‌های عصبی، نارسائی پانکراس، بعد از برداشتن کیسه صفرا، گاستروآنتریت، کولیت صفراوی، بعد از

گاسترو کتومی، کولون اسپاستیک، کاردیواسپاسم و پیلورواسپاسم
نفخ، درد، اسپاسم.

مقدار مصرف و طرز استعمال: روزی ۳ بار هربار ۱ قرص با هروعده غذا

بسته‌بندی: قرص × ۳۰

بها: ۱۷۰ ریال.

DAFLON
سرویه ـ فرانسه

ترکیب: عصاره فلاوونوئید روتاسه ۰/۳۷۵ گرم.

موارد استعمال: اختلالات گردش خون نزد زنان، بواسیر، گرفتگی عروق، شکنندگی.

مقدار مصرف و طرز استعمال: روزی ۲ بار، هربار ۲ قرص بعد از نهار و شام.

عوارض جانبی: گاهی سردرد و سوء‌هاضمه.

بسته‌بندی: قرص × ۳۰

بها: ۲۵۰ ریال.

DAGRAVIT B - COMPLEX
داگرا ـ هلند

ترکیب: در هر ۱۰ میلی‌لیتر: ویتامین B_1 ۱۲ میلی‌گرم + ویتامین B_2 ۴ میلی‌گرم + نیکوتینامید ۴۰ میلی‌گرم + کلسیم پانتوتنات ۶ میلی‌گرم + ویتامین B_6 ۲ میلی‌گیرم. در هر قرص: ویتامین B_1 ۱/۵ میلی‌گرم + ویتامین B_2 ۲/۵ میلی‌گرم + نیکوتینامید ۲۰ میلی‌گرم + پانتوتنات کلسیم ۳ میلی‌گرم + ویتامین B_1 ۲ میلی‌گرم.

موارد استعمال: کلیه موارد کمبود ویتامین های فوق.

مقدار مصرف و طرز استعمال: روزی ۲ ـ ۳ قاشق مرباخوری.

بسته‌بندی: شربت ۲۰۰ گرم. قرص × ۲۰

بها: شربت ۹۴ ریال. قرص ۵۳ ریال.

DAGRAVIT TOTAL
داگرا هلند ـ فارمکس ایران

ترکیب: در هر میلی‌لیتر: ویتامین A ۶ هزار واحد + ویتامین B_1 ۲ میلی‌گرم + ویتامین B_2 ۱ میلی‌گرم + نیکوتینامید ۱۵ میلی‌گرم + اسید پانتوتنیک ۱/۵ میلی‌گرم +

ویتامین B_6 ۰/۲ میلی‌گرم + ویتامین C ۰/۵ میلی‌گرم + ویتامین D_2 دوهزار واحد.

موارد استعمال: تقویت عمومی، عقب‌افتادگی رشد. کمبود مقاومت در مقابل بیماریهای عفونی، راشی‌تیسم، دوران آبستنی و شیردهی.

مقدار مصرف و طرز استعمال: روزی ۳ بار، هربار نوزادان: ۱۰ ـ ۲۰ قطره. خردسالان: ۲۰ ـ ۳۰ قطره. بزرگسالان: ۳۰ ـ ۶۰ قطره.

بسته‌بندی: قطره خوراکی ۳۰ میلی‌لیتر.

بها: ۵۴ ریال.

DALACIN - C

آپجان ـ آمریکا

ترکیب: کلیندامیسین.

موارد استعمال: درعفونتهای حاصل از ارگانیسم‌های حساس مخصوصاً استرپتوکوک، پنوموکوک، و استافیلوکوک.

مقدار مصرف و طرز استعمال: بزرگسالان: ۱۵۰ ـ ۳۰۰ میلی‌گرم در ۴ قسمت مساوی. خردسالان: ۸ ـ ۱۶ میلی‌گرم بازای هرکیلو وزن بدن در ۳ ـ ۴ قسمت مساوی.

عوارض جانبی: ناراحتی‌های گوارشی، شل شدن مدفوع، استفراغ و اختلالات کبدی.

بسته‌بندی: کپسول ۷۵ و ۱۵۰ میلی‌گرم × ۱۰۰

بها: ۷۵ میلی ۸۵۵ ریال، ۱۵۰ میلی ۱۷۰۰ ریال.

DAMAGAL

زیگفرید ـ سویس

ترکیب: قرص معده (زرد): کاربوهیدراز ۴۰ میلی‌گرم + پاپائین ۴۰ میلی‌گرم + پپسین ۱۰ میلی‌گرم + ویتامین B_1 ۲ میلی‌گرم + ویتامین B_2 ۱۰ میلی‌گرم + کاربوهیدرات سیستئین ۲ میلی‌گرم. قرص روده (قهوه‌ای): پانکراتین ۷۵ میلی‌گرم + دهیدروکولات سدیم ۲۵ میلی‌گرم + ویتامین B_6 ، ۰/۵ میلی‌گرم + نیکوتینامید ۱۰ میلی‌گرم + کلرورمنیزیم ۲ میلی‌گرم.

موارد استعمال: افزایش اسید معده، افزایش جذب ویتامینها، کم‌اشتهائی، سوءهاضمه حاد و مزمن، کمبود ترشحات پانکراس.

مقدار مصرف و طرز استعمال: روزی ۳ بار، هربار ۱ قرص زرد و ۱ قرص

قهوه‌ای بعد از غذا.
بسته‌بندی: قرص × ۴۰
بها: ۱۳۸ ریال.

DAMETINE
مرک ـ آلمان

ترکیب: کلریدرات دهیدروامتین.
موارد استعمال: آمیبیاز حاد و مزمن و عفونت‌های آمیبی سایر اعضاء.
مقدار مصرف و طرز استعمال: قرص: بزرگسالان: روزی ۳ قرص بمدت ۱۰ روز. خردسالان: نصف مقدارفوق. آمپول: بزرگسالان: روزی ۶۰ میلی‌گرم بطور عمقی در عضله. خردسالان: نصف تا ربع مقدار بزرگسالان.
بسته‌بندی: قرص ۱۰ میلی‌گرم × ۳۰. آمپول ۶۰ میلی‌گرم × ۲
بها: قرص ۸۸ ریال. آمپول ۱۱۷ ریال.

DAONIL
هوخست آلمان ـ ایران

ترکیب: در هرقرص: N ـ ۴ ـ [۲ ـ (۵ ـ کلرو ـ ۲ ـ متوکسی بنز- امیدو) ـ اتیل] ـ فنیل ـ سولفونیل ـ N ـ سیکلوهگزیل اوره= گلی بن گلامايد ۵ میلی‌گرم.
موارد استعمال: درمان خوراکی بیماری قند.
مقدار مصرف و طرز استعمال:
۱ ـ بیمارانی که دیابت آنان تازه کشف شده است: نصف قرص صبح، درصورت لزوم نصف قرص هنگام غروب.
۲ ـ بیمارانی که قبلا از داروی دیگری استفاده کرده‌اند: بعد از قطع داروی قبلی طبق دستور بالا رفتار میکنند.
۳ ـ بیمارانی که قبلا تحت درمان با انسولین بوده‌اند: درصورت نبودن اختلالات متابولیسم بتدریج از مقدار انسولین کاسته دائونیل را تا برقراری تعادل، جانشین آن مینمایند.
موارد منع استعمال: دیابت جوانی، اختلالات جبران‌ناپذیر متابولیک همراه با اسیدوز بخصوص حالت پرکوماو کوما، عدم کفایت کلیه‌ها، دوران بارداری یا احتمال حاملگی.
بسته‌بندی: قرص ۵ میلی‌گرم × ۳۰

بها: ۱۷۶ ریال.

D

DARROW'S SOLUTION

باکستر ـ ایران

ترکیب: کلرور پتاسیم ۰/۲۶ گرم + کلرور سدیم ۰/۴ گرم + لاکتات سدیم ۰/۵۹ گرم + آب مقطر مقدار کافی تا ۱۰۰ میلی‌لیتر (غلظت سدیم ۱۲۱، پتاسیم ۲۵، کلرور ۱۰۳، لاکتات ۵۳ میلی‌اکی‌والان).

موارد استعمال: اسهال حاد و شدید، محرومیت طولانی از پتاسیم، مصرف طولانی دزوکسی کورتیکوسترون و تستوسترون. سندرم کوشینگ، آلکالوز روده‌ای، اسپرو و اسهال مزمن، نفریت مزمن دیابت قندی.

مقدار مصرف و طرز استعمال: حداکثر ۸۰ میلی‌لیتر پارکیلو بمدت ۸ تا ۱۲ ساعت از راه پرفوزیون وریدی.

موارد منع استعمال: هیپرکالیمی، بیماری کلیوی، نارسائی قشر غده فوق کلیوی، بلوک قلبی.

بسته‌بندی: محلول ۵۰۰ میلی‌لیتر.

بها: ۱۲۳ ریال.

DARTALAN

سرل انگلستان ـ ایران

ترکیب: تیوپروپازات دی کلریدرات.

موارد استعمال: پسیکوز، شیزوفرنی حاد و مزمن، پسیکونوروز، اختلال عصبی ناشی از وسواس، تهوع و استفراغ، دردهای ناشی از سرطان.

مقدار مصرف و طرز استعمال: روزی ۳ بار هربار ۲ قرص که بعداً بیک قرص کاهش می‌یابد.

احتیاط: در مبتلایان به صرع، افسردگی‌های روانی و اختلالات کبدی با احتیاط مصرف شود.

اثر متقابل: ممکن است اثر الکل، داروهای مخدر و آرامبخش را افزایش دهد.

بسته‌بندی: قرص ۵ میلی‌گرم × ۵۰

بها: ۱۳۰ ریال.

DAVITAMON[10]
ارگانون هلند
ـ ایران

ترکیب: ویتامین A ۱۰۰۰ واحد + ویتامین B_1 ۵۰۰ میکروگرم + ویتامین B_2 ۵۰۰ میکروگرم + ویتامین B_6 ۲۰۰ میکروگرم + ویتامین C ۲۰ میلی‌گرم + ویتامین D_2 ۵۰۰ واحد + ویتامین B_{12} ۰/۵ میکروگرم + پانتوتنات کلسیم ۱ میلی‌گرم + نیکوتینامید ۵ میلی‌گرم + اسیدفولیک ۱۰۰ میکروگرم.

موارد استعمال: کمک به تغذیه بالغین و اطفال، زنان باردار و شیرده، کمبود ویتامین های فوق.

مقدار مصرف و طرز استعمال: روزی ۴ـ۸ قرص

بسته‌بندی: قرص × ۵۰

بها: ۷۰ ریال.

DEANASE
دلکن ـ انگلستان

ترکیب: دلتا کیموتریپسین.

موارد استعمال: بیماریهای عفونی، ترمیم نسوج، التهابهای ارتوپدی و زنانگی، التهابات تنفسی و پوستی، ضربه های داخل چشمی.

مقدار مصرف: هر ۱۲ ساعت ۲ قرص. ادامه درمان: هر ۱۲ ساعت ۱ قرص.

بسته‌بندی: قرص ۱۰ میلی‌گرم × ۱۶

بها: ۱۷۵ ریال.

DECADRON
مرک شارپ‌انددوهم
آمریکا ـ ایران

ترکیب: دگزامتازون.

موارد استعمال: شوک، آسم، ادم انژیونوروتیک، خیزحنجره، درماتیت، اختلالات گلوبولی، آلرژی، التهاب قسمت قدامی چشم، بیماری‌های گوش خارجی.

مقدار مصرف و طرز استعمال: آمپول: روزی یک تا دو تزریق. قرص: ۱ـ۳ عدد. محلول چشمی: ۱ـ۴ قطره هر ۱ـ۴ ساعت. پماد چشمی: روزی ۱ـ۳ بار در چشم مالیده می‌شود.

موارد منع استعمال: سل فعال، بیماریهای ویروسی قرنیه، عفونت های قارچی، سل پوستی، آبله و آبله‌مرغان، اولسرپپتیک در مورد اشکال داروئی سیستمیک.

D

عوارض جانبی: عدم تعادل الکترولیتی، تشدید مرض قند، پوکی استخوان، میوپاتی.

بسته‌بندی: آمپول ۲ میلی‌لیتر= ۸ میلی‌گرم. قرص ۰/۵ میلی‌گرم × ۱۰۰. قطره چشمی ۲/۵ میلی‌لیتر. پماد چشمی ۳/۵ گرم. شربت ۱۱۰ میلی‌لیتر.

بها: قرص ۴۰۰ ریال، قطره چشمی ۱۰۵ ریال، آمپول ۲۱۱ ریال، شربت ۱۲۹ ریال، پماد نئود کادرون ۷۰ ریال.

DECA - DURABOLIN

ارگانون هلند
ـ ایران

ترکیب: دکانوات ناندرولون.

موارد استعمال: متاستازهای سرطان پستان، استئوپورز، ضایعات عروقی پیشرفته مثل رتینوپاتی دیابتیک، در مواقعیکه یک آنابولیک قوی با اثر طولانی مورد نظر باشد، شکستگی‌ها، قبل و بعد از اعمال جراحی، همراه درمان با کورتیکوستروئیدها.

مقدار مصرف و طرز استعمال: خردسالان: هر ۱۵ روز یک تزریق عضلانی ۵ میلی‌گرمی. بزرگسالان: هر ۱۵ روز یک تزریق عضلانی ۲۵ میلی‌گرمی یا هر ۳۰ روز یک تزریق عضلانی نوع ۵۰ میلی‌گرمی.

موارد منع استعمال: مانند تمام آنابولیکها در آبستنی و سرطان پروستات

عوارض جانبی: آکنه، هیرسوتیسم، خیز.

بسته‌بندی: آمپول ۲۵ میلی‌گرم = ۱ میلی‌لیتر× ۱. آمپول ۵۰ میلی‌گرم= ۱ میلی‌لیتر× ۱.

بها: ۲۵ میلی ۱۶۴ ریال، ۵۰ میلی ۳۰۴ ریال.

DECHOPHYLINE
DECHOPHYLINE Phenobarbital

میلو-فرانسه

ترکیب: اسید دهیدروکولیک ۰/۰۵۹ گرم + دی‌اتیل آمینو اتیل تئوفیلین ۰/۰۴۱ گرم + اولئات سدیم ۰/۱۵ گرم، قرص فنوباربیتال: دکوفیلین + فنوباربیتال ۰/۰۱ گرم.

موارد استعمال: کله‌سیستیت، آنژیوکولیت، نارسائی کبدی و عوارض ثانویه آن، کولوپاتی فونکسیونل، هیپرکلسترولمی.

مقدار مصرف و طرز استعمال: روزی ۲ ـ ۳ قرص میل شود.
بسته‌بندی: قرص ساده و فنوباربیتال × ۵۰
بها: قرص ساده ۷۱ ریال، همراه با فنوباربیتال ۹۰ ریال.

DECODERM³
مرک ـ آلمان

ترکیب: فلوپردنیلیدن ۰/۱ درصد + سولفات نئومایسین ۰/۵ درصد + کلروئیدروکسی کینولئین ۰/۵ درصد.
موارد استعمال: کلیه بیماریهای پوستی ناشی از حساسیت و بیماریهای میکربی و قارچی.
مقدار مصرف و طرز استعمال: شروع درمان: روزی ۲ ـ ۳ بار. ادامه درمان: روزی یکبار.
بسته‌بندی: پماد ۱۰ گرم.
بها: ۸۰ ریال.

DECONTRACTYL
روبر کاریه ـ فرانسه

ترکیب: کرزوکسیدیول = مفنزین.
موارد استعمال: لمباگو، درد پشت، نورالژی بین دنده‌ای، کوفتگی عضلات، درد معلول سلولیت، پیچ خوردگی اندام.
مقدار مصرف و طرز استعمال: مقدار کمی دارو را روی پوست گذارده به طور ملایم مالش داده یا بوسیله گاز می‌پوشانند.
بسته‌بندی: پماد ۳۰ گرم. قرص ۰/۲۵ گرم × ۵۰
بها: قرص ۶۴ ریال، پماد ۵۰ ریال.

DECTANCYL
روسل ـ فرانسه

ترکیب: استات دکسامتازون
موارد استعمال: سندرمهای آلرژیک، حالات هیپرآندروژنی
مقدار مصرف و طرز استعمال: بزرگسالان روزی سه بار هربار ۱ ـ ۲ قرص حداکثر تا ۱۶ قرص در روز. خردسالان: ۱/۵ میلی‌گرم برای هر کیلو وزن بدن.
بسته‌بندی: قرص ۰/۵ میلی‌گرم × ۳۰
بها: ۱۰۵ ریال.

DELFEN CREAM
ارتو-انگلستان

ترکیب: نونیل‌فنوکسی پلی‌اتواکسی اتانول ۵ درصد

موارد استعمال: جلوگیری از آبستنی، تنظیم پ هاش واژن، دیسپارونیا، جلوگیری از عود تریکومونا، زیرا با استعمال مرتب پ هاش واژن را در محیط ۴/۵ نگهداری مینماید، نزدیکی دردناک.

مقدار مصرف و طرز استعمال: هردفعه قبل از نزدیکی از یک آپلیکاتور پر استفاده شود

بسته‌بندی: کرم ۷ گرم همراه با آپلیکاتور

بها: ۱۲۸ ریال.

DELPHICOL
لدرلی آمریکا- ایران

ترکیب: در هر قاشق مرباخوری: تری کولین سیترات ۴۸۰ میلی‌گرم (معادل ۴۰۰ میلی‌گرم کلرور کولین) + استیل‌متیونین ۴۱۰ میلی‌گرم (دارای فعالیت بیولوژیک معادل ۱۶۰ میلی‌گرم متیونین) + اینوزیتول ۸۰ میلی‌گرم + اسید فولیک ۰/۰۵۳ میلی‌گرم + ویتامین B_{12} ۴ میکروگرم.

موارد استعمال: سیروزکبد، سایر اختلالات کبدی که موجب تجمع چربی در کبد میشوند، متابولیسم غیرطبیعی چربی.

مقدار مصرف و طرز استعمال: دوز متوسط: روزی ۳ بار، هربار ۱ قاشق مرباخوری بعد از غذا.

احتیاط: در بعضی از موارد علائم تحریک جهازهاضمه مشاهده میشود. با معده خالی نباید مصرف گردد.

بسته‌بندی: شربت ۱۲۰ میلی‌لیتر.

بها: ۱۱۷ ریال.

DELTA-BUTAZOLIDINE
گایگی-سویس

ترکیب: در هردراژه بوتازولیدین ۵۰ میلی‌گرم + پردنیزون ۱/۲۵ میلی‌گرم.

موارد استعمال: درمان طولانی پلی‌آرتریت مزمن پیش رونده، اسپوندیلو-آرتریت، روماتیسم‌های حاد و صعب‌العلاج خارج مفصلی.

مقدار مصرف و طرز استعمال: خردسالان: مقدار اولیه: ۲-۵ دراژه در روز. مقدار نگهدارنده: روزی ۱-۳ دراژه بزرگسالان: مقدار

اولیه: روزی ۳ـ۴ بار، هربار ۲ دراژه. مقدار نگهدارنده: روزی ۲ـ۳ دراژه.

موارد منع استعمال: زخمهای معده و اثنی‌عشر، در استئوپوروز پیش‌رفته و حساسیت به پیرازول‌ها و کورتیکوستروئیدها، بیماریهای قلبی، کبدی و کلیوی، دوران بارداری.

احتیاط: هنگام تجویز دلتابوتازولیدین به بیماران مبتلا به دیابت و سل مراقبت جدی باید بعمل آید.

بسته‌بندی: دراژه × ۳۰

بها: ۱۸۰ ریال.

DELTACORTRIL

فایزر آمریکا ـ ایران

ترکیب: استات پردنیزولون.

موارد استعمال: نقرس، عفونتهای چشمی، انواع درماتوزها، آسم، بیماریهای نئوپلاستیک معدی ـ روده‌ای، ضایعات خونی، آرتریت روماتوئید.

مقدار مصرف و طرز استعمال: قرص خوراکی: روزی ۵ ـ ۶۰ میلی‌گرم بمدت ۳ ـ ۴ روز.

موارد منع استعمال: اولسرپپتیک، سل، آبله‌مرغان، پسیکوز.

بسته‌بندی: قرص ۵ میلی‌گرم × ۲۰

بها: ۵۹ ریال.

DENCORUB

کمیکال دنور آمریکا انگلستان ـ دوپار ایران

ترکیب: در هر ۱۰۰ گرم: اسید سالیسیلیک ۰/۱ گرم + اوکالیپتوس ۰/۵ گرم + مانتول ۰/۷۵ گرم + کامفر ۱ گرم + متیل‌سالیسیلات ۱۲ گرم.

موارد استعمال: مسکن موضعی، دردهای عصبی عضلانی، روماتیسمی سیاتیک لمباگو، پیچ خوردگی.

مقدار مصرف و طرز استعمال: روزی چند بار روی محل درد مالیده شود.

احتیاط: نباید با چشم یا زخم‌های باز تماس پیدا کند.

بسته‌بندی: کرم ۶۰ گرم.

بها: ۳۵ ریال.

D

DENORAL
فورنید فرر فرانسه ــ فارماشیمی ایران

ترکیب: در ۱۰۰ میلی‌لیتر شربت: یدومتیلات دی‌فکسامید ۴ میلی‌گرم + بی کلرهیدرات کلرسینازین ۱۵ میلی‌گرم + فولکودین ۴۰ میلی‌گرم. در هر قرص یدومتیلات دی‌فکسامید ۱ میلی‌گرم + بی کلرهیدرات کلرسینازین ۵ میلی‌گرم + کلرهیدرات فنیل‌آمینو پروپانول ۳۰ میلی‌گرم.

موارد استعمال: سرماخوردگی، گرفتگی بینی، ضدتشنج، رینیت‌عفونی و فصلی، سینوزیت، برونشیت، سرفه های عصبی و تشنجی.

مقدار مصرف و طرز استعمال: قرص: روزی ۳ بار، هربار ۱ قرص. شربت: خردسالان ۱ـ۲ سال: روزی ۱ـ۲ قاشق مرباخوری، ۳ـ۴ سال: ۳ـ۴ قاشق مرباخوری، ۴ـ۶ سال: ۲ـ۳ قاشق غذاخوری.

بسته‌بندی: قرص × ۲۰. شربت ۱۵۰ میلی‌لیتر.

بها: قرص و شربت ۷۰ ریال.

DENTIFECTE
آویسن ــ ایران

ترکیب: تیمول ۰/۱۵ گرم + مانتول ۰/۰۱ گرم + اسید بنزوئیک ۰/۸ گرم + سالیسیلات دومتیل ۰/۰۵ میلی‌لیتر + او کالیپتول ۰/۰۵ میلی‌لیتر + بوراکس ۱ گرم + اسیدبوریک ۱ گرم + گلیسیرین ۲ میلی‌لیتر + الکل ۹۰ درصد ۲۰ میلی‌لیتر + اکسیپیان مقدار کافی تا ۱۰۰ میلی‌لیتر.

موارد استعمال: درمان و پیشگیری عفونتهای دهان و دندان، تورم لثه ها، پیوره، فساد و کرم‌خوردگی دندانها، آبسهٔ دندان و پس از کشیدن دندان و همچنین در انواع گلودردها و آنژینها بصورت غرغره.

مقدار مصرف و طرز استعمال: هر ۲ تا ۳ ساعت ۲ قاشق از محلول را در یک گیلاس آب نیمگرم ریخته دهان را شتشو داده و یا غرغره میکنند.

بسته‌بندی: محلول ۵۰ میلی‌لیتر.

بها: ۳۵ ریال.

D

DENTIGAR
ویرا ـ ایران

ترکیب: در هر ۱۰۰ میلی‌لیتر: آنتائین ۱ گرم + آنتی‌پیرین ۳ گرم + کلروفرم ۴ گرم + الکل ۹۶ درجه ۴۰ گرم + گلیسیرین ۸ گرم + اسانس مانت ۱ گرم.

موارد استعمال: شتشوی دهان و دندان، برای بند آوردن خون.

مقدار مصرف و طرز استعمال: ۱ قاشق چایخوری از محلول را در یک استکان آب نیمگرم مخلوط کرده مضمضه می‌نمایند.

بسته‌بندی: محلول ۴۰ میلی‌لیتر.

بها: ۳۵ ریال.

DENTOVAX
بوتی ـ ایتالیا

ترکیب: در هر ۱۰۰ گرم: اشریشیا کولی ۴۰۰ میلیارد + استرپتوکوکوس اووالیس ۱۴ میلیارد + استافیلوکوکوس پیوژیانوس ۲۸ میلیارد + پروتئوس‌ولگاریس ۲۲ میلیارد.

موارد استعمال: پیوره آلوئولاریس، التهابات پیشرونده دندانی.

مقدار مصرف و طرز استعمال: مسواک می‌کنند.

بسته‌بندی: کرم ۴۰ گرم همراه با مسواک

بها: ۱۲۰ ریال.

DEPO-MEDROL
آپجان ـ آمریکا

ترکیب: استات متیل پردنیزولون.

موارد استعمال: تب یونجه، آسم، رینیت، واکنشهای داروئی، درماتیت تماسی، آرتریت روماتوئید، استئوآرتریت.

مقدار مصرف و طرز استعمال: تزریق داخل عضلانی: ۸۰ ـ ۱۲۰ میلی‌گرم. داخل مفصلی: بستگی بشدت بیماری دارد. تزریق داخل تاندون ۳۰ ـ ۴۰ میلی‌گرم.

بسته‌بندی: ویال ۴۰ میلی‌گرم = ۱ میلی‌لیتر × ۱

بها: ۲۱۰ ریال.

D

DEPO - PROVERA
آپجان ـ آمریکا

ترکیب: سوسپانسیون مائی استات مدروکسی پروژسترون ۵۰ میلی گرم.
موارد استعمال: تهدید به سقط، سقط های عادتی، آندومتریوز، بعنوان داروی کمکی و تسکینی در سرطان آندومتر، و همراه با متاستاز غیرقابل عمل مصرف میشود.
مقدار مصرف و طرز استعمال: بصورت تزریق داخل عضلانی. سقط عادتی: درسه ماهه اول هر هفته ۵۰ میلی گرم درسه ماهه دوم ۱۰۰ میلی گرم و تا ماه هشتم حاملگی ادامه میدهند. تهدید به سقط: ۵۰ میلی گرم هر روز تا موقعی که علائم وجود دارد سپس هرهفته ۵۰ میلی گرم در طول سه ماه اول. اندومتریوز ۵۰ میلی گرم هرهفته یا ۱۰۰ میلی گرم هردو هفته بمدت حداقل ۶ ماه.
بسته بندی: ویال ۵۰ میلی گرم = ۱ میلی لیتر × ۱
بها: ۱ میلی ۱۶۰ ریال.

DEPOSTAT
شرینگ ـ آلمان

ترکیب: در هر آمپول: ۱۷ آلفاهیدروکسی ۱۹ نورپروژسترن کاپروات = ژستونورون کاپرونات ۲۰۰ میلی گرم.
موارد استعمال: هیپرتروفی پروستات، سرطان پیشرفته آندومتر.
مقدار مصرف و طرز استعمال: هرهفته تزریق یک آمپول داخل عضلانی کافی است. مقدار استعمال را درصورت لزوم میتوان دو برابر نمود.
بسته بندی: آمپول ۲ میلی لیتر × ۱
بها: ۲۲۲ ریال.

DEPOT - TESTRON
ابو ـ اتریش

ترکیب: تستوسترون روتارد.
موارد استعمال: مردان: عقیمی و کمی اسپرم، کوچکی بیضه ها و پروستات، عوارض ناشی از برداشتن بیضه ها، آتروفی بیضه ها، دیابت. زنان: سرطان تخمدانها، آندومتریت.
مقدار مصرف و طرز استعمال: برحسب نوع و شدت بیماری متفاوتست.

بسته‌بندی: آمپول ۱۰۰ میلی‌گرم × ۱
بها: ۹۰ ریال.

D

DEPROPANEX
مرک شارپ انددوهم آمریکا ـ ایران

ترکیب: عصارهٔ بدون پروتئین پانکراس.
موارد استعمال: انسداد حالب بعلت سنگ، اورتریت‌اسپاستیک، قولنج صفراوی، دیسمنوره، و جراحی شکم برای جلوگیری از ایلئوس پارالیتیک.
مقدار مصرف و طرز استعمال: برحسب مورد مصرف ۲ ـ ۴ میلی‌لیتر در عضله تزریق می‌شود.
عوارض جانبی و احتیاط: تزریق بیش از مقدار توصیه شده معمولی سبب کاهش فشار خون میشود. برای درمان کاهش فشارخون یک داروی بالابرنده فشارخون ممکن است لازم شود.
بسته‌بندی: ویال ۱۰ میلی‌لیتر.
بها: ۱۶۴ ریال.

DEQUADIN Lozenges
آلن هانبوریز انگلستان ـ داروپخش ایران

ترکیب: در هر قرص: کلرورد کوالینیوم ۰/۲۵ میلی‌گرم.
موارد استعمال: التهاب لوزتین، گلودرد، استوماتیت، التهاب حلق، برفک، التهاب زبان و آنژین و نسان.
مقدار مصرف و طرز استعمال: یک قرص هر ۲ ـ ۳ ساعت مکیده می‌شود.
بسته‌بندی: قرص × ۲۰ و ۲۵۰.
بها: ۲۰ عددی ۲۹ ریال، ۲۵۰ عددی ۳۵۱ ریال.

DEQUADIN Paint
آلن هانبوریز انگلستان ـ داروپخش ایران

ترکیب: محلول ۰/۵ درصد کلرورد کوالینیوم در پروپیلن گلیکول.
موارد استعمال: استوماتیت قارچی و عفونی، عفونت قارچی مقعد، عفونتهای قارچی موضعی پوست، زخمهای عفونی دهان و گلو، اورتریت ناشی از تریکوموناس.
مقدار مصرف و طرز استعمال: برای درمان برفک دهان و سایر عفونتهای

D

دهان و گلو و پوست هرسه‌ساعت یکبار. در اورتریت ناشی از تریکوموناس ۲ میلی‌لیتر محلول را در ۱۰۰ میلی‌لیتر آب حل کرده مجرای ادرار را با آن شستشو میدهند. محلول را بوسیله بروس یا میله‌ای که سر آن پنبه پیچیده باشند باید بکار برد.

بسته‌بندی: محلول ۲۸ میلی‌لیتر.

بها: ۶۰ ریال.

DEQUADIN Pessaries

آلن هانبوریز انگلستان ـ داروپخش ایران

ترکیب: کلرورد کوالینیوم ۱۰ میلی‌گرم.

موارد استعمال: درمان التهاب مهبل ناشی از کاندیدا آلبیکانس و تریکوموناس واژینالیس و عفونتهای مختلط

مقدار مصرف و طرز استعمال: تا آنجا که ممکن است یک اوول در منتهی‌الیه فوقانی مهبل قرار میدهند و این کار در صبح و شب تکرار می‌شود.

بسته‌بندی: اوول × ۲۰.

بها: ۸۰ ریال.

DERMEX

مارین ـ ایران

ترکیب: اکسی کینولئین سولفات + بنزوکائین + اکسیددوزنک + مانتول + ایکتیول.

موارد استعمال: سوختگیها، خراشیدگیها، بریدگی ها، خارشهای جلدی، عفونتهای قارچی و گزیدگی حشرات.

مقدار مصرف و طرز استعمال: موضع را تمیز نموده و با پماد پانسمان می کنند.

احتیاط: بر روی چشم و پوستهای خیلی حساس مالیده نشود.

بسته‌بندی: پماد ۲۰ گرم.

بها: ۲۹ ریال.

DERMOVATE

گلاکسو انگلستان ـ داروپخش ایران

ترکیب: کلوبتازول ۱۷ ـ پروپیونات

موارد استعمال: درماتوزهای التهابی، اکزما، درماتیت سبوروئیک، اوتیت خارجی، آفتاب‌سوختگی.

مقدار مصرف و طرز استعمال: روزی ۲ بار، هربار مقدار کمی از پماد را در محل می‌مالند.
موارد منع استعمال: بیماریهای ویروسی پوستی.
بسته‌بندی: پماد و کرم ۱۵ گرم
بها: ۱۵۲ ریال.

DESCLIDIUM
اسپرت ـ فرانسه

فارماکولوژی: وازودیلاتاتور عروق مغزی.
ترکیب: کلریدرات وی‌کی‌دیل.
موارد استعمال: نارسائی درگردش خون عروق مغزی، آبستنی، ضعف حافظه.
مقدار مصرف و طرز استعمال: روزی ۳ بار، هربار یک کپسول وسط غذا.
موارد منع استعمال: هنگام قاعدگی زنان.
بسته‌بندی: کپسول × ۳۰
بها: ۳۰۰ ریال.

DESITIN
دسی‌تین ـ تولیدارو ایران

ترکیب: روغن کبد ماهی ۱ درصد + اکسید روی ۳۰ درصد + لانولین و تالک تا ۱۰۰ درصد.
موارد استعمال: معالجه زخمها، سوختگیها، خراشیدگی‌های جلدی، تحریکات و التهابات جلدی ناشی از آفتاب‌زدگی، اریتم ناحیه نشیمن خردسالان، اکزما، بواسیر، تحریکات و سرخی جلدی.
طرز استعمال: پماد را روی باند تمیزی بضخامت نیم تا یک‌سانتیمتر مالیده روی زخم قرار میدهند.
بسته‌بندی: پماد ۲۵ گرم.
بها: ۲۹ ریال.

DESOXYCORTICOSTERON "VIFOR"
ویفور ـ سولیس

ترکیب: استات‌دزوکسی کورتیکوسترون
موارد استعمال: بیماری آدیسون، میاستنی، هیپوکلرمی، آستنی.
مقدار مصرف: برحسب نوع بیماری روزی ۵ ـ ۲۰ میلی‌گرم.

بسته‌بندی: آمپول ۵ و ۱۰ میلی‌گرم = ۱ میلی‌لیتر × ۶

بها: ۵ میلی‌لیتری ۵۰ ریال، ۱۰ میلی ۷۲ ریال.

D

DETIGON
بایرآلمان: ایران

ترکیب: کلریدرات ۱ ـ کلروفنیل ـ ۲ ـ فنیل ـ ۳ ـ دی‌متیل‌آمینو ـ پروپانول = کلریدرات کلوفدیانول

موارد استعمال: سرفه‌های تحریکی، برونشیت حاد و مزمن، تومورهای ریوی، سرفه‌های حاد و مزمن، پلورزی.

مقدار مصرف و طرز استعمال: بزرگسالان: روزی ۳ـ۴ بار، هربار ۲۰ـ ۳۰ قطره. خردسالان: متناسب با سن روزی ۲ـ۴ بار هربار ۵ـ ۱۵ قطره. شیرخواران: روزی ۳ـ۴ بار هربار ۵ قطره.

بسته‌بندی: قطره ۵۰ میلی‌گرم = ۱ میلی‌لیتر × ۱۰ میلی‌لیتر.

بها: ۳۵ ریال.

DETTOL
ریکت اند کلمن ـ انگلستان

ترکیب: کلروگزیلنول ۴/۸ درصد.

موارد استعمال: ضدعفونی عمومی.

مقدار مصرف و طرز استعمال: یکقاشق چایخوری را بر حسب مورد مصرف در ۱۵ تا ۳۰۰ میلی‌لیتر آب حل کرده بطور موضعی استعمال می‌کنند.

بسته‌بندی: محلول ۵۰ میلی‌لیتر و گالن ۵ لیتر.

بها: ۵۰ میلی‌لیتری ۳۰ ریال، گالن ۵۴۰ ریال.

DEVALIL CORTISONE
ایکار ایتالیا ـ آترا ایران

ترکیب: در هر ۱۰۰ گرم: دوالیل (محصول حاصل از تقطیر چوب) ۱۰ گرم + استات هیدروکورتیزون ۱ گرم.

موارد استعمال: امراض پوستی حاد، نیمه حاد و مزمن، اکزما، خارش.

مقدار مصرف و طرز استعمال: روزی ۱ ـ ۳ بار در محل می‌مالند.

بسته‌بندی: پماد ۵ گرم.

بها: ۵۹ ریال.

DEVORA
تانابی ژاپن ـ
فارماشیمی ایران

ترکیب: تی‌پیپدین هی‌بنزات.
موارد استعمال: سرفه، گریپ، سل ریوی، پلورزی، فارنژیت.
مقدار مصرف: بزرگسالان: هربار یک قاشق مرباخوری در شبانه‌روز.
خردسالان: قبل از دوسالگی نصف قاشق قهوه‌خوری دوبار در شبانه‌روز، ۳ ـ ۵ سال یک قاشق قهوه‌خوری دوبار در شبانه‌روز.
۶ ـ ۱۴ سال یک قاشق قهوه‌خوری ۳ بار در شبانه‌روز.
بسته‌بندی: شربت ۵/۵۸ میلی‌گرم = ۱ میلی‌لیتر × ۱۲۰ میلی‌لیتر.
بها: شربت ۷۲ ریال.

DEXACILLIN
اسکوئیب آمریکا ـ
ایران

ترکیب: اپی‌سیلین (پنی‌سیلین نیمه‌صناعی)
موارد استعمال: انواع عفونتهای گرم مثبت و گرم منفی حساس به‌آنتی‌بیوتیک فوق.
مقدار مصرف و طرز استعمال: ۵۰ ـ ۲۰۰ میلی‌گرم بازاء هر کیلو وزن بدن.
بسته‌بندی: کپسول ۲۵۰ میلی‌گرم × ۱۰۰ و ۵۰۰ میلی‌گرم × ۵۰. قطره ۱۰۰ میلی‌گرم = ۱ میلی‌لیتر × ۱۰ میلی‌لیتر. ویال: ۲۵۰ میلی‌گرم × ۱، ۵۰۰ میلی‌گرم × ۱، ۱۰۰۰ میلی‌گرم × ۱. سوسپانسیون ۱/۵ و ۳ گرم × ۶۰ میلی‌لیتر.
بها: کپسول ۲۵۰ میلی ۱۳ ریال، ۵۰۰ میلی ۲۶ ریال، قطره ۱۰۰ ریال. شربت ۱/۵ گرمی ۱۲۹ ریال، ۳ گرمی ۲۱۱ ریال، ویال. ۲۵۰ میلی ۴۴ ریال، ۵۰۰ میلی ۸۲ ریال، ۱۰۰۰ میلی ۱۴۱ ریال.

DEXA-SCHEROSON
شرینگ ـ آلمان

ترکیب: در هر قرص یا آمپول: دگزامتازون ۰/۵ میلی‌گرم.
موارد استعمال: روماتیسم حاد و آرتریت روماتوئید، کاردیت، آسم برونشیک، اکزمای عمومی شدید و اکزمای آندوژن، بیماریهای جلدی در اثر حساسیت، اریتماتوهای حاد، پمفیگوس، اریترودرمی، دیسکرازیهای خونی مانند آگرانولوسیتوز بدخیم سیستمیک

(مثل بیماری هوجکین)

مقدار مصرف و طرز استعمال: در ابتدای درمان روزی ۵ـ۶ میلی‌گرم دارو را هر ۲ـ۳ روز ۰/۲۵ ـ ۰/۵ میلیگرم کاهش میدهند تا آنکه دوز نگهدارنده دارو که مقدار آن در حدود ۰/۵ـ۲ میلی‌گرم در روز است بدست آید. آمپول: بر حسب نوع و شدت بیماری ۵ـ۱۰ میلی‌گرم داخل وریدی در صورت لزوم هر ۴ـ۶ ساعت تکرار میشود.

موارد منع استعمال: مانند سایر کورتون‌ها در زخم‌معده و اثنی‌عشر، استئوپوروز پسیکوزهای مخفی.

احتیاط: در سل ریوی پیشرونده و بیماریهای عفونی دیگر درمان باید توأم با مقادیر کافی آنتی‌بیوتیک مربوطه و یا سولفونامید باشد. مدت درمان و مقدار استعمال باید تا حدامکان کم و کوتاه باشد. در دیابت باید با احتیاط مصرف شود.

بسته‌بندی: قرص ۰/۵ میلی‌گرم × ۳۰ و ۱۵۰. آمپول ۵ میلی‌گرم ۱ میلی‌لیتر × ۱.

بها: قرص ۳۰ عددی ۸۸ ریال. ۱۵۰ عددی ۳۵۱ ریال. آمپول ۵۹ ریال.

DEXATOPTC
ارگانون ـ هلند

ترکیب: دگزامتازون ۰/۴ میلی‌گرم + دکانوات ـ ناندرولون ۰/۴ میلی‌گرم + کلریدرات کلروهگزیدین ۱۰ میلی‌گرم.

موارد استعمال: التهابات و عوارض آلرژیک جلدی و انواع اکزماها.

مقدار مصرف و طرز استعمال: روزی ۲ـ۳ بار، هربار مقدار کمی از پماد را در محل میمالند.

موارد منع استعمال: سل، عفونتهای ویروسی جلدی، آبله‌مرغان.

بسته‌بندی: کرم جلدی ۱۵ گرم.

بها: ۱۶۰ ریال.

DEXTROSE IN SALINE
باکستر ـ ایران

ترکیب: دکستروز ۵ گرم + کلرورسدیم ۰/۹ گرم + آب مقطر مقدار کافی تا ۱۰۰ میلی‌لیتر (غلظت سدیم ۱۵۴،

کلرور ۱۵۴ میلی اکی والان).

موارد استعمال: رسانیدن آب و کالری در موارد جراحی، آلکالوز، اسیدوز دیابتی.

مقدار مصرف و طرز استعمال: معمولا بین ۱ ـ ۳ لیتر در ۲۴ ساعت با سرعت ۹۰ ـ ۱۸۰ قطره در دقیقه پرفوزیون وریدی.

بسته‌بندی: محلول ۵۰۰ و ۱۰۰۰ میلی‌لیتر.

بها: ۵۰۰ میلی ۹۹ ریال، یک لیتری ۱۱۹ ریال.

DEXTROSE IN SODIUM CHLORIDE

باکستر ـ ایران

ترکیب: دکستروز ۳/۳۳ درصد + کلرورسدیم ۰/۳۳ درصد + آب مقطر مقدار کافی تا ۱۰۰ (غلظت سدیم ۵۶، کلرور ۵۶ میلی اکی والان)

موارد استعمال: رسانیدن آب و کالری در موارد جراحی، اسهال، استفراغ و تعریق شدید.

مقدار مصرف و طرز استعمال: معمولا بین ۱ تا ۳ لیتر در ۲۴ ساعت از راه تزریق وریدی.

احتیاط: در مبتلایان به خیز با رعایت احتیاط‌های لازم تزریق شود.

بسته‌بندی: محلول ۵۰۰ و ۱۰۰۰ میلی‌لیتر.

بها: ۵۰۰ میلی ۹۷ ریال، یک لیتری ۱۱۹ ریال.

DEXTROSE IN WATER

باکستر ـ ایران

ترکیب: دکستروز در محلول آب مقطر.

موارد استعمال: رساندن مقدار کافی مایع به بدن قبل یا بعد از عمل جراحی.

مقدار مصرف و طرز استعمال: معمولا بین ۵۰۰ میلی تا چندین لیتر در ۲۴ ساعت از راه تزریق وریدی.

بسته‌بندی: محلول ۵ درصد و ۱۰ درصد × ۵۰۰ و ۱۰۰۰ میلی‌لیتر.

بها: ۵ درصد: ۵۰۰ میلی ۹۶ ریال، یک‌لیتری ۱۱۷ ریال، ۱۰ درصد: ۵۰۰ میلی ۱۰۰ ریال، یک لیتری ۱۲۳ ریال.

D

D.G.Drop
میسین ـ ایران

ترکیب: کلرال‌ئیدراته ۶ گرم + اسیدفنیک ۲ گرم + گلیسیرین ۶ گرم + اسید سالیسیلیک ۶ سانتی‌گرم + تنطور کشنیل ۲۰ سانتی گرم + استوائین ۴۰ سانتی‌گرم + کلروفرم ۲۰ سانتی‌گرم + مانتول ۱۵ سانتی‌گرم + اسید لاکتیک ۶ سانتی‌گرم.

موارد استعمال: ضدعفونی دهان و گلو، خونریزی لثه و ورم مخاط، التهابات بافت‌های پای دندان.

مقدار مصرف و طرز استعمال: ۴۰ قطره را در نصف استکان آب جوشیده نیم‌گرم مضمضه یا غرغره می کنند.

بسته‌بندی: قطره ۳۰ میلی‌لیتر.

بها: ۴۹ ریال.

D.-G. Powder
میسین ـ ایران

ترکیب: ریشه‌ختمی ۵ گرم + کلرات پتاسیم ۵ گرم + نشاسته ۵ گرم.

موارد استعمال: ضدعفونی دهان و گلو، التیام دردهای دهان و دندان و گلو، خونریزی لثه و ورم مخاط، التهابات بافتهای پای دندان.

مقدار مصرف و طرز استعمال: محتوی بسته را در یک بطری آب گرم ریخته پس از چند دقیقه با پارچه داخل جعبه صاف کرده و گرم گرم به دفعات متعدد در دهان غرغره میکنند. پس از سرد شدن دوباره میتوان آنرا گرم کرد.

بسته‌بندی: گرد ۲۰ گرم.

بها: ۵۳ ریال.

DIABINESE
فایزر آمریکا ـ ایران

ترکیب: کلرپروپامید ۲۵۰ میلی‌گرم.

اثر متقابل: مصرف توأم کلرامفنیکل درکسانیکه تحت درمان با کلرپروپامید یا ترکیبات وابسته به‌سولفونیل اوره میباشند باعث طولانی شدن نیمه عمر کلرپروپامید شده و موجب بروز یک واکنش هیپوگلیسمیک شدید میگردد.

موارد استعمال: دیابت قندی غیرکمپلیکه، پایدار، ملایم یا نسبتاً شدید از نوع غیرکتونی.

مقدار مصرف و طرز استعمال: دیابت خفیف یا نسبتاً شدید: روزی ۲ قرص. بیماران سالخورده یا کمتر از ۵۰ کیلوگرم وزن یک قرص مقدار نگهدارنده نیم تا یک قرص در روز.

موارد منع استعمال: دیابت ژوونیل، دیابت شدید یا غیر پایدار دوران بارداری. نارسائی کبدی، کلیوی یا تیروئیدی.

بسته‌بندی: قرص × ۱۰۰

بها: ۴۶۸ ریال.

DIACOL
ایران دراگ ـ ایران

ترکیب: در هر ۵ میلی‌لیتر: سولفات نئومایسین ۱۵۰ میلی‌گرم + پاپاورت ۲ میلی‌گرم + سولفات آتروپین ۰/۰۱۲۵ میلی‌گرم + ساخارین سدیم ۱۰ میلی‌گرم.

موارد استعمال: درمان سریع انواع اسهالها.

مقدار مصرف و طرز استعمال: بزرگسالان: روزی ۴ بار، هربار ۲ پیمانه. خردسالان: روزی ۴ بار، هربار نصف پیمانه برای هر کیلو وزن.

بسته‌بندی: شربت ۶۰ میلی‌لیتر.

بها: ۷۳ ریال.

DIACORTICIN
دیامان ـ فرانسه

ترکیب: قطره چشمی نئومایسین ۰/۳۵ درصد + هیدروکور تیزون ۱ درصد. قطره گوشی به ترتیب ۰/۳۵ درصد + ۰/۵ درصد. پماد ۵ گرمی ۰/۳۵ درصد + ۲/۵ درصد. پماد ۱۵ گرمی ۰/۳۵ درصد + ۱ گرم درصد.

موارد استعمال: اگزمای پلک‌ها، بلفاریت، کونژنکتیویت کاتارال، کراتیت، اپی‌اسکلریت، ایریتیس. عفونتهای گوشی و چشمی حساس به نئومایسین.

مقدار مصرف و طرز استعمال: روزی ۲ تا چند قطره در چشم یا گوش می‌چکانند. پماد: روزی ۳ بار هربار مقداری پماد را در چشم یا گوش می‌گذارند.

بسته‌بندی: قطره چشمی ۳ میلی‌لیتری. قطره گوشی ۱۰ میلی‌لیتری. پماد ۲/۵ درصد × ۵ و ۱۵ گرم.

بها: قطره چشمی ۵۹ ریال. گوشی ۷۳ ریال. پماد ۵ گرمی ۱۲۰ ریال، ۱۵ گرمی ۱۲۶ ریال.

D

DI-ADRESON F
ارگانون هلند ـ ایران

ترکیب: پردنیزولون ۵ میلی‌گرم.
موارد استعمال: التهاب، آسم برونشیک، روماتیسم مفصلی، آلرژی
مقدار مصرف و طرز استعمال: شروع درمان: روزی ۲۰ ـ ۶۰ میلی‌گرم.
مقدار نگهدارنده: ۱۰ ـ ۲۰ میلی‌گرم.
موارد منع استعمال: اولسرهای معدی ـ روده‌ای، عفونتهای ویروسی یا قارچی
عوارض جانبی: هیپوکالمی، استئوپورز، آتروفی پوست، خیز، اکنه.
بسته‌بندی: قرص × ۱۰۰ و ۱۰۰۰
بها: ۱۰۰ عددی ۲۳۴ ریال. ۱۰۰۰ عددی ۲۳۴۰ ریال

DIAMICRON
سرویه ـ فرانسه

ترکیب: در هرقرص گلیکلازید ۸۰۰ میلی‌گرم
موارد استعمال: دیابت بالغین و عوارض عروقی ناشی از دیابت.
مقدار مصرف و طرز استعمال: روزی ۱ ـ ۳ بار هربار ۱ قرص.
موارد منع استعمال: دیابت‌های انسولینی
بسته‌بندی: قرص × ۲۰
بها: ۳۸۶ ریال

DIAMOX
لدرلی آمریکا ـ ایران

ترکیب: در هرقرص: استازولامید ۲۵۰ میلی‌گرم
موارد استعمال: درمان ورم‌های ناشی از نارسائی قلب، گلوکوم، توکسمی و ادم آبستنی، فشار و ناراحتی قاعدگی، چاقی.
مقدار مصرف و طرز استعمال: برای ایجاد دیوزر: ۱ ـ ۱/۵ قرص. درمان گلوکوم حاد احتقانی و گلوکوم ثانویه: در هرچهارساعت ۱ قرص.
موارد منع استعمال: در اسیدوزایدیوپاتیک هیپرکلرمیک کلیوی، در بیماری آدیسون و در نارسائی‌های غده فوق کلیوی.
بسته‌بندی: قرص × ۱۰۰
بها: ۷۰۰ ریال.

DIANABOL
سیبا ـ سویس

ترکیب: در هر قرص: متاندینون ۱ میلی‌گرم و ۵ میلی‌گرم. در هر آمپول: ۱۰ میلی‌گرم. در هر میلی‌لیتر قطره: ۱ میلی‌گرم.

موارد استعمال: دوره نقاهت طولانی پس از عفونت های سخت، کاشکسی، آستنی، کمبود وزن، پوك استخوانی.

مقدار مصرف و طرز استعمال: خردسالان: ۰/۰۴ میلی‌گرم بازاء هر کیلو وزن بدن. بزرگسالان: شروع: ۱۰ میلی‌گرم. مقدار نگهدارنده: ۵ میلی‌گرم در روز.

بسته‌بندی: قرص ۱ و ۵ میلی‌گرم × ۲۰، آمپول ۱۰ میلی‌گرم × ۵، قطره ۲۰ میلی‌لیتر.

بها: قرص ۱ میلی ۴۰ ریال، ۵ میلی ۲۰۰ ریال. آمپول ۱۰۵ ریال. قطره ۴۵ ریال

DIANAVIT
سیبا ـ سویس

ترکیب: دیانابول (متاندینون) ۱ میلی‌گرم + ویتامین B_1 ۵ میلی‌گرم + ویتامین B_2 ۲ میلی‌گرم + ویتامین B_6 ۵ میلی‌گرم + ویتامین B_{12} ۱ میکروگرم + ویتامین A ۳۵۰۰ واحد + نیکوتینامید ۲۰ میلی‌گرم + ویتامین C ۵۰ میلی‌گرم + ویتامین E ۷ میلی‌گرم

موارد استعمال: بی‌اشتهائی، نگهداری و تقویت حال عمومی و بالا رفتن مقاومت بدن. کمبود ویتامین های فوق.

مقدار مصرف و طرز استعمال: خردسالان بزرگتر از ۶ سال: روزی یک کپسول یا یک روزدرمیان یک کپسول. بزرگسالان: شروع: ۲-۳ کپسول در روز همراه با کمی مایع. ادامه درمان روزی ۱-۲ کپسول.

موارد منع استعمال: خردسالان کمتر از ۶ سال، سرطان پروستات، نارسائی کبدی.

بسته‌بندی: کپسول × ۳۰

بها: ۱۰۵ ریال

DIAREX
ویرا ـ ایران

ترکیب: فورازولیدن ۴۰۰ میلی‌گرم + پکتین ۲ گرم + کائولن ۲۴ گرم + ساکارین ۵۰ میلی‌گرم + متیل هیدروکسی بنزوات ۱۲۰

میلی‌گرم.

موارد استعمال: اسهالهای عفونی و آمیبی.

مقدار مصرف و طرز استعمال: روزی ۳-۴ قاشق غذاخوری.

بسته‌بندی: سوسپانسیون ۱۲۰ میلی‌لیتر.

بها: ۵۹ ریال

DICHLOTRIDE

مرک شارپ انددوهم آمریکا - ایران

ترکیب: هیدروکلروتیازید ۵۰ میلی‌گرم

اثر متقابل: در بسیاری از بیماران مبتلا به بیماری قند که بوسیله داروهای هیپوگلیسمیک خوراکی بیماریشان تحت کنترل درآمده وقتی دیورتیک‌های گروه تیازیدی به رژیم داروئی آنان اضافه شود بیماری آنان از کنترل خارج میگردد.

موارد استعمال: خیزهای همراه با نارسائی‌های قلبی، بیماریهای کلیوی و کبدی، سندرم قبل از قاعدگی.

مقدار مصرف و طرز استعمال: روزی ۱-۲ بار، هربار ۱ قرص

موارد منع استعمال: آنوری

احتیاط: همراه با غذاهای سرشار از پتاسیم باید داده شود.

بسته‌بندی: قرص × ۲۵

بها: ۱۷۶ ریال

DICYNONE

واندر-سویس

ترکیب: در هرقرص یا آمپول دی‌هیدروکسی-۱ و ۴ بنزن سولفونات دی‌اتیل آمونیم = اتامسیلات ۲۵۰ میلی‌گرم

موارد استعمال: پیشگیری و درمان خونریزی‌ها

مقدار مصرف و طرز استعمال: در فوریت‌ها: ۱-۲ تزریق عضلانی یا وریدی قبل، حین یا بعد از جراحی. موارد معمولی: روزی ۳-۶ قرص ۱۵-۲۰ روز درماه

بسته‌بندی: قرص × ۲۰. آمپول × ۱۰۰

بها: قرص ۴۳۰ ریال. آمپول ۴۵۰۰ ریال

D

DIDROSULFON
شمی گرونتال
آلمان ـ تهران
شیمی ایران

ترکیب: در هرمیلی‌لیتر: دی هیدرو استرپتومایسین ۵ میلی‌گرم + سولفازومیدین ۵۰ میلی‌گرم + استات هیدروکورتیزون ۵ میلی‌گرم.

موارد استعمال: عفونتهای کیسه چشم، کیسه و مجاری اشکی و گوش و پیشگیری از سوزاك چشم در نوزادان.

مقدار مصرف و طرز استعمال: روزی ۳ بار هربار ۱-۲ قطره در چشم یا گوش چکانده شود.

موارد منع استعمال: حساسیت به استرپتومایسین یا سولفامیدها

احتیاط: بیشتر از ۳۰ قطره در روز نباید استعمال شود.

بسته‌بندی: قطره چشمی گوشی ۵ میلی‌لیتر

بها: ۲۷ ریال

DIENOESTROL CREAM
ارتو ـ انگلستان

ترکیب: هورمون استروژن ۰/۰۱ درصد

موارد استعمال: درمان واژینیتهای پیری و اتروفیک، خارش فرج، جماع دردناك، تورم اپیتلیوم واژن و ناحیه فرج بطور حاد، کاهش زیاد ضخامت اپیتلیوم واژن، جلوگیری و درمان چینها و خارش روی پوست شکم در دوران بارداری (ورژتور)، ازبین بردن لکهای صورت در دوره آبستنی و بعد از زایمان.

مقدار مصرف و طرز استعمال: روزی ۲ آپلیکاتور بمدت ۱۴ روز، مقدار نگهدارنده هفته‌ای ۲ آپلیکاتور بمدت ۲ ماه.

موارد منع استعمال: سرطان و مرحله پیش ازسرطان دستگاه تناسلی.

بسته‌بندی: کرم واژینال ۷۸ گرمی همراه با آپلیکاتور.

بها: ۱۲۸ ریال

DIETELMIN
برونو فرانسه ـ
فارماشیمی ایران

ترکیب: در هر ۱۰۰ گرم: آدیپات پیپرازین ۲۰ گرم + اسانس سیترون ۰/۱ گرم

موارد استعمال: اسکاریس واکسیور

مقدار مصرف و طرز استعمال: اسکاریس ـ درمان یک روزه: یک قاشق پیمانه داخل جعبه برای هرسال سن که جمعاً از ۱۲ قاشق تجاوز

نمیکند، روز بعد بهتر است یک مسهل نمکی تجویز گردد.
اکسیور - درمان سه روزه: هرروز نصف پیمانه داخل جعبه که جمعاً از ۶ قاشق تجاوز نمی کند. مقدار روزانه در چند قسمت مساوی در فواصل غذا جویده میشود.
بسته‌بندی: گرانول ۱۰۰ گرم
بها: ۷۰ ریال

DIFRAREL 100
شیره - فرانسه
ترکیب: بتا کاروتن ۵ میلی‌گرم + آنتی‌سیانوزید ۱۰۰ میلی‌گرم
موارد استعمال: چشم پزشگی: اختلالات گردش خون در شبکیه، بیماریهای غیرالتهابی شبکیه، اختلالات عروق شبکیه، نزدیک‌بینی و تظاهرات التهابی مشیمیه و شبکیه و شبکوری. شکنندگی مویرگها و اختلال در نفوذپذیری آنها. بیماریهای وریدی: واریس، نارسائی‌های وریدی، سنگینی ساق پا، زخمهای واریسی
مقدار مصرف و طرز استعمال: مقدار متوسط: روزی ۳ تا ۶ قرص. در موارد مختلف میتوان مقدار مصرف را افزایش داد. مقدار مصرف باید طبق تجویز پزشک باشد. قرصها را میتوان در فواصل غذا و یا در هنگام غذا خوردن جوید یا بلعید
بسته‌بندی: دراژه × ۲۰
بها: ۲۵۰ ریال

DIFRAREL E
شیره - فرانسه
ترکیب: ویتامین E ۰/۰۵ گرم + آنتوسیانوزید ۰/۰۵ گرم.
موارد استعمال: نزدیک‌بینی‌های پیش‌رونده که تجویز دارو مانع از کنده شدن رتین میشود.
مقدار مصرف و طرز استعمال: خردسالان: روزی ۲-۳ قرص ۱۰ الی ۱۵ روز در ماه. بزرگسالان: روزی ۳-۶ قرص ۱۵ روز در ماه.
بسته‌بندی: دراژه × ۲۴
بها: ۱۷۰ ریال

DI-GEL

ترکیب: سیمکتون ۲۵ میلی‌گرم + ژل هیدروکسید آلومینیم و منیزیم ۲۸۲ میلی‌گرم + هیدروکسید منیزیم ۸۵ میلی‌گرم.

اثر متقابل: ژل هیدروکسید آلومینیم با مقادیر درمانی از جذب تتراسیکلین ها از لوله گوارش جلوگیری کرده و در نتیجه میزان غلظت خونی این آنتی‌بیوتیک را کاهش میدهد ترکیبات منیزیم یا کلسیم نیز دارای همین واکنش هستند بنابراین از تجویز همزمان تتراسیکلین با آنتی‌اسیدهای محتوی آلومینیم و کلسیم و یا منیزیم باید خودداری کرد.

موارد استعمال: افزایش اسیدیته معدی

مقدار مصرف و طرز استعمال: هر ۲ ساعت ۲ قرص یا ۲ قاشق مرباخوری شربت بعد یا در فواصل غذاها

احتیاط: روزانه از ۲۰ قرص نباید تجاوز کند.

بسته‌بندی: قرص × ۱۰۰. شربت ۳۴۰ میلی‌لیتر

بها: قرص ۱۵۰ ریال. شربت ۱۳۵ ریال

DIGITALINE NATIVELLE

ناتیول ـ فرانسه

ترکیب: دیژیتالین

موارد استعمال: انواع نارسائیهای قلبی و دریچه‌ای، اختلال نظم و قدرت قلب، فیبریلاسیون، تاکیکاردی پاروکسیستیک.

مقدار مصرف و طرز استعمال: بطور متوسط روزی ۰/۶ میلی‌گرم.

موارد منع استعمال: برادیکاردی، طپش بطنی، اکستراسیستولهای منظم.

احتیاط: بمحض بروز علائم مسمومیت دیژیتالینی درمان باید قطع گردد.

بسته‌بندی: قرص ۰/۱ میلی‌گرم × ۴۰. قطره خوراکی یک در هزار ۰/۱ میلی‌گرم = ۵ قطره × ۱۰ میلی‌لیتر. آمپول وریدی ۰/۲ میلی‌گرم = ۱ میلی‌لیتر × ۶

بها: قرص ۳۰ ریال. قطره ۵۶ ریال. آمپول ۲۹ ریال.

DIGOXINE

ساندوز ـ سویس

ترکیب: در هرقرص: دیگوکسین متبلور که از تجزیهٔ آنزیمی لاناتوزید C حاصل میشود ۰/۲۵ میلی‌گرم.

هر ۳۰ قطره = ۱ میلی‌لیتر = ۰/۵ میلی‌گرم

اثر متقابل: مدرهائی که ایجاد اختلالات الکترولیتی بویژه هیپوکالمی میکنند منجر به مسمومیت با دیژیتال میگردند.

موارد استعمال: در کلیه موارد نارسائی قلبی و ازجمله در عوارضی که با ریتم طبیعی یا کند همراهند.

مقدار مصرف و طرز استعمال: درمان سریع (۲۴-۳۶ ساعته): بزرگسالان: روزی ۶-۱۰ قرص یا ۹۰-۱۵۰ قطره بدفعات مساوی تقسیم میشود. درمان کند (۳ تا ۵ روزه): بزرگسالان: روزی ۳-۶ قرص یا ۴۵-۹۰ قطره. ادامهٔ درمان: بزرگسالان: روزی ۱-۳ قرص یا ۲۵-۴۵ قطره. خردسالان: مقدار استعمال متوسط آن در اطفال ۰/۰۲۵ میلی‌گرم برای هر کیلوگرم از وزن بدن هر ۶ ساعت یکبار، و مقدار استعمال آن برای ادامهٔ درمان ۰/۰۲۵ میلی‌گرم برای هر کیلوگرم از وزن بدن در روز است.

بسته‌بندی: قرص × ۲۵. قطره ۱۰ میلی‌لیتر

بها: قرص ۴۸ ریال. قطره ۶۰ ریال

DIHYDERGOT

ساندوز سویس - پارس ایران

ترکیب: متان سولفونات دی هیدروارگوتامین ۱ میلی‌گرم.

موارد استعمال: میگرن و سردردهای مشابه (بین حملات)، سردردهای ناشی از پونکسیون لومبر و ضربه های مغزی، سندرم اورتوستاتیک (کاهش فشار اورتوستاتیک)، اختلالات تنوس عروقی، اوریون، زونا، تبخال، عوارض نامطلوبی که درنتیجهٔ مصرف تیمولپتیک‌ها و آرامبخش ها پیش میآید (طپش قلب، سرگیجه، عرق ناگهانی، خشکی دهان، سردرد) احتباس ادرار بعد از اعمال جراحی و زایمان.

مقدار مصرف و طرز استعمال: مقدار متوسط استعمال: روزی ۳ بار، هربار ۱-۳ قرص، ۰/۵ تا یک آمپول عضلانی یا ۱۰-۲۰ قطره.

بسته‌بندی: قطره ۱۵ میلی‌لیتر. قرص ۲/۵ میلی‌گرم × ۳۰ قطره هر میلی‌لیتر = ۲ میلی‌گرم × ۱۵ میلی‌لیتر. آمپول ۱ میلی‌لیتر = ۱ میلی‌گرم × ۶

بها: قطره ۱۵۸ ریال. قرص ۵۶۷ ریال. آمپول هرعدد ۱۴ ریال

D

DILANTIN
DILANTIN Phenobarbital
پارک دیویس
آمریکا ـ ایران

ترکیب: دیفنیل هیدانتوئین سدیم: در هر کپسول ساده ۱۰۰ میلی‌گرم. در هر ۵ میلی‌لیتر شربت ۱۲۵ میلی‌گرم. در هرویال: ۲۵۰ میلی‌گرم. در هر کپسول با فنوباربیتال: دیلانتین ۱۰۰ میلی‌گرم + فنوباربیتال نیم گرم.

موارد استعمال: صرع گراندمال، صرع پسیکوموتور، برخی از میگرنها، نورالژی تری ژومو، آریتمیهای قلبی.

مقدار مصرف و طرز استعمال: روزی ۲-۴ کپسول یا ۲-۴ قاشق مربا‌خوری شربت (حداکثر مصرف ۶۰۰ میلی‌گرم در روز است) آمپول روزی یک تزریق

موارد منع استعمال: حساسیت بدارو

احتیاط و عوارض جانبی: در صورت تمایل به‌جانشین نمودن دارو بجای سایر داروهای ضدصرع مانند بروموړها، فنوباربیتون‌ها و سایر داروها بایستی بتدریج از مصرف روزانه داروهای قبلی کاسته و بجای آنها بتدریج دیلانتین تجویز کرد. زیرا درصورت قطع ناگهانی داروهای قبلی ممکن است «حالت صرع» بوجود آید.

بسته‌بندی: کپسول ساده × ۱۰۰. کپسول فنوباربیتال × ۱۰۰، شربت ۱۲۰ میلی‌لیتر. آمپول × ۱.

بها: کپسول ساده ۱۱۷ ریال. کپسول فنوباربیتال ۱۱۲ ریال. شربت ۸۲ ریال. آمپول ۲۲۰ ریال

DILATOL
ترپون ـ آلمان

ترکیب: کلریدرات بوفنین.

موارد استعمال: اختلالات عروقی.

مقدار مصرف و طرز استعمال: روزی سه بار، هربار نصف قرص.

بسته‌بندی: قرص ۶ میلی‌گرم × ۲۰

بها: ۱۰۰ ریال

DILOMINE
DILOMINE P.B.
تولیدارو ـ ایران

ترکیب: در هرقرص یا قاشق مرباخوری: کلریدرات دیسیکلومین ۱۰ میلی‌گرم. .P.B علاوه بر مواد فوق فنوباربیتال ۱۵ میلی‌گرم.

موارد استعمال: کولون تحریک‌پذیر، کولیت توأم با اسهال و یبوست متناوب، اسپاسم مجاری صفراوی و پیلور، درد جهاز هاضمه در دوران زخم‌معده و اثنی‌عشر، فتق دیافراگماتیک، ازوفاژیت گاستریت.

مقدار مصرف و طرز استعمال: بزرگسالان: روزی ۳-۴ بار، هربار ۱-۲ دراژه یا ۱-۲ قاشق مرباخوری شربت. خردسالان: ۱ قرص یا ۱ قاشق مرباخوری شربت. نوزادان: نصف قاشق مرباخوری.

موارد منع استعمال: هیپرتروفی پروستات آتونی روده. کولیت‌های اولسراتیو.

بسته‌بندی: دراژه × ۳۰. دراژه × ۳۰. شربت ۶۰ میلی‌لیتر.

بها: دراژه ساده ۷۶ ریال. .P.B۸۲ ریال. شربت ۵۹ ریال

DILOSYN
بی‌دی‌اچ انگلستان ـ داروپخش ایران

ترکیب: کلریدرات متدیلازین.

موارد استعمال: نورودرماتیت، اکزماآتوپیک، درماتیت تماسی، تب یونجه، کهیر.

مقدار مصرف و طرز استعمال: هر ۱۲ ساعت یک قرص.

عوارض جانبی: خواب‌آلودگی.

بسته‌بندی: قرص ۸ میلی‌گرم × ۲۵

بها: ۷۶ ریال.

DIMEDROL
مدکسپورت ـ شوروی

ترکیب: کلریدرات دیفن هیدرامین ۵ سانتی‌گرم

موارد استعمال: درمان کهیر، تب یونجه، بیماری سروم، ادم کوئینک، درماتوزهای خارش‌دار، ابریدوسیکلیت حاد، کونژونکتیویت آلرژیک.

مقدار مصرف و طرز استعمال: روزی ۱-۳ بار، هربار ۱ قرص.

عوارض جانبی: سبب بی‌حسی موضعی کوتاه میگردد که پس از قطع

دارو یا کاهش مقدار آن بسرعت ازبین میرود، بهتر است دارو دوساعت قبل از خواب به بیمار داده شود.

بسته‌بندی: قرص × ۱۲.

بها: ۲۸ ریال

DIMELOR

لی‌لی – آمریکا

ترکیب: در هرقرص: استوهگزامید ۵۰۰ میلی‌گرم.

اثر متقابل: ممکنست عمل هیپرگلیسمیک استوهگزامید با تجویز توأم فنیل بوتازون تشدید شود. در اینحالت کاهش مقدار استو-هگزامید توصیه میشود. این نکته درمورد سولفامیدهای ضد-میکروبی و پروبنسید نیز ممکن است صادق باشد.

موارد استعمال: دیابت پایدار بزرگسالان.

مقدار مصرف و طرز استعمال: ۲۵۰ میلی‌گرم تا ۱/۵ گرم برحسب شدت بیماری.

موارد منع استعمال: دیابت‌های ناپایدار جوانان و دیابت وخیم، اسیدوز، ستوز، اغما، اعمال جراحی، دوران حاملگی.

احتیاط و عوارض جانبی: اختلالات گوارشی (تهوع، احساس سنگینی و سوزش دل)، تظاهرات آلرژیک جلدی (خارش، کهیر، بثورات موربیلفرم یا ماکولوپاپولر) ممکن است بروز کند، چنانکه واکنش جلدی ادامه یابد باید دارو قطع شود. درافراد مسن یا کسانی که دچار الکلیسم حاد یا نارسائی سورنال و هیپوفیز باشند باید با احتیاط مصرف گردد.

زیاده‌روی در مصرف: تجویز محلول ۱۰ تا ۵۰ درصد گستروز قابل توصیه است تا وقتیکه تمایل به هیپوگلیسمی ازبین برود.

بسته‌بندی: قرص × ۵۰

بها: ۱۵۰ ریال

DIMENFOR MON

ارگانون – ایران

ترکیب: بنزوات استرادیول

موارد استعمال: اختلالات قاعدگی زایمان و عوارض بعد ازآن، اختلالات عروق محیطی سرطان و هیپرتروفی پروستات.

مقدار مصرف و طرز استعمال: روزی ۰/۱ تا ۵ میلی‌گرم برحسب نوع و شدت بیماری.

بسته‌بندی: آمپول ۵ میلی‌لیتر = ۱ میلی‌گرم × ۳

بها: ۵۳ ریال.

DIMER-X

آندره گربه ـ فرانسه

ترکیب: متیل گلوکامینو کارمات ۳/۰۲ گرم + کلسیم دی‌سدیم ادتات ۰/۰۰۰۵ گرم + سدیم دی هیدروژن فسفات ۰/۰۰۰۷ گرم + سدیم سولفیت ۰/۰۰۰۵ گرم (غلظت ید ۵۰ درصد).

موارد استعمال: رادیوگرافی لومبوساکره.

بسته‌بندی: آمپول ۵ میلی‌لیتر × ۱

بها: ۳۳۰ ریال

DIMETANE

رابینز ـ آمریکا

ترکیب: بروم فنیرآمین مالئات

موارد استعمال: زکام موسمی، اورام ملتحمه و آنژیونوروتیک، خارشهای مختلف، رینیت، اکزمای جلدی، کهیر، درماتیت، آسم، سرماخوردگی.

مقدار مصرف و طرز استعمال: روزی ۳ـ۴ قرص. الیگزیر: روزی ۳ـ۴ بار، هربار ۲ـ۴ قاشق مرباخوری یا ۱ـ۲ اکستنتاب در روز.

موارد منع استعمال: مثل تمام آنتی هیستامین ها در دوران حاملگی

عوارض جانبی: خواب‌آلودگی، بیحالی، تهوع، گیجی، میدریاز

بسته‌بندی: قرص ۴ میلی‌گرم × ۳۰، اکستنتاب ۱۲ میلی‌گرم × ۶، الیگزیر ۲ انسی (۲ میلی‌گرم در هرقاشق مرباخوری)

بها: قرص ۷۰ ریال. اکستنتاب ۲۳۰ ریال. شربت ۱۰۵ ریال.

DIMETANE Expectorant

رابینز ـ آمریکا

ترکیب: بروم فنیرآمین مالئات ۲ میلی‌گرم + گلیسریل گایاکولات ۱۰۰ میلی‌گرم + فنیل افرین ۵ میلی‌گرم + فنیل پروپانولامین ۵ میلی‌گرم.

موارد استعمال: سرفه های تحریکی و آلرژیک.

مقدار مصرف و طرز استعمال: خردسالان: روزی ۳ـ۴ بار، هربار ۰/۵ ـ

۱ قاشق مرباخوری. بزرگسالان: روزی ۴ بار، هربار ۱-۲ قاشق مرباخوری.

موارد منع استعمال: بیماران مبتلا به فشارخون، امراض قلبی، و امراض عروقی محیطی.

بسته‌بندی: شربت ۲ اونس

بها: ۷۰ ریال.

DIMETAPP EXTENTABS

روبینز ـ آمریکا

ترکیب: دیمتان ۱۲ میلی‌گرم + کلریدرات فنیل افرین ۱۵ میلی‌گرم + کلریدرات فنیل پروپانولامین ۱۵ میلی‌گرم.

موارد استعمال: سرماخوردگیها، آسم برونشیک، آلرژیهای فصلی، سینوزیت، اورام ملتحمه چشمی، اوتیت.

مقدار مصرف و طرز استعمال: روزی دوبار، هربار یک قرص.

موارد منع استعمال: مانند کلیه آنتی هیستامین ها در دوران آبستنی نباید مصرف شود.

بسته‌بندی: قرص × ۳۰

بها: ۲۵۰ ریال.

DIONINE

پ. او. اس فرانسه ـ دوپار ایران

ترکیب: در هر ۱۰۰ میلی‌لیتر: کلریدرات دیونین.

موارد استعمال: مسکن درد و تقویت کننده جریان خون و لنف در چشم.

مقدار مصرف و طرز استعمال: روزی چند بار، هربار ۱-۲ قطره.

بسته‌بندی: قطره چشمی ۱۰ میلی‌لیتر

بها: ۲ درصد ۶۴ ریال، ۱ درصد ۶۱ ریال.

DIONOSYL

گلاکسو انگلستان ـ داروپخش ایران

ترکیب: دیونوزیل

موارد استعمال: کلیه طرق معمولی برونکوگرافی.

مقدار مصرف و طرز استعمال: معمولا سه‌چهارم تا ۱ میلی‌لیتر برای هرسال سن.

احتیاط: مصرف دارو نباید از ۱۲ تا ۱۸ میلی‌لیتر تجاوز کند.

بسته‌بندی: سوسپانسیون روغنی ۶۰ درصد و آبی ۵۰ درصد × ۲۰ میلی‌لیتر
بها: ۱۷۰ ریال.

DIPASIC
ادوارد ژستلیخ – سویس

ترکیب: اسید ایزونیکوتینیک پارا-آمینوسالیسیلات ۱۰۰ میلی‌گرم.
موارد استعمال: سل ریوی، سل دستگاه تنفسی، مننژیت سلی، سل پوست، استخوانها و مفاصل.
مقدار مصرف و طرز استعمال: خردسالان: روزی ۲-۴ قرص بازاء هر ۱۰ کیلو وزن. برحسب احتیاج بمقادیر بیشتری میتوان داد. بزرگسالان: روزی ۱-۲ قرص بازاء هر ۱۰ کیلو وزن. شیمیو-پروفیلاکسی: روزی ۱۰-۱۵ میلی‌گرم برای هر ۱۰ کیلو وزن.
بسته‌بندی: قرص × ۱۰۰
بها: ۱۷۰ ریال.

DIPHENTORAL
ویرا – ایران

ترکیب: کلریدرات دیفن هیدرامین ۳۰۰ میلی‌گرم + کلرور امونیوم ۳ گرم + سیترات سدیم ۱/۱ گرم + کلروفرم ۴۳۰ میلی‌گرم + مانتول ۲۴ میلی‌گرم + اتانول ۶ گرم + شربت ساده تا ۱۲۰ میلی‌لیتر.
موارد استعمال: سرفه‌های ناشی از سرما خوردگی، سرفه‌های آلرژیک.
مقدار مصرف و طرز استعمال: هر ۳ ساعت ۱-۲ قاشق مرباخوری.
بسته‌بندی: شربت ۱۲۰ میلی‌لیتر.
بها: ۴۵ ریال.

DIPHTHERIA Antitoxin
برنا – سویس

ترکیب: از سرم اسب هائیکه بوسیله آناتوکسین دیفتری مصون گردیده‌اند بدست میآید.
موارد استعمال: پیشگیری و درمان بیماری دیفتری.
مقدار مصرف و طرز استعمال: پیشگیری: برحسب سن بیمار ۱۰۰۰ تا ۲۵۰۰ واحد زیرجلدی. درمان: در موارد خفیف ۵ هزار تا ۱۰ هزار واحد، موارد متوسط ۱۰ هزار تا ۲۰ هزار. در موارد وخیم ۲۰ هزار تا ۴۰ هزار.

D

موارد منع استعمال: حساسیت به‌سروم

مصرف در دوران بارداری: ممنوع است.

بسته‌بندی: ۱۰ هزارواحدی ۲/۵ میلی‌لیتر. ۲۰ هزار واحدی ۵ میلی‌لیتر. ۴۰ هزارواحدی ۱۰ میلی‌لیتر.

بها: ده هزارواحدی ۲۰۰ ریال. ۲۰ هزارواحدی ۳۶۰ ریال. ۴۰ هزار واحدی ۶۳۰ ریال.

DIPRO Oleosom
DIPRO Emoltion
ارگانون هلند ـ ایران

ترکیب: در هرمیلی‌لیتر: بنزوات استرادیول ۲/۵ میلی‌گرم + پروژسترون ۱۲/۵ میلی‌گرم.

موارد استعمال: آمنوره اولیه و ثانویه، هیپومنوره، الیگومنوره.

مقدار مصرف و طرز استعمال: یک آمپول دو روز متوالی درعضله تزریق میشود.

موارد منع استعمال: سرطان پستان و دستگاه تناسلی، ضایعات ترومبوآمبولی، بیماریهای شدید کبدی.

احتیاط: دی پروامولسیون برای تشخیص بارداری تجویز نمیشود.

عوارض جانبی: ناراحتیهای گوارشی، افزایش وزن، حساسیت پستان

بسته‌بندی: آمپول ۱ میلی‌لیتر × ۲

بها: الئوزوم ۷۶ ریال. امولسیون ۷۰ ریال

DIREXIODE
دلالاند ـ فرانسه

ترکیب: در هرقرص ۵ و ۷ ـ دی یدو ـ ۸ ـ ئیدروکسی کینولئین ۰/۲۱ گرم.

موارد استعمال: اسهال خونی آمیبی، مسمومیت‌های غذائی، عفونتهای دستگاه گوارش، کلیت‌ها

مقدار مصرف و طرز استعمال: خردسالان: برحسب سن متغیر است.
بزرگسالان: روزی ۴ـ۸ قرص، بمدت ۱۰ تا ۲۰ روز.

بسته‌بندی: قرص × ۱۰۰

بها: ۱۳۶ ریال

Di Te Anatoxal
برنا ــ سویس

ترکیب: توکسین فرمله یا آناتوکسین تصفیه شده میکربهای دیفتری و کزاز.

موارد استعمال: ایجاد مصونیت آکتیو در مقابل بیماریهای دیفتری و کزاز.

مقدار مصرف و طرز استعمال: دو تزریق زیرجلدی و یا داخل عضلانی بفاصله یکماه.

بسته‌بندی: آمپول ۰/۵ میلی‌لیتر × ۲

بها: ۷۱ ریال

Di Te Per ANATOXAL
برنا ــ سویس

ترکیب: در هرمیلی‌لیتر: آنتی‌ژن دیفتری ۵۰ واحد + آنتی‌ژن نوار ۶۰ واحد + ۴ میلیارد بوردتلا

موارد استعمال: ایجاد مصونیت در برابر بیماریهای دیفتری، کزاز، سیاه‌سرفه.

مقدار مصرف و طرز استعمال: ۳ تزریق زیرجلدی عضلانی بفواصل ۳-۵ هفته تا دوسالگی بمقدار ۰/۵ میلی‌لیتر در ۳ نوبت و نوبت چهارم در ۳-۱۲ سالگی.

موارد منع استعمال: تبهای شدید.

بسته‌بندی: آمپول ۰/۵ میلی‌لیتر × ۳

بها: ۷۶ ریال

Di Te Tab Vaccinc
برنا ــ سویس

ترکیب: در هرمیلی‌لیتر: آناتوکسین دیفتری LF ۵۰ + آناتوکسین کزاز LF ۱۵ + سالمونلاتیفی ۶۰۰ میلیون + سالمونلا پاراتیفی A و سالمونلا پاراتیفی B هریک ۲۰۰ میلیون.

موارد استعمال: ایجاد مصونیت در مقابل بیماریهای دیفتری، کزاز، حصبه و شبه حصبه آ و ب

مقدار مصرف و طرز استعمال: سه تزریق زیرجلدی یا داخل عضلانی بفواصل ۳-۵ هفته. خردسالان: تا سن ۷ سالگی ۰/۵ میلی‌لیتر سه مرتبه، تا سن ۱۶ سالگی دو تزریق ۰/۵ میلی‌لیتر و یک تزریق ۱ میلی‌لیتر. بزرگسالان: یک تزریق ۰/۵ میلی‌لیتر و دو

تزریق ۱ میلی‌لیتر.
موارد منع استعمال: تب های شدید.
عوارض جانبی: ممکن است محل تزریق کمی متورم، قرمز و دردناک شده و یک تا دو روز ادامه یابد و ممکن است تب و سردرد نیز بآن اضافه شود.
بسته‌بندی: آمپول ۰/۵ و ۱ میلی‌لیتر × ۳
بها: ۵۵ ریال

DOCA
ارگانون هلند ـ ایران

ترکیب: استات دزوکسی کورتیکوسترون
موارد استعمال: آدیسون، جلوگیری از دزئیدراتاسیون
مقدار مصرف و طرز استعمال: روزی ۲ تا ۱۰ میلی‌گرم تزریق عضلانی
موارد منع استعمال: هیپرتانسیون، خیز، فعالیت زیاد غده سورنال
بسته‌بندی: آمپول‌های ۵ و ۱۰ میلی‌گرم × ۴
بها: ۵ میلی ۵۳ ریال، ۱۰ میلی ۵۹ ریال

DOCABOLIN
ارگانون هلند ـ ایران

ترکیب: فنیل پروپیونات دزوکسی کورتیکوسترون ۱۰ میلی‌گرم + فنیل پروپیونات ناندرولون ۲۵ میلی‌گرم.
موارد استعمال: آستنی هیپوتانسیو، سوختگیها، توکسیکوزانفانتیل
مقدار مصرف و طرز استعمال: هفته‌ای یک آمپول عضلانی به‌مدت یکماه.
موارد منع استعمال: هیپرتانسیون، بیماریهای قلبی و کلیوی، آبستنی، سرطان پرستات، ادم.
عوارض جانبی: اختلالات دوره ماهیانه، خیز، پیدایش علایم مردی
بسته‌بندی: آمپول ۱ میلی‌لیتر × ۱
بها: ۱۰۵ ریال

DOGMATIL FORT
دلاگرانژ ـ فرانسه

ترکیب: (اتیل اپیرولی دی‌نیل ـ ۲) سولفاموئیل ـ ۵ بنزامید (سولپیرید)
موارد استعمال: دپرسیون، مالیخولیا، شیزوفرنی حاد، الکلیسم حاد.

D

مقدار مصرف و طرز استعمال: برحسب نوع و شدت بیماری متفاوت است

بسته‌بندی: قرص ۲۰۰ میلی‌گرم × ۱۲. شربت ۲۵ میلی‌گرم = ۵ میلی‌لیتر × ۲۰۰ میلی‌لیتر. آمپول ۱۰۰ میلی‌گرم = ۲ میلی‌لیتر × ۶.

بها: قرص ۶۰۰ ریال. شربت ۲۹۰ ریال. آمپول ۲۰۰ ریال.

DOLO - ADAMON

آستا ـ آلمان

ترکیب: نورآمیدازوفن ۲۵۰ میلی‌گرم + فسفات کدئین ۱۵ میلی‌گرم + اسید ۵ ـ اتیل ـ ۵ ـ کروتیل باربیتوریک ۵۰ میلی‌گرم + برمور سیکلونی ۱۰ میلی‌گرم در هرمیلی‌لیتر آمپول: نورآمیدازون ۵۰۰ میلی‌گرم + برمورسیکلونی ۵ میلی‌گرم.

موارد استعمال: دردهای روده و معده، دردهای بعد از جراحی، دیسمنوره، میگرن، دردهای عروقی.

مقدار مصرف و طرز استعمال: روزی ۱ ـ ۲ بار، هربار ۱ قرص یا یک تزریق داخل عضلانی یا داخل وریدی.

موارد منع استعمال: گلوکوم، هیپرتروفی پروستات، گرانولوسیتوپنی، تاکی کاردی

بسته‌بندی: قرص × ۲۰، آمپول × ۵

بها: قرص ۱۵۶ ریال. آمپول ۲۴۵ ریال

DOLO - NEUROBION

مرک ـ آلمان

ترکیب: آمپول شماره I (۲ میلی‌لیتر): ویتامین B_1 ۱۰۰ میلی‌گرم + ویتامین B_6 ۱۰۰ میلی‌گرم + ویتامین B_{12} ۱۰۰۰ میکروگرم + پروکائین کلریدرات ۵۰ میلی‌گرم، آمپول شماره II (۱ میلی‌لیتر): متامیزول ۵۰۰ میلی‌گرم. دراژه: ویتامین B_1 ۵۰ میلی‌گرم + ویتامین B_6 ۱۰۰ میلی‌گرم + ویتامین B_{12} ۱۰۰ میلی‌گرم + متامیزول ۲۵۰ میلی‌گرم.

موارد استعمال: نوریت و نورالژیهای حاد و دردناک، سیاتیک، بعد از جراحی دیسک بین مهره‌ای، زونا، رادیکولیت‌های با مبدأ ضایعات دژنراتیو.

مقدار مصرف و طرز استعمال: مخلوط آمپول I و II عمیقاً داخل عضله سرینی تزریق می‌گردد. در موارد حاد و شدید روزی یک تزریق

و در موارد ساده‌تر ۲-۳ تزریق در هفته یا روزی ۳ تا ۶ قرص

بسته‌بندی: آمپول × ۳ (I+II) قرص × ۲۰

بها: آمپول ۲۶۰ ریال. قرص ۱۹۸ ریال.

DOLOXENE COMPOUND
لی‌لی-آمریکا

ترکیب: دکستروپروپوکسی‌فن ۶۵ میلی‌گرم + اسید استیل سالیسیلیک ۲۲۷ میلی‌گرم + کافئین ۳۲/۴ میلی‌گرم + فناستین ۱۶۲ میلی‌گرم.

موارد استعمال: ضد درد در تمام اشکال دردهای حاد و مزمن.

مقدار مصرف و طرز استعمال: روزی ۳ تا ۴ بار، هربار یک کپسول

موارد منع استعمال: دوران آبستنی.

احتیاط: بیمارانی که مدت طولانی آنالژزیک دیگری مصرف کرده و بآن عادت پیدا نموده‌اند جانشین کردن دولوکسن بطور ناگهانی بجای آن ممکن است موجب بروز علائم اعتیاد گردد.

بسته‌بندی: کپسول × ۲۰

بها: ۶۴ ریال.

DOLVIRAN
بایر آلمان-ایران

ترکیب: قرص و شیاف بزرگسالان: سالیسیلامید ۲۰۰ میلی‌گرم + فناستین ۲۰۰ میلی‌گرم + کافئین ۵۰ میلی‌گرم + کدئین فسفات ۱۰ میلی‌گرم + لومینال ۲۵ میلی‌گرم. شیاف خردسالان: بترتیب ۱۰۰ میلی‌گرم + ۱۰۰ میلی‌گرم + ۲/۵ میلی‌گرم + ۵ میلی‌گرم + ۳۰ میلی‌گرم. شیاف شیرخواران: بترتیب ۵۰ میلی‌گرم + ۵۰ میلی‌گرم + ۱/۲۵ میلی‌گرم + ۲/۵ میلی‌گرم + ۱۵ میلی‌گرم.

موارد استعمال: سردرد، میگرن، نورالژی، تب ناشی از سرماخوردگی و بیماریهای عفونی، نوریت، دردهای بعد از عمل جراحی.

مقدار مصرف و طرز استعمال: بزرگسالان: روزی ۲-۳ بار، هربار ۱-۲ قرص. روزی یک تا چند شیاف. خردسالان: یک تا چند شیاف خردسالان. شیرخواران: روزی ۱-۲ شیاف شیرخواران.

بسته‌بندی: قرص × ۱۰۰. شیاف × ۵.

بها: قرص ۳۲۸ ریال. شیاف بزرگسالان: ۳۵ ریال، خردسالان ۴۹

ریال، شیرخواران ۳۸ ریال.

DONAZYME
رابینز ـ آمریکا

ترکیب: در هرقرص: پانکراتین ۳۰۰ میلی‌گرم + پپسین ۱۵۰ میلی‌گرم + صفرا ۱۵۰ میلی‌گرم + سولفات هیوسیامین ۰/۰۵۱۸ میلی‌گرم + سولفات آتروپین ۰/۰۰۹۷ میلی‌گرم + برمیدرات هیوسین ۰/۰۰۳۳ میلی‌گرم + فنوباربیتال ۸/۱ میلی‌گرم.
موارد استعمال: تشنج، دردهای معدی، سوء هاضمه
مقدار مصرف و طرز استعمال: روزی ۳ بار، هربار ۲ قرص بعد از غذا.
بسته‌بندی: قرص × ۳۰
بها: ۱۷۰ ریال

DONNAGEL - PG
رابینز ـ آمریکا

ترکیب: در هراونس: گرد تریاك ۲۴ میلی‌گرم + کائولن ۶ گرم + پکتین ۱۴۲/۸ میلی‌گرم + هیوسیامین سولفات ۰/۱۰۳۷ میلی‌گرم + آتروپین سولفات ۰/۰۱۹۴ میلی‌گرم + هیوسین هیدرو-برومید ۰/۰۰۶۵ میلی‌گرم.
موارد استعمال: اسهالهای حاد و نامشخص، استفراغ.
مقدار مصرف و طرز استعمال: خردسالان: ۱-۲ قاشق مرباخوری بعد از هراجابت مزاج. بزرگسالان: ۱-۲ قاشق غذاخوری.
موارد منع استعمال: گلوکوم حاد، بیماریهای کلیوی یا کبدی شدید.
عوارض جانبی: خشکی دهان و تاری دید.
بسته‌بندی: سوسپانسیون ۴ اونسی.
بها: ۱۲۰ ریال.

DONNATAL
رابینز ـ آمریکا

ترکیب: هرقرص یا هر ۵ میلی‌لیتر الیگزیر: فنوباربیتال ۱۶/۲ میلی‌گرم + سولفات هیوسیامین ۰/۱۰۳۷ میلی‌گرم + سولفات آتروپین ۰/۰۱۹۴ میلی‌گرم + هیدروبرمور هیوسین ۰/۰۰۶۵ میلی‌گرم. در هرقرص اکستنتاب: فنوباربیتال ۴۸/۶ میلی‌گرم + هیوسیامین سولفات ۰/۳۱۱۱ میلی‌گرم + سولفات آتروپین ۰/۰۵۸۲ میلی‌گرم + هیوسین هیدروبروماید ۰/۰۹۵ میلی‌گرم.
موارد استعمال: اسپاسم مری و پیلور، تهوع، استفراغ، گاستریتها،

زخم معده و اثنی‌عشر، هیپراسیدیته، سوء هاضمه، نفخ، اسپاسم ناشی از کولیت، اولسر و یبوست، سیستیت، دیسمنوره، ازدیاد فشار خون.

مقدار مصرف و طرز استعمال: روزی ۳-۴ بار، هربار ۱-۲ قرص یا ۱ قاشق مرباخوری الیگزیر.

موارد منع استعمال: گلوکوم، بیماریهای پیشرفته کلیوی یا کبدی.

عوارض جانبی: تاری دید، خشکی دهان.

بسته‌بندی: قرص × ۳۰. الیگزیر ۲ اونسی. قرص اکستنتاب × ۱۵

بها: قرص ۶۰ ریال. الیگزیر ۱۰۰ ریال. اکستنتاب ۹۰ ریال

DOPAMET
دومکس- دانمارک

فارماکولوژی: درمان فشار خون

ترکیب: لوو ۳-(۳ و ۴ دی هیدروکسی فنیل)-۲-متیل آلانین (اِل- آلفا-متیل دوپا).

مکانیسم: با عمل رقابتی از تبدیل دوپامین به نور آدرنالین جلوگیری کرده و بجای آن متیل نور آدرنالین ترشح میشود.

موارد استعمال: فشار خون اصلی، فشار خون نفروژنیک

مقدار مصرف و طرز استعمال: روزی ۲ بار، هربار ۰/۵-۱ قرص

موارد منع استعمال: هپاتیت حاد، سیروز کبدی، فئوکروموسیتوم، حساسیت بدارو، دوران شیردهی، دوران آبستنی.

عوارض جانبی: خشکی دهان و مخاط بینی، گاهی عوارض معدی-روده‌ای، سرگیجه، سردرد، بثورات جلدی، افزایش وزن، ادم.

احتیاط: سابقه بیماریهای کبدی و اختلالات مغزی، درصورت بروز آنمی همولیتیک درمان باید قطع شود.

بسته‌بندی: قرص ۲۵۰ میلی‌گرم × ۲۴

بها: ۲۹۰ ریال

DOPRAM
رابینز-آمریکا

ترکیب: کلریدرات دوکساپرام.

موارد استعمال: محرك تنفسی پس از اعمال جراحی، تسریع و برگشت رفلکس های حنجره‌ای-حلقی

مقدار مصرف و طرز استعمال: برحسب نوع و مقدار داروهای بیهوشی و فاصله بیهوشی تا تزریق دارو. ۰/۵ تا ۴ میلی‌گرم در دقیقه تزریق داخل وریدی.
بسته‌بندی: فلاکن ۲۰ میلی‌گرم در هرمیلی‌لیتر × ۲۰ میلی‌لیتر.
بها: ۸۰۰ ریال

DOREVANE
کلن بیلا فرانسه ـ فارماشیمی ایران

ترکیب: مالئات پروپیلون-۳ (دی‌متیل آمین - پروپیل) - ۱۰ تیودی فنیل آمین ۰/۱ گرم + بنزوات پروپیل ئیدروکسی -۴- ۰/۰۳۵ گرم + بنزوات متیل ۴ ئیدروکسی ۰/۰۶۵ گرم.
موارد استعمال: بیخوابیها، اضطرابات، لکنت زبان، خستگی اعصاب.
مقدار مصرف و طرز استعمال: بزرگسالان: روزی ۲ -۴ قاشق غذاخوری.
خردسالان: روزی ۲ -۵ قاشق مرباخوری.
بسته‌بندی: شربت ۵۰ میلی‌لیتر
بها: ۵۹ ریال.

DORITAL
بهرینگرمانهایم آلمان ـ تهران‌شیمی ایران

ترکیب: در هرقرص: بیسموت آلومینیوم ئیدروکسید کربنات ۵۰ میلی‌گرم + کربنات منیزیم بازیک ۵۰ میلی‌گرم + کربنات کلسیم ۵۰ میلی‌گرم + گلیکوکول ۱۰۰ میلی‌گرم + هیدروکسید آلومینیوم گلیسینات ۱۰۰ میلی‌گرم + ژل هیدروکسید آلومینیوم ۱۵۰ میلی‌گرم.
موارد استعمال: سوزش معده، گاستریتهای حاد و مزمن، زخم معده و اثنی‌عشر
مقدار مصرف و طرز استعمال: یک قرص نیمساعت قبل یا بلافاصله بعد از غذا می‌مکند.
بسته‌بندی: قرص × ۲۰
بها: ۴۷ ریال

DOXERGAN
اسپسیا ـ فرانسه

ترکیب: کلریدرات ۱۰ -(دی‌متیل آمینو ۲ -متیل پروپیل) فنو- تیازین ۵ و ۵ دی‌اکسید ـ اکسوممازین.

موارد استعمال: بثورات آلرژیک، ورم کوئینک، اریتما، عوارض داروئی، رینیت آلرژیک، آسم، گاستر آلرژی پیروزیس، انواع سرفه ها.

مقدار مصرف و طرز استعمال: روزی ۲ ـ ۸ قاشق چایخوری.

موارد منع استعمال: حساسیت بدارو

عوارض جانبی: مانند سایر فنوتیازین ها خواب‌آلودگی.

بسته‌بندی: شربت ۱۲۵ میلی‌لیتر.

بها: ۷۵ ریال

DOXIUM
اوام ـ فرانسه

ترکیب: کلسیم ۲، ۵ ـ دی هیدروکسی بنزن سولفونات

موارد استعمال: کلیه نارسائی‌های عروقی.

مقدار مصرف و طرز استعمال: روزی ۲ بار، هربار یک قرص همراه با غذا

مصرف در آبستنی: ممنوع است.

بسته‌بندی: قرص ۲۵۰ میلی‌گرم × ۲۰

بها: ۴۲۰ ریال

DPT Vaccine
هوخست ـ آلمان

ترکیب: در هرمیلی‌لیتر: توکسوئید دیفتری ۵۰ واحد + توکسوئید کزاز ۵۰ واحد + میکروب غیرفعال سیاه‌سرفه $10^9 \times 30$ + ماده نگهدارنده (تیوسید) ۰/۰۶ میلی‌گرم.

موارد استعمال: ایجاد مصونیت در مقابل دیفتری، کزاز و سیاه‌سرفه.

مقدار مصرف و طرز استعمال: در تمام ایام سال از سه‌ماهگی در اطفال قابل استفاده است. واکسیناسیون با یک آمپول نیم میلی‌لیتر انجام میشود و ۴ـ۶ هفته بعد یادآوری تجدید میگردد.

موارد منع استعمال: درعفونت‌های حاد و بیماریهای مزمن.

احتیاط و عوارض جانبی: در محل تزریق گاهی تورم، قرمزی و نیز تب عمومی دیده میشود.

بسته‌بندی: آمپول ۰/۵ میلی‌لیتر × ۳

بها: ۵۰ ریال

DRAMAMINE
سرل انگلستان ـ پارس ایران

D

ترکیب: دیمن هیدرینات ۵۰ میلی‌گرم.

موارد استعمال: درمان علامتی تهوع، استفراغ و سرگیجه بخصوص هنگام مسافرت سندرم منیر، هیپرتانسیون، لابیرنتیت، تابش اشعه، هنگام درمان با آنتی‌بیوتیک‌ها، نارکوتیک‌ها و سایر داروهای سرگیجه‌آور، میگرن.

مقدار مصرف و طرز استعمال: خردسالان ۱ـ۶ساله روزی ۲ـ۳ بار، هربار ربع تا نصف قرص. ۶ـ۱۲ ساله: روزی ۲ـ۳ بار، هربار نصف تا ۱ قرص. ۱۲ سال به بالا روزی ۲ـ۳ بار، هربار ۱ـ۲ قرص.

بسته‌بندی: قرص × ۶

بها: ۱۸ ریال

DRIXORAL
شرینگ ـ آلمان

ترکیب: هرقرص: دکس بروم فنیرامین مالئات ۶ میلی‌گرم + ایزو- افدرین سولفات ۱۲۰ میلی‌گرم.

موارد استعمال: آلرژیهای فصلی و یا دائمی بینی، رینیت حاد و رینو- سینوزیت و انسداد شیپور استاش.

مقدار مصرف و طرز استعمال: بزرگسالان و خردسالان بزرگتر از ۱۲ سال: هر ۱۲ ساعت یک قرص. در موارد استثنائی یک قرص هر ۸ ساعت یکبار.

موارد منع استعمال: خردسالان کوچکتر از ۱۲ سال.

احتیاط: در دوران آبستنی با احتیاط مصرف شود.

بسته‌بندی: قرص × ۱۰۰

بها: هرقرص ۹ ریال

DROXARYL
کنتینانتال فارما ـ بلژیک

ترکیب: اسید پارابوتوکسی فنیل استید روکسامیک = (بوفکساماك)

موارد استعمال: پلی‌آرتریت روماتوئید، آرتروز، بورسیت، تاندنیت.

مقدار مصرف و طرز استعمال: بزرگسالان: روزی ۳ بار، هربار ۲ قرص همراه با یک شیاف در موقع خواب. خردسالان: روزی ۳ بار، هربار یک قرص بمیزان ۲۵ میلی‌گرم برای هر کیلو وزن بدن.

بسته‌بندی: قرص ۲۵۰ میلی‌گرم × ۵۰، آمپول × ۵، شیاف ۱ گرم × ۱۲

بها: قرص ۱۵۵ ریال. آمپول ۱۰۰ ریال. شیاف ۲۴۰ ریال.

D

DULCOLAX
بهرینگر اینگلهایم آلمان
- تولیدارو ایران

ترکیب: (۴، ۴َ-دی استوکسی-دی فنیل)-(پیریدیل-۲) متان = بیساکودیل

موارد استعمال: یبوست های عادتی، یبوست های اتونیک و دیسکنتیک، یبوست های حاصله دراثر بستری بودن، تغییر رژیم غذائی و محیط زندگی، برای آماده نمودن و درمان بیماران قبل و بعد از اعمال جراحی، جهت سهولت اجابت مزاج در بیماران مبتلا به بواسیر و شقاق، جهت تخلیه روده‌ها و غیره قبل از رادیوگرافی و رادیوسکپی.

مقدار مصرف و طرز استعمال: دوز معمولی ۲ دراژه و یا یک شیاف.

احتیاط: همزمان با خوردن دارو قرص آنتی اسید نبایستی مصرف شود.

بسته‌بندی: دراژه ۵ میلی‌گرم × ۳۰ شیاف ۱۰ میلی‌گرم × ۶. شیاف خردسالان ۵ میلی‌گرم × ۶.

بها: دراژه و شیاف بزرگسالان ۴۹ ریال. شیاف خردسالان ۳۵ ریال.

DUPHASOL A
فیلیپس هلند-
تولیدارو ایران

ترکیب: در هر قرص: ویتامین A ۵۰ هزار واحد

موارد استعمال: هیپرکراتوز پوستی، شبکوری، خشکی و پوسته شدن پوست، عدم مقاومت بدن در برابر عفونتها.

مقدار مصرف و طرز استعمال: روزی ۳ بار، هربار ۱ قرص.

مصرف در آبستنی: ویتامین A در دوران بارداری نباید بمقدار زیاد مصرف شود.

بسته‌بندی: قرص × ۲۵

بها: ۵۳ ریال

DUPHASOL Multivitamin
فیلیپس هلند-
تولیدارو ایران

ترکیب: در هرمیلی‌لیتر قطره: ویتامین A ۵۰۰ واحد + ویتامین B_3 ۱۰۰۰ واحد + ویتامین B_1 ۱/۸ میلی‌گرم + ویتامین B_2 ۰/۸ میلی‌گرم + ویتامین B_6 ۱ میلی‌گرم + نیکوتینامید ۱۵ میلی‌گرم + d - پانتنول ۱/۵ میلی‌گرم + اسید

پاراآمینوبنزوئیک ۷/۵ میلی‌گرم.

موارد استعمال: کمبود ویتامین‌های فوق، آبستنی، شیردادن، سالخوردگی، ضعف عمومی.

مقدار مصرف و طرز استعمال: برای پیشگیری از کمبود ویتامین در نوزادان: روزی ۲ بار، هربار ۱۰ ـ ۵۰ قطره، خردسالان و بزرگسالان: روزی ۲ بار، هربار ۱۵ ـ ۲۰ قطره. برای ازبین بردن عُلائم کمبود ویتامینی و هم‌چنین در هنگام آبستنی و شیردادن: روزی ۲ بار. هربار ۳۰ـ۴۰ قطره

بسته‌بندی: قطره ۱۵ میلی‌لیتر.

بها: ۴۹ ریال.

DUPHASOL Vitamine A + D_3

فیلیپس دوفار هلند ـ تولیدارو ایران

ترکیب: ویتامین A ۳۰ هزار واحد + ویتامین D_3 ۶ هزار واحد.

موارد استعمال: شب کوری، اختلالات رشد و نمو، راشی‌تیسم، اسپاسموفیلی، تتانی، استئوپورز، استئومالاسی، دوران رشد و آبستنی و شیر دادن.

مقدار مصرف و طرز استعمال: پیشگیری: روزی ۴ـ۱۰ قطره. درمان: روزی ۱۰ ـ ۱۸ قطره.

بسته‌بندی: قطره ۱۵ میلی‌لیتر.

بها: ۴۷ ریال

DUPHASTON

فیلیپس دوفار هلند ـ تولیدارو ایران

ترکیب: در هرقرص: دئیدروژسترون ۵ میلی‌گرم.

موارد استعمال: برای ازبین بردن درد ماهانه، ایجاد تخمک‌گذاری طبیعی.

مقدار مصرف و طرز استعمال: روزی ۱ ـ۴ قرص از روز پنجم تا بیست‌و پنجم سیکل ماهانه. برحسب میزان تأثیر دارو می‌توان این مقدار را کم نمود.

بسته‌بندی: قرص × ۲۰

بها: ۲۳۴ ریال

DURABOLIN
ارگانون هلند ـ ایران

ترکیب: فنیل پروپیونات ناندرولون (فنیل پروپیونات ـ ۱۹ ـ نور ـ آندرواستنولون)

موارد استعمال: کاهش ذخیره کلسیم استخوان، استئوپورز، متاستازهای سرطان پستان، در مواقعی که بدن پروتئین ازدست میدهد، لاغری، قبل و بعد از اعمال جراحی، همراه درمان با کورتیکوستروئیدها.

مقدار مصرف و طرز استعمال: هفته‌ای یک تزریق عضلانی.

موارد منع استعمال: مانند تمام آنابولیکها در آبستنی و سرطان پروستات

عوارض جانبی: ظاهر شدن علایم مردی اکنه، بزرگ شدن آلت تناسلی، بسته شدن زودرس اپی‌فیز.

بسته‌بندی: آمپول ۲۵ میلی‌گرم = ۱ میلی‌لیتر × ۲ آمپول ۱۰ میلی‌گرم = ۱ میلی‌لیتر × ۲

بها: ۲۵ میلی ۱۷۶ ریال، ۱۰ میلی ۸۲ ریال.

DUROLIOPAQUE
آندره‌گربه ـ فرانسه

ترکیب: منوید و استئارات دتیل (غلظت ید ۳۲ درصد وزن به حجم).

موارد استعمال: میلوگرافی، میلوآنسفالوگرافی، یدووانتریکولوگرافی.

بسته‌بندی: آمپول ۵ میلی‌لیتر.

بها: ۱۹۰ ریال.

DUVADILAN
فیلیپس دوفار هلند ـ تولیدارو ایران

فارماکولوژی: وازودیلاتاتور.

ترکیب: ایزوکسوپرین.

موارد استعمال: تهدید به‌سقط و زایمان پیش‌رس، انقباض‌های تتانیک رحمی، دیسمنوره اسپاستیک.

مقدار مصرف و طرز استعمال: انقباض‌های تتانیک رحمی، درمان اولیه مرحله حاد: تزریق ۰/۱ ـ ۰/۴ میلی‌گرم در دقیقه، درمان مداوم یا نگهدارنده: ۱۰ میلی‌گرم از راه تزریق داخل عضلانی یک یا چند بار. دیسمنوره اسپاستیک: روزی ۳ـ۴ بار، هربار ۱ـ۲ قرص ۲۴ـ۷۲ ساعت قبل از شروع قاعدگی تا ازبین رفتن درد.

D

تهدید به‌سقط و زایمان: ۰/۲-۰/۳ میلی‌گرم در هردقیقه بطور انفوزیون وریدی. می‌توان درصورت لزوم تا ۰/۵ میلی‌گرم آنرا بالا برد.

بسته‌بندی: قرص ۱۰ میلی‌گرم × ۲۰. آمپول ۱۰ میلی‌گرم = ۲ میلی‌لیتر × ۶.

بها: قرص ۷۰ ریال. آمپول ۸۲ ریال.

DYAZIDE

اسکالف ـ انگلستان

ترکیب: در هرقرص: تریامترن ۵۰ میلی‌گرم + کلریدرات تیازید ۲۵ میلی‌گرم.

موارد استعمال: خیز قلبی و کلیوی، افزایش فشار خون.

مقدار مصرف و طرز استعمال: بعد از هروعده غذا یک قرص میل شود.

بسته‌بندی: قرص × ۲۰

بها: ۱۴۲ ریال.

DYCHOLIUM

تراپلیکس ـ فرانسه

ترکیب: قرص: اسید د هیدرو کولیک ۰/۲۵ گرم + اسید دِ هیدرو-دراُکسی کولیک ۰/۰۵ گرم. آمپول: د هیدرو کولات‌سدیم ۱ گرم

موارد استعمال: بیماریهای کبدی، ناراحتیهای قلبی، رادیولوژی.

مقدار مصرف و طرز استعمال: آمپول: ۱-۲ آمپول در روز و یا یک روز درمیان بمدت ۷ روز داخل ورید تزریق میشود. قرص: ۱ تا ۴ عدد در روز.

بسته‌بندی: قرص × ۲۰ ، آمپول ۵ میلی‌لیتر × ۵.

بها: قرص ۲۰ عددی ۸۰ ریال. آمپول ۱۰۰ ریال

DYNAPEN

میدجانسون ـ آمریکا

ترکیب: دی‌کلوکزاسیلین سدیم

موارد استعمال: عفونتهای ناشی از میکرب‌های گرم مثبت، استافیلوکوک ساده و مقاوم.

مقدار مصرف و طرز استعمال: ۱۲/۵ میلی‌گرم در روز برای هر کیلوگرم در دو یا چهار دوز منقسم.

بسته‌بندی: کپسول ۲۵۰ و ۵۰۰ میلی‌گرم × ۱۰۰. شربت ۶۰ میلی‌لیتر

بها: کپسول ۲۵۰ میلی هرعدد ۱۵ ریال، ۵۰۰ میلی هرعدد ۳۰ ریال. شربت ۱۲۰ ریال.

DYSPNE-INHAL
دیسپنه اینهال ـ فرانسه

ترکیب: محلول ۴ درصد اپی نفرین استابیلیزه.
موارد استعمال: آسم، آمفیزم، تنگی نفس.
مقدار مصرف و طرز استعمال: روزی ۴ـ۵ بار استنشاق شود.
بسته‌بندی: محلول ۱۰ میلی‌لیتر.
بها: بدون دستگاه ۳۲ ریال. با دستگاه ۱۳۳ ریال

DYSTAZINE
لپتی ایتالیا ـ ایران

ترکیب: مپروبامات ۲۰۰ میلی‌گرم + هماتروپین متیل برومور ۱/۲ میلی‌گرم + تارترات ارگوتامین ۰/۳ میلی‌گرم.
موارد استعمال: اختلالات نورووژتاتیف، میگرن، قاعدگی دردناك، اختلالات وازوموتور، اولسرپپتیک، نفخ.
مقدار مصرف و طرز استعمال: روزی ۲ـ۳ بار، هربار ۱ـ۲ دراژه.
بسته‌بندی: دراژه × ۲۴
بها: ۷۰ ریال

DYTIDE
اسکالاف ـ انگلستان

ترکیب: تریامترن ۵۰ میلی‌گرم + بنزوتیازید ۲۵ میلی‌گرم.
موارد استعمال: کنترل خیز در نارسائی قلبی، خیز ناشی از سیروز کبد، سندرم نفروتیک و مصرف داروها، خیز ناشی از قاعدگی.
مقدار مصرف و طرز استعمال: ۲ کپسول بعد از صبحانه، یکی بعد از نهار
موارد منع استعمال: هیپرکالمی، ناتوانی کلیوی.
عوارض جانبی: مانند سایر تیازیدها باعث هیپرگلیسمی و گلیکوزوری میشود.
بسته‌بندی: کپسول × ۳۰
بها: ۲۰۰ ریال

EDECRIN
مرك شارپ اند دوهم
آمریکا ـ ایران

مکانیسم: جذب مجدد آب و الکترولیت‌ها را کاهش داده و درنتیجه موجب دفع آنها می‌شود.

ترکیب: اسید اتاکرینیک ۵۰ میلی‌گرم.

اثر متقابل: ۱ــ گرچه تجویز همزمان اسید اتاکرینیک و دیگوکسین در درمان نارسائی‌های احتقانی قلبی مقاوم و شدید باعث بهبودی بیماری میگردد، با این وجود در اثرکمبود منیزیم یا پتاسیم بر خطر بروز عوارض سمی قلبی ناشی از دیگوکسین افزوده میشود، درصورت مصرف متناوب از این دیورتیک و استفاده از یک دیورتیک احتباس دهنده پتاسیم نظیر اسپیرونولاکتون یا تریامترن میتوان تا حدودی از خطر دفع زیاد پتاسیم کاست.

موارد استعمال: انواع خیزها، نارسائی احتقانی قلب

مقدار مصرف و طرز استعمال: روزی ۱-۲ قرص پس از صبحانه

موارد منع استعمال: آنوری

عوارض جانبی: هیجان، ناراحتی عصبی، بی‌اشتهایی، تهوع و اسهال

احتیاط: در هیپوتانسیون حاد، افزایش اسیداوریک، اختلالات معدی روده‌ای و سیروزکبدی با احتیاط باید مصرف کرد.

بسته‌بندی: قرص × ۱۲

بها: ۱۱۱ ریال

EFFORTIL
بهرینگر اینگلهایم آلمان
ـ تولیدارو ایران

ترکیب: کلریدرات ۲-اتیل آمینو-۱- (۳ هیدروکسی فنیل) اتانول = (اتیل فنیل افرین)

موارد استعمال: حالات هیپوتونی، بیماریهای عفونی، موارد کلاپس، شوکها، جراحات، جراحی‌ها، بیهوشی‌ها، مسمومیت‌های داروئی

سردردهای وازوموتور، میگرن ها، نارسائیهای خفیف میوکارد
مقدار مصرف و طرز استعمال: قطره: بزرگسالان: روزی ۲ـ۳ بار، هربار ۵ـ۱۰ قطره. خردسالان: روزی ۲ـ۳ بار، هربار ۵ قطره. شیرخواران: روزی ۲ـ۳ بار، هربار ۳ قطره. تزریق آمپول بشکل زیرجلدی و یا داخل عضلانی و در موارد شدید اگر لازم باشد داخل ورید و یا بصورت انفوزیون انجام می‌گیرد.
بسته بندی: قطره ۱۵ میلی‌لیتر، آمپول ۱ میلی‌لیتر= ۱۰ میلی‌گرم × ۶.
بها: قطره ۸۲ ریال، آمپول ۸۴ ریال.

EFRINOSE
عبیدی ـ ایران

ترکیب: مالئات پیریلامین ۰/۲۵ درصد + کلریدرات فنیل افرین ۰/۲۵ درصد.
موارد استعمال: گرفتگی بینی هنگام سرماخوردگی، گریپ، زکام یونجه، ترشحات زیاد بینی، درمان حساسیت‌های بینی.
مقدار مصرف و طرز استعمال: هر ۳ـ۴ ساعت، ۲ـ۳ قطره در هرسوراخ بینی با قطره‌چکان مخصوص میچکانند.
بسته‌بندی: قطره ۱۵ میلی‌لیتر.
بها: ۴۱ ریال

EFRINOSE B.B.
عبیدی ـ ایران

ترکیب: پیریلامین مالئات ۰/۱۲۵ درصد + کلریدرات فنیل افرین ۰/۳۷۵ درصد + کلروبوتون ۰/۲۵ درصد.
موارد استعمال: گرفتگی بینی، تب یونجه، رینیت آلرژیک و وازوتومور، گریپ.
مقدار مصرف: هر ۳ـ۴ ساعت ۱ـ۲ قطره در هرسوراخ بینی می‌چکانند.
بسته بندی: قطره بینی ۱۵ میلی‌لیتر.
بها: ۳۵ ریال

EFRYL
تراپلیکس ـ فرانسه

ترکیب: کلریدرات اتیل مرفین ۰/۸ گرم + کلریدرات افدرین ۰/۱ گرم + بنزوات سدیم ۰/۳ گرم + سالیسیلات سدیم ۰/۱ گرم.
موارد استعمال: رینوفارنژیت، تراکئیت، لارنژیت، آسم، تب یونجه.

مقدار مصرف و طرز استعمال: بزرگسالان: روزی ۲ تا ۴ قاشق سوپخوری
خردسالان از دوسال ببالا: روزی یک تا ۴ قاشق مرباخوری.
موارد منع استعمال: خردسالان پائین تر از دوسال
بسته‌بندی: شربت ۲۵۰ میلی‌لیتر
بها: ۷۰ ریال.

EJIDOX
اژیس ـ بلژیک

ترکیب: در هر میلی‌لیتر آمپول یا یک قرص: دگزامتازون ۰/۵ میلی‌گرم.
موارد استعمال: انواع روماتیسمهای عفونی، آرتریت، آرتروز، پولی-آرتریت، آسم آلرژیک، آسم برونشیال، رینیت آلرژیک، درماتوز.
مقدار مصرف و طرز استعمال: سوسپانسیون: بمدت ۳ تا ۵ روز هر روز یک بار، هربار ۲ میلی‌گرم برابر ۴ میلی‌لیتر از سوسپانسیون را در مفصل و یا عضله تزریق میکنند، سوسپانسیون را می‌توان با همان مقدار بالا داخل پرده صفاق و جنب هم تزریق نمود.
قرص: روزی ۳ بار هربار ۱ ـ ۲ قرص.
موارد منع استعمال: سل ریوی، زخم معده و روده، پسیکوز، تزریق داخل وریدی.
بسته بندی: سوسپانسیون تزریقی ۲۰ میلی‌لیتر.
بها: آمپول ۲۲۵ ریال، قرص ۴۷ ریال.

EJIFICOL
اژیس ـ بلژیک

ترکیب: در هر کپسول: کلرامفنیکل ۲۵۰ میلی‌گرم. در هر ۴ میلی‌لیتر شربت: کلرامفنیکل ۱۲۵ میلی‌گرم.
موارد استعمال: انواع عفونت‌ها، بخصوص عفونتهای معدی-روده‌ای، تیفوس، عفونتهای دستگاه تنفسی و ادراری، بروسلوز.
مقدار مصرف و طرز استعمال: بزرگسالان: هر ۶ ساعت برای هر ۱۰ کیلوگرم وزن یک کپسول یا یک قاشق مرباخوری. خردسالان هر ۶ ساعت ۱ ـ ۲ قاشق مرباخوری.
موارد منع استعمال: بیماریهای خونی.
بسته بندی: کپسول × ۱۲. شربت ۶۰ میلی‌لیتر.
بها: کپسول ۵۶ ریال. شربت ۷۰ ریال.

EJIFICOL OTIC
اژیس ـ بلژیک

ترکیب: در هر میلی‌لیتر: کلرآمفنیکل **۵۰** میلی‌گرم + اسکاندیکائین **۲/۵** میلی‌گرم + پروپیلن گلیکول ۱ میلی‌گرم.

موارد استعمال: کلیه عفونتهای گوش میانی و خارجی، بعلت دارا بودن بیحسی دهنده موضعی بنام اسکاندیکائین مسکن گوش درد است.

مقدار مصرف و طرز استعمال: روزی **۴** بار، هربار **۴** قطره درگوش می‌چکانند.

بسته‌بندی: قطره گوشی ۱۰ میلی‌لیتر.

بها: **۵۵** ریال.

EJIFICOL - OVULES
اژیس ـ بلژیک

ترکیب: کلرامفنیکل **۵۰۰** میلی‌گرم + روغن کبدماهی **۴۲۰** میلی‌گرم.

موارد استعمال: واژینیت، ولوواژینیت، سرویسیت، متریت، آدنکسیت.

مقدار مصرف و طرز استعمال: بمدت ۸ تا ۱۲ روز روزی ۱ـ۲ اوول در عمق مهبل جای می‌دهند.

بسته‌بندی: اوول × ۶

بها: ۱۴۰ ریال.

EJIFICOL SUCCINAT
اژیس ـ بلژیک

ترکیب: سوکسینات کلرامفنیکل

موارد استعمال: انواع عفونت‌های گرم مثبت و گرم منفی.

مقدار مصرف و طرز استعمال: بزرگسالان: روزی **۲** تا **۳** گرم هر ۸ تا ۱۲ ساعت بصورت تزریق داخل وریدی، عضلانی و زیرجلدی.

خردسالان: روزی **۵۰** تا ۱۰۰ میلی‌گرم برای هر کیلو.

موارد منع استعمال: حساسیت به کلرامفنیکل.

بسته‌بندی: ویال ۱ گرمی.

بها: ۸۲ ریال.

EJISIX
اژیس ـ بلژیک

ترکیب: در هرقرص کلریدرات پیریدوکسین ـ (ویتامین B_6) **۰/۰۲۵** میلی‌گرم.

موارد استعمال: بیماریهای عصبی، استفراغ زنان باردار، آنسفالوپاتی،

موارد عدم تحمل داروها، آستنی، آفت، آکنه و اکزما، آتریو-اسکلروز و انفارکتوس میوکارد.

مقدار مصرف: روزی ۳ بار هربار ۱ قرص پیش از غذا بمدت ۲۰ ـ ۳۰ روز

بسته بندی: قرص × ۲۰.

بها: ۷۰ ریال.

ELASE
پارك دیویس
آمریکا ـ ایران

ترکیب: پماد ۱۰ گرمی فیبرینولیزین ۱۰ واحد + دزوکسی ریبوکلئاز ۶۶۶۶ واحد + تیمروزال ۰/۰۰۴ میلی‌گرم. پماد ۳۰ گرمی فیبرینولیزین ۳۰ واحد + دزوکسی ریبونوکلئاز ۲۰۰۰۰ واحد + تیمروزال ۱۲ میلی‌گرم.

موارد استعمال: سوختگیها و زخمها، جراحات مزمن، آبسه‌ها، زخمهای مزمن جلدی، واژینیت و سرویسیت.

مقدار مصرف و طرز استعمال: بسته به‌نوع جراحت مقداری از پماد را روزانه یک یا دوبار در محل زخم پانسمان می‌نمایند. در واژینیت و سرویسیت هرشب ۵ گرم پماد را عمیقاً در داخل واژن قرار می‌دهند (بمدت ۵ شب متوالی و تا پایان یک لوله ۳۰ گرمی مصرف شود)

موارد منع استعمال: اشخاصی که به فیبرینولیزین بووین و ترکیبات جیوه‌ای حساسیت دارند.

بسته‌بندی: پماد ۱۰ گرم. پماد ۳۰ گرم همراه دو آپلیکاتور.

بها: پماد ۱۰ گرم ۲۴۰ ریال، پماد ۳۰ گرم ۵۷۰ ریال.

ELASE - CHLOROMYCETIN
پارك دیویس
ـ آمریکا

ترکیب: در هر ۱۰ گرم پماد: فیبرینولیزین ۱۰ واحد + دزوکسی ریبونوکلئاز ۶۶۶۶ واحد + کلرامفنیکل ۱۰۰ میلی‌گرم + تیمروزال ۰/۰۴ گرم.

موارد استعمال: برای درمان موضعی عفونتها مانند سوختگیهای عفونت-یافته، قرحه‌های واریسی، اولسرکوبیتوس، زخمهای مزمن جلدی، آبسه‌ها، زخمهای جراحی عفونت یافته.

مقدار مصرف و طرز استعمال: برحسب وسعت زخم مقداری از پماد را

روزانه یک یا دوبار در محل زخم پانسمان می کنند.

موارد منع استعمال: اشخاصی که به‌فیبرینولیزین بووین و ترکیبات جیوه‌ای حساسیت دارند.

بسته‌بندی: پماد ۱۰ گرم.

بها: ۲۲۰ ریال.

ELDEC
بارك دبوبس
آمریکا ـ ایران

ترکیب: در هر کپسول: ویتامین A ۱۶۶۷ واحد + ویتامین B_1 ۰/۶۷ میلی‌گرم + ویتامین B_2 ۰/۶۷ میلی‌گرم + ویتامین B_6 ۰/۵ میلی‌گرم + نیاسینامید ۱۶/۷ میلی‌گرم + تاکادیاستاز ۲۰ میلی‌گرم + متیل تستوسترون ۱/۶۷ میلی‌گرم + استرون ۰/۱۶۷ میلی‌گرم + پانکرآتین ۱۳۳/۳ میلی‌گرم + اسید فولیک ۰/۱ میلی‌گرم + ویتامین C ۳۳/۳ میلی‌گرم + کولین ۶/۶۷ میلی‌گرم + پانتنول ۱۰ میلی‌گرم + ید ۰/۰۵ میلی‌گرم + کربنات کلسیم ۶۶/۷ میلی‌گرم + لیزین ۶۶/۷ میلی‌گرم + متیونین ۱۶/۷ میلی‌گرم + سولفات فرو ۱۶/۷ میلی‌گرم.

موارد استعمال: بعنوان مکمل ویتامینی، کمبود مواد معدنی، هورمون و آنزیم.

مقدار مصرف و طرز استعمال: روزی ۳ بار، هر بار یک کپسول قبل از غذا.

احتیاط: بانوان پس از هر دوره ۲۱ روزه بایستی ۷ روز مصرف دارو را قطع کنند.

بسته بندی: ۲۵ × کپسول

بها: ۱۱۷ ریال.

EMBROCATION
بوتس انگلستان
ـ پارس ایران

ترکیب: مانتول ۲/۴ درصد + سالیسیلات متیل ۱۴/۲ درصد + او کالیپتوس ۲ درصد + اسانس کاژه‌پوت ۰/۵ درصد + اسانس اکالیپتونس ۱/۵ درصد + اکسیپیان تا ۱۰۰ درصد.

موارد استعمال: دردهای عضلانی، ضرب‌دیدگیها، دردهای روماتیسمی.
بعنوان بخور جهت بیماریهای دستگاه تنفسی: مانند سرفه، سرماخوردگی، آنفلوآنزا، برونشیت.

مقدار مصرف و طرز استعمال: جهت درمان موضعی: روزی ۲ـ۳ بار در محل مورد نظر مالش دهند.
در التهابات دستگاه تنفسی: مقدار کمی از پماد را در آب گرم ریخته بخور دهند.
بسته بندی: پماد ۲۸ گرم.
بها: ۲۹ ریال.

EMETROL
رورر آمریکا ـ ایران

ترکیب: محلول خوراکی حاوی لوولز، دکستروز، اسید ارتوفسفریک که در پ هاش مناسبی تثبیت شده است.
موارد استعمال: استفراغ، دل بهم خوردگی، تهوع ناشی از سرماخوردگی تهوع ناشی از هیجانات روحی، بیماری مسافرت.
مقدار مصرف: بزرگسالان ۱ـ۲ قاشق غذاخوری. خردسالان ۱ـ۲ قاشق چایخوری.
احتیاط: با آب نباید مخلوط شود. پیش یا پس از مصرف نباید مایعات نوشید.
بسته‌بندی: محلول ۸۹ میلی‌لیتر.
بها: ۸۸ ریال.

EMU - V
آبجان ـ آمریکا

ترکیب: در هر قرص: اریترومایسین ۲۵۰ میلی‌گرم.
موارد استعمال: عفونت‌های پنوموکوکی، استافیلوکوکی، استرپتوکوکی، بعضی از بیماریهائی که ناشی از استرپتوکوك بتاهمولتیک و سایر عفونت‌هائی که به اریترومایسین حساس باشند.
مقدار مصرف و طرز استعمال: هر ۴ ساعت یک قرص.
عوارض جانبی: به‌مقدار دوگرم یا بیشتر در روز سبب ناراحتی‌های شکمی، کرامپ، تهوع و استفراغ میشود که معمولا با ادامه درمان از بین میرود.
بسته‌بندی: قرص × ۱۰۰.
بها: ۱۵۰۰ ریال.

ENCEPHABOL
مرك آلمان ـ ایران

ترکیب: بیس ـ [هیدروکسی ـ متیل ـ ۲ ـ متیل پیریدیل ـ (۵) ـ متیل] دی‌سولفید. دی کلریدرات = پیریتیو کسین ۱۰۰ میلی‌گرم.

موارد استعمال: ضربه‌های مغزی، اطفال عقب افتاده، کاهش قدرت تمرکز فکری، کاهش عاطفه، تغییر خلق و خو، سرگیجه، سردرد، مسمومیت مزمن با الکل.

مقدار مصرف و طرز استعمال: بزرگسالان: روزی ۳ بار، هربار ۱ قرص یا یک قاشق مرباخوری شربت. خردسالان: روزی ۱ ـ ۲ قرص یا یک قاشق مرباخوری شربت سه بار در روز.

بسته‌بندی: قرص ۱۰۰ میلی‌گرم × ۱۰۰. شربت هر ۵ میلی‌لیتر = ۱۰۰ میلی‌گرم × ۲۰۰ میلی‌لیتر.

بها: قرص ۵۸۵ ریال. شربت ۳۱۰ ریال.

ENDOGLOBIN
اندو ـ آمریکا

ترکیب: در هر قرص: فومارات فرو ۲۵۰ میلی‌گرم + ویتامین B_1 ۵ میلی‌گرم + ویتامین B_6 ۱/۵ میلی‌گرم + پانتنول ۵ میلی‌گرم + نیکوتینامید ۱۵ میلی‌گرم + ویتامین B_{12} ۵ میکروگرم + ویتامین C ۷۵ میلی‌گرم + ویتامین B_2 ۳ میلی‌گرم.

موارد استعمال: کم‌خونی، ضعف عمومی.

مقدار مصرف: یک قرص پس از هر غذا.

بسته‌بندی: قرص × ۱۰۰.

بها: ۳۶۰ ریال.

ENDOGRAFIN
شرینگ ـ آلمان

ترکیب: متیل گلوکامینات N ، N ـ آدی ـ پیک ـ دی ـ (۳ ـ آمینو ـ ۲ ، ۴ ، ۶، تری‌یدوبنزوئیک اسید)

موارد استعمال: رادیوگرافی زهدان و لوله‌ها، رادیوگرافی فیستول‌ها، رادیوگرافی مجرای ادرار و مثانه.

بسته‌بندی: آمپول ۷۰ درصد ۱۰ میلی‌لیتر × ۵.

بها: ۷۰۰ ریال.

ENDOXAN
آستا ـ آلمان

ترکیب: سیکلوفسفامید.

اثر متقابل: اثر هیپوگلیسمیک سولفونیل اوره‌ها با تجویز همزمان با این دارو میتواند تشدید شود.

موارد استعمال: لوسمی لنفوسیتیک و میلوسیتیک مزمن، لنفوسارکوم، کارسینوم.

مقدار مصرف و طرز استعمال: روزی ۴ـ۶ میلی‌گرم بازاء هر کیلو وزن بدن. ادامه درمان: روزی ۵۰ـ۲۰۰ میلی‌گرم.

موارد منع استعمال: سه ماه اول حاملگی.

بسته‌بندی: قرص ۵۰ میلی‌گرم × ۵۰. آمپول ۱۰۰، ۲۰۰، ۵۰۰ و ۱۰۰۰ میلی‌گرم.

بها: قرص ۵۳۰ ریال، آمپول ۱۰۰ میلی ۸۰، ۲۰۰ میلی ۱۰۹، ۵۰۰ میلی ۲۴۰ و ۱۰۰۰ میلی ۴۸۰ ریال.

ENTEROLEINE STREPTO
میسین ـ ایران

ترکیب: سولفات دی ئیدرواسترپتومیسین ۱۰۰ میلی‌گرم + یدوکلرواکسی کینولئین ۲۵۰ میلی‌گرم + سولفاسوکسیدین ۲۵۰ میلی‌گرم.

موارد استعمال: اسهالهای آمیبی و باسیلی، کلیت‌ها، سوء هاضمه، اسهالهای مزمن و تابستانی.

مقدار مصرف و طرز استعمال: برحسب نوع و شدت بیماری متفاوتست.

بسته‌بندی: قرص × ۱۰۰۰.

بها: ۱۷۶۰ ریال.

ENTEROQUINE
برونوفرانسه ـ فارماشیمی ایران

ترکیب: سالیسیلات بازیک آلومین ۰/۳۵ گرم + کلرو-یدوکین ۰/۱۵ گرم

موارد استعمال: عفونت گوارشی، انواع اسهالها، اسهالهای تابستانی، آنتریت‌ها، اسهالهائی که علت آنها بالانتی‌دوز یا لامبلیاها باشد.

مقدار مصرف و طرز استعمال: بزرگسالان: روزی ۳ بار، هر بار ۲ قرص. خردسالان ۶ـ۱۲ سال: روزی ۴ قرص. ۴ـ۶ سال: ۳ قرص، ۱ـ۳ سال: ۲ قرص. کمتر از یکسال: نیم تا یک قرص.

احتیاط: در طول درمان باید از نوشیدن مواد قلیایی (جوش‌شیرین و آسپیرین) خودداری کرد.
بسته‌بندی: قرص × ۲۰.
بها:

E

ENTERO VIOFORM
سیبا ـ سویس

ترکیب: در هرقرص: یدوکلروئیدروکسی کینولئین ۰/۲۵ گرم.
موارد استعمال: سوء هضم‌های فرمانتاسیون و پوترفاکسیون، اسهالهای تابستانی، دیسانتری باسیلی و آمیبی.
مقدار مصرف و طرز استعمال: روزی ۳ بار، هربار ۱ ـ ۲ قرص.
بسته‌بندی: قرص × ۲۰.
بها: ۸۰ ریال.

ENTOCIMA
رابینز ـ آمریکا

ترکیب: در هرقرص: پانکراتین ۳۰۰ میلی‌گرم + پپسین ۲۵۰ میلی‌گرم + صفرا ۱۵۰ میلی‌گرم.
موارد استعمال: اختلالات هاضمه.
مقدار مصرف و طرز استعمال: روزی ۳ بار، هربار ۱ ـ ۲ قرص بعد از غذا
بسته‌بندی: قرص × ۲۵.
بها: ۱۱۵ ریال.

ENTROCOLI MAX
ماکس ـ ایران

ترکیب: کلرویدوئیدروکسی کینولین.
موارد استعمال: کولیت، آنتروکولیت، اسهالهای حاد و مزمن
مقدار مصرف و طرز استعمال: روزی ۳ بار، هربار ۰/۵-۱ قرص بمدت سه هفته.
بسته‌بندی: قرص × ۲۵۰.
بها: ۲۶۳ ریال.

ENZACTIN
آیرست آمریکا

ترکیب: در هر ۱۰۰ گرم: تری استین (گلیسریل تری استات) ۳۳ گرم.

موارد استعمال: درمان عفونت قارچی پا و کشاله ران.
مقدار مصرف و طرز استعمال: بعد از تمیز کردن موضع کمی از پماد را درمحل مالیده سپس پودر را درمحل می‌پاشند.
بسته‌بندی: پودر ۴۲/۵ گرم. پماد ۲۸ گرم.
بها: پودر ۱۰۰ ریال، پماد ۱۰۰ ریال.

ENZYLAC
لیوسانتر ـ فرانسه

ترکیب: آنزیمهای لازم برای هضم بخصوص آنزیمهای شیر و مواد پروتیدی + فاکتورهای تغذیه + فاکتور ضد کم‌خونی مخلوط با مقادیر فیزیولوژیک ویتامین B_{12} + اسید لازم جهت عمل این آنزیمها.
موارد استعمال: کمبود وزن، تأخیر رشد، دوران نقاهت بیماریهای مختلف، بی‌اشتهائی و اختلالات هضم.
مقدار مصرف و طرز استعمال: خردسالان: روزی ۲ بار، هربار نیم لیوان آب + ۲ قاشق چایخوری شکر + ۱ قاشق چایخوری پودر. بزرگسالان: روزی ۲ بار، هربار ۱ لیوان آب + ۲ قاشق چایخوری شکر + ۲ قاشق چایخوری پودر. مدت درمان ۱۵ روز.
بسته بندی: گرد ۴۰ گرم.
بها: ۱۲۹ ریال.

ENZYMOFLASH
فرانسیز تراپوتیک ـ فرانسه

ترکیب: در هرقرص: پانکراتین (عوامل آمیلولیتیک، پروتئولیتیک، لیپولیتیک) ۲۰۰ میلی‌گرم + عصاره صفراوی گوساله ۱۰۰ میلی‌گرم + پلی‌آنزیم فونگال.
موارد استعمال: سوء هاضمه، دیس پپسی، اسهال.
مقدار مصرف و طرز استعمال: بزرگسالان: روزی ۴ـ۶ بار، هربار یک قرص، خردسالان: روزی ۱ـ۲ قرص.
بسته‌بندی: قرص × ۶۰.
بها: ۲۰۰ ریال.

ENZYNORM
نورد مارك ـ آلمان

ترکیب: عصاره معدی همراه با آنزیم پپتیک و کاتپتیک + موسین و اسید کلریدریک.

موارد استعمال: کمبود آنزیم‌ها و اسید کلریدریک معدی، گاستریت حاد و مزمن، اختلالات کبدی و صفراوی، بی‌اشتهایی.

مقدار مصرف و طرز استعمال: روزی ۳ بار، هربار ۰/۵ـ۱ قاشق مرباخوری یا ۱ـ۲ دراژه قبل از غذا.

بسته‌بندی: شربت ۲۰۰ میلی‌لیتر.

بها: ۵۰ ریال.

EPARGRISEOVIT
فارمیتالیا ـ ایتالیا

ترکیب: آمپول I (قرمز): ویتامین B_{12} ۲۵۰۰ میکروگرم + اسیدفولیک ۰/۷ میلی‌گرم + نیکوتینامید ۱۲ میلی‌گرم. آمپول II (بیرنگ): ویتامین C ۱۵۰ میلی‌گرم.

موارد استعمال: بی‌اشتهائی، آستنی، آنمی مزمن، عوارض ناشی از کمبود ویتامین های فوق.

مقدار مصرف و طرز استعمال: هرروز یا یک روزدرمیان یک تزریق داخل عضلانی.

بسته‌بندی: آمپول × ۶.

بها: ۱۶۸ ریال.

EPHECODE
ویرا ـ ایران

ترکیب: کلریدرات دیفن هیدرامین ۲۵۰ میلی‌گرم + کلریدرات افدرین ۱۰۰ میلی‌گرم + فسفات کدئین ۱۰۰ میلی‌گرم + منوهیدروکسی بنزوات ۱۰۰ میلی‌گرم + اتانول ۵ گرم + اکسیپیان تا ۱۰۰ میلی‌لیتر.

موارد استعمال: سرفه های ناشی از سرماخوردگی، سرفه های آلرژیک، تنگی نفس.

مقدار مصرف و طرز استعمال: هر ۳ـ۴ ساعت یک قاشق مرباخوری.

بسته‌بندی: شربت ۱۲۰ میلی‌لیتر.

بها: ۴۱ ریال.

E

EPHETONINE Syrup
مرك ـ آلمان

ترکیب: در هر ۱۰۰ میلی‌لیتر: افتونین ۲۰۰ میلی گرم + دیونین ۴۰ میلی‌گرم + عصاره تیم ۲ گرم.

موارد استعمال: آرام کننده سرفه، برنشیت حاد و مزمن، گریپ و پنومونی.

مقدار مصرف و طرز استعمال: بزرگسالان: روزی ۳ـ۴ بار، هربار ۱ـ۲ قاشق مرباخوری. خردسالان: نصف تا یک قاشق مرباخوری.

موارد منع استعمال: کودکان کمتر از ۳ سال.

بسته بندی: شربت ۱۷۰ گرم.

بها: شربت ۴۰ ریال.

EPHYNAL
روش ـ سویس

ترکیب: استات dl ـ آلفا ـ توکوفرول = ویتامین E

موارد استعمال: بیماریهای داخلی، زنان و زایمان، پوست، دندانپزشکی

مقدار مصرف و طرز استعمال: روزی ۱ ـ ۶ دراژه جویده شود. از آمپول مائی کلوئیدال فقط بصورت تزریق داخل عضلانی عمیق استفاده میشود.

بسته بندی: دراژه ۱۰۰ میلی‌گرم × ۲۰. آمپول ۱۰۰ میلی‌گرم = ۲ میلی‌لیتر × ۶.

بها: دراژه ۱۵۵ ریال. آمپول ۱۰۸ ریال.

EPIFRIN %1
EPIFRIN %2
آلرگان ـ آمریکا

ترکیب: کلریدرات لوو اپی نفرین.

موارد استعمال: گلوکوم ساده مزمن (با زاویه باز).

مقدار مصرف و طرز استعمال: روزی ۱ ـ ۲ بار. هربار ۱ قطره در هر چشم می‌چکانند.

موارد منع استعمال: گلوکوم حاد با زاویه بسته زیرا انبساط مردمک ممکنست باعث حمله دیگری شود.

بسته بندی: قطره چشمی ۱ درصد و ۲ درصد × ۱۵ میلی‌لیتر.

بها: ۱ درصد ۲۹۵ ریال. ۲ درصد ۲۹۳ ریال.

EPONTOL
بایر ـ آلمان

ترکیب: پروپیل ـ ۴ ـ (N ـ N ـ دی اتیل کارباموئیل متوکسی) ـ ۳ ـ متوکسی فنیل استات = پروپانیدید ۵۰۰ میلی‌گرم.

موارد استعمال: بیهوشی‌های کوتاه‌مدت برای موارد جراحی و تشخیص طبی که ۳ ـ ۴ دقیقه کافی باشد، بیهوشی بمنظور جراحیهای طولانی.

مقدار مصرف و طرز استعمال: بزرگسالان: ۵ ـ ۷ میلی‌گرم بازاء هر کیلوگرم وزن بدن. اشخاص ضعیف و مسن‌تر از ۶۰ سال: ۳ ـ ۴ میلی‌گرم بازاء هر کیلوگرم وزن بدن. خردسالان ۷ ـ ۱۰ میلی‌گرم بازاء هر کیلوگرم وزن بدن. برای تجویز دارو در خردسالان باید محلول ۵ درصد آنرا با هم حجم خود از محلول فیزیولوژیک کلرورسدیم رقیق کرده به ۲/۵ درصد رسانید.

موارد منع استعمال: شوک، مسمومیت حاد الکلی، کم‌خونی همولیتیک، در آن دسته بیماریهای کلیوی که کار کلیه آسیب دیده است.

احتیاط: این دارو مانند هر ماده تزریقی باید وسیله متخصص بکار برده شود.

بسته بندی: آمپول ۱۰ میلی‌لیتر × ۲۵.

بها: ۱۴۰۰ ریال.

EQUAGESIC
وایت ـ آمریکا

ترکیب: هر قرص: مپروبامات ۱۵۰ میلی‌گرم + سیترات اتوهپتازین ۷۵ میلی‌گرم + اسید استیل سالیسیلیک ۲۵۰ میلی‌گرم.

موارد استعمال: اختلالات عصبی و روماتیسمی همراه با انقباض عضلانی، تانسیون قبل از قاعدگی.

مقدار مصرف و طرز استعمال: روزی ۳ ـ ۴ بار، هر بار ۱ ـ ۲ قرص.

عوارض جانبی: خواب‌آلودگی

بسته بندی: قرص × ۵۰.

بها: ۲۶۱ ریال.

EQUILID
لپتی ایتالیا ـ ایران

ترکیب: ان ـ (۱ ـ اتیل ـ ۲ ـ پیرولیدینیل) ـ ۲ ـ متوکسی ـ ۵ ـ سولفاموئیل بنزامید = سولپیرید.

موارد استعمال: بیماریهای روانی مانند اسکیزوفرنی حاد و حمله‌های حاد دلیریوم ، بیماریهای دستگاه گوارشی ، سرگیجه .

E

مقدار مصرف و طرز استعمال: پسیکونوروزها : ۳ ـ ۶ کپسول در روز در ۲ ـ ۳ دوز منقسم. اولسرها : درمان نگهدارنده: ۳ کپسول در روز بمدت ۲۱ روز و در پی آن ۱ ـ ۳ کپسول در روز برای یک دوره ـ ۲۱ روزه دیگر.

عوارض جانبی: گاهی عوارض اکسترا پیرامیدال ، تحریکات پسیکوموتور

بسته بندی: کپسول ۵۰ میلی‌گرم × ۱۲ .

بها: ۱۴۱ ریال.

ERALDIN

آی‌سی‌آی ـ انگلستان

ترکیب: پراکتولول.

موارد استعمال: تاکی کاردی سینوسی و دهلیزی ،آریتمی های فوق بطنی.

مقدار مصرف و طرز استعمال: ۱ میلی‌لیتر بتدریج در مدت یک دقیقه در ورید تزریق میشود.

احتیاط: حداکثر بین ۲/۵ تا ۱۰ میلی‌لیتر تزریق شود.

بسته بندی: آمپول ۱ میلی‌لیتر × ۱۰ .

بها: ۱۳۰۰ ریال.

ERCORIL

اِرکوفارم ـ دانمارك

ترکیب: پروپانتلین پروماید - (۲ ـ هیدروکسی اتیل) دی ایزو- پروپیل متیل آمونیوم برومایدگزانتن ـ ۹ ـ کربوکسیلات .

موارد استعمال: زخم معده و اثنی‌عشر ، اکولون اسپاستیک ، دیسکنزی .

مقدار مصرف و طرز استعمال: روزی ۲ ـ ۳ بار هربار ۱ تا ۲ قرص بمدت ۲ تا ۳ هفته.

موارد منع استعمال: گلوکوم ، پروستاتیسم .

احتیاط و عوارض جانبی: احتباس ادرار ، خشکی دهان ، میدریاز.

بسته بندی: قرص ۱۵ میلی‌گرم × ۱۰۰ .

بها: ۲۵۰ ریال.

ERYTHROCIN
ابوت ـ آمریکا

ترکیب: قرص: استئارات اریترومایسین. شربت، قطره، آمپول: اتیل سوکسینات اریترومایسین.

موارد استعمال: عفونتهای استرپتوکوکی آلفا و بتوهمولیتیک خفیف و شدید دستگاه تنفسی، عفونت پوست و بافت نرم، آندوکاردیت باکتریال، اوتیت میانی، فارنژیت، پنومونی.

مقدار مصرف و طرز استعمال: قرص: هر ۶ ساعت ۱ ـ ۲ قرص بمدت یک هفته. شربت و قطره: ۳۰ ـ ۵۰ میلی گرم بازاء هر کیلو وزن بدن در ۴ دوزمنقسم (هر قاشق ۲۰۰ میلی گرم). قطره‌چکان (دارای اندازه ۵۰ ـ ۷۵ و ۱۰۰ میلی گرم است.) آمپول: روزانه ۵ ـ ۸ میلی گرم برای هر کیلو در ۳ ـ ۶ دوزمنقسم.

موارد منع استعمال: بیماریهای پیشرفته کبدی.

عوارض جانبی: گاهی کهیر، تهوّع، استفراغ، هنگام درمان درازمدت یرقان انسدادی دیده شده است.

بسته‌بندی: قرص ۲۵۰ میلی گرم × ۱۰۰، سوسپانسیون هر ۵ میلی لیتر = ۲۰۰ میلی گرم × ۶۰ میلی لیتر، آمپول ۱۰۰ میلی گرم = ۲ میلی‌لیتر × ۱. قطره (بصورت گرانول) ۳۰ میلی لیتر.

بها: قرص ۱۶۰۰ ریال. شربت ۱۶۰ ریال. قطره ۱۰۰ ریال. آمپول ۴۵ ریال.

ERYTHROMEX
آی دی آی ـ ایران

ترکیب: اریترومایسین استولیت.

موارد استعمال: عفونتهای حساس به اریترومایسین.

مقدار مصرف و طرز استعمال: بزرگسالان: روزی ۴ بار، هربار ۲۵۰ میلی تا یک گرم. خردسالان: نصف مقدار بزرگسالان.

موارد منع استعمال: حساسیت بدارو، بیماریهای شدید کلیوی و کبدی.

عوارض جانبی: گاهی تهوع، اسهال، استفراغ، گلوسیت، استوماتیت.

بسته بندی: کپسول ۲۵۰ میلی گرم × ۱۲، قطره خوراکی ۱۰ میلی لیتر، شربت ۱۲۵ و ۲۵۰ میلی گرم = ۵ میلی لیتر × ۶۰.

بها: کپسول ۲۵۰ میلی ۲۳۴ ریال، قطره ۹۴ ریال، شربت ۱۲۵ میلی ۱۴۱ ریال، ۲۵۰ میلی ۲۴۶ ریال.

ESBATAL
بوروزولکام ــ انگلستان

ترکیب: در هر قرص : سولفات بتانیدین .
موارد استعمال: درمان فشارخون های اولیه و ثانویه .
مقدار مصرف و طرز استعمال: برحسب شدت بیماری متفاوت است .
عوارض جانبی: بندرت سردرد، عرق، آبریزش از بینی .
بسته بندی: قرص ۱۰ میلی گرم × ۲۵ .
بها: ۹۰ ریال.

ESERINE HUILEUSE
دوپار ــ ایران

ترکیب: ازرین باز ۱ گرم + روغن زیتون خنثی تا ۱۰۰ میلی لیتر.
موارد استعمال: گلوکوم (حاد ــ تحت حاد ــ مزمن).
مقدار مصرف و طرز استعمال: هر نیم تا یکساعت یک قطره در چشم بچکانند.
احتیاط و عوارض جانبی: گاهی علائم افزایش ترشح بزاق و عرق و عوارض معدی ــ روده‌ای ایجاد میشود.
بسته بندی: قطره چشمی ۱۰ میلی لیتر.
بها: ۶۵ ریال.

ESIDREX
سیبا ــ سوئیس

ترکیب: در هر دراژه: هیدروکلروتیازید ۲۵ میلی گرم .
موارد استعمال: ورم های قلبی، کلیوی و کبدی، ورم های دوره آبستنی، فشار قبل از قاعدگی، چاقی همراه با احتباس آب.
مقدار مصرف و طرز استعمال: روزی ۱ ــ ۳ قرص. فشارخون شریانی: روزی ۱ ــ ۲ قرص همراه با سایر داروهای ضدفشارخون.
خردسالان روزی نیم تا یک قرص .
موارد منع استعمال: نارسائی شدید کلیوی.
بسته بندی: دراژه × ۲۰ .
بها: ۱۶۸ ریال.

ESKACEF
اسکاف ــ انگلستان

ترکیب: سفرادین .
موارد استعمال: کلیه عفونتهای حساس به‌آنتی‌بیوتیک فوق .

مقدار مصرف و طرز استعمال: برحسب نوع و شدت بیماری متفاوت است.

بسته بندی: کپسول ۲۵۰ و ۵۰۰ میلی‌گرم × ۱۲ شربت ۱۲۵ میلی‌گرم ـ ۵ میلی‌لیتر × ۶۰ میلی‌لیتر. آمپول ۲۵۰ و ۵۰۰ میلی‌گرم.

بها: کپسول ۲۵۰ میلی ۴۶۰ ریال، ۵۰۰ میلی ۸۲۰ ریال. شربت ۲۵۰ ریال. آمپول ۱۰۰۰ میلی ۲۸۰ ریال ۵۰۰ میلی ۱۵۰ ریال.

E

ESKAZINA

اسکا اف ـ انگلستان

ترکیب: دی کلریدرات تری فلوئوپرازین.

موارد استعمال: اضطرابات، ضربه‌های عصبی و هیجانی، حالات تحریک، اضطرابات قاعدگی و یائسگی، اسکیزوفرنی حاد و مزمن، پسیکوز ناشی از ضایعات ارگانیک مغز، پسیکوزسمی، الکلیسم مزمن، اختلالات رفتار در عقب‌ماندگیهای روانی.

مقدار مصرف و طرز استعمال: در موارد خفیف ـ بزرگسالان: روزی ۲ ـ ۴ میلی‌گرم، خردسالان: روزی ۱ ـ ۲ آمپول یا ۱ ـ ۳ تزریق عضلانی، درموارد شدید: خوراکی: بزرگسالان: ۱۰ میلی‌گرم در روز. خردسالان: ۵ میلی‌گرم در روز. تزریقی: حداکثر ۶ میلی‌گرم در روز. خردسالان: بازاء هر ۲۰ کیلو ۱ آمپول عضلانی.

موارد منع استعمال: اختلالات خونی، دپرسیون مغز استخوان، ضایعات کبدی.

احتیاط: در بیماران مبتلا به‌آرتریواسکلروز و آنژین دوپوآترین باید با احتیاط مصرف شود.

عوارض جانبی: گاهی سستی، خواب‌آلودگی، خشکی دهان، سرگیجه، تاری‌دید.

بسته‌بندی: قرص ۱ و ۵ میلی‌گرم × ۵۰، کپسول اسپانسول ۲ میلی‌گرم × ۳۰، کپسول ۱۰ و ۱۵ میلی‌گرم × ۱۰۰. آمپول ۱ میلی‌گرم = ۱ میلی‌لیتر × ۱۲.

بها: قرص ۱۲۵ ریال، کپسول ۲ میلی ۱۹۶ ریال، ۵ میلی ۲۳۰ ریال. ۱۰ میلی ۹۵۰ ریال، ۱۵ میلی ۱۳۵۰ ریال آمپول ۳۱۰ ریال.

E

ESKORNADE
اسکا اف ـ انگلستان

ترکیب: یدورایزوپروپامید ۲/۵ میلی‌گرم + کلریدرات فنیل پروپانولامین ۵۰ میلی‌گرم + هیستریل ۵ میلی‌گرم.

موارد استعمال: احتقان و ترشحات زیاد بینی و سینوسهای اطراف، سرماخوردگی، رینیت، آنفلوانزا، سینوزیت.

مقدار مصرف و طرز استعمال: هر ۱۲ ساعت یک کپسول.

موارد منع استعمال: گلوکوم، هیپرتروفی پروستات، بیماران تحت‌درمان با منوآمینوا کسیداز، حساسیت به‌فرآورده های تهیه شده از پیلور و فرآورده‌های حاوی ید.

احتیاط: هیپرتانسیون، بیماری عروق کرونر، زنان باردار.

عوارض جانبی: گاهی خشکی دهان، تاری دید، احتباس ادراری، خواب‌آلودگی.

بسته بندی: کپسول × ۱۲.

بها: ۹۶ ریال.

ESTANDRON Prolongatum
ارگانون هلند ـ ایران

ترکیب: هر آمپول: بنروات استرادیول ۱ میلی‌گرم + فنیل‌پروپیونات استرادیول ۴ میلی‌گرم + پروپیونات تستوسترون ۲۰ میلی‌گرم + فنیل پروپیونات تستوسترون ۴۰ میلی‌گرم + ایزو کاپروات تستوسترون ۴۰ میلی‌گرم.

موارد استعمال: ناراحتی‌های دوران یائسگی و عوارض آن، استئوپروز.

مقدار مصرف و طرز استعمال: ماهیانه یک آمپول عضلانی.

موارد منع استعمال: آبستنی و تومورهای تحت اثر استروژن، ترومبوفلبیت ترومبوآمبولی، ضایعات کبدی.

بسته بندی: آمپول ۱ میلی‌لیتر × ۱.

بها: ۱۰۵ ریال.

ESTRADURIN
لئو ـ دانمارک

ترکیب: پلی‌استرادیول فسفات ۴۰ میلی‌گرم + کاربوکائین ۵ میلی‌گرم + نیکوتینامید ۲۵ میلی‌گرم + فنیل مرکوریک‌نیترات ۰/۰۲ میلی‌گرم در هر آمپول ۸۰: بترتیب ۸۰ میلی‌گرم + ۵ میلی‌گرم + ۴۰ میلی‌گرم + ۰/۰۲ میلی‌گرم.

موارد استعمال: عوارض ناشی از کمبود استروژن.
مقدار مصرف و طرز استعمال: برحسب نوع و شدت بیماری متفاوت است.
بسته بندی: ویال + ۲ میلی‌لیتر آب مقطر.
بها: ۴۰ میلی ۲۶۵ ریال، ۸۰ میلی ۴۸۰ ریال.

E

ETAPHYLLINE
دلالاند-فرانسه

ترکیب: تئوفیلینات دی‌اتیلن دی‌آمین.
موارد استعمال: آسم، تنگی نفس، بیماریهای قلب و گردش خون، بیماریهای کلیه.
مقدار مصرف و طرز استعمال: آمپول: روزی ۱ ـ ۴ آمپول داخل عضله شیاف: روزی ۱ ـ ۳ عدد. قرص: روزی ۱ ـ ۶ عدد.
بسته بندی: آمپول ۵ میلی‌لیتر × ۶. دراژه × ۲۰، شیاف × ۵.
بها: قرص ۵۰ ریال. شیآف ۳۱ ریال. آمپول ۴۶ ریال.

ETAPHYLLINE Phenobarbital
دلالاند-فرانسه

ترکیب: در هر قرص: اتافیلین ۰/۲۵ گرم + فنوباربیتال ۱۷/۵ گرم. در هر شیاف بترتیب: ۰/۵ گرم + ۱۰۰ میلی گرم.
موارد استعمال: انواع آسم‌ها، تنگی نفس با منشأ قلبی ـ عصبی و تشنجی، بیخوابی، بیماران قلبی و ریوی، آمفیزم ریوی.
مقدار مصرف و طرز استعمال: روزی ۲ ـ ۶ قرص، ۱-۲ شیاف. شربت. بزرگسالان: ۱ ـ ۳ قاشق غذاخوری. خردسالان: ۱ ـ ۳ قاشق مرباخوری. شیرخواران: ۱ قاشق مرباخوری.
بسته بندی: قرص × ۲۰. شیاف × ۵. شربت ۱۸۰ میلی‌لیتر.
بها: قرص ۵۵ ریال. شیاف ۳۲ ریال. شربت ۶۸ ریال.

ETAPHYLLINE Phenobarbital Papaverine
دلالاند-فرانسه

ترکیب: اتافیلین ۰/۲۰ گرم + فنوباربیتال ۱۷ میلی‌گرم + کلریدرات پاپاورین ۵۰ میلی‌گرم.
موارد استعمال: تشنج، درد، انواع آسم‌ها، آسم‌های عصبی، کورونژیت، سندرم‌های قلبی.
مقدار مصرف و طرز استعمال: روزی ۲ ـ ۶ قرص.

بسته بندی: قرص × ۲۰ .
بها: ۶۰ ریال.

E

ETHNINE
آلن هانبوریز انگلستان
ـ داروپخش ایران

ترکیب: در هر قاشق مرباخوری: فولکودین ۴ میلی گرم.
موارد استعمال: سرفه های خشک بدون خلط، سرفه های ناشی از تحریک حنجره و نای.
مقدار مصرف و طرز استعمال: خردسالان: روزی ۳ ـ ۴ بار، هربار تا یک قاشق مرباخوری برحسب سن. بزرگسالان: روزی ۳ ـ ۴ بار، هربار ۲ قاشق مرباخوری.
بسته بندی: شربت ۱۰۰ میلی لیتر.
بها: ۵۳ ریال.

ETIBI
جیورجیوزویا ـ ایتالیا

ترکیب: درهرقرص: ایزومر راست گرد اتیلن دی آمینو دی بوتول (اتامبوتول) ۲۵۰ میلی گرم.
موارد استعمال: درمان سل اولیه و مقاوم. بعنوان درمان ثانویه همراه با ایزونیازید در سل ریوی که میکوباکتری آن نسبت به سایر داروهای ضدسل مقاوم شده است.
مقدار مصرف و طرز استعمال: در دوماه اول ۲۵ میلی گرم بازاء هرکیلو وزن. ادامه درمان: ۱۵ میلی گرم بازاء هرکیلو وزن.
موارد منع استعمال: گلوکوم.
عوارض جانبی: اختلال دید.
بسته بندی: قرص × ۵۰ و ۱۰۰۰ .
بها: ۵۰عددی ۲۹۰ ریال، ۱۰۰۰ عددی ۵۲۷۵ ریال.

ETIBI INH
جیورجیوزویا ـ ایتالیا

ترکیب: ایزومر راست گرد اتیلن دی آمینو دی بوتول (اتامبوتول) ۳۰۰ میلی گرم + ایزونیازید ۱۰۰ میلی گرم.
موارد استعمال: درمان اولیه و مقاوم بیماری سل.
مقدار مصرف و طرز استعمال: ۳ تا ۸ قرص برحسب وزن بدن.
احتیاط: بایستی قبل از تجویز چشمها را دقیقاً معاینه نمود.

بسته بندی: قرص × ۵۰.
بها: ۵۰۰ ریال.

EUGLUCON
بهرینگر مانهایم آلمان ـ تهران شیمی ایران

ترکیب: گلی‌بن کلامید ۵ میلی‌گرم
موارد استعمال: هیپرگلیسمی، دیابت سالمندان.
مقدار مصرف و طرز استعمال: ابتدا روزی نصف قرص که حداکثر به ۳ قرص در روز، همراه با غذا، افزایش داده میشود.
موارد منع استعمال: دیابت نوجوانان، کوما و پری کومای دیابتیک، اختلال شدید در کار کلیه‌ها.
عوارض جانبی: هیپوگلیسمی، تب، بثورات جلدی، تهوع.
بسته‌بندی: قرص × ۳۰.
بها: ۱۷۶ ریال.

EUGYNON
شرینگ ـ آلمان

ترکیب: هر قرص: نورژسترل ۰/۵ میلی‌گرم + اتی‌نیل استرادیول ۰/۰۵ میلی‌گرم.
موارد استعمال: جلوگیری از آبستنی، دیسمنوره بدون علت عضوی، آندومتریوز، نازائی فونکسیونل، بی‌نظمی‌های قاعدگی (قاعدگیهای مکرر یا زیاد).
مقدار مصرف و طرز استعمال: در اولین دوره درمان روزی ۱ قرص. از روز پنجم تا روز ۲۵ قاعدگی.
موارد منع استعمال: سرطان پستان و مجاری تناسلی، فیبروئید.
بسته‌بندی: قرص × ۲۱.
بها: ۷۰ ریال.

EUPACO
مرك ـ آلمان

ترکیب: اوپاورین ۳۰ میلی‌گرم + پزدوتروپین ۰/۲۵ میلی‌گرم + لومینال ۱۵ میلی‌گرم + دی متیل آمینوفنازول ۱۵۰ میلی‌گرم.
موارد استعمال: اسپاسم پیلور، روده، کیسه‌صفرا و مجاری صفراوی، مجای ادراری، برای تسریع بازشدن دهانه رحم و تسکین درد، درد زایمان.

مقدار مصرف و طرز استعمال: روزی یک شیاف و در موارد شدید ۲ شیاف.
بسته بندی: شیاف × ۵.
بها: ۶۸ ریال.

EURAX
گایگی ـ سویس

ترکیب: N ـ کروتونیل ـ N ـ اتیل ـ O ـ تولوئیدین = کروتامیتون.
موارد استعمال: انواع مختلف خارش، خارش ناشی از آلرژی و آبله مرغان، دیابت ملیتوس، خارش ناشی از گزش حشرات.
مقدار مصرف و طرز استعمال: روزی ۲ ـ ۳ بار در محل می‌مالند.
موارد منع استعمال: حساسیت به‌دارو، نوزادان و خردسالان، التهابات حاد جلدی.
احتیاط: دور از گرما نگهداری شود.
بسته بندی: پماد ۱۰ درصد ۲۰ گرم.
بها: ۸۲ ریال.

EURHYTON
هوسمن ـ سویس

ترکیب: عصاره فعال و مؤثر کراتاگوس اکسی کانتا محتوی ۱/۵ درصد هپتا هیدروکسی فلاوان گلیکوزید.
موارد استعمال: ضعف و نارسائی قلب، طپش قلب، سرعت ضربان، خونریزیها، مسمومیت ها، بی‌نظمی کار قلب.
مقدار مصرف و طرز استعمال: روزی ۳ بار، هربار ۱۵ ـ ۳۰ قطره با کمی آب میل شود.
بسته بندی: قطره ۳۰ میلی‌لیتر.
بها: ۱۴۰ ریال.

EVION
مرك ـ آلمان

ترکیب: در هر آمپول: ویتامین E ۳۰۰ میلی‌گرم: در هر دراژه ۱۰۰ میلی‌گرم.
موارد استعمال: اختلالات هورمونی و متابولیسمی، حالات تهدید به سقط، ناراحتی‌های متعدد قلبی و عروقی، قرحه‌های دیر التیام‌پذیر ساق پا.

مقدار مصرف و طرز استعمال: روزی یک آمپول عضلانی تا ظهور بهبودی که فواصل تزریقات طولانی‌تر میشود. در اختلالات یائسگی و پیوره آلوئولر هفته‌ای ۱ ـ ۲ آمپول عضلانی. قرص: روزی ۱ ـ ۲ عدد.

بسته بندی: آمپول × ۳. دراژه × ۲۰.

بها: آمپول ۱۰۹ ریال، دراژه ۱۰۸ ریال.

EXPANSYL

اسکا اف ـ انگلستان

ترکیب: اسکازینا ۲ میلی‌گرم + سولفات افدرین ۵۰ میلی‌گرم + هیستریل ۵ میلی‌گرم.

موارد استعمال: برونکواسپاسم، برنشیت مزمن، آسم برنشیال خفیف، حملات آسمی.

مقدار مصرف و طرز استعمال: هر ۱۲ ساعت یک کپسول.

موارد منع استعمال: بالا رفتن فشارخون، بیماریهای قلبی، بیماران تحت درمان با منوآمینوا کسیداز.

احتیاط: هیپرتیروئیدیسم، زنان باردار.

عوارض جانبی: گاهی خواب‌آلودگی، خشکی دهان، سرگیجه، طپش قلب، بیقراری.

بسته بندی: اسپانسول × ۳۰

بها: ۱۸۲ ریال.

EXTENCILLINE

اسپسیا ـ فرانسه

ترکیب: بنزاتین پنیسیلین.

موارد استعمال: کلیه مواردیکه پنی‌سیلین باید مصرف شود بخصوص عفونت‌های گونوکوکسی دیرعلاج، سیفلیس اولیه و ثانوی، پیشگیری از تبهای روماتیسمی.

مقدار مصرف و طرز استعمال: برحسب نوع و شدت بیماری متفاوت است.

موارد منع استعمال: اشخاص حساس به‌پنی‌سیلین.

بسته بندی: ۱/۲ مگا.

بها: ۱/۲ مگا ۵۳ ریال.

E

EXTENCILLINE 6,3,3
اسپسیا ـ فرانسه

ترکیب: پروکائین پنی‌سیلین ژ ۳۰۰ هزار واحد + سدیم پنی‌سیلین ژ ۳۰۰ هزار واحد + بنزاتین پنی‌سیلین ۶۰۰ هزار واحد.

موارد استعمال: عفونتهای استرپتوکوکسی (فارنژیت، تونسیلیت، ماستیت، تب اسکلره)، عفونتهای استافیلوکوکسی و پنوموکوکسی، سوزاکهای دیرعلاج، سیفلیس.

مقدار، مصرف و طرز استعمال: برحسب نوع و شدت بیماری متفاوت است.

موارد منع استعمال: اشخاصی که نسبت به پنی‌سیلین و پروکائین حساسیت نشان می‌دهند.

بسته‌بندی: ویال × ۱.

بها: ۴۱ ریال.

EXTRAIT THYROIDIEN
شونه ـ فرانسه

ترکیب: عصاره کامل غده تیروئید.

موارد استعمال: هیپوتیروئیدی، میکزودم، چاقی، آمنوره، هیپرـ کلسترولمی.

مقدار مصرف و طرز استعمال: تا روزی ۲۰ سانتی‌گرم برحسب تجویز پزشک.

بسته‌بندی: قرص ۵ سانتی‌گرم × ۵۰. قرص ۱۰ سانتی‌گرم × ۴۰.

بها: ۵ سانتی ۳۸ ریال. ۱۰ سانتی ۴۰ ریال.

F

FARLUTAL
فارمیتالیا ـ ایتالیا

ترکیب: در هرقرص: استات ۶ـ الفا ـ متیل ـ ۱۷ ـ الفا ـ ئیدروکسی پروژسترون = استات مدروکسی پروژسترون ۱۰ میلی‌گرم

موارد استعمال: اعمال جراحی در زنان آبستن، سقط‌های عادتی، سقط‌های احتمالی

مقدار مصرف و طرز استعمال: برحسب نوع و شدت بیماری متفاوت است.

بسته‌بندی: قرص × ۱۲

بها: ۱۸۰ ریال.

FARMICETINA
فارمیتالیا ـ ایتالیا

ترکیب: در هرویال: کلرامفنیکل سوکسینات یک گرم.

موارد استعمال: تمام عفونتهای حساس به کلرامفنیکل.

مقدار مصرف و طرز استعمال: خردسالان ۱۰ میلی‌گرم برای هرکیلو وزن بدن در روز منقسم به‌مقادیر مساوی. بزرگسالان: هر ۶ـ ۸ ساعت ۵۰۰ میلی‌گرم داخل عضلانی.

عوارض جانبی: اختلال در مراکز خونسازی.

بسته‌بندی: ویال ۱ گرم × ۱۲

بها: ۶۰ ریال

FASIGYN
فایزر آمریکا ـ ایران

ترکیب: در هرقرص: تی نیدازول ۵۰۰ میلی‌گرم.

موارد استعمال: تریکوموناواژینالیس، آنتامباهیستولی‌تیکا، ژیاردیا لامبلیا.

مقدار مصرف و طرز استعمال: ۴ قرص یکجا میل میشود.

بسته‌بندی: قرص × ۴

بها: ۲۱۱ ریال

FAZ INHALER
فاز-ایران

ترکیب: در هر ۱۰۰ میلی‌لیتر: کربنات منیزیم ۷ گرم + مانتول ۲ گرم + روغن اوکالیپتوس ۱۰ میلی‌لیتر

موارد استعمال: التهاب و تورم حاد و مزمن مجاری تنفسی و ریوی، سرماخوردگی، گلودرد، برونشیت.

مقدار مصرف و طرز استعمال: روزی ۳-۴ بار، هربار یک قاشق مربا-خوری را در یک ظرف آب جوش ریخته بخور میدهند.

بسته‌بندی: بخور ۶۰ میلی‌لیتر

بها: ۵۶ ریال

FEBRECTOL
سولاک فرانسه
-فارماشیمی ایران

ترکیب: شیاف بزرگسالان: استیل آمینوفنل ۶۰۰ میلی‌گرم + اسانس اکیوی‌دوپن ۴۰ میلی‌گرم + موکوپلی‌ساکارز ۲۰ میلی-گرم. شیاف خردسالان بترتیب: ۳۰۰ میلی‌گرم + ۳۰ میلی‌گرم + ۱۵ میلی‌گرم. فنوباربیتال ۲۰ میلی‌گرم. شیاف نوزادان بترتیب ۱۵۰ میلی‌گرم + ۲۰ میلی‌گرم + ۱۰ میلی‌گرم + ۱۰ میلی‌گرم.

موارد استعمال: التهاب و ورم دستگاه تنفسی، تراکئیت، برونشیت، گریپ.

مقدار مصرف و طرز استعمال: روزی ۲ بار، هربار یک شیاف. خردسالان و نوزادان: روزی ۱-۲ شیاف

بسته‌بندی: شیاف × ۶.

بها: شیاف بزرگسالان ۷۸ ریال. خردسالان ۶۲/۵ ریال. نوزادان ۴۶ ریال

FEFOL
اسکا اف-انگلستان

ترکیب: سولفات فروخشک ۱۵۰ میلی‌گرم + اسید فولیک ۰/۵ میلی‌گرم

موارد استعمال: پیشگیری از کمبود آهن و اسید فولیک در دوران بارداری.

مقدار مصرف و طرز استعمال: روزی یک کپسول بعد از غذا.

احتیاط: مبتلایان به‌آنمی پرنیسیوز.

عوارض جانبی: گاهی تهوع و ناراحتی‌های گوارشی.
بسته‌بندی: کپسول × ۳۰.
بها: ۱۲۳ ریال

FEMANDREN-M
سیبا ـ سوئیس

ترکیب: در هرمیلی‌لیتر آمپول: منوبنزوات استرادیول ۲/۵ میلی‌گرم + ایزوبوتیرات تستوسترون ۵ میلی‌گرم.
موارد استعمال: اختلالات دورهٔ یائسگی، نشانه‌های نارسائی هورمونی پس از کاستراسیون، هیپوتروفی پروستات، استئوپوروز.
مقدار مصرف و طرز استعمال: روزی یک آمپول عضلانی هر ۳ـ۶ هفته
بسته‌بندی: آمپول ۱ میلی‌لیتر × ۱
بها: ۷۳ ریال

FEMIDOL
لپتی ایتالیا ـ ایران

ترکیب: دکستروپروپوکسی فن ۰/۰۲۷ گرم + کلرپروفن پیریدامین مالئات ۰/۰۰۱۶ گرم + کافئین ۰/۰۳۶ گرم + استیل پاراآمینوفنل ۰/۱۲۰ گرم + آلومینیوم استیل سالیسیلات ۰/۳ گرم.
موارد استعمال: سردرد، نورالژی، میالژی، قاعدگی دردناک، آنفلوانزا، دردهای بعد از اعمال جراحی.
مقدار مصرف و طرز استعمال: خردسالان: روزی دو قرص. بزرگسالان: روزی ۳ـ۸ قرص.
بسته‌بندی: قرص × ۱۰
بها: ۴۱ ریال

FENAROL
وینتروپ ـ آمریکا

خاصیت درمانی: آرام‌بخش و انبساط دهنده مرکزی.
ترکیب: ۲ ـ (۴ کلروفنیل) ـ ۳ ـ متیل ـ ۴ ـ متا تیازانن ـ ۱ ـ دی‌اکسید ـ ترانکوپال.
مکانیسم: مدار پلی‌سیناپتیک با انترونورونها را قطع نموده درنتیجه هیجانات و انقباض عضلات از بین میرود.
موارد استعمال: نگرانی و ناراحتیهای عصبی، ترس و اضطراب، خستگی مزمن و الکلیسم، پارکینسون، فلج، انقباض شدید عضلانی.

مقدار مصرف و طرز استعمال: بزرگسالان: روزی ۳-۴ بار، هربار یک قرص بعد از غذا، خردسالان: نصف مقدار بزرگسالان،
عوارض جانبی: گاهی سرگیجه، برافروختگی چهره، تهوع و ضعف.
بسته‌بندی: قرص ۲۰۰ میلی‌گرم × ۱۲
بها: ۷۹ ریال.

F

FENISTIL
زیما ـ سویس

ترکیب: دیمت پیریدن مالئات.
موارد استعمال: خارش عمومی.
مقدار مصرف و طرز استعمال: خردسالان تا یکسال: روزی ۳۰ قطره. از ۱ تا ۳ سال روزی ۴۵ قطره. از ۳ سال بزرگتر روزی ۶۰ قطره. بزرگسالان: روزی ۶۰-۱۲۰ قطره یا ۶-۳ دراژه.
عوارض جانبی: خشکی دهان، ناراحتی معدی، اسهال، سردرد، لوکوپنی اگرانولوسیتوز
بسته‌بندی: دراژه ۱ میلی‌گرم × ۲۰، قطره ۱ میلی‌گرم = ۱ میلی‌لیتر × ۱۰ میلی‌لیتر.
بها: دراژه ۵۴ ریال. قطره ۴۳ ریال.

FENISTIL RETARD
زیما ـ سویس

ترکیب: در هرقرص: مالئات دی‌متیندیوم ۲/۵ میلی‌گرم.
اثر متقابل: الکل و خواب‌آورها اثر آنرا تقویت میکنند.
موارد استعمال: خارشهای ناشی از آبستنی، سرخک، سرخجه، آبله‌مرغان. اکزمای خارش دار، لیکن پلان، اریتم گره‌ای.
مقدار مصرف و طرز استعمال: هر ۱۲ ساعت یکعدد میل شود.
احتیاط: بعد از مصرف دارو از رانندگی باید خودداری شود.
بسته‌بندی: قرص × ۲۰
بها: ۱۷۵ ریال.

FENOX
بوتس انگلستان ـ پارس ایران

ترکیب: کلریدرات‌فنیل افرین ۰/۲۵ درصد + نافازولین نیترات ۰/۰۲۵ درصد + کلروبوتول ۰/۵ درصد.

موارد استعمال: برای درمان علامتی احتقان مخاط بینی ناشی از سرما-خوردگی، سینوزیت، تب یونجه و غیره.

مقدار مصرف و طرز استعمال: بزرگسالان: هر ۴ساعت ۳-۴ قطره در هرسوراخ بینی می‌چکانند. خردسالان ۱۲-۵ سال: هر ۴ساعت ۲ قطره در هرسوراخ بینی می‌چکانند.

احتیاط: نباید بیش از مقدار توصیه‌شده و مداوم و بدفعات خیلی زیاد مصرف شود.

عوارض جانبی: تحریک موضعی مخاط بینی.

بسته‌بندی: قطره بینی ۱۴ میلی‌لیتر.

بها: ۳۷ ریال.

F

FENOXYPEN

نوو- دانمارک

ترکیب: فنوکسی متیل پنی‌سیلین.

مکانیسم: با وقفه اثر آنزیم ترانس پپتیدازو رقابت با اسید آمینه آلانین موجب ساخته نشدن جدار یاخته میشود.

موارد استعمال: کلیه عفونتهای حساس به پنی‌سیلین.

مقدار مصرف و طرز استعمال: برحسب نوع و شدت بیماری متفاوت است.

بسته‌بندی: قرص یک‌میلیون واحدی × ۱۲. شربت ۵۰ هزارواحد= ۱ میلی‌لیتر × ۹۰.

بها: قرص ۱۲۶ ریال. شربت ۸۵ ریال.

FENTAZIN

آلن هانبوریز
انگلستان- داروپخش ایران

ترکیب: پرفنازین.

موارد استعمال: اضطراب و حالات فشار روحی، اختلالات روان‌تنی، کنترل صرع و استفراغ.

مقدار مصرف و طرز استعمال: قرص: روزی ۱۲ میلی‌گرم حداکثر تا ۲۴ میلی‌گرم. آمپول: شروع ۵ میلی‌گرم داخل عضلانی هر ۶ساعت یکبار.

موارد منع استعمال: به بیمارانی که لکوپنی دارند و یا داروهائی مصرف میکنند که باعث کم کاری مغز استخوان میشود نباید داده شود. در سه ماهه اول آبستنی تا حد امکان مصرف نشود.

احتیاط: در بیماران حساس به‌فنوتیازین گاهی علائم خارج هرمی مانند تونوس عضلانی، اسپاسم و لرزش رخ میدهد.

بسته‌بندی: قرص ۲ و ۴ و ۸ میلی‌گرم × ۵۰ و ۵۰۰. آمپول ۵ میلی‌گرم = ۱ میلی‌لیتر × ۵ و ۱۰

F

بها: قرص ۵۰ عددی: ۲ میلی ۱۰۵ ریال، ۴ میلی ۱۴۱ ریال، ۸ میلی. ۱۸۷ ریال. قرص ۵۰۰ عددی: ۲ میلی ۹۳۶ ریال، ۴ میلی ۱۴۰۴ ریال، ۸ میلی ۱۶۳۸ ریال. آمپول ۵ عدد ۱۰۵ ریال

FEOSPAN
اسکا اف ـ انگلستان

ترکیب: سولفات فرو خشک ۱۵۰ میلی‌گرم.

موارد استعمال: درمان و پیشگیری کم‌خونی ناشی از فقر آهن.

مقدار مصرف و طرز استعمال: روزی ۱ـ۲ کپسول پس از هر غذا

موارد منع استعمال: زخم معده و اثنی‌عشر.

عوارض جانبی: یبوست، گاهی تهوع

بسته‌بندی: کپسول × ۳۰

بها: ۱۱۲ ریال

FER - IN - SOL
میدجانسون ـ آمریکا

ترکیب: در هر میلی‌لیتر قطره سولفات فرو ۱۲۵ میلی‌گرم

موارد استعمال: پیشگیری و درمان آنمی ناشی از کمبود آهن، کم‌خونی خردسالان ناشی از کمبود آهن، کمبود وزن نوزادان.

مقدار مصرف و طرز استعمال: روزی ۰/۳ـ۶ میلی‌لیتر

بسته‌بندی: قطره خوراکی ۱۵

بها: ۴۹ ریال

FERRO - BIFACTON
ارگانون هلند ـ ایران

ترکیب: تارترات فرو ۱۰۰ میلی‌گرم + فاکتور انترنسیک ۰/۰۵ واحد + کربنات مس ۰/۰۹۵ میلی‌گرم + ویتامین C ۱۰ میلی‌گرم.

موارد استعمال: آنمی‌های هیپوکروم، کمی وزن، بی‌اشتهائی، زنان باردار و شیرده، فقر آهن، اختلالات کبدی.

مقدار مصرف و طرز استعمال: روزی ۳ بار، هربار ۱-۳ قرص.
بسته‌بندی: قرص × ۱۰۰
بها: ۹۴ ریال

FERRONICUM
ساندوز سویس - ایران

ترکیب: در هرقاشق غذاخوری شربت: گلوکونات فرو ۰/۴ گرم معادل ۴۶ میلی‌گرم آهن دوظرفیتی. در هرقرص: ۰/۲ گرم گلوکونات فرو معادل ۲۳ میلی‌گرم آهن دوظرفیتی.
موارد استعمال: در تمام مواردیکه کمبود آهن باید پیشگیری و یا درمان شود.
مقدار مصرف و طرز استعمال: بزرگسالان: روزی ۳ بار، هربار ۱ تا ۲ قاشق سوپخوری شربت. خردسالان: روزی ۳ بار، هربار ۲ قاشق مرباخوری شربت.
بسته‌بندی: شربت ۲۰۰ میلی‌لیتر.
بها: شربت ۷۰ ریال

FERRUM - SR
هوسمن - سویس

ترکیب: در هر کپسول فومارات فرو ۳۳۰ میلی‌گرم + ویتامین B_1 ۵ میلی‌گرم.
موارد استعمال: کم‌خونی ناشی از کمبود آهن
مقدار مصرف و طرز استعمال: روزی ۱-۲ کپسول پس از غذا
موارد منع استعمال: زخم معده و روده

FERSOLIN
گلاکسو انگلستان - داروپخش ایران

ترکیب: در هرقرص: سولفات آهن خشک شده ۲۰۰ میلی‌گرم + سولفات مس ۲/۵ میلی‌گرم + سولفات منگنز ۳/۵ میلی‌گرم.
موارد استعمال: کلیه کم‌خونیهای ناشی از فقر آهن، ازجمله کم‌خونی هیپوکروم، در دوران آبستنی و شیردهی، بواسیر، منوراژی.
مقدار مصرف و طرز استعمال: برای تشکیل هموگلوبین بمیزان ۱-۰/۰۲ در روز: روزی ۳ بار، هربار ۱ قرص.

بسته‌بندی: کپسول × ۳۰
بها: ۲۲۰ ریال

بسته‌بندی: قرص × ۱۰۰ و ۱۰۰۰

بها: ۱۰۰ عددی ۳۰ ریال، ۱۰۰۰ عددی ۲۰۰ ریال.

FESOVIT
اسکا اف ـ انگلستان

ترکیب: در هر کپسول: سولفات فرو ۱۵۰ میلی‌گرم + ویتامین ث ۵۰ میلی‌گرم + ویتامین B_1 ۲ میلی‌گرم + ویتامین B_2 ۲ میلی‌گرم + ویتامین B_6 ۱ میلی‌گرم + نیکوتینامید ۱۰ میلی‌گرم + پانتوتنات کلسیم ۲/۱۷ میلی‌گرم.

موارد استعمال: کم‌خونی ناشی از فقر آهن، نقاهت عوارض ناشی از کمبود ویتامینهای فوق.

مقدار مصرف و طرز استعمال: روزی ۱ ـ۲ کپسول بعد از غذا

بسته‌بندی: کپسول × ۳۰

بها: کپسول ۱۵۰ ریال

FESTAL
هوخست آلمان ـ ایران

ترکیب: در هر دراژه: لیپاز لوزالمعده ۱۰ واحد + آمیلاز لوزالمعده ۱۰ واحد + پروتئاز لوزالمعده ۱۰ واحد + همی‌سلولاز ۵۰ میلی‌گرم + مواد صفراوی ۲۵ میلی‌گرم.

موارد استعمال: عدم کفایت لوزالمعده، پانکراتیت مزمن، گاستریت و التهاب مزمن اثنی‌عشر، آنتریت، عوارض حاصل از سوء هضم، نفخ با منشأ مختلف.

مقدار مصرف و طرز استعمال: روزی ۳ بار، هربار ۱ ـ۲ دراژه درحین و یا بلافاصله بعد از غذا بدون جویدن میل می‌شود.

بسته‌بندی: دراژه × ۲۰

بها: ۵۳ ریال

FESTAVITAL
هوخست آلمان ـ ایران

ترکیب: لیپاز ۸ واحد + آمیلاز ۸ واحد + تریپسین ۱۴ واحد + همی‌سلولز ۴۰ میلی‌گرم + مواد صفراوی ۲۰ میلی‌گرم + ویتامین A ۲۵۰۰ واحد + ویتامین B_1 ۱ میلی‌گرم + ویتامین B_2 ۰/۶۷ میلی‌گرم + نیاسینامید ۱۶/۷ میلی‌گرم + ویتامین B_6 ۰/۵ میلی‌گرم + کلسیم د. پانتوتنات ۵ میلی‌گرم + اسید فولیک ۰/۶ میلی‌گرم +

ویتامین C ۳۳/۳ میلی‌گرم + ویتامین E ۵ میلی‌گرم + ویتامین P
۱۰ میلی‌گرم + بی‌تارترات دوکولین ۲۵ میلی‌گرم + متیونین
۱۶/۷ میلی‌گرم + آهن + منگنز + مس + ید + فلوئور.

موارد استعمال: ناراحتیهای جهاز هاضمه ناشی از فقدان آنزیم‌ها، بیماریهای مزمن کبد و کیسه صفرا، تظاهرات خستگی و پیری، آبستنی، معالجه و پیشگیری کمبود ویتامین‌ها و مواد فوق، دوران شیر دادن و نقاهت.

مقدار مصرف و طرز استعمال: روزی ۳ بار، هربار ۱-۲ دراژه بعد از هر غذا.

بسته‌بندی: دراژه × ۳۰

بها: ۱۲۷ ریال.

FIBRINOGEN HUMAN
ایمونو-اطریش

ترکیب: در هر ۱۰۰ میلی‌لیتر: فیبرینوژن یک میلی‌گرم + سیترات سدیم ۴۰۰ میلی‌گرم + کلرور سدیم ۲۲۵ میلی‌گرم.

موارد استعمال: نقصان فیبرینوژن پلاسما و درنتیجه خونریزیهای وخیم و نارسائی‌های کبدی، نقصان فیبرینوژن در دوران آبستنی بعلل مختلف (مرگ جنین در رحم، سقط جنین توأم با عفونت، مسمومیت شدید حاملگی) نقصان فیبرینوژن بدون علت واضح، مسمومیت حاصله از ارسنیک، کلروفرم، فسفر، کربن تترا کلراید، کم‌خونی شدید درنتیجه لوسمی میلوئید.

مقدار استعمال: طبق دستور پزشک

بسته‌بندی: جعبه شامل یک شیشه محتوی گرد + حلال و دستگاه.

بها: ۴۵۰۰ ریال

FIGINE
بوتس انگلستان
- پارس ایران

ترکیب: عصاره الکلیک ۱۵ درصد میوه سنا ۴۵ درصد + عصاره انجیر ۱۱ درصد + عصاره مالت ۲۶/۷ درصد + اسانس میخک ۰/۰۲ درصد + اسانس نعناع ۰/۰۰۵ درصد.

موارد استعمال: درتمام موارد یبوست‌ها.

مقدار مصرف و طرز استعمال: بزرگسالان و خردسالان بیش از ۱۲ سال: ۱-۲ قاشق مرباخوری، درصورت لزوم تا یک قاشق غذاخوری. کودکان ۵-۱۲ سال: نصف تا ۱ قاشق مرباخوری، درصورت لزوم تا ۲ قاشق مرباخوری، ۱-۵ سال: ۱-۲ قاشق چایخوری.

احتیاط: مانند سایر ملین‌ها نباید به‌مدت طولانی و یا در مواردیکه بیمار دل‌درد شدید دارد بکار برده شود.

بسته‌بندی: شربت ۵۶ میلی‌لیتر.

بها: ۲۳ ریال

FILIBON Prenatal
لدرلی آمریکا ـ ایران

ترکیب: در هر کپسول: ویتامین A ۴ هزار واحد + ویتامین D ۴۰۰ واحد + ویتامین B_1 ۳ میلی‌گرم + ویتامین B_2 ۲ میلی‌گرم + ویتامین B_6 ۲ میلی‌گرم + ویتامین B_{12} ۲ میکروگرم + ویتامین C ۵۰ میلی‌گرم + نیاسینامید ۱۰ میلی‌گرم + اسیدفولیک ۱ میلی‌گرم + املاح مختلف.

موارد استعمال: بعنوان کمک رژیم در دوران حاملگی و شیردادن، تمام موارد کمبود ویتامینها و املاح فوق.

مقدار مصرف و طرز استعمال: روزی یک یا چند کپسول.

بسته‌بندی: کپسول × ۱۰۰

بها: ۲۹۳ ریال.

FILLINE
عبیدی ـ ایران

ترکیب: سدیم توروگلیکوکولات ۱۰ میلی‌گرم + پودوفیلین ۱۰ میلی‌گرم + آلونین ۱۵ میلی‌گرم + کاسکاراساگرادا ۲۵ میلی‌گرم + بلادون ۵ میلی‌گرم + هیوسیامین ۵ میلی‌گرم

موارد استعمال: بعنوان ملین و مسهل، زیادکننده ترشح صفرا

مقدار مصرف و طرز استعمال: بعنوان ملین: روزی دو قرص. بعنوان مسهل: روزی ۳-۴ قرص.

بسته‌بندی: قرص × ۸۰

بها: ۴۷ ریال.

FINALGON
بهرینگر اینگلهایم آلمان
– تولیدارو ایران

ترکیب: اسید نونیلیک و انیلیل آمید + بوتوکسی اتیل استرنیکو- تینیک اسید

موارد استعمال: رماتیسم‌های مفصلی و عضلانی، فیبروزیت، کشش و فشار عضلات در فعالیتهای ورزشی، درد عضلات بعلت حرکت زیاد، لمباگو، نوریت، سیاتیک، بورسیت، اسپاسم عضلات در آرتریت‌ها، برای بهبود گردش خون موضعی و ایجاد حرارت برای تشدید و طولانی کردن اثرات ماساژ درمانی و ورزش.

مقدار مصرف و طرز استعمال: ۱- پماد: درحدود نیم سانتیمتر از خمیر را در روی وسیله مخصوص که در داخل جعبه وجود دارد قرارداده و سپس پماد را با همین وسیله بنرمی روی پوست محل میمالند ۲- لینمنت: ۲ الی ۵ قطره از لینمنت را روی قسمتی از پوست سالم و بدون آسیب محل عارضه قرار داده و بنرمی مالش می‌دهند.

بسته‌بندی: پماد ۲۰ گرم، لینمنت ۴۰ میلی‌گرم

بها: پماد و لینمنت ۵۳ ریال

FLAGYL
اسپسیا – فرانسه

ترکیب: (ئیدروکسی-۲ اتیل) ۱-متیل ۲ نیترو-ایمیدازول = مترو- نیدازول.

موارد استعمال: تریکوموناس واژینالیس، لامبلیاز روده‌ای وکبدی، سالک، اسپیروکت ونسان.

مقدار مصرف و طرز استعمال: تریکوموناس: روزی ۲ بار، هربار یک قرص خوراکی بمدت ۱۰ روز-قرص موضعی شبی یک قرص بمدت ۱۰ روز، آمیبیاز روده‌ای: روزی ۸ قرص بمدت ۵-۷ روز، آمیبیاز کبدی: روزی ۸ قرص بمدت ۷-۱۰ روز،سالک: روزی ۲-۳ قرص بمدت ۱۵-۲۰ روز، لامبلیاز: روزی ۲-۳ قرص بمدت ۷-۱۰ روز

عوارض جانبی: تهوع و استفراغ

بسته‌بندی: قرص ۲۵۰ میلی‌گرم × ۲۰. قرص ژینکولوژیک ۵۰۰ میلی‌گرم × ۱۰.

بها: قرص خوراکی و ژینکولوژیک ۲۰۲ ریال.

FLAGYL Suspension

اسپسیا ـ فرانسه

ترکیب: مترونیدازول

موارد استعمال: تریکوموناواژینالیس، لامبلیازگوارشی و هپاتیک سالک، اسپیروکت ونسان

مقدار مصرف و طرز استعمال: تریکوموناس واژینالیس: ۲ تا ۵ ساله روزی ۲ پیمانه، ۵ تا ۱۰ ساله روزی ۳ پیمانه. بالاتر از ۱۰ سال روزی ۴ پیمانه. آمیبیاز روده‌ای و کبدی: برای خردسالان به‌نسبت ۴۰ میلی‌گرم برای هر کیلو وزن بدن یا تقریباً یک پیمانه برای ۳ کیلوگرم وزن بدن است که در ۲ تا ۴ نوبت همراه با غذا تجویز میکنند. مدت درمان ۵-۷ روز پی‌درپی است. لامبلیاز: همانند تریکوموناس واژینالیس منتها مدت درمان ۵ روز متوالی است. در برخی موارد ممکن است یک دوره پنج‌روزه درمان مجدد نیز پس از ۱۰ تا ۱۵ روز فاصله با دوره درمان اولیه انجام شود.

موارد منع استعمال: سه‌ماهه اول آبستنی، عوارض خونی، بیماریهای دستگاه اعصاب مرکزی.

عوارض جانبی: تهوع و استفراغ، سردرد، دپرسیون، سرگیجه و گاهی لوکوپنی

بسته‌بندی: قرص ۲۵۰ میلی‌گرم × ۲۰، قرص ژینکولوژیک ۵۰ میلی گرم × ۱۰

بها: قرص خوراکی و ژینکولوژیک ۲۰۳ ریال.

FLAXEDIL

اسپسیا ـ فرانسه

ترکیب: ۱-۲-۳-تری (۲-دی‌اتیل آمینواتوکسی) بنزن تری اتیودایدـ = گالامین تری اتیودایدـ.

موارد استعمال: پلویک بطنی، توراسیک، جراحی ریه، بیحسی داخل تراشه، آزمایشهای آندوسکوپی، درمان و جلوگیری شوک، سندرم هیپرتونی عضله، تتانوس، پارالژی اسپاسمودیک، دیسمنوره.

مقدار مصرف و طرز استعمال: مقدار آن نسبت به اشخاص متفاوت است، معمولا در شروع بیهوشی ۱-۲ آمپول.

موارد منع استعمال: ضعف عضلانی (میاستنی)

بسته‌بندی: آمپول ۴۰ میلی‌گرم = ۲ میلی‌لیتر × ۱۰
بها: ۱۱۶ ریال.

FLEBOCORTID
ریختر ـ ایتالیا

ترکیب: همی‌سوکسینات هیدروکورتیزون
موارد استعمال: شوکهای جراحی، شوکهای پس از حوادث و سانحه، حالات آلرژیک و آنافیلاکسی شدید، آسم مداوم و حملات آسم، نارسائی حاد غدد فوق کلیوی، مسمومیتهای حاد و مسمومیتهای همراه با بیماریهای عفونی.
مقدار مصرف و طرز استعمال: بطور متوسط ۲۵-۵۰ میلی‌گرم برای هر کیلوگرم از وزن بدن در روز بصورت عضلانی یا وریدی.
بسته‌بندی: آمپول ۲۵ میلی‌گرم × ۳. آمپول ۱۰۰ میلی‌گرم × ۱. آمپول ۵۰۰ میلی‌گرم × ۱
بها: ۲۵ میلی ۱۷۰ ریال، ۱۰۰ میلی ۱۶۰ ریال، ۵۰۰میلی ۲۴۰ ریال.

FLOXAPEN
بنکارد انگلستان ـ ایران

ترکیب: فلوگزاسیلین سدیم
موارد استعمال: عفونتهای دستگاه تنفسی، پوست و بافت‌های نرم، اوتیت میانی، زخمها و سوختگیها، سپتی‌سمی، مننژیت آندوکاردیت، آنتروکولیت.
مقدار مصرف و طرز استعمال: بزرگسالان ـ خوراکی: هر ۸ ساعت ۲۵۰ میلی‌گرم قبل از غذا، تزریقی: هر ۶-۸ ساعت ۲۵۰-۵۰۰ میلی‌گرم عضلانی، وریدی یا پرفوزیون. خردسالان: نصف مقدار فوق، نوزادان: ربع مقدار بالا.
موارد منع استعمال: حساسیت به پنی‌سیلین یا تزریق زیرملتحمه.
بسته‌بندی: کپسول ۲۵۰ میلی‌گرم × ۱۰۰، شربت ۱۲۵ میلی‌گرم = ۵ میلی‌لیتر × ۶۰ میلی‌لیتر.
بها: کپسول ۲۳۴۱ ریال، شربت ۲۱۲ ریال.

FLUANXOL
FLUANXOL Retard
لوندبک ـ دانمارک

ترکیب: فلوپن تیوکسول (مشتق از تیاگزانتن)

موارد استعمال: خستگیهای عصبی، سستی و کم کاری، دپرسیون و تخیلات، بی‌توجهی، کم دقتی، اضطراب، شیزوفرنی.

مقدار مصرف و طرز استعمال: روزی ۲ بار، هربار ۰/۵ میلی‌گرم که تا ۲ میلی‌گرم افزایش میابد.

عوارض جانبی: با مقادیر زیاد علائم اکستراپیرامیدال ممکن است ظاهر شود.

مصرف در آبستنی: با قید احتیاط در موارد ضروری.

بسته‌بندی: دراژه ۰/۲۵، ۰/۵ و ۱ میلی‌گرم × ۱۰۰. آمپول ۱ میلی‌گرم = ۱ میلی‌لیتر × ۱۰. آمپول ۲۰ و ۴۰ میلی‌گرم روتارد × ۱.

بها: قرص ۰/۲۵ میلی، ۱۷۱ ریال، ۱ میلی ۴۸۰ ریال. آمپول ۲۰- میلی ۲۸۰ ریال. آمپول ۴۰ میلی ۴۸۰ ریال

FLUORO-URACIL
روش ـ سویس

ترکیب: ۵-فلوئورو اوراسیل

موارد استعمال: شیمی درمانی برای درمان تسکینی ضایعات سرطانی.

مقدار مصرف و طرز استعمال: برحسب شدت بیماری متفاوت است.

موارد منع استعمال: دوران حاملگی

بسته‌بندی: آمپول ۲۵۰ میلی‌گرم = ۵ میلی‌لیتر × ۱۰

بها: ۱۲۰۰ ریال

FLUOTHANE
آی.سی.آی ـ انگلستان

ترکیب: ۲-برمو-۲-کلرو-۱، ۱، ۱ تری فلوروواتان = هالوتان

موارد استعمال: در کلیه موارد استفاده از داروهای بیهوشی.

مقدار مصرف و طرز استعمال: برای ایجاد بیهوشی تا ۳درصد فلوتان بهمراه هوا یا اکسیژن مخلوط با پروتوکسید ازت یا بدون آن بکار برده میشود. بعد از آن ادامه بیهوشی با غلظت ۰/۵ تا ۱ درصد حفظ میگردد.

بسته‌بندی: محلول ۵۰ و ۲۵۰ میلی‌لیتر

بها: محلول ۵۰میلی ۴۲۰ ریال، ۲۵۰ میلی ۱۶۷۰ ریال.

FLURAZINE
عبیدی ـ ایران

ترکیب: دی کلریدرات تری فلوئوپرازین.
موارد استعمال: پسیکوز، نوروژ، اختلالات رفتاری، اختلالات نوروژ-تاتیف، اعتیاد و الکلیسم، تهوع و استفراغ و سکسکه.
مقدار مصرف و طرز استعمال: روزی دوبار، هربار ۱-۲ میلی‌گرم.
موارد منع استعمال: اغما، مسمومیت، دپرسیون شدید.
احتیاط: در حساسیت داروئی، دیابت، صرع، آرتریواسکلروز با احتیاط مصرف شود.
عوارض جانبی: گاهی علایم اکسترا پیرامیدال، دیسکرازی خونی و آسیب کبدی.
مصرف در آبستنی: با وجودیکه اثر تراتوژنیک دارو گزارش نشده است بهتر است از مصرف آن خودداری شود.
بسته‌بندی: قرص ۲ میلی‌گرم × ۳۰
بها: ۱۰۵ ریال

FML Liquifilm
آلرگان ـ آمریکا

ترکیب: فلورومتولون ۰/۱ درصد + لیکوئی‌فیلم ۱/۴ درصد
موارد استعمال: کلیه عفونتهای التهابی حاد و مزمن چشمی حساس به کورتیکوستروئیدها.
مقدار مصرف و طرز استعمال: روزی ۲-۴ بار، هربار ۱-۲ قطره در چشم می‌چکانند.
موارد منع استعمال: کراتیت، تب‌خالی، بیماریهای قارچی و ویروسی چشم، سل چشمی.
عوارض جانبی: عفونتهای قارچی چشم.
بسته‌بندی: قطره چشمی ۱۰ میلی‌لیتر.
بها: ۲۰۰ ریال.

FML-NEO
آلرگان ـ آمریکا

ترکیب: فلورومتولون ۰/۱ درصد + سولفات نئومایسین ۰/۵ درصد + لیکوئی‌فیلم ۱/۴ درصد.
موارد استعمال: کونژونکتیویت عفونی، عفونتهای قدامی چشم قبل و بعد از اعمال جراحی چشم.

مقدار مصرف و طرز استعمال: روزی ۳-۴ بار، هربار ۱-۲ قطره.
احتیاط: در بیمارانی که سابقه کراتیت ناشی از هرپس سیمپلکس دارند باید با احتیاط مصرف شود.
بسته‌بندی: سوسپانسیون چشمی ۵ میلی‌لیتر.
بها: ۲۵۰ ریال.

F

FOIE LYOPHILISE
هپاترول ـ فرانسه

ترکیب: در هرآمپول: عصاره کبد لیوفیلیزه ۵۰ میلی‌گرم.
موارد استعمال: دژنراسیون سلولهای کبدی سیروز، نارسائی کبدی، هپاتیت، هیپرکلسترولمی، آرتریواسکلروز، ازتمی، توکسمی، آنمی.
مقدار مصرف و طرز استعمال: روزی ۱-۵ تزریق عضلانی یا وریدی.
بسته‌بندی: آمپول ۵۰ میلی‌گرم + حلال ۲ میلی لیتری × ۳.
بها: ۱۴۰ ریال.

FOLACID
بوسی بی ـ بلژیک

ترکیب: اسید فولیک.
موارد استعمال: سندرم سلیاك، آنمی، ماکروسیتیک ناشی از آبستنی، تنظیم خونسازی
مقدار مصرف و طرز استعمال: روزی ۲-۳ بار، هربار یک قرص بعد از غذا.
بسته‌بندی: قرص ۵ میلی‌گرم × ۲۰.
بها: ۱۱۰ ریال.

FOLICOFER
عبیدی ـ ایران

ترکیب: در هر ۱۲۰ میلی‌لیتر شربت: پیروفسفات فریک ۲/۴ گرم + ویتامین B_{12} ۰/۲ میلی‌گرم + ویتامین B_6 ۴۸ میلی‌گرم + اسید- فولیک ۲۰ میلی‌گرم.
موارد استعمال: آنمی ناشی از فقر آهن، آبستنی و دوران شیردهی، آنمی کودکان، سوء تغذیه.
مقدار مصرف و طرز استعمال: بزرگسالان: روزی ۳-۴ بار، هربار ۱ قاشق مرباخوری. خردسالان: روزی ۲-۳ بار، هربار ۱ قاشق

مریاخوری.
موارد منع استعمال: آنمی پرنیسیوز
بسته‌بندی: شربت ۱۲۰ میلی‌لیتر.
بها: ۷۶ ریال.

F

FONGITEX
فرابس ـ فرانسه

ترکیب: استربوریک اسید تری اکسی بنزوئیک.
موارد استعمال: عفونتهای قارچی سطح پوست، عفونتهای قارچی ناخنها.
مقدار مصرف و طرز استعمال: یکبار صبح یک بار شب با قلم‌مو روی ضایعات می‌مالند.
موارد منع استعمال: کودکان کوچکتر از ۳ ماه
بسته‌بندی: فلاکن ۲۰ میلی‌لیتر.
بها: ۱۰۰ ریال.

FORAPIN
ماک ـ آلمان

ترکیب: در هر ۱۰۰ گرم: ونوم استاندارد زنبور ۰/۰۱ گرم + بنزیل استراسید نیکوتی نیک ۱ گرم + وانیلیلامید اسید نونیلیک ۰/۲ گرم + بورنیل استراسید سالیسیلیک ۳ گرم.
موارد استعمال: درد مفاصل دنده‌ها، دردهای روماتیسمی.
مقدار مصرف و طرز استعمال: ۱-۳ سانتی‌متر از پماد را در محل گذارده مدت ۲-۵ دقیقه ماساژ میدهند.
بسته‌بندی: پماد ۵۰ گرم.
بها: ۱۹۰ ریال.

FORTOLAX
ویو ـ ایران

ترکیب: اسید سیتریک + کربنات منیزیم
موارد استعمال: بعنوان مسهل، ملین
مقدار مصرف و طرز استعمال: تمام محتوی بسته را در یک لیوان آب‌جوش حل کرده پس ازسرد شدن میل میکنند.
بسته‌بندی: پودر ۱۰۰ گرم
بها: ۱۸ ریال

FORTRAVEL
شموفو کس ـ اتریش

ترکیب: سیکلیوین ۱۰ میلی‌گرم + سدیم ساکارین ۲ میلی‌گرم + دکستروز ۳۰۰ میلی‌گرم.
موارد استعمال: تهوع های ناشی از مسافرت
مقدار مصرف و طرز استعمال: نیم ساعت قبل از مسافرت ۱ قرص بمدت ۵ـ۱۰ دقیقه جویده شود.
بسته‌بندی: قرص × ۱۰
بها: ۸۰ ریال.

FRAGIVIX
لاباز ـ فرانسه

ترکیب: اتیل ۲ - (هیدروکسی ۴- بنزوئیل) ۳- بنزوفوران = بنزارون.
موارد استعمال: ساقهای سنگین، کمبود عروقی، واریس، زخم
مقدار مصرف و طرز استعمال: شروع درمان: ۶-۸ قرص بمدت ۴ روز.
ادامهٔ درمان: روزی ۴ قرص
بسته‌بندی: قرص ۱۰۰ میلی‌گرم × ۴۸
بها: ۲۰۰ ریال

FRANOL
وینتروپ آمریکا ـ ایران

ترکیب: تئوفیلین منوهیدرات ۱۳۰ میلی‌گرم + کلریدرات هیدروافدرین ۱۱ میلی‌گرم + فنوباربیتال ۸ میلی‌گرم.
موارد استعمال: آسم برونشیک، تب یونجه، برونشیت مزمن
مقدار مصرف و طرز استعمال: دوز متوسط: روزی ۳ بار، هربار ۱ قرص یا هنگام شروع حملات. در حملات شدید: روزی ۳ بار، هربار ۲ قرص میل شود.
موارد منع استعمال: بیماران مبتلا به هیپرتیروئیدی، بیماران قلبی، عروقی، آسم قلبی.
بسته‌بندی: قرص × ۲۰
بها: ۵۳ ریال.

FRUBIOSE CALCIQUE Forte
فرانسیرتراپوتیک ـ فرانسه

ترکیب: در هرآمپول: ویتامین D ۵ هزار واحد + ویتامین C ۱۰۰ میلی‌گرم + فسفر ۹۴ میلی‌گرم.
موارد استعمال: رشد و نمو اطفال، شکستگی استخوانها، دوران آبستنی

زنان شیرده، هموفیلی و تتانی، کم‌خونی، دوران نقاهت، تمام موارد کمبود ویتامین های فوق

مقدار مصرف و طرز استعمال: روزی ۳ بار، هربار یک آمپول خوراکی.

بسته‌بندی: آمپول ۲۰ میلی‌لیتر × ۲۰

بها: ۱۴۰ ریال

F

FRUGALAN
دیامان ـ فرانسه

ترکیب: سیکلر هگزیل سولفونات فورفنورکس

موارد استعمال: چاقی مفرط، چاقی ناشی از دیابت، فشارخون یا آترو- اسکلروز، چاقی ناشی از بلوغ و منوپوز، بعنوان ضد اشتها.

مقدار مصرف و طرز استعمال: بزرگسالان: روزی ۳ بار، هربار یک کپسول قبل از هرغذا. خردسالان روزی ۱-۲ کپسول.

عوارض جانبی: هیجان، اختلالات عصبی

بسته‌بندی: کپسول ۴۰ میلی‌گرم × ۳۰

بها: ۱۷۵ ریال

FUCA EXCELLENT
کلستروفرو ـ آلمان

ترکیب: ترکیب گیاهی.

موارد استعمال: لاغری از طریق ایجاد لینت مزاج.

مقدار مصرف و طرز استعمال: روزی ۳ بار هربار ۱-۲ قرص.

بسته‌بندی: دراژه × ۵۰

بها: ۱۳۰ ریال.

FULAX
لبتی ایتالیا ـ ایران

ترکیب: در هر دراژه: عصاره خشک روبارب ۱۲/۵ میلی‌گرم + پودر روبارب ۲۵ میلی‌گرم + عصاره خشک صفرا ۲۵ میلی‌گرم + عصاره خشک بلادون ۵ میلی‌گرم + عصاره خشک هیوسیاموس ۲ میلی- گرم + پودر آلون ۴ میلی‌گرم + فنل فتالئین ۵۰ میلی‌گرم + پودو- فیلین ۵ میلی‌گرم.

مکانیسم: پس از وارد شدن در روده‌ها موجب تحریک و افزایش حرکات دودی آنها میشود.

موارد استعمال: بعنوان ملین و مسهل.

مقدار مصرف و طرز استعمال: خردسالان: یک قرص موقع خواب.
بزرگسالان: بعنوان ملین ۱-۲ قرص هنگام خواب. بعنوان مسهل ۲-۵ قرص قبل از خواب یا صبح ناشتا
بسته‌بندی: پاکت ۵ دراژه × ۳۰
بها: ۱۰۵ ریال

F

FUMAGRIPPE
آویسن - ایران

ترکیب: تنطور او کالیپتوس ۸/۳۵ گرم + تنطور بنژوان ۶/۶۵ گرم + کامفر ۰/۸۵ گرم + مانتول ۰/۴۰ گرم + الکل ۷۰ درجه مقدار کافی تا ۵۰ میلی‌لیتر.
موارد استعمال: جلوگیری از سرماخوردگی سردرد، گریپ، زکام، آنفلوآنزا، گرفتگی و آبریزش بینی، برونشیت، سینوزیت، برای ضدعفونی کردن مجاری تنفسی و هوای اطاق کودکان و بیماران
مقدار مصرف و طرز استعمال: روزی ۳ بار، هربار یک قاشق سوپخوری را در یک ظرف آب در حال جوش ریخته و بخور حاصل را استشمام می‌کنند.
بسته‌بندی: محلول ۵۰ میلی‌لیتر
بها: ۴۱ ریال

FURACIN Soluble Dressing
FURACIN Soluble Powder
ایتون - آمریکا

ترکیب: نیتروفورازون ۰/۲ درصد
موارد استعمال: پیشگیری و درمان عفونت‌های سطحی، زخم‌ها، سوختگی‌ها، پیودرمیت‌های مختلف.
مقدار مصرف و طرز استعمال: بطور موضعی استعمال میشود.
موارد منع استعمال: حساسیت بدارو
بسته‌بندی: لوله ۲۸ گرم. قوطی ۱۳۵ گرم. گرد ۱۴ گرم
بها: لوله ۶۵ ریال. قوطی ۱۵۳ ریال. گرد ۸۱ ریال.

FURACIN Solution
ایتون - آمریکا

ترکیب: نیتروفورازون ۰/۲ درصد.
موارد استعمال: شستشوی زخمهای عفونی و سوختگی‌ها، مجاری ادرار و مثانه.

مقدار مصرف و طرز استعمال: محلولهای یک‌ششم و یکدهم برای شستشوی مجاری ادرار، محلول خالص برای زخم و سوختگی.

موارد منع استعمال: حساسیت بدارو

بسته‌بندی: محلول ۶۰ میلی‌لیتر

بها: ۸۷ ریال.

F

FURACIN Urethral Inserts

ایتون ـ آمریکا

ترکیب: نیتروفورازون ۰/۲ درصد

موارد استعمال: ضد میکرب و ضد درد موضعی

مقدار مصرف و طرز استعمال: روزی ۲ عدد صبح و شب در مجرای ادرار و یا هرشب یکعدد بمدت حداقل یکهفته تا ازبین رفتن عارضه.

موارد منع استعمال: حساسیت بدارو

بسته‌بندی: قرص استعمالی × ۱۲

بها: ۱۸۰ ریال

FURABEN

میسن ـ ایران

ترکیب: فورازولیدین.

موارد استعمال: درمان عفونتهای روده‌ای ناشی از میکربهای گرم مثبت و گرم منفی، اسهالها.

مقدار مصرف و طرز استعمال: خردسالان: هرشش ساعت ۵۰ میلی‌گرم بزرگسالان: دوبرابر این مقدار.

بسته‌بندی: سوسپانسیون ۹۰ میلی‌لیتر

بها: ۷۶ ریال

FURADANTIN

ایتون ـ آمریکا

ترکیب: نیتروفورانتوئین

موارد استعمال: پیلونفریت، پیلیت، سیستیت، سیستیت حاصل از میکربهای حساس بدارو.

مقدار مصرف و طرز استعمال: خردسالان: مجموعاً برای هر کیلو ۵ـ۷ میلی‌گرم که در چهاربار روزانه تجویز می‌شود. بزرگسالان: روزی ۴ بار، هربار ۵۰ـ۱۰۰ میلی‌گرم.

موارد منع استعمال: آنوری، الیگوری، نارسائی کلیوی، اطفال کمتر از یکماه.
عوارض جانبی: تهوع و استفراغ
بسته‌بندی: قرص ۵۰ میلی‌گرم × ۲۵، ۱۰۰ میلی‌گرم × ۱۲.
بها: قرص ۵۰ میلی ۲۵۰ ریال، ۱۰۰ میلی ۲۱۶ ریال.

F

FURADANTIN Sodium
ایتون ـ آمریکا

ترکیب: نیتروفورانتوئین سدیم
موارد استعمال: پیلونفریت، پیلیت، سیستیت حاصل از میکروبهای حساس
مقدار مصرف و طرز استعمال: ۷ میلی‌گرم برحسب هر کیلوگرم وزن بدن در دو مقدار مساوی برای تزریق داخل وریدی یا عضلانی.
موارد منع استعمال: دوران آبستنی و خردسالان کمتر از ۱۲ سال
احتیاط و عوارض جانبی: تهوع و استفراغ
بسته‌بندی: شیشه ۱۸۰ میلی‌گرم.
بها: ۱۷۱ ریال

FURANIT
روزا ـ ایران

ترکیب: نیتروفورازون ۰/۲ درصد.
موارد استعمال: درمان عفونت‌های پوستی ناشی از میکروارگانیسم‌های گرم مثبت و گرم منفی، عفونتهای ناشی از سوختگی‌های درجه ۱ و درجه ۲ و ۳، پیودرمیت.
مقدار مصرف و طرز استعمال: برحسب شدت جراحات بر روی محل می‌مالند.
موارد منع استعمال: افراد حساس به نیتروفورازون.
بسته‌بندی: پماد ۳۰ گرم.
بها: ۱۶۴ ریال.

FURAZOL
میسین ـ ایران

ترکیب: نیتروفورازون
موارد استعمال: درمان کلیه سوختگیها و عفونتهای پوستی، زردزخم، بریدگی.

مقدار مصرف و طرز استعمال: روزی ۲-۳ بار روی زخم می پاشند.
بسته‌بندی: گرد ۲۰ گرم.
بها: ۷۰ ریال.

FURILIN
ایکار-ایتالیا
آترا-ایران

ترکیب: در هرقرص: ملح سدیم N-(۵-نیترو-۲-فورفوریلیدن)-۱-آمینو هیدانتوئین ۰/۰۵ گرم.
موارد استعمال: سیستیت، پیلیت، پیلونفریت، سیستوپیلیت، پیشگیری از عفونتها در جراحی مجاری ادراری.
مقدار مصرف و طرز استعمال: روزی ۴-۸ قرص برحسب شدت بیماری ۱ آمپول هر ۸-۱۲ ساعت داخل عضله.
بسته‌بندی: قرص × ۱۵.
بها: قرص ۵۳ ریال

FUROCYCLIN
آرکیفار-ایتالیا

ترکیب: در هر کپسول: تتراسیکلین فسفات کمپلکس معادل کلریدرات تتراسیکلین ۱۲۵ میلی‌گرم + نیتروفورانتوئین ۵۰ میلی‌گرم + کلریدرات فنیل آزودیامینوپیریدین ۵۰ میلی‌گرم + ویتامین B_6 ۲۰ میلی‌گرم.
موارد استعمال: تمام عفونتهای دستگاه ادراری.
مقدار مصرف و طرز استعمال: هر ۸ ساعت ۲ کپسول
موارد منع استعمال: افراد حساس به تتراسیکلین ها، نارسائی حاد کلیوی
بسته‌بندی: کپسول × ۱۶
بها: ۱۴۰ ریال

FUROXONE
ایتون-آمریکا

ترکیب: در هر ۱۵ میلی‌لیتر شربت: فورازولیدون ۵۰ میلی‌گرم + کائولن ۳ گرم + پکتین ۰/۲۲۵ گرم. در هر قرص: فورازولیدون ۱۰۰ میلی‌گرم.
موارد استعمال: اسهالهای ناشی از باکتریها و پروتوزوئرها، آنتریت ها
مقدار مصرف و طرز استعمال: خردسالان: روزی ۴ بار، هربار ۲۵-۵ میلی‌گرم. بزرگسالان: روزی ۴ بار، هربار ۱۰۰ میلی‌گرم.

موارد منع استعمال: خردسالان کوچکتر از یک ماه، حساسیت بدارو.
احتیاط: از مصرف الکل تا چهار روز خودداری شود.
بسته‌بندی: محلول ۶۰ میلی‌لیتر. قرص × ۱۲
بها: محلول ۱۰۵ ریال، قرص ۱۷۶ ریال.

G

GABBRORAL
فارمیتالیا ـ ایتالیا

ترکیب: سولفات آمینوسیدین
موارد استعمال: آمیباز، لامبلیاز، بالانتیدیوز، تریکوموناز، سالمونلوز، شیگلوز.
مقدار مصرف و طرز استعمال: خردسالان: روزی ۱۵-۵۰ میلی‌گرم برای هر کیلو وزن. بزرگسالان: روزی ۰/۵-۲ گرم بمدت ۶ روز
بسته‌بندی: قرص ۱۲۵ و ۲۵۰ میلی‌گرم × ۱۲. شربت ۶۰ میلی‌لیتر.
بها: ۱۲۵ میلی ۱۳۴ ریال، ۲۵۰میلی ۲۳۸ ریال. شربت ۱۵۰ ریال.

GABROMICINA
فارمیتالیا ـ ایتالیا

ترکیب: سولفات آمینوسیدین.
موارد استعمال: سپتی‌سمی استافیلوکوکی، عفونتهای پنوموکوکی و استافیلوکوکی دستگاه تنفسی و ادراری، سوزاك.
مقدار مصرف و طرز استعمال: خردسالان: ۱۰-۲۰ میلی‌گرم برای هر کیلو وزن بدن. بزرگسالان: روزی ۱-۱/۵ گرم که منقسم به مقادیر مساوی تجویز میشود.
موارد منع استعمال: نارسائی کلیوی.
بسته‌بندی: ویال ۰/۵ گرم همراه با آمپول آب‌مقطر ۴ میلی‌لیتر.
بها: ۸۷ ریال.

GAMMA GLOBULIN HUMAN IMMUNO
ایمونو ـ اتریش

ترکیب: محلول ۱۶ درصد گاماگلوبولین سرم انسانی + گلبولین ایمونوسرم ۹۰-۱۰۰ درصد + گلیسرین ۰/۳ مولار + تی‌مروزال یک درهزار.
موارد استعمال: پیش‌گیری و تخفیف بیماری‌های ویروسی نظیر سرخک، هپاتیت اپیدمیک، سرخجه، آبله‌مرغان، اوریون، فلج اطفال،

بیماریهای عفونی وخیم همراه با آنتی‌بیوتیکها.
مقدار مصرف و طرز استعمال: ۰/۲ میلی‌لیتر برای هر کیلوگرم وزن بدن بصورت زیرجلدی یا داخل عضلانی.
بسته‌بندی: ویال ۳۲۰ میلی‌گرم = ۲ میلی‌لیتر.
بها: ۳۸۴ ریال.

G

GAMMALON

دائی‌چی‌سیکو- ژاپن

ترکیب: اسید گاما آمینوبوتیریک
موارد استعمال: عقب ماندگیهای مغزی ناشی از فلج های مغزی اطفال و ضربه های زایمان، فراموشی، بدی حافظه، لکنت زبان، فلجی که بعلت اختلالات جریان خون مغز حادث شده باشد، فشار خون‌های اساسی، فشارهای کلیوی و علائم سوبژکتیف فشار خون بیدارکننده و درمان اغماء که بعلل مسمومیت یا ضربه حادث شده باشد.
مقدار مصرف و طرز استعمال: روزی ۳ بار، هربار ۱ قرص بمدت ۴ روز خردسالان ۱-۳ ساله: ۱-۲ گرم در روز. خردسالان ۴-۶ ساله: ۲-۵ گرم در روز. بالاتر از هفت‌سال: ۳ گرم در روز به نسبت حالات بیماری.
عوارض جانبی: هنگام مصرف خوراکی گرمای بدن افزایش می‌یابد و ممکنست با مصرف مقدار زیاد دارو تهوع و سرگیجه دیده شود.
بسته‌بندی: قرص ۲۵۰ میلی‌گرم × ۱۰۰
بها: ۲۹۰ ریال

GANTRISINE

روش- سویس

ترکیب: ۳ و ۴- دی‌متیل-۵- سولفانیلامیدو ایزوکسازول = سولفافورازول.
موارد استعمال: تمام عفونتهای حاصل در بیماریهای داخلی، مجاری ادرار، زنان، گوش و حلق و بینی، چشم، پنوموني، سپتی‌سمی، مننژیت، ورم لوزه‌ها، سینوزیت، بادسرخ.
مقدار مصرف و طرز استعمال: روزی ۲-۸ قرص یا ۱-۲ آمپول عضلانی یا وریدی.

موارد منع استعمال: مانند سایر سولفامیدها نزد نوزادان زودرس و هفته اول تولد.

بسته‌بندی: قرص ۰/۵ گرم × ۲۰. شربت ۵۰۰ میلی‌گرم = ۵ میلی‌لیتر × ۱۰۰ میلی‌لیتر. آمپول ۲ گرم = ۵ میلی‌لیتر × ۳.

بها: قرص ۱۰۰ ریال. شربت ۱۵۰ ریال. آمپول ۱۳۸ ریال.

G

GARAMYCIN Cream & Ointment

شرینگ آمریکا ـ ایران

ترکیب: در هرگرم کرم: سولفات جنتامایسین ۱/۷ میلی‌گرم. در هرگرم پماد: سولفات جنتامایسین ۱/۷ میلی‌گرم معادل با ۱ میلی‌گرم باز جنتامایسین.

موارد استعمال: فولیکولیت سطحی، اکتیما، فورونکولوز، سیکوزیس ریش و پیودرما گانگرونوز، درماتیت‌های عفونی و اکزمائی، اکنه چرکی، درماتیت‌های سبورئیک عفونی، درماتیت‌های تماسی عفونی و یا عفونتهای میکربی و عفونتهای ثانویه میکربی حاصل از عفونتهای خارجی و یا عفونت‌های میکربی.

مقدار مصرف و طرز استعمال: روزی ۳-۴ بار مقدار کمی از پماد یا کرم بطور موضعی استعمال می‌شود.

موارد منع استعمال: حساسیت بدارو

احتیاط: استعمال آنتی‌بیوتیکهای موضعی گاهی امکان میدهد که ارگانیسمهای غیرحساس مانند قارچها رشد کنند. چنانچه این وضع پیش آید و یا اگر تحریک حساسیت و یا عفونت اضافی دیده شود درمان را باید قطع کرد، و با داروی دیگر درمان مناسب را انجام داد.

بسته‌بندی: کرم و پماد ۰/۱ درصد ۱۵ گرم

بها: ۸۸ ریال

GARAMYCIN INJECTION

شرینگ آمریکا ـ ایران

ترکیب: سولفات جنتامایسین معادل ۴۰ میلی‌گرم باز جنتامایسین.

موارد استعمال: باکتریمی، عفونتهای دستگاه تنفسی ادراری، اورتریت سوزاکی در مردان، عفونتهای معدی ـ روده‌ای، زخمهای عفونی،

عفونتهای نسوج استخوانی و نرم، مننژیت، سپتی‌سمی
مقدار مصرف و طرز استعمال: در بیمارانی که وزنشان از ۶۰ کیلو بیشتر باشد روزی ۳ بار، هربار ۲ میلی‌لیتر (بیماران کمتر از ۶۰ کیلو- گرم ۱/۵ میلی‌لیتر). خردسالان: ۳-۵ میلی‌گرم برای هر کیلو وزن بدن در ۳ قسمت مساوی. شیرخواران و نوزادان: ۶ میلی- گرم برای هر کیلو وزن بدن در ۲ قسمت مساوی.
موارد منع استعمال: بیمارانیکه سابقهٔ حساسیت دارند و یا قبلا از نتیجه درمان با این دارو واکنشهای سمی نشان داده‌اند.
احتیاط: در بیماران کلیوی و زنان آبستن باید با احتیاط مصرف شود.
عوارض جانبی: سرگیجه، عوارض کلیوی و شنوائی.
بسته‌بندی: آمپول ۲۰ میلی‌گرم و ۴۰ میلی‌گرم × ۱، ۸۰ میلی‌گرم × ۱۰
بها: ۲۰ میلی ۹۵ ریال، ۴۰ میلی ۱۴۵ ریال، ۸۰ میلی ۲۸۱ ریال.

GARAMYCIN Ophthalmic
شرینگ آمریکا ـ ایران

ترکیب: در هرمیلی‌لیتر= سولفات جنتامایسین ۳ میلی‌گرم + دی‌سدیم فسفات ۶ میلی‌گرم
موارد استعمال: کونژنکتیویت، بلفاریت، بلفاروکونژنکتیویت، کراتیت، کراتوکونژنکتیویت، اپی‌اسکلریت، داکریوسیستیت، زخمهای قرنیه، گل مژه و عفونتهای کاسه چشم، بعنوان پیشگیری: برای جلوگیری از عفونتهای چشمی قبل و بعد از عمل جراحی در چشم.
مقدار مصرف و طرز استعمال: روزی ۳-۴ بار، هربار ۲ قطره در هرچشم می‌چکانند.
موارد منع استعمال: حساسیت بدارو.
بسته‌بندی: محلول چشمی ۵ میلی‌لیتر.
بها: ۱۲۶ ریال.

GAROIN
می‌اندبیکر- انگلستان

ترکیب: در هرقرص: سدیم دی‌فنیل هیدانتوئین ۱۰۰ میلی‌گرم + سدیم فنوباربیتال ۵۰ میلی‌گرم + سدیم لوریل سولفات ۲/۳۲ میلی‌گرم.
موارد استعمال: صرع (درگراندمال بیشتر از پتی‌مال مؤثر است)

مقدار مصرف و طرز استعمال: تا ۳ روز، روزی ۳ بار، هربار، ۱ قرص. بعداً ۲ قرص پیش از هرغذا.

عوارض جانبی: درصورت تحریک معدی قرص‌ها پس از غذا میل شود.

بسته‌بندی: قرص × ۵۰۰

بها: ۶۵۰ ریال

GASTRALGINE
ویرا ـ ایران

ترکیب: در هر ۱۰۰ گرم: نمک دیژستیو ۴ گرم + سیترات سدیم ۳ گرم + برمور سدیم ۱ گرم + لومینال سدیک ۰/۳ گرم + تنطور بلادون ۲ گرم + تنطور بادیان ۱ گرم + الکلادومانت ۱ گرم.

موارد استعمال: درد معده، سوء هاضمه، ازدیاد ترشی معده و استفراغ.

مقدار مصرف و طرز استعمال: خردسالان: هر ۳ ساعت ۱ قاشق مربا‌خوری. بزرگسالان: روزی ۲ بار، هربار ۱ـ۲ قاشق سوپخوری قبل یا بعد از غذا.

بسته‌بندی: شربت ۱۲۵ میلی‌لیتر.

بها: ۴۷ ریال

GASTRHEMA B_{12}
ژن‌روا ـ فرانسه

ترکیب: در هرآمپول ۵ میلی‌لیتر: عصاره مخاط پیلور ۰/۵ گرم + ویتامین B_{12} ۲۵ میکروگرم.

موارد استعمال: عفونت‌ها، تأخیر رشد، خستگی، ضعف، ناراحتی‌های گوارشی، کم‌خونی‌ها

مقدار مصرف و طرز استعمال: خردسالان: روزی ۱ آمپول. بزرگسالان: روزی ۲ آمپول بعد از غذا.

بسته‌بندی: آمپول × ۸.

بها: ۷۷ ریال.

GASTROPULGITE
بوفور ـ فرانسه

ترکیب: در هربسته گرد: سیلیکات منیزیم و آلومینیوم ۲/۵ گرم + پودر خشک هیدروکسید آلومینیوم و کربنات منیزیم ۰/۵ گرم. در هرقرص بترتیب ۰/۱۲۵ گرم + ۰/۲۵ گرم.

موارد استعمال: اولسر پپتیک، گاستریتهای هیپراسیدیته، فتق هیاتال، دیس پپسی، سوزش معده و مری.

مقدار مصرف و طرز استعمال: ۲۰ دقیقه قبل از هروعده غذا یک بسته گرد را در آب حل کرده و میل می کنند. یا یک قرص میجوند.

بسته‌بندی: گرد ۳ گرم × ۳۰، قرص × ۱۰۰

بها: پودر ۲۰۲ ریال. قرص ۱۹۹ ریال.

GASTROPYLOR

لیوسانتر ـ آی. دی. آی. ایران

ترکیب: مخاط معده و پیلور لیوفیلیزه بره‌شیری + عصاره جگر کنسانتره + ویتامین های: A + B_1 + B_2 + B_6 + B_{12} + PP + D + ویتامین C + پانتوتنات کلسیم + گلیکوکول + گلوکونات کلسیم + اسید های آمینه.

موارد استعمال: تقویت عمومی و تقویت معده نزد سالمندان و بیماران معدی، گاسترکتمی دوران نقاهت و بارداری، بی‌اشتهائی، اختلالات رشد، بدی هضم، آویتامینوز، آنمی ها، خستگی، متعاقب آنتی بیوتیک‌ها، درمان با اشعه ایکس.

مقدار مصرف و طرز استعمال: روزی ۲ بار هربار یک آمپول مایع را با محتوی آمپول پودر در نیم استکان آب مخلوط نموده می‌آشامند.

بسته‌بندی: ۱۲ آمپول خوراکی مایع + ۱۲ آمپول محتوی پودر لیوفیلیزه

بها: ۳۵۱ ریال.

GASTRYL

آی. دی. آی. ایران

ترکیب: سایمتیکون + هیدروکسید آلومینیوم + هیدروکسید منیزیم.

موارد استعمال: اولسرهای معده و اثنی‌عشر هیپراسیدیته، گاستریت، نفخهای شکم و سوء هضم.

مقدار مصرف و طرز استعمال: ۱-۲ قرص یا ۲-۴ قاشق مرباخوری شربت بعد از غذا و هنگام خواب.

بسته‌بندی: شربت ۲۰۰ میلی‌لیتر. قرص × ۵۰.

بها: شربت ۱۱۷ ریال. قرص ۸۸ ریال.

GELFOAM
آبجان ـ آمریکا

ترکیب: اسفنج منعقد کننده و قابل جذب.
موارد استعمال: بصورت خشک و یا آغشته با محلول نمکی ایزوتونیک بعنوان یک بندآورنده قوی در سطح خونریزی مصرف میشود.
بسته‌بندی: بسته‌های استریل ۱۲ سانتیمترمربع × ۴
بها: ۱۵۶ ریال

G

GELUSIL
وارنرلامبرت ـ آمریکا

ترکیب: در هر میلی‌لیتر سوسپانسیون یا هر قرص: تری‌سیلیکات منیزیم ۵۰۰ میلی‌گرم + هیدروکسید آلومینیوم ۲۵۰ میلی‌گرم.
موارد استعمال: هیپراسیدیته، ازوفاژیت اولسرهای مری، گاستریت، اولسر معده و دوازدهه، سوء هاضمه.
مقدار مصرف و طرز استعمال: در بین غذاها و قبل از خواب ۱-۲ قاشق مرباخوری شربت یا ۱-۲ قرص.
بسته‌بندی: سوسپانسیون ۱۸۰ میلی‌لیتر. قرص × ۵۰.
بها: سوسپانسیون ۸۲ ریال. قرص ۸۸ ریال.

GEL «V»
پ.او.اس. ـ ایران

ترکیب: در هر ۱۰۰ گرم ۰/۵ گرم یدوکسوریدین
موارد استعمال: عفونتهای ویروسی چشم و پوست و دستگاه تناسلی (تب‌خال ـ زونا)
مقدار مصرف و طرز استعمال: روزی ۵ بار در روی ضایعه استعمال شود.
بسته‌بندی: کرم ۱۰ گرم × ۱
بها: ۲۱۱ ریال

GEOCILLIN
فایزرآمریکا ـ ایران

ترکیب: کاربنی‌سیلین ایندانیل سدیم.
موارد استعمال: انواع عفونتهای دستگاه ادراری.
مقدار مصرف و طرز استعمال: هر ۶ ساعت یک قرص.
موارد منع استعمال: حساسیت به پنی‌سیلین.
عوارض جانبی: ممکنست ناراحتی معدی روده‌ای بروز کند.
مصرف در آبستنی: بی‌ضرری دارو به ثبوت نرسیده است.
بسته‌بندی: قرص ۵۰۰ میلی‌گرم × ۴۰.

بها: ۱۳۴۶ ریال.

GEOPEN
فایزر آمریکا ـ ایران

ترکیب: دی‌سدیم کاربنی‌سیلین.
موارد استعمال: عفونتهای ادراری، سپتی‌سمی، عفونتهای تنفسی.
مقدار مصرف و طرز استعمال: برحسب نوع و شدت بیماری متفاوت است
موارد منع استعمال: حساسیت به پنی‌سیلین.
بسته‌بندی: ویال ۱ گرم و ۵ گرم.
بها: ۱ گرم ۲۱۱ ریال، ۵ گرم ۸۴۳ ریال

G

GERIATRIC PHARMATON
فارماتون سویس ـ ایران

ترکیب: دی‌متیل اتانول بی‌تارترات ۲۰ میلی گرم + ویتامین A ۴ هزار واحد + ویتامین B_1 ۲ میلی گرم + ویتامین B_2 ۲ میلی گرم + ویتامین B_6 ۱ میلی گرم + ویتامین B_{12} ۱ میکروگرم + ویتامین C ۶۰ میلی گرم + ویتامین D ۴۰۰ واحد + ویتامین E ۱۰ میلی گرم + نیکوتین آمید ۱۵ میلی گرم + پانتوتنات کلسیم ۱۰ میلی گرم + اسید فولیک ۰/۴ میلی گرم + روتین ۲۰ میلی گرم + آهن ۱۰ میلی گرم + ید ۰/۲ میلی گرم + کلسیم ۳/۵ میلی گرم + فسفر ۸۰ میلی گرم + فلوئور ۰/۲ میلی گرم + مس ۱ میلی گرم + پتاسیم ۴ میلی گرم + منیزیم ۱ میلی گرم + منگنز ۵ میلی گرم + روی ۱ میلی گرم + کولین + اینوزیتول + اسید لینولنیک + اسید- لینولئیک.
موارد استعمال: عوارض پیری، افسردگی ناشی از پیری، ترمیم قوای از دست رفته.
مقدار مصرف و طرز استعمال: روزی ۲ بار هربار یک کپسول هنگام صبحانه و نهار بمدت ۱ـ۴ هفته.
بسته‌بندی: کپسول × ۳۰
بها: ۴۵۰ ریال.

GERIPLEX
پارک دیویس آمریکا ـ ایران

ترکیب: ویتامین A ۵۰۰۰ واحد + ویتامین B_1 ۵ میلی گرم + ویتامین B_2 ۵ میلی گرم + ویتامین B_{12} ۲ میکروگرم + ویتامین C ۵۰ میلی گرم

+ ویتامین E ۵ واحد + نیکوتینامید ۱۵ میلی‌گرم + تاکادیاستاز ۱۵۰ میلی‌گرم + کولین ۲۰ میلی‌گرم + فسفات کلسیم ۲۰۰ میلی‌گرم + سولفات مس ۴ میلی‌گرم + سولفات فرو ۳۰ میلی‌گرم + سولفات منگنز ۴ میلی‌گرم + سولفات روی ۲ میلی‌گرم.

موارد استعمال: مکمل ویتامین و مواد معدنی، همراه دیاستاز برای سالمندان.

مقدار مصرف و طرز استعمال: روزی یک کپسول یا بیشتر.

بسته‌بندی: کپسول × ۲۵

بها: ۱۰۵ ریال

GEROBION
مرک ـ آلمان

ترکیب: در هر کپسول: بی‌تارترات کولین ۵۰ میلی‌گرم + اینوزیتول ۵۰ میلی‌گرم + اولئات منیزیم ۵۰ میلی‌گرم + ویتامین A ۵ هزار واحد + ویتامین D_3 ۰/۰۲۵ میلی‌گرم + ویتامین E ۱۰ میلی‌گرم + ویتامین B_1 ۴ میلی‌گرم + ویتامین B_2 ۳ میلی‌گرم + نیکوتینامید ۲۵ میلی‌گرم + ویتامین B_6 ۴ میلی‌گرم + ویتامین P ۱۰ میلی‌گرم.

موارد استعمال: تقویت عمومی، کاهش سرعت پیرشدگی، برطرف کردن عوارض حاصل از کار زیاد، کمبود ترکیبات و ویتامین‌های فوق.

مقدار مصرف و طرز استعمال: پیشگیری: روزی ۱-۲ کپسول. درمان: روزی ۳ بار، هربار ۱ کپسول.

بسته‌بندی: کپسول × ۳۰

بها: ۹۴ ریال

GERODERM ACIDO
درمون ـ ایتالیا

ترکیب: (۳، ۴،۴ تری کاربانیلیدو) اسید لاکتیک ۰/۱ درصد ـ آسپتانید (با ph ۵/۵)

موارد استعمال: شستشوی موهای چرب، بهداشت بانوان.

مقدار مصرف و طرز استعمال: مخصوص شستشوی موی سر و بدن

بسته‌بندی: صابون ۹۰ گرم.

بها: ۱۷۹ ریال

GERODERM NEUTRO
درمون ـ ایتالیا

ترکیب: در هر ۱۰۰ گرم: آسپتانید ۰/۱ گرم (با PH ۷)
موارد استعمال: شستشوی پوستهای چرب اسیدی، ضدعفونی.
مقدار مصرف و طرز استعمال: مخصوص شستشوی پوست بدن‌و موی سر.
بسته بندی: صابون ۹۰ گرم.
بها: ۱۷۹ ریال.

G

GERODERM ZOLFO
درمون ـ ایتالیا

ترکیب: در هر ۱۰۰ گرم: آسپتانید ۰/۵ گرم + گوگرد بیولوژیک ۳ گرم (با PH ۵/۵)
موارد استعمال: شوره‌سر ناشی از آکنه و لگاریس، بهداشت بانوان.
مقدار مصرف و طرز استعمال: مخصوص شستشوی موی سر.
بسته‌بندی: صابون ۹۰ گرم.
بها: ۱۷۹ ریال.

GESTANON
ارگانون هلند ـ ایران

ترکیب: آلیل استرنول ۵ میلی‌گرم
موارد استعمال: سقط عادتی، تهدید به‌سقط، دردهای زایمانی زودرس
مقدار مصرف و طرز استعمال: سقط تهدیدی: روزی ۳ قرص بمدت ۵ـ۷ روز. سقط عادتی: روزی ۱ قرص بمدت ۲ـ۴ ماه تا رفع خطر.
بسته‌بندی: قرص × ۲۰
بها: ۱۹۹ ریال.

GESTYL
ارگانون ـ هلند

ترکیب: در هرآمپول: گونادوتروپین سرم + کلرورسدیم ۹ میلی‌گرم.
موارد استعمال: نازائی دراثر عدم تخمک‌گذاری، آمنوره اولیه و ثانویه، تأخیر در بلوغ.
مقدار مصرف و طرز استعمال: از روز ۹ تا ۱۴ قاعدگی روزی ۴۰۰ واحد تزریق عضلانی، روز ۱۴ قاعدگی ۲۰۰ واحد تزریق داخل ورید. این درمان را درصورت احتیاج در چند دوره قاعدگی میتوان تکرار نمود.
احتیاط: در زمان درمان باید تخمدانها را بطور مرتب از نظر حجم

معاینه کرد تا زیاد بزرگ نشوند.

عوارض جانبی: تحریک و بزرگی تخمدان‌ها، بارداری چندقلو، آسیت.

بسته‌بندی: آمپول ۲۰۰، ۴۰۰، ۱۰۰۰ واحدی لیوفیلیزه × ۳.

بها: ۲۰۰ واحدی ۱۷۰ ریال، ۴۰۰ واحدی ۲۳۰ ریال، ۱۰۰۰- واحدی ۴۰۰ ریال

G

GESTYL TESTO
ارگانون ـ هلند

ترکیب: گونادوتروپین خالص تهیه شده از سرم مادیان حامله ۴۰۰ واحد + تستوسترون قابل حل در آب ۵۰ میلی‌گرم.

موارد استعمال: عقیمی بعلت الیگواسپرمی، اختلالات اسپرماتوژنز، آستنواسپرمی، کمک در نارسائی جنسی مردان.

مقدار مصرف و طرز استعمال: هفته‌ای ۳ تزریق بمدت ۶ هفته، جمعاً ۱۸ تزریق عضلانی.

بسته‌بندی: آمپول ۴۰۰ واحدی بصورت پودر، هرآمپول حاوی ۵۰ میلی‌گرم تستوسترون قابل حل در آب × ۲

بها: ۳۳۰ ریال

GEVRAL Cap
لدرلی آمریکا ـ ایران

ترکیب: در هر کپسول: ویتامین A ۵ هزار واحد + ویتامین D ۵۰۰ واحد + ویتامین B_{12} با اوترینیک عصاره فاکتور انترنسک لدرلی ۱ میکروگرم + ویتامین مونونیترات ۵ میلی‌گرم + ریبو- فلاوین ۵ میلی‌گرم + نیاسینامید ۱۵ میلی‌گرم + کلریدرات پیریدوکسین ۰/۵ میلی‌گرم + پانتوتنات کلسیم ۵ میلی‌گرم + کولین بی‌تارترات ۵۰ میلی‌گرم + اینوزیتول ۵۰ میلی‌گرم + اسید آسکوربیک ۵۰ میلی‌گرم + منوکلریدرات لیزین ۲۵ میلی- گرم + ویتامین E ۱۰ واحد + فومارات آهن ۳۰ میلی‌گرم + ید ۰/۱ میلی‌گرم + کلسیم ۱۴۵ میلی‌گرم + فسفر ۱۱۰ میلی‌گرم + مس ۱ میلی‌گرم + منگنز ۱ میلی‌گرم + منیزیم ۱ میلی‌گرم + پتاسیم ۵ میلی‌گرم + روی ۰/۵ میلی‌گرم.

موارد استعمال: جلوگیری از بروز کمبود ویتامین‌ها و مواد معدنی فوق.

مقدار مصرف و طرز استعمال: روزی یک کپسول پس از هرغذا یا

برحسب تجویز پزشک.
بسته‌بندی: کپسول × ۱۰۰ و ۳۰.
بها: ۳۰ عددی ۱۲۳ ریال، ۱۰۰ عددی ۴۱۰ ریال

GEVRAL PROTEIN
لدرلی آمریکا
ـ ایران

G

ترکیب: در هر ۳۰ گرم: ویتامین A ۲۵۰۰ واحد + ویتامین D ۲۵۰ واحد + تیامین منونیترات ۲/۵ میلی‌گرم + ریبوفلاوین ۲/۵ میلی‌گرم + نیاسینامید ۷/۵ میلی‌گرم + کلریدرات پیریدوکسین ۰/۲۵ میلی‌گرم + کلسیم پانتوتنات ۲/۵ میلی‌گرم + ویتامین B_{12} ۱ میکروگرم + کولین بی‌تارترات ۵۰ میلی‌گرم + اینوزیتول ۲۵ میلی‌گرم + اسید اسکوربیک ۲۵ میلی‌گرم + لیزین ۱۰/۵ میلی‌گرم + ویتامین E ۵ واحد + فاکتور انترنسک کنسانتره تصفیه شده ۰/۵ میلی‌گرم + کلسیم ۴۱۴ میلی‌گرم + فسفر ۶۰/۹ میلی‌گرم + کلسیم کازئینات ۲۱ میلی‌گرم + فومارات آهن ۱۵ میلی‌گرم + مس ۰/۵ میلی‌گرم + ید ۰/۰۵ میلی‌گرم + پتاسیم ۱۵ میلی‌گرم + منگنز ۰/۵ میلی‌گرم + روی ۰/۲۵ میلی گرم + منیزیم ۰/۵ میلی‌گرم + کربوهیدرات (از عصارهٔ مالت و ساکارز) ۷ میلی‌گرم + کالری ۱۰۵/۳ + پروتئین کل ۶۰ درصد + سدیم ۰/۱۹ درصد + چربی ۲ درصد.
موارد استعمال: جلوگیری از اختلالات تغذیه، کمبود ویتامین‌ها و مواد معدنی فوق.
مقدار مصرف و طرز استعمال: بزرگسالان: روزی ۲ ـ ۴ قاشق سوپخوری
بسته‌بندی: پودر ۲۴۰ گرم.
بها: ۱۷۶ ریال.

GEVRINE Cap
لدرلی آمریکا
ـ ایران

ترکیب: در هر کپسول: اتی‌نیل استرادیول ۰/۰۱ میلی‌گرم + متیل تستوسترون ۲/۵ میلی‌گرم + ویتامین A ۵ هزار واحد + ویتامین B_{12} ۱ میکروگرم + تیامین منونیترات ۵ میلی‌گرم + ریبو-فلاوین ۵ میلی‌گرم + نیاسینامید ۱۵ میلی‌گرم + کلریدرات پیریدوکسین ۰/۵ میلی‌گرم + کلسیم پانتوتنات ۵ میلی‌گرم +

منو کلرولیزین ۵۰ میلی‌گرم + کولین بی‌تارترات ۵۰ میلی‌گرم + اینوزیتول ۵۰ میلی‌گرم + اسید آسکوربیک ۵۰ میلی‌گرم + ویتامین E ۱۰ واحد + فومارات آهن ۳۰ میلی‌گرم + ید ۰/۱ میلی‌گرم + کلسیم ۱۴۵ میلی‌گرم + فسفر ۱۱۰ میلی‌گرم + مس ۱ میلی‌گرم + پتاسیم ۵ میلی‌گرم + منگنز ۱ میلی‌گرم + روی ۰/۵ میلی‌گرم + منیزیم ۱ میلی‌گرم.

مقدار مصرف و طرز استعمال: روزی ۱ کپسول.

بسته‌بندی: کپسول × ۱۰۰ و ۳۰

بها: کپسول ۳۰ عددی ۱۴۰ ریال، ۱۰۰ عددی ۵۲۷ ریال.

GIOPEN
فابزر آمریکا ـ ایران

ترکیب: دی‌سدیم کاربنی‌سیلین

موارد استعمال: عفونتهای مجاری ادرار، سپتی سمی، عفونتهای تنفسی.

مقدار مصرف و طرز استعمال: بر حسب نوع و شدت بیماری متفاوت است.

موارد منع استعمال: دوران آبستنی.

بسته‌بندی: ویال ۱ گرم.

بها: ۲۱۷ ریال.

GLAUPAX
آرکوفام ـ دانمارک

ترکیب: استازولامید.

موارد استعمال: گلوکوم حاد، اولیه و ثانویه.

مقدار مصرف و طرز استعمال: بر حسب شدت بیماری متفاوت است.

موارد منع استعمال: اسیدوز، بیماری آدیسون، ایدیوپاتیک هیپرکلرمیک کلیوی، هرگونه نارسائی فوق کلیوی.

عوارض جانبی: مصرف بیش از حد باعث پاراستزی انگشتان، صورت و پا میگردد.

بسته‌بندی: قرص ۲۵۰ میلی‌گرم × ۲۵.

بها: ۳۰۰ ریال.

GLIFANAN
روسل ـ فرانسه

ترکیب: گلافنین در هر قرص ۲۰۰ میلی‌گرم.
موارد استعمال: انواع دردها.
مقدار مصرف و طرز استعمال: بزرگسالان: ابتدا ۲ قرص بعداً هر ۶ ساعت ۱ قرص. خردسالان: روزی ۳ بار هر بار ۰/۵ ـ ۱ قرص.
موارد منع استعمال: نارسائی شدید کلیوی.
عوارض جانبی: تهوع، استفراغ، واکنش های آلرژیک.
مصرف در حاملگی: در ۳ ماهه اول حاملگی ممنوع است.
بسته‌بندی: قرص ۲۰۰ میلی‌گرم × ۱۸.
بها: ۱۵۸ ریال.

GLOBENICOL
مایکوفارم هلند ـ آی. دی. آی. ایران

ترکیب: کلرامفنیکل.
موارد استعمال: تبهای تیفوئیدی، مننژیت، تب کیو، بروسلوز، تولارمیا
مقدار مصرف و طرز استعمال: برحسب نوع و شدت بیماری متفاوت است.
موارد منع استعمال: اختلالات خونی. دوران آبستنی.
عوارض جانبی: دیسکرازی خونی
بسته‌بندی: کرم ۱۰ گرم. ویال محتوی پودر سوکسینات. سوسپانسیون پالمیتات ۶۰ میلی‌گرم. کپسول ۲۵۰ میلی‌گرم × ۱۰۰
بها: کرم ۵۹ ریال. ویال سوکسینات ۹۴ ریال. سوسپانسیون ۱۰۵ ریال. کپسول هرعدد ۶ ریال.

GLOBISINE
روژه‌بلون فرانسه ـ فارماشیمی ایران

ترکیب: ویتامین B_{12} ۶ میکروگرم + عصاره پیلور ۱۰۰ میلی‌گرم + عصاره لوور ۶۰۰ میلی‌گرم + D ـ لوین منوکلریدرات ۴۰۰ میلی‌گرم + ویتامین B_{12} ۲۰۰ میلی‌گرم + سیترات‌دوفر آمونیاکال ۴۱/۴ میلی‌گرم + گلیسرو فسفات دومنگنز ۲/۹۲ میلی‌گرم + سولفات مس ۲/۲ میلی‌گرم + پاراهیدروکسی بنزوات دومتیل‌ـ سدیک ۳۰ میلی‌گرم + پاراهیدروکسی بنزوات دوپروپیل سدیک ۱۰ میلی‌گرم.
موارد استعمال: اختلالات رشد و نمو، کمی متابولیسم، ترمیم قوای از دست رفته.

مقدار مصرف و طرز استعمال: بزرگسالان: روزی ۲ ـ ۳ قاشق مرباخوری
خردسالان: روزی ۱ ـ ۳ قاشق چای‌خوری.
بسته‌بندی: شربت ۱۸۰ میلی‌لیتر.
بها: ۱۰۵ ریال.

GLUBUMAN
برنا ـ سویس

ترکیب: در هر آمپول گلبولین ایمونوسرم ۱۶ درصد + تی‌سروزال ۰/۰۱ درصد
موارد استعمال: بعنوان کاهش‌دهنده در پیشگیری و درمان بیماریهای ویروسی مانند سرخک، هپاتیت، مخملک، اریون، سرخچه، پنومونی ویروسی، آبله‌مرغان، عفونتهای میکربی.
مقدار مصرف: طبق دستور پزشک.
بسته‌بندی: آمپول ۲ میلی‌لیتری × ۱
بها: ۳۵۰ ریال.

GLUCANTIME
اسپسیا ـ فرانسه

ترکیب: N ـ متیل گلو کامین آنتی‌مونیات ۱/۵ گرم.
موارد استعمال: لیشمانیاز (کالاآزار)، لیشمانیاز برازیلینسیس، گرانولوماانگونیال، لیشمانیاز جلدی.
مقدار مصرف و طرز استعمال: ۶۰ میلی‌گرم برای هر کیلو وزن بمدت ۴ ـ ۶ هفته.
بسته‌بندی: آمپول ۵ میلی‌لیتر × ۱۰
بها: ۴۹۹ ریال.

GLUCITOL
فارماشیمی ـ ایران

ترکیب: سوربیتول.
موارد استعمال: اختلالات گوارشی با مبدأ کبدی و صفراوی، ناراحتی و نارسایی لوزالمعده، یبوست.
مقدار مصرف و طرز استعمال: روزی ۳ ـ ۵ بار، هربار یک بسته.
بسته‌بندی: بسته ۵ گرم × ۲۰.
بها: ۷۶ ریال.

GLUCOPHAGE
GLUCOPHAGE Retard
آرون ـ فرانسه

ترکیب: در هر قرص ساده ۵۰۰ میلی‌گرم کلریدرات متفرمین
در هر قرص روتارد ۸۵۰ میلی‌گرم کلریدرات متفرمین.

موارد استعمال: انواع دیابت‌ها.

مقدار مصرف و طرز استعمال: معمولی: روزی ۳ ـ ۴ قرص بعد از غذا
روتارد: یک قرص صبح، یک قرص عصر.

موارد منع استعمال: کومای دیابتی.

احتیاط: در عفونتها، قبل از اعمال جراحی و موارد کورتیکوتراپی، متابولیسم باید تحت کنترل قرار گیرد.

بسته‌بندی: قرص معمولی × ۵۰. قرص روتارد × ۳۰.

بها: قرص ساده ۱۵۸ ریال، قرص روتارد ۱۷۵ ریال.

GLYCEROVIT
عبیدی ـ ایران

ترکیب: در هر ۲ قاشق غذاخوری: ویتامین B_1 ۱۵ میلی‌گرم + ویتامین B_2 ۳ میلی‌گرم + ویتامین B_6 ۹ میلی‌گرم + ویتامین PP ۳۰ میلی‌گرم + کافئین ۷۵ میلی‌گرم + گلیسروفسفات سدیم ۰/۹ گرم + تنطور نوآومیک ۰/۰۹ گرم + تنطور نارنج ۰/۹ میلی‌گرم + اسیدفسفریک ۸۵ میلی‌گرم.

موارد استعمال: دوران نقاهت، بیماریهای عفونی، خستگی جسمی و فکری، ضعف قوای جسمانی، عصبانیت، بی‌اشتهایی، اختلالات گوارشی.

مقدار مصرف و طرز استعمال: خردسالان: روزی ۳ بار، هربار ۱ قاشق مرباخوری. بزرگسالان: روزی ۳ بار. هربار ۱ قاشق غذاخوری.

بسته‌بندی: شربت ۱۲۰ میلی‌لیتر.

بها: ۷۶ ریال.

GLYO-6
هوده ـ فرانسه

ترکیب: در هر کپسول: پیریدوکسیلات ۰/۱ گرم، در هر آمپول: ۲۰۰ میلی‌گرم.

موارد استعمال: نارسائی های دستگاه گردش خون، نارسائیهای وازوموتور

مقدار مصرف و طرز استعمال: روزی ۴ ـ ۶ قرص. آمپول روزی ۱ ـ ۲

تزریق.

بسته‌بندی: کپسول × ۳۰. آمپول ۲۰۰ میلی‌گرم لیوفیلیزه + ۵ میلی لیتر حلال × ۶.

بها: کپسول ۲۴۰ ریال. آمپول ۴۰۰ ریال.

GLYVENOL
سیبا ـ سویس

ترکیب: در هر کپسول: اتیل ۳ ـ ۵ ـ ۶ تری‌ارتو ـ بنزیل ـ د ـ گلوکوفورانوزید = تری‌بنوزید ۴۰۰ میلی‌گرم.

موارد استعمال: اختلالات گردش خون، واریس، بواسیر.

مقدار مصرف و طرز استعمال: روزی ۲ بار، هربار یک کپسول بعد از هر غذا بمدت چندین هفته.

بسته‌بندی: کپسول × ۲۰

بها: ۲۴۰ ریال.

GOLAGARINE
گل ـ ایران

ترکیب: پارافین مایع ۱۳ درصد + فنل‌فتالئین ۱ درصد + گلیسیرین خالص ۹ درصد + بنزوات سدیم ۰/۵ درصد + موسیلاژ ـ آگارآگارتا ۱۰۰ درصد.

موارد استعمال: درمان یبوست، سوء هاضمه، تنبلی روده‌ها و مسمومیت خودبه‌خود.

مقدار مصرف و طرز استعمال: خردسالان: ۱ قاشق مرباخوری بعد از شام. بزرگسالان: ۱ ـ ۲ قاشق سوپخوری بعد از شام.

بسته‌بندی: شربت ۲۵۰ میلی‌لیتر.

بها: ۶۴ ریال.

GONDAFON
شرینگ ـ آلمان

ترکیب: در هر قرص: ملح سدیم ۲ ـ آمینو ـ بنزن ـ سولفونامیدو ـ ۵ ـ متوکسی ـ اتیل ـ پیریمیدین = گلیکودیازین ۰/۵ گرم.

موارد استعمال: برای کم کردن مقدار مصرف انسولین در دیابت‌های مربوط به نقصان انسولین.

مقدار مصرف و طرز استعمال: ابتدا روزی ۳ قرص بمدت ۳ ـ ۵ روز. سپس مقدار دارو را بتدریج کم کرده و به روزی ۱ ـ ۲ و یا نصف

قرص میرسانند تا دوز نگاهدارنده بدست آید.

موارد منع استعمال: اغمای دیابتی و حالت قبل از اغما، اسیدوز و دگرگونی متابولیسم هنگام عفونتها و استرس. موقع آبستنی باید داروی خوراکی بیمار را به انسولین تبدیل کرد.

بسته‌بندی: قرص × ۶۰.

بها: ۱۷۵ ریال.

G

GONOCOCCIC Vaccine

برنا ـ سویس

ترکیب: در هر آمپول: جرم میکروبی گونوکوک ۵۰۰۰ میلیون + فنول ۰/۴ درصد.

موارد استعمال: درمان عفونت‌های مزمن و مخصوصاً عوارض حاصله از میکرب گونوکوک مانند التهاب مفصلی.

مقدار مصرف و طرز استعمال: ۱۰ تزریق زیرجلدی یا داخل عضلانی بفاصله ۳ تا ۵ روز.

بسته‌بندی: آمپول ۱ میلی‌لیتر × ۱۰ که غلظت میکربی آنها بترتیب شماره افزایش می‌یابد.

بها: ۶۰ ریال.

GRANEODIN

اسکوئیب آمریکا ـ ایران

ترکیب: سولفات نئومایسین + گرامیسیدین.

موارد استعمال: عفونت‌های موضعی پوست ناشی از میکربهای گرم مثبت و گرم منفی، ترمیم بافت‌های مرده، عفونت‌های چشمی.

مقدار مصرف و طرز استعمال: روزی ۲ ـ ۳ بار بطور موضعی استعمال می‌شود.

موارد منع استعمال: حساسیت بدارو.

بسته‌بندی: پماد زخمی ۱۵ گرم، پماد چشمی ۳/۶ گرم.

بها: پماد زخمی ۳۴ ریال، پماد چشمی ۲۱ ریال.

GRAVIBINAN

شرینگ ـ آلمان

ترکیب: در هر میلی‌لیتر: آلفاهیدروکسی پروژسترون کاپرونات ۲۵۰ میلی‌گرم + استرادیول ۱۷ والرایانات ۵ میلی‌گرم.

موارد استعمال: جلوگیری از سقط، درمان سقط عادتی و هیپوپلازی

رحم، درمان تهدید سقط.
بسته‌بندی: آمپول ۱ و ۲ میلی‌لیتر × ۱
بها: ۱ میلی ۱۸۷ ریال، ۲ میلی ۲۵۷ ریال.

GRIPE MIXTURE
بوتس انگلستان ـ پارس ایران

ترکیب: در هر ۱۰۰ میلی‌لیتر بیکربنات‌سدیم ۱ گرم + اسانس زنجبیل ۰/۱ میلی‌لیتر + اسانس زیره سیاه ۰/۰۲۹۲ میلی‌لیتر + اسانس نعناع سبز ۰/۰۰۰۲۰۷۵ میلی‌لیتر + اسانس فلفل ۰/۰۰۰۲۰۷۵ میلی‌لیتر.
موارد استعمال: نفخ و دل‌درد نوزادان و خردسالان.
مقدار مصرف و طرز استعمال: نوزادان تا ۱ ماهه: ۱ قاشق چایخوری. خردسالان ۱ تا ۶ ماهه: ۱ قاشق مرباخوری. ۶ ماهه تا ۲ سال: ۱ـ۲ قاشق مرباخوری. بالاتر از ۲ سال: ۲ـ۳ قاشق مرباخوری.
بسته‌بندی: شربت ۱۱۲ میلی‌لیتر.
بها: ۳۷ ریال.

GRIPIN
ایران دراگ ـ ایران

ترکیب: در هر قرص: کلرفنیر آمین مالئات ۲ میلی‌گرم + کلریدرات فنیل افرین ۸ میلی‌گرم + فسفات کدئین ۱۲ میلی‌گرم + پارا-اتوکسی استانیلید ۱۵۰ میلی‌گرم + اسیداستیل سالیسیلیک ۳۰ میلی‌گرم + ۱، ۳، ۷ تری‌متیل گزانتین ۳۰ میلی‌گرم + ویتامین C ۲۵ میلی‌گرم. در هر ۵ میلی‌لیتر شربت: برمیدرات دکسترو-متورفان ۲۰ میلی‌گرم + کلریدرات فنیل افرین ۸ میلی‌گرم + کلرفنیرآمین مالئات ۴ میلی‌گرم.
موارد استعمال: گریپ، سرماخوردگی، سینوزیت، آنفلوآنزا، تسکین سرفه. گرفتگی بینی.
مقدار مصرف و طرز استعمال: روزی ۳ بار، هر بار ۱ـ۲ قرص. شربت بزرگسالان: هر ۶ـ۸ ساعت یک پیمانه، خردسالان: نصف پیمانه.
بسته‌بندی: قرص × ۶. شربت ۶۰ میلی‌لیتر.

بها: قرص ۲۱ ریال. شربت ۵۳ ریال.

GRISOVIN - F.P.
گلاکسو انگلستان
ـ داروپخش ایران

ترکیب: در هر قرص: گریزئوفولوین ۱۲۵ میلی‌گرم.

موارد استعمال: درماتوفیت‌های عامل کچلی در سر و عفونت قارچی در دست، پا، ناخن و بدن.

مقدار مصرف و طرز استعمال: ۱۰ میلی‌گرم بازاء هر کیلو وزن بدن.

عوارض جانبی: گاهی سردرد و ناراحتی معده.

موارد منع استعمال: هنگام بیماریهای شدید کلیوی.

بسته‌بندی: قرص × ۱۰۰ و ۱۰۰۰.

بها: ۱۰۰ عددی ۴۰۰ ریال، ۱۰۰۰ عددی ۳۵۰۰ ریال.

GRUNICYCLINE
شمی‌گرونتال آلمان
ـ تهران‌شیمی ایران

ترکیب: تتراسیکلین.

موارد استعمال: انواع عفونتهای ناشی از باکتریهای گرم مثبت و منفی مانند عفونتهای گوش، حلق، بینی، دستگاه تنفس و دستگاه گوارش، کیسه و مجاری صفرا، کلیه و مجاری ادرار و بیماریهای آمیزشی.

مقدار مصرف و طرز استعمال: روزانه ۱ ـ ۲ تزریق عضلانی.

موارد منع استعمال: در نارسائی‌های شدید کلیه و کبد حساسیت به تتراسیکلین. دوران آبستنی.

احتیاط: از مصرف تتراسیکلین در اطفال بعلت رنگین شدن دندانها باید حتی‌الامکان خودداری کرد.

بسته‌بندی: ویال خشک ۲۵۰ میلی‌گرم + حلال ۲ میلی‌لیتر.

بها: ۸۸ ریال.

GT 50
ادوارد ژستیلیخ
ـ سویس

ترکیب: در هر آمپول A: کالسیفرول ۵۰۰ هزار واحد + آنورین ۵ میلی‌گرم + بروموروئوستیژمنیوم ۰/۲۵ میلی‌گرم + کاربا کولوم ۰/۰۸ میلی‌گرم. در هر آمپول B: کالسیفرول ۵۰۰ هزار واحد + استرونا ۱ میلی‌گرم + پرژسترون ۵ میلی‌گرم + بروموروئو-ستیژمنیوم ۰/۲۵ میلی‌گرم + کاربامیل کولینا ۰/۰۸ میلی‌گرم.

موارد استعمال: آترو ز و عوارض ناشی از آن.
موارد منع استعمال: در افرادیکه ناراحتی کلیوی یا سرطان پستان دارند نباید مصرف شود.
مقدار مصرف و طرز استعمال آن: بر حسب شدت بیماری متفاوت است.
عوارض جانبی: سرگیجه، اسهال، تهوع، ادم، کهیر، خارش و ناراحتی های گوارشی.
بسته‌بندی: آمپول ۵ میلی‌لیتر × ۵
بها: آمپول A و B ۲۱۰ ریال.

GYNAECOSID
بهرینگر اینگلهایم آلمان- تولیدارو ایران

ترکیب: در هر دراژه: متیل- استرنولون ۵ میلی‌گرم + متیل- استرادیول ۰/۳ میلی‌گرم.
موارد استعمال: برای تشخیص آبستنی و درمان آمنوره‌های کوتاه‌مدت.
مقدار مصرف و طرز استعمال: روزی ۱ دراژه در ۲ روز متوالی. درصورتی که آبستنی در بین نباشد پس از ۳ روز آمنوره رفع خواهد شد ولی درصورت آبستنی هیچ تغییری روی نخواهد داد.
احتیاط: درصورت مصرف قرص ضدآبستنی جواب چندان مورد اعتماد نخواهد بود.
بسته‌بندی: دراژه × ۲. آمپول ۲ میلی‌لیتر × ۱
بها: قرص ۷۶ ریال. آمپول ۷۶ ریال.

GYNECOLOGIC LYSOCILLIN
پین هروس - برزیل

ترکیب: پروکائین پنی‌سیلین G ۳۰۰ واحد + پتاسیم پنی‌سیلین G ۱۰۰ هزار واحد
موارد استعمال: عفونتهای دستگاه تناسلی و ادراری حساس به‌پنی‌سیلین
مقدار مصرف و طرز استعمال: روزی یک ویال داخل عضلانی
موارد منع استعمال: حساسیت به‌پنی‌سیلین
بسته‌بندی: ویال همراه با آب مقطر × ۲۰۰
بها: هر عدد ۴۷ ریال.

GYNOPLIX
تراپلیکس ـ فرانسه

ترکیب: در هر قرص: استارسول ۰/۲۵ گرم + اسید بوریک ۰/۰۵ گرم.

موارد استعمال: درمان تریکوموناواژینالیس و تمام لکوره‌ها.

مقدار مصرف و طرز استعمال: در لکوره‌های عادی ۱ ـ ۲ قرص در موقع خواب و بعد از شستشو بطور موضعی مصرف میشود. برای درمان تریکوموناواژینالیس روزانه ۱ تا ۳ بار و هر بار ۲ قرص بطور موضعی مصرف میشود.

بسته‌بندی: قرص واژینال × ۲۰.

بها: ۳۵ ریال.

H

HADENSA
هادنزا ــ ایرلند

ترکیب: سانتول ۲/۵ گرم + کلرکارواکرول ۰/۰۱ گرم + ایکتامول ۰/۲ گرم + روغن آراشید ۱۸ گرم.

موارد استعمال: درمان بواسیر، شقاق، زورپیچ، ترک، خارش و زخمهای مقعد.

مقدار مصرف و طرز استعمال: روزی ۳ بار بعد از اجابت مزاج استعمال می‌شود.

بسته‌بندی: پماد ۴۲ گرم.

بها: ۴۷ ریال.

HADEX
ویرا ــ ایران

ترکیب: اوره ۱۰ گرم + اکرینول ۱ گرم + ۴۰ دوپرو ۳ گرم + اکسید روی ۱۲ گرم + ایکتیول ۳ گرم + عصاره هامامليس ۷۰۰ میلی گرم + آب‌مقطر ۷ گرم + لانولین ۱۵ گرم + وازلین ۴۸ گرم.

موارد استعمال: انواع تحریکات جلدی، اکزما، بریدگی، سوختگی، زرد زخم و آفتاب‌زدگی.

مقدار مصرف و طرز استعمال: روزی ۲ بار روی زخم می‌مالند.

بسته‌بندی: پماد ۲۲ گرم.

بها: ۳۲ ریال.

HADEX Pommade
ویرا ــ ایران

ترکیب: سولفانیلامید ۱۰ درصد + ریوانل ۱ درصد + بم‌دوپرو ۵ درصد + اکسید دوزنگ ۱۲ درصد + سولفاتیازول ۱۰ درصد + عصاره برگ هامامليس ۵ درصد + ایکتیول ۴ درصد + لانولین انیدر ۲۴ درصد.

موارد استعمال: انواع تحریکات جلدی، اکزما، بریدگی، سوختگی،

زرد زخم و آفتابزدگی.

مقدار مصرف و طرز استعمال: روزی ۲ بار، روی زخم را پانسمان می‌نمایند.

بسته‌بندی: پماد ۲۲ گرم.

بها: ۲۵ ریال.

HAEMACCEL
بهرینگ هوخست
ـ آلمان

ترکیب: در هر ۱۰۰۰ میلی‌لیتر: پلی‌پپتید ژلاتین تجزیه شده ۳۵ گرم + کلرورسدیم ۸/۵ گرم + کلرور پتاسیم ۰/۳۸ گرم + کلرور کلسیم ۰/۷ گرم + آب‌مقطر استریل مقدار کافی تا ۱۰۰۰ میلی‌لیتر.

H

موارد استعمال: درمان کلیه شوکهای مختلف در مراحل مختلف، شوکهای عصبی، شوکهای با منشأ عروقی، از دست رفتن پلاسما، از دست رفتن آب و الکترولیت‌ها.

مقدار مصرف و طرز استعمال: مقدار مصرف نسبت به حجم خونی که از گردش خارج شده است تعیین و از راه ورید بکار میرود. تعداد قطرات در دقیقه = مقدار پیش‌بینی شده دارو به‌میلی‌لیتر تقسیم برمدت پیش‌بینی شده برحسب ساعت × ۴.

موارد منع استعمال: مصرف توأم با خون سیتراته.

احتیاط: در صورتیکه در محفظه دارو منفذی ایجاد شده باشد قابل استفاده نخواهد بود، نارسائی‌های قلبی، فشارخون، شوک کاردیوژنیک.

بسته‌بندی: محلول ۵۰۰ میلی‌لیتر با دستگاه پرفوزیون.

بها: ۲۲۰ ریال.

HALIBORANGE
آلن هانبوریز
انگلستان ـ
داروپخش ایران

ترکیب: در هر ۲۸ میلی‌لیتر شربت: ویتامین A ۱۵۶۰۰ واحد + ویتامین C ۲۲۷۰ واحد + ویتامین C ۴۰ میلی‌گرم. در هر قرص: ویتامین A ۴۰۰۰ واحد + ویتامین D ۵۵۰ واحد + ویتامین C ۲۵ میلی‌گرم.

موارد استعمال: کمبود ویتامین‌های فوق، آبستنی، شیردهی، دوران

نقاهت.

مقدار مصرف و طرز استعمال: شربت: شیرخواران ۳ هفته تا ۶ماهه: یک قاشق مرباخوری که در آب جوشیده سرد حل میشود و یکبار در روز بین ۲ غذا داده میشود. ۶ماهه تا ۱۲ماهه: روزی ۱ بار، هربار ۲ قاشق مرباخوری، در آب حل میشود. بیش از یک ساله: روزی ۳بار، هربار ۲ قاشق مرباخوری. قرص: روزی ۳بار، هربار ۱ـ۲ قرص.

بسته بندی: شربت ۱۰۰ و ۲۵۰ میلی‌لیتر، قرص × ۲۵ و ۱۰۰.

بها: شربت ۱۰۰ میلی ۴۷ ریال، ۲۵۰ میلی ۹۴ ریال. قرص ۲۵ عددی ۴۲ ریال، ۱۰۰ عددی ۱۲۰ ریال.

HALOTESTIN
آپجان ـ آمریکا

ترکیب: فلوکسی مسترون ۵ میلی‌گرم.

موارد استعمال: هیپوگونادیسم نزد مردان، عقیمی در اثر نارسائی بیضه ها، سرطان پستان، استئوپوروز و آنمی آپلاستیک.

مقدار مصرف و طرز استعمال: برحسب نوع و شدت بیماری متفاوت است.

موارد منع استعمال: سرطان پروستات و مثانه، نارسائی کبدی.

بسته بندی: قرص ۵ میلی‌گرم × ۲۰

بها: ۲۶۱ ریال.

HALOTHANE
هوخست ـ آلمان

ترکیب: ۲ ـ برومو ـ ۲ ـ کلرو ـ ۱ و۱ و۱ تری‌فلوروواتان.

موارد استعمال: بیهوشی بطریقه استنشاقی.

مقدار مصرف و طرز استعمال: با توجه به‌نوع جراحی و مدت عمل ۰/۳ ـ ۱ میلی‌لیتر بهمراه مخلوطی ازگاز اکسیژن و پروتواکسید ازت بکار میرود.

احتیاط: در تب شدید و یرقان با احتیاط مصرف شود.

بسته بندی: ۲۵۰ میلی‌لیتر.

بها: ۲۵۰ میلی ۱۶۱۸ ریال.

HELIOFER
لیوسانتر فرانسه ـ آی دی آی ایران

ترکیب: در هر ۱۰۰ میلی‌لیتر: هپتوگلوکونات فرو ۱۰ گرم + اسید هیپوفسفرو ۵۰ درصد ۱ گرم.
موارد استعمال: کلیه کم‌خونیهای ناشی از فقر آهن و هیپوکروم، میکروسیتر.
مقدار مصرف و طرز استعمال: روزی ۲ ـ ۳ بار، هربار ۱ قاشق مرباخوری بمدت ۲ ـ ۳ هفته.
بسته بندی: شربت ۱۴۵ میلی‌لیتر.
بها: ۸۲ ریال.

HELMEZINE
آلن هانبوریز انگلستان ـ داروپخش ایران

ترکیب: در هر قاشق مرباخوری: سیترات پی‌پرازین ۵۵۰ میلی‌گرم.
موارد استعمال: اسکاریدوز، اکسیوروز.
مقدار مصرف و طرز استعمال: درمان اسکاریس یا اکسیور: شیرخواران ۹ تا ۲ ساله روزی ۲ بار، هربار نصف قاشق مرباخوری خردسالان ۲ ـ ۱۴ ساله: نصف تا ۱ قاشق مرباخوری ۳ بار در روز. بزرگسالان: ۲ قاشق مرباخوری ۲ بار در روز. درمان آسکاریس با دوز واحد: شیرخواران و کودکان کوچکتر از ۲۰ کیلو هر بار ۶ قاشق مرباخوری. بزرگسالان و کودکان بیشتر از ۲۰ کیلو: هربار ۸ قاشق مرباخوری.
عوارض جانبی: گاهی سرگیجه، استفراغ، ضعف تمرکز فکر.
بسته بندی: الیگزیر ۲۸، ۱۰۰ و ۲۰۰۰ میلی‌لیتر، قرص × ۱۰۰ و ۱۰۰۰.
بها: ۲۸ میلی ۲۸ ریال، ۱۰۰ میلی ۶۰ ریال، ۲۰۰۰ میلی ۹۰۰ ریال، قرص ۱۰۰ عددی ۱۷۵ ریال، ۱۰۰۰ عددی ۵۸۶ ریال

HELMYCINE
میسین ـ ایران

ترکیب: سیترات پیپرازین ۶ گرم.
موارد استعمال: ریشه کن کردن کرم آسکاریس و اکسیور.
مقدار مصرف و طرز استعمال: نصف شیشه صبح ناشتا و نصف شیشه روز بعد میل میشود.

بسته بندی: شربت ۶۰ میلی‌لیتر.
بها: ۲۹ ریال.

HEMINEVRIN
آسترا ـ سوند

ترکیب: هر میلی‌لیتر محلول: اتان دی‌سولفات کلرمتیازول ۸ میلی‌گرم. در هر کپسول: کلرمتیازول ۱۹۲ میلی‌گرم.
موارد استعمال: هیجان و بیقراری مخصوصاً مانی حاد و پسیکوز سالمندان، بیخوابی، اپی‌لپسی استاتوس، دلیریوم تره‌منس، توکسمی پراکلامپسی.
مقدار مصرف و طرز استعمال: بعنوان خواب‌آور: ۲ ـ ۴ کپسول در شب بعنوان آرامبخش: ۱ ـ ۲ کپسول بعد از هر غذا. علائم بازگیری از اعتیاد: روزی ۴ بار، هربار ۲ کپسول بمدت ۳ روز.
عوارض جانبی: احساس سوزش در بینی و عطسه، هیپوتانسیون جزئی و موقتی، فلبیت سطحی.
بسته بندی: ویال‌وریدی ۰/۸ درصد × ۱۰۰ و ۵۰۰ میلی‌لیتر. کپسول × ۲۵.
بها: ویال ۱۰۰ میلی ۱۰۰ ریال، ۵۰۰ میلی ۳۰۰ ریال، کپسول ۱۶۵ ریال.

HEMORRAGINE Ergotinee
ویرا ـ ایران

ترکیب: کلرورسدیم ۵ گرم + تنطور هامامليس ۶ گرم + تنطور هیدراستیس ۶ گرم + تنطوروبیبورنوم ۴ گرم + ارگوتین ۵۰ گرم + گلیسرین ۱۰۰ گرم.
موارد استعمال: جلوگیری و درمان فوری خونریزی پس از زایمان.
مقدار مصرف و طرز استعمال: روزی ۱ ـ ۵ قاشق سوپخوری.
بسته بندی: شربت ۹۰ میلی‌لیتر.
بها: ۸۲ ریال.

HEMORRODINE
سکتا ـ فرانسه

ترکیب: در هر ۱۰۰ گرم: بوتوفرم ۰/۸ گرم + روتین ۰/۲ گرم + آدرنالون ۱ درصد.
موارد استعمال: بواسیرهای داخلی و خارجی، خارش و دردهای

مقعد، پرولاپس، فیسور.
مقدار مصرف و طرز استعمال: خردسالان: روزی یکبار بطور موضعی استعمال می‌شود. بزرگسالان: یکبار صبح و یکبار شب.
بسته بندی: شیاف × ۸.
بها: ۱۳۶ ریال.

H

HEMOSTYL
روسل ـ فرانسه

ترکیب: گلبول قرمز کنسانتره + آهن ۲۵ درصد.
موارد استعمال: هیپوکروم و کم‌خونی پس از خونریزی‌ها، مالاریا، دوران نقاهت، خستگی جسمی و روحی، اختلالات رشد، کمبود وزن، سوءتغذیه.
مقدار مصرف و طرز استعمال: بزرگسالان: روزی ۲ ـ ۳ بار هربار یک قاشق غذاخوری. خردسالان: ۱/۵ قاشق مرباخوری.
بسته بندی: شربت ۲۰۰ میلی‌لیتر.
بها: ۱۰۵ ریال.

HEPACHOLINE SORBITOL
روبر کاریه ـ فرانسه

ترکیب: سیترات کولین ۰/۵۶۷ گرم + سوربیتول ۵ گرم + پاراهیدروکسی بنزوات پروپیل ۲/۳ میلی گرم.
موارد استعمال: عفونتهای کبدی و گوارشی.
مقدار مصرف و طرز استعمال: بزرگسالان: روزی ۱ ـ ۳ آمپول خوراکی.
خردسالان: برحسب سن روزی نصف تا دوآمپول خوراکی.
بسته بندی: آمپول ۱۰ میلی‌لیتر × ۱۴.
بها: ۱۲۶ ریال.

HEPA - DESICOL
پارک دیویس آمریکا ـ ایران

مکانیسم: با تحریک کیسه‌صفرا سبب ورود مقدار زیادی صفرا در روده شده و در نتیجه ترشحات کبدی را افزایش میدهد.
ترکیب: متیونین ۱۵۰ میلی‌گرم + کولین ۲۰۰ میلی‌گرم + دزیکول (صفرای تازه خشک شده گاو) ۱۵۰ میلی‌گرم + اینوزیتول ۱۵ میلی‌گرم + بتائین ۵۰ میلی‌گرم.

موارد استعمال: نارسائی‌های کبدی، مراحل اولیه سیروز، الکلیسم، دیابت قندی کنترل نشده، سوء‌تغذیه، چاقی، سل.

مقدار مصرف و طرز استعمال: ۲ـ۴ کپسول ۳ بار در روز همراه یا بلافاصله بعد از هر غذا.

موارد منع استعمال: یرقانهای شدید.

بسته بندی: کپسول × ۵۰.

بها: ۱۵۲ ریال.

H

HEPAMINE
سیسین ـ ایران

ترکیب: سولفات‌آهن + ویتامین B کمپلکس + ویتامین C

موارد استعمال: نقاهت امراض حاد، ضعف و سستی عمومی، بیماریهای مزمن که ضعف بسیار ایجاد میکنند.

مقدار مصرف و طرز استعمال: روزی ۳ بار، هربار ۱ قاشق غذاخوری.

بسته بندی: شربت ۱۸۰ میلی‌لیتر.

بها: ۹۴ ریال.

HEPAREXINE
لوبات و بوانو ـ فرانسه

ترکیب: نمک منیزیم فسفریل کولین ۰/۷۵ گرم.

موارد استعمال: نارسائیهای کبدی، هپاتیت‌های ویروسی معمولی و عفونی، هپاتیت‌های توکسیک اسکلروز، کلسیستیت.

مقدار مصرف و طرز استعمال: محتوی هربسته در یک‌سوم لیوان آب حل شده و میل شود. درمان حمله‌ای: روزی ۴ـ۶ بسته. درمان برای تشدید ترشح صفرا: ۲ بسته صبح ناشتا.

بسته بندی: بسته × ۲۰.

بها: ۱۲۰ ریال.

HEPARINE
دوپار ـ ایران

ترکیب: هپارین ۱ گرم + محلول ایزوتونیک تا ۱۰۰ میلی‌لیتر.

موارد استعمال: التهابات خفیف و مزمن چشم، سوختگیهای چشم، کدورتهای خفیف قرنیه، ترومبوزهای مویرگی.

مقدار مصرف و طرز استعمال: هر ۲ـ۴ ساعت ۱ـ۳ قطره در هر چشم می‌چکانند.

بسته بندی: قطره چشمی ۵ میلی‌لیتر.
بها: ۹۴ ریال.

HEPARINE
شونه ـ فرانسه

ترکیب: هپارین تهیه شده از بافت‌های ریه.
موارد استعمال: انفارکتوس میوکارد، آمبولی، ترومبوز، آرتریواسکلروز هیپرکلسترولمی.
مقدار مصرف و طرز استعمال: فقط با نظر پزشک معالج در موارد حاد و حمله روزانه ۲۵۰۰۰ تا ۴۰۰۰۰ واحد در ۴ نوبت (بطور منقسم) در موارد دیگر هفته‌ای ۱ ـ ۲ تزریق.
بسته بندی: فلاکون لیوفیلیزه ۲۵۰۰۰ واحدی = ۵ میلی‌لیتر × ۱، آمپول ساده ۵۰۰۰ واحدی = ۱ میلی‌لیتر × ۳، فلاکون ساده ۲۵۰۰۰ واحدی = ۵ میلی‌لیتر × ۱.
بها: ساده ۵۰۰۰ واحدی ۱۶۳ ریال، ۲۵۰۰۰ واحدی ساده ۲۱۸ ریال، لیوفیلیزه ۲۲۶ ریال.

HEPATIQUE
شونه ـ فرانسه

ترکیب: عصاره جگر + ویتامین B_{12}
موارد استعمال: فقر غذائی، آنمی، هپاتیت، سیروز، نوروپاتی، ضعف عمومی، نقاهت بیماریهای عفونی و بعد از اعمال جراحی.
مقدار مصرف و طرز استعمال: روزی ۱ ـ ۲ آمپول عضلانی یا وریدی.
بسته بندی: آمپول هپاتیک ۱۰۰ + ۱۰۰ گاما ویتامین B_{12} × ۶، آمپول هپاتیک ۱۰۰ + ۱۰۰۰ گاما ویتامین B_{12} × ۳.
بها: ۶ عددی ۱۲۰ ریال، ۳ عددی ۱۷۳ ریال.

HEPATROL
هپاترول ـ فرانسه

ترکیب: ویتامین B_{12} ۱۰ میکروگرم معادل ۱/۲۵ میلی‌گرم عصاره کبد لیوفیلیزه.
موارد استعمال: آنمی وخیم، عوارض ناشی از تابش اشعه‌ایکس.
مقدار مصرف و طرز استعمال: روزی ۱ ـ ۳ آمپول خوراکی.
بسته بندی: آمپول ۱۰ میلی‌لیتر × ۶.

بها: ۷۱ ریال.

HEPAX
بوبی اس آ ــ فرانسه

ترکیب: عصاره‌های آرتیشو ۵ گرم + لومبرتوم ۳/۶ گرم + اووا اورسی ۲/۴ گرم + بولدو ۲ گرم + آدونیس ۰/۴ گرم + کراتاگوس ۰/۶ گرم + پپتون پانکراتیک ۲ گرم + کلرور منیزیم ۱ گرم + تنطور بولدوروماریِن ۶۵ گرم.

موارد استعمال: آزتمی، کلسترولمی، دیورز، سیروز، هپاتیت حاد و مزمن، آترواسکلروز، درماتوز.

مقدار مصرف و طرز استعمال: هر ۱۲ ساعت ۱ ـ ۲ قاشق مرباخوری.

بسته بندی: شربت ۱۰۰ میلی‌لیتر.

بها: ۷۲ ریال.

HEPOL
آلن هانبوریز انگلستان ـ دارو پخش ایران

ترکیب: در هر آمپول: عصاره جگر + ویتامین B_{12}

موارد استعمال: کم‌خونی ماکروسیتر از جمله آنمی پرنیسیوز، کم‌خونی آبستنی، اسپرو، کم‌خونی تغذیه‌ای.

مقدار مصرف و طرز استعمال: درمان کم‌خونی ماکروسیتر: ۴ میلی‌لیتر تزریق شده و بدنبال آن هر روز ۲ میلی‌لیتر بمدت ۳ روز متوالی تزریق می‌شود و سپس ۲ میلی‌لیتر، یک روز در میان تا وضع خون عادی شود. دوزنگهدارنده: ۵ میلی‌لیتر هر ۳ ـ ۴ هفته یک بار.

بسته بندی: آمپول ۲ میلی‌لیتر با ۱۰۰ میکروگرم ویتامین B_{12} × ۵، آمپول ۲ میلی‌لیتر با ۱۰۰۰ میکروگرم ویتامین B_{12} × ۵.

بها: آمپول ۱۰۰۰ گاما ۱۷۶ ریال، ۱۰۰ گاما ۱۱۷ ریال.

HEPTAMYL
دلالاند ـ فرانسه

ترکیب: کلریدرات دوهپتامول.

موارد استعمال: عدم کفایت بطن چپ، کولاپسوس، شوکها، احیاء کننده عضله قلب ازسموم و گاز، کاهش دهنده فشار زائد برطرف راست قلب افزایش بازده قلب، تقویت مرکز هیپوتالامیک.

مقدار مصرف و طرز استعمال: در موارد شدید: روزی ۳ ـ ۴ آمپول

بشکل تزریق عضلانی، وریدی، پرفوزیون و یا داخل قلب.
خردسالان: روزی یک آمپول عضلانی یا وریدی. نوزادان ۳ میلی‌لیتر تزریق داخل بند ناف. قرص ــ بزرگسالان: روزی ۴ ــ ۶ قرص، خردسالان: روزی ۱ ــ ۲ قرص. قطره: روزی ۵۰ ــ ۲۰۰ قطره.

بسته بندی: آمپول ۲۵۰ میلی‌گرم = ۵ میلی‌لیتر × ۶، قرص ۱۵۰ میلی‌گرم × ۲۰، محلول ۳۰ درصد ۲۰ میلی‌لیتر.

بها: آمپول ۷۲ ریال، قرص ۶۷ ریال، قطره ۱۱۸ ریال.

HEPTUNA - PLUS
فایزر آمریکا ــ ایران

ترکیب: در هر کپسول: سولفات آهن ۳۴۰ میلی‌گرم + آهن ۱۰۰ میلی‌گرم + پودر خشک جگر ۵۰ میلی‌گرم + ویتامین C ۱۵۰ میلی‌گرم + ویتامین B_{12} ۵ میکروگرم + عامل انترنسک ۲۵ میلی‌گرم + ویتامین B_1 ۳ میلی‌گرم + ویتامین B_2 ۲ میلی‌گرم + ویتامین B_6 ۲ میلی‌گرم + نیاسینامید ۱۵۱ میلی‌گرم + پانتوتنات کلسیم یک میلی‌گرم + مس ۱ میلی‌گرم + مولیبدن ۰/۲ میلی‌گرم + کلسیم ۳۷/۴ میلی‌گرم + ید ۰/۰۵ میلی‌گرم + منگنز ۰/۰۳۳ میلی‌گرم + منیزیم ۲ میلی‌گرم + فسفر ۲۹ میلی‌گرم + پتاسیم ۱/۷ میلی‌گرم.

موارد استعمال: آنمی‌های هیپوکرومیک ناشی از کمبود مواد معدنی فوق.

مقدار مصرف و طرز استعمال: روزی ۱ کپسول بعد از نهار.

بسته بندی: کپسول × ۳۰.

بها: ۱۰۵ ریال.

HERBESAN
لوئیس ساندر ــ بلژیک

ترکیب: ریزوم تری‌تیسی + ریزوم داکتیل + فرانگولا + مانت + کومی‌نی + کاروی + فونی کومی + ملیس اوفیسینالیس + انیس + کلی‌دونی ماژور + برگ مالوا سیلوستریس + برگ کالندولا اوفیسینالیس + برگ سنه + کوریاندری.

موارد استعمال: فشارخون، چاقی، درد معده، روماتیسم، اکزما،

بواسیر، سردردهای مزمن، بیماریهای زنان.

مقدار مصرف و طرز استعمال: مانند چای معمولی به‌مقدار زیر تهیه میشود: خردسالان: ربع تا نصف قاشق چایخوری دم کرده مصرف می‌شود. بزرگسالان: ۱ قاشق چایخوری دم کرده مصرف می‌شود.

بسته بندی: ۱۰۰ گرم.

بها: ۳۵ ریال.

H

HERPLEX
آلرگان ـ آمریکا

ترکیب: یدوکسوریدین ۰/۱ درصد + کلروربنزالکونیوم ۰/۰۰۴ درصد + لیکوئی فیلم ۱/۴ درصد.

موارد استعمال: کراتیت ناشی از ویروس تب‌خال.

مقدار مصرف و طرز استعمال: ساعتی یک قطره تا رفع عارضه در چشم می‌چکانند. درمان تا ۵ روز باید ادامه یابد.

احتیاط: دوران آبستنی.

موارد منع استعمال: حساسیت به‌دارو.

عوارض جانبی: خارش، تحریک، درد، التهاب، ورم چشمها یا پلکها.

بسته بندی: قطره چشمی ۱۵ میلی‌لیتر.

بها: ۲۸۰ ریال.

HEXOMEDINE
تراپلیکس ـ فرانسه

ترکیب: محلول یک در هزار هیدروالکولیک دی ـ ایزتیونات هگزامیدین.

موارد استعمال: پیشگیری و درمان عفونتهای موضعی، در درماتولوژی ـ جراحی و تروماتولوژی.

مقدار مصرف و طرز استعمال: روزانه چندین بار بطور موضعی در محل میمالند.

بسته بندی: فلاکن ۲۵۰ میلی‌لیتر.

بها: ۵۰ ریال.

H

HEXOMEDINE TRANSCUTANEE

ترا پلیکس ـ فرانسه

ترکیب: محلول قابل نفوذ یک ونیم درهزاردی ـ ایزتیونات هگزامیدین.

موارد استعمال: آکنه، استافیلوکوکسی‌های جلدی، فورونکل و بوتونهای چربی.

مقدار مصرف و طرز استعمال: روزانه چندین‌بار بطور موضعی در محل میمالند.

بسته‌بندی: فلاکن ۴۵ میلی‌لیتر.

بها: ۵۰ ریال.

HIBITANE

آی‌سی‌آی ـ انگلستان

ترکیب: کلروهگزیدین ۵ درصد.

موارد استعمال: آنتی‌سپتیک عمومی برای ضدعفونی دستها، فضا، محیط، حمام، و ضدعفونی بیمارستانی.

مقدار مصرف و طرز استعمال: برحسب نوع مصرف متفاوت است.

بسته‌بندی: محلول ۵ لیتری.

بها: ۱۵۰۰ ریال.

HICONCIL

مید جانسون ـ آمریکا

ترکیب: آموکسی سیلین تری هیدرات.

موارد استعمال: عفونتهای تنفسی، زنانگی و دستگاه ادرار، عفونتهای پوستی و نسوج نرم.

مقدار مصرف و طرز استعمال: روزی سه‌بار جمعا ۲۰ ـ ۴۰ میلی‌گرم بازاء هر کیلو وزن بدن. بزرگسالان: ۲۵۰ ـ ۵۰۰ میلی‌گرم.

بسته‌بندی: کپسول ۲۵۰ و ۵۰۰ میلی‌گرم × ۱۰۰. شربت ۱۲۵ و ۲۵۰ میلی‌گرم = ۵ میلی‌لیتر × ۶۰ میلی‌لیتر. قطره ۱۰۰ میلی گرم = ۱ میلی‌لیتر × ۱۰ میلی‌لیتر.

بها: کپسول ۲۵۰ میلی هر عدد ۲۰ ریال، ۵۰۰ میلی ۳۶ ریال، شربت ۱۲۵ میلی ۱۹۰ ریال، ۲۵۰ میلی ۳۲۰ ریال، قطره ۱۳۵ ریال.

HIRUDOIDE
لوئیت پولد ـ آلمان

ترکیب: در هر ۱۰۰ گرم: هپارینوئید آلی ۱۰۰ گرم معادل ۲۵ هزار واحد هپارین.

موارد استعمال: امراض ترمبوتیک و اختلالات واریسی، التهاب و ضایعات التهابی، درمان اسکار، آسیبهای حاصله از ورزش و تصادفات.

موارد منع استعمال: روی زخم‌های باز نباید مالیده شود.

بسته‌بندی: پماد ۴۰ گرم.

بها: ۲۰۸ ریال.

H

HISTAGLOBIN
بیوبا زال ـ سویس

ترکیب: گاماگلوبین انسانی (منشاء از جفت) ۱۲ میلی‌گرم + کلریدرات هیستامین ۰/۱۵ میکروگرم.

موارد استعمال: بیماریهای تنفسی با مبدأ آلرژیک، حالات آلرژیک در بیماریهای پوستی، میگرن، سندرم قبل از قاعدگی.

مقدار مصرف و طرز استعمال: بزرگسالان: سه تزریق (هر بار ۲ میلی لیتر) بفاصله ۴ ـ ۷ روز. خردسالان: بفاصله ۸ ـ ۱۵ روز.

موارد منع استعمال: عفونت ثانوی، دوره قاعدگی، تزریق وریدی.

بسته‌بندی: آمپول لیوفیلیزه + ۲ میلی‌لیتر حلال × ۳.

بها: ۸۵۹ ریال.

HISTA TWO
عبیدی ـ ایران

ترکیب: در هر قاشق چایخوری: مالئات کلرفنیرامین ۰/۵ میلی‌گرم + مالئات پیریلامین ۳/۲۵ میلی‌گرم + کلریدرات فنیل پروپانولامین ۳/۱۲۵ میلی‌گرم + کلریدرات فنیل افرین ۱/۸۷۵ میلی‌گرم.

موارد استعمال: احتقان بینی توأم با ریزش آب، رینیت آلرژیک، آسم برونشیک و آلرژیک.

مقدار مصرف و طرز استعمال: خردسالان ۱ ـ ۱۲ سال: ۱ ـ ۲ قاشق مرباخوری در هر ۴ ساعت. نوزادان کمتر از ۱ سال: هر ۴ ساعت نصف قاشق مرباخوری.

بسته‌بندی: شربت ۹۰ میلی‌لیتر.

بها: ۵۶ ریال.

HISTIN
ایران دراگ ـ ایران

ترکیب: در هر دراژه: کلرفنیرامین مالئات ۵ میلی‌گرم، در هر ۵ میلی‌لیتر شربت: ۲/۵ میلی‌گرم.
موارد استعمال: در تمام موارد آلرژی.
مقدار مصرف و طرز استعمال: روزی ۳ بار، هربار ۱ ـ ۲ دراژه. شربت: روزی ۳ بار، هربار ۲ قاشق مرباخوری.
بسته‌بندی: دراژه × ۲۰، شربت ۶۰ میلی‌لیتر.
بها: دراژه ۴۷ ریال، شربت ۴۱ ریال.

HISTOGAN EXPECTORANT
فاریا ـ ایران

ترکیب: دی‌فنیدرامین + کلرورامونیم + سیترات سدیم + کلروفرم + مانتول + الکل و شربت معطر.
موارد استعمال: سرفه‌های اسپاسمودیک و سایر حالات هیستامینیک از قبیل بثورات جلدی، تنگی نفس، زکام یونجه‌ای.
مقدار مصرف و طرز استعمال: بزرگسالان: هر ۲ ـ ۳ ساعت ۱ ـ ۲ قاشق مرباخوری، خردسالان: هر سه ساعت ۰/۵ ـ یک قاشق مرباخوری برحسب سن.
بسته‌بندی: شربت ۱۰۰ میلی‌لیتر.
بها: ۴۷ ریال.

HISTOLIT Expectorant
HISTOLIT Expectorant D.C.
تولیدارو ـ ایران

ترکیب: در هر قاشق مرباخوری اکسپکتورانت: گلیسیریل گایاکولات ۵۰ میلی‌گرم + کلریدرات فنیل افرین ۵ میلی‌گرم + فنیل پروپانولامین ۵ میلی‌گرم + کلرفنیرامین مالئات ۲ میلی گرم + کلرور آمونیوم ۵۰ میلی‌گرم، اکسپکتورانت دی‌سی: مواد فوق باضافه فسفات کدئین ۱۰ میلی‌گرم. شربت اطفال: دکسترومتورفان ۷/۵ میلی‌گرم + کلرفنیرامین مالئات ۰/۷۵ میلی‌گرم + فنیل پروپانولامین ۱/۲۵ میلی‌گرم + کلریدرات فنیل افرین ۱/۲۵ میلی‌گرم + گلیسریل گاما کولات ۳۵ میلی‌گرم.

موارد استعمال: درمان علامتی ناراحتیها و تحریکات مجاری فوقانی تنفسی.

مقدار مصرف و طرز استعمال: اکسپکتورانت و DC بزرگسالان: روزی ۳ـ۴ بار، هربار ۱ـ۲ قاشق مرباخوری. شربت اطفال: خردسالان ۶ـ۱۲ ساله: ۱ قاشق مرباخوری. ۲ـ۶ ساله: ۰/۵ـ۱ قاشق مرباخوری.

موارد منع استعمال: دوران بارداری.

احتیاط و عوارض جانبی: تجویز فراورده‌های سمپاتومی‌متیک (فنیل افرین و فنیل پروپانولامین) در بیماران مبتلا به‌امراض قلبی و فشارخون باید با نظر پزشک باشد. کدئین در شربت دی‌سی ممکنست باعث اعتیاد گردد.

بسته‌بندی: شربت اکسپکتورانت و ۱۲۰DC میلی‌لیتر، اطفال ۹۰ میلی‌لیتر.

بها: اکسپکتورانت ۵۹ ریال، دی‌سی ۸۴ ریال، اطفال ۷۰ ریال.

HISTRYL

اسکاالف ـ انگلستان

ترکیب: کلریدرات دی‌فنیل پیرالین.

موارد استعمال: کهیر، اکزما آلرژیک، گزش حشرات، ادم آنژیونوروتیک، ضایعات آلرژیکی پوست، حساسیت به‌داروها و مواد خوراکی.

مقدار مصرف و طرز استعمال: هر ۱۲ ساعت ۱ کپسول.

عوارض جانبی: گاهی خواب‌آلودگی.

بسته‌بندی: کپسول ۵ میلی‌گرم × ۳۰.

بها: ۱۵۰ ریال.

HMS

آلرگان ـ آمریکا

ترکیب: مدریزون ۱ درصد + لیکوفیلم ۱/۴ درصد.

موارد استعمال: کونژونکتیویت حاد و مزمن آلرژیک ساده، اپی اسکلریت و حساسیت به‌اپی نفرین.

مقدار مصرف و طرز استعمال: روزی ۲ـ۴ بار، هربار ۱ قطره در زیر پلکها می‌چکانند.

موارد منع استعمال: عفونتهای درمان نشده چشم، عفونتهای ویروسی، سل چشمی، عفونتهای قارچی.
بسته‌بندی: قطره چشمی ۵ میلی‌لیتر.
بها: ۱۸۰ ریال.

HOMATROPINE
پ. او. اس فرانسه ـ دوپار ایران

ترکیب: برمیدرات هماتروپین.
موارد استعمال: آزمایش ته‌چشم، کرآتیت نقطه‌ای شکل سطحی اپیدمیک، اسکلریتها، اووه‌ایت هیپوتانسیو.
مقدار مصرف و طرز استعمال: روزی ۳ بار، هربار ۲ قطره در چشم می‌چکانند.
موارد منع استعمال: بالا بودن فشار داخل چشم.
بسته‌بندی: قطره چشمی ۱۰ میلی‌لیتر.
بها: ۱ درصد ۶۴ ریال، ۲ درصد ۷۰ ریال.

HONVAN
آستا ـ آلمان

ترکیب: در هر قرص: دی‌اتیل استیل بسترول دی‌فسفات تتراسدیم ۱۲۰ میلی‌گرم. هر آمپول: ۵ میلی‌لیتر= ۶۰ میلی‌گرم.
مقدار مصرف و طرز استعمال: درمان اولیه: روزی ۳ ـ ۴ قرص بمدت ۵ ـ ۱۰ روز، سپس ۲ ـ ۳ قرص به‌مدت ۱۰ ـ ۲۰ روز. بعداً با توجه به‌مقدار فسفاتاز اسید به ۱ ـ ۲ قرص در روز ادامه می‌یابد. آمپول: روزی یک تزریق عضلانی بمدت ۱۰ ـ ۲۰ روز درمان نگهدارنده: برحسب نوع بیماری و پاسخ بیمار مقدار دارو را باهستگی کاهش میدهند.
بسته‌بندی: آمپول ۵ میلی‌لیتر × ۱۰، قرص × ۵۰.
بها: آمپول ۱۲۰۰ ریال، قرص ۱۰۰۰ ریال.

HORMO GEROBION Amp.
مرک ـ آلمان

ترکیب: ویتامین A ۱۰ هزار واحد + ویتامین D_3 ۵۰۰ واحد + ویتامین E ۲۰ میلی‌گرم + ویتامین B_1 ۸ میلی‌گرم + ویتامین B_2 ۶ میلی‌گرم + ویتامین PP ۵۰ میلی‌گرم + ویتامین B_6 ۸ میلی‌گرم + ویتامین C ۱۰۰ میلی‌گرم + ویتامین P ۱۰

میلی‌گرم + پروپیونات تستوسترون ۱/۵ میلی‌گرم + بنزوات استرا-
دیول ۷۵ میکروگرم + تری‌یدوتیرونین ۲ میکروگرم + اینوزیتول
۵۰ میلی‌گرم + کلریدرات پروکائین ۴۰ میلی‌گرم.

موارد استعمال: در کلیهٔ عوارض حاصل از بالا رفتن سن، از جمله اختلالات عروقی، خستگیهای جسمی و روحی، سنگینی گوش، اختلالات مخاطی.

مقدار مصرف و طرز استعمال: پیشگیری: هفته‌ای ۱ـ۲ تزریق عضلانی
درمان: هفته‌ای ۳ تزریق.

بسته بندی: آمپول لیوفیلیزه + حلال ۳ میلی‌لیتر × ۳.

بها: ۱۱۹ ریال.

HORMO-GEROBION Tab.
مرك ـ آلمان

ترکیب: ویتامین A ۵ هزار واحد + ویتامین D_3 ۲۰۰ واحد + ویتامین E ۱۰ میلی‌گرم + ویتامین B_1 ۴ میلی‌گرم + ویتامین B_2 ۳ میلی‌گرم + ویتامین PP ۲۵ میلی‌گرم + ویتامین B_6 ۴ میلی‌گرم + ویتامین C ۵۰ میلی‌گرم + ویتامین P ۱۰ میلی‌گرم + متیل تستوسترون ۱ میلی‌گرم + اتی نیل استرادیول ۰/۷۵ میلی گرم + تری یدوتیرونین ۲ میکروگرم + بی‌تارترات کولین ۵۰ میلی گرم + اینوزیتول ۵۰ میلی‌گرم + اولئات منیزیم ۵۰ میلی‌گرم.

موارد استعمال: مشابه داروی قبلی.

مقدار مصرف و طرز استعمال: پیشگیری: روزی ۱ـ۲ دراژه پس از غذا. درمان: روزی ۳-۴ دراژه بمدت ۴-۶ هفته.

بسته بندی: دراژه × ۳۰.

بها: ۱۱۷ ریال.

HOSTACILLIN (aqu.ol.)
هوخست آلمان ـ ایران

ترکیب: مائی: پروکائین پنی‌سیلین ۳۰۰ هزار واحد + بنزیل پنی‌سیلین سدیم ۱۰۰ هزار واحد. روغنی: پروکائین پنی‌سیلین ۳،۰۰۰،۰۰۰ واحد + منواستئارات آلومینیوم ۲ درصد.

موارد استعمال: کلیه عفونت‌هائی که عوامل بیماری‌زای آنها نسبت

به پنی‌سیلین حساسند.

مقدار مصرف و طرز استعمال: خردسالان: روزی ۲ بار ۲۰۰ تا ۴۰۰ هزار واحد تزریق عضلانی. بزرگسالان: روزی ۲ بار ۴۰۰ تا ۸۰۰ هزار واحد تزریق عضلانی. بزرگسالان (روغنی): روزی ۱ ـ ۲ میلی‌لیتر تزریق داخل عضلانی واحد تزریق عضلانی. شیرخواران: روزانه ۲۰ هزار واحد برای هر کیلو وزن تزریق عضلانی.

H

موارد منع استعمال: حساسیت به پنی‌سیلین.

احتیاط: قبل از مصرف تست شود.

بسته‌بندی: ویال ۴۰۰ هزار واحدی × ۱۰۰، ویال ۱۰ میلی‌لیتر روغنی حاوی ۳ میلیون واحد.

بها: ۴۰۰ هزار ۱۲ ریال، ۳ میلیون ۴۰ ریال.

HOSTACORTIN "H"

هوخست ـ آلمان

ترکیب: پردنیزولون ۵ میلی‌گرم.

موارد استعمال: بیماریهای رماتیسمی، آسم برونشیک، زکام یونجه‌ای، بیماری سرم، حساسیت نسبت بداروها، واکنشهای آلرژیک و کهیر.

مقدار مصرف و طرز استعمال: شروع درمان: روزی ۳۰ تا ۶۰ میلی‌گرم ادامه درمان: روزی ۵ تا ۲۵ میلی‌گرم قرص‌ها بعد از غذا و بدفعات میل میشود.

موارد منع استعمال: قرحه‌های معده و اثنی‌عشر.

احتیاط: در دوران آبستنی با احتیاط مصرف شود.

بسته‌بندی: قرص × ۱۰۰.

بها: ۲۰۵ ریال.

HOSTACYCLIN

هوخست آلمان ـ ایران

ترکیب: کلریدرات تتراسیکلین.

موارد استعمال: عفونت‌های حاصله از میکروب‌های گرم مثبت و گرم منفی، بروسلا، ریکتزیا و ویروس‌های بزرگ، کلیه عفونت‌های حساس به‌تتراسیکلین.

مقدار مصرف و طرز استعمال: خردسالان: روزی ۲۰ ـ ۲۵ میلی‌گرم برای هر کیلو وزن. بزرگسالان: روزی ۱ تا ۲ گرم. مقدار روزانه در ۳ یا ۴ نوبت میل شود.

احتیاط: در دوران بارداری و در خردسالان با احتیاط بکار برده شود.

بسته‌بندی: کپسولهای ۲۵۰ میلی‌گرم × ۱۰۰ دراژه ۵۰۰ میلی‌گرم × ۵۰.

بها: کپسول ۲۵۰ میلی ۵۸۶ ریال، دراژه ۵۰۰ میلی ۴۵۰ ریال.

H

HUMAN IMMUNE GLOBULINS

آی اس ام ـ ایتالیا

ترکیب: گاماگلوبولین لیوفیلیزه انسانی ۳۰۰ میلی‌گرم.

موارد استعمال: هیپوپا گاماگلوبولینمی، سرخک، پولیومیلیت، هپاتیت عفونی، سرخجه، مخملک، سیاه سرفه.

مقدار مصرف و طرز استعمال: برای هر کیلو وزن بدن ۳۰ تا ۶۰ میلی‌گرم بصورت عضلانی تزریق میشود. در صورت لزوم میتوان آنرا تکرار کرد. برای تزریق، محلول را آهسته وارد ویال کرده و پس از چند دقیقه تأمل میکنند. آنگاه ویال را بین دودست حرکت دورانی میدهند بطوری که کف نکند سپس تزریق میکنند.

عوارض جانبی: در بعضی موارد نادر ممکن است در محل تزریق واکنش خفیفی پیدا شود.

بسته‌بندی: ویالهای ۳۰۰ میلی‌گرم همراه با آمپول ۳ میلی لیتر.

بها: ۳۴۰ ریال.

HUMATIN

پارك دیویس آمریکا ـ ایران

ترکیب: در هر کپسول: پاروموما یسین سولفات ۲۵۰ میلی‌گرم. در هر ۵ میلی‌لیتر شربت: ۱۲۵ میلی‌گرم.

موارد استعمال: دیسانتری باسیلی و عفونتهای مختلف روده‌ای (سالمونلا ـ شیگلا ـ اشریشیا کولی)، آمیبیاز روده‌ای.

مقدار مصرف و طرز استعمال: دیسانتری باسیلر و عفونت‌های مختلف روده‌ای: ۳۵ ـ ۶۰ میلی‌گرم بازاء هر کیلوگرم وزن بدن به‌مقدار منقسم. آمیبیاز روده‌ای: ۲۵ میلی‌گرم بازاء هر کیلوگرم وزن

بدن برای مدت ۵ روز.
بسته بندی: کپسول × ۱۶ . شربت ۶۰ میلی‌لیتر.
بها: کپسول ۳۷۵ ریال. شربت ۱۸۷ ریال.

HUMEGON
ارگانون ـ هلند

ترکیب: گونادوتروفین کوریونیک.
مکانیسم اثر: سبب تحریک تخمگذاری و ترشح استروژن میشود.
موارد استعمال: نازائی بعلت عدم تخمگذاری.
مقدار مصرف و طرز استعمال: روزی ۱ ـ ۲ و حداکثر ۳ تزریق عضلانی.
احتیاط: قبل از انجام آزمونهای بالینی و آزمایشگاهی نباید دارو تجویز شود. هر چندگاه یکبار استروژن ادرار باید اندازه‌گیری شود.
عوارض جانبی: درد زیرشکم، احتمالا آبستنی چندقلو پس از درمان.
بسته بندی: آمپول ۷۵ واحدی لیوفیلیزه + حلال ۱ میلی‌لیتر × ۱۰.
بها: ۶۰۰۰ ریال.

Hydergine
ساندوز ـ سویس

ترکیب: در هر قرص به‌نسبت مساوی از مزیلات دی‌هیدروارگو- کورنین، دی‌هیدروارگوکریستین و دی‌هیدروارگوکریپتین (دی‌هیدرو ـ آلفا ـ ارگوکریپتین و دی‌هیدرو ـ بتا ـ ارگوکریپتین به‌نسبت ۲ به ۱) ۱/۵ گرم.
موارد استعمال: سمپتوم‌ها و علائم ضایعات مغزی، بخصوص آنهائی که به‌پیری مربوط میگردند مانند: سرگیجه، سردرد، تمرکز فکری ضعیف، عدم تعادل و جهت‌یابی، حافظه مغشوش، فقدان قوه ابتکار، روحیه افسرده، غیر اجتماعی بودن، اشکال در فعالیتهای زندگی روزانه و مراقبت و توجه بخود. میگرن و سردردهای عروقی (فقط برای پیشگیری).
مقدار مصرف و طرز استعمال: روزی ۳ بار هربار ۱ قرص. بهتر است قبل از غذا میل شود. در بیمارانی که دچار ضایعات ذهنی یا میگرن میباشند، بهبودی سمپتوم‌ها معمولا تدریجی بوده و پس از ۳ ـ ۴ هفته ظاهر میشود. درمانهای طولانی (سه ماه یا بیشتر)

نیز تجویز میشود و ممکن است برحسب لزوم دوره درمان تجدید شود.

موارد منع استعمال: حساسیت شدید شناخته شده نسبت به‌دارو.

احتیاط: در موارد برادی کاردی شدید باید احتیاط و دقت لازم بعمل آید. هیدرژین را دور از دسترس کودکان نگهدارید.

عوارض جانبی: گرفتگی بینی، حالت تهوع زودگذر و دل‌آشوبه گاهی ممکن است پیش بیاید، ولی معمولاً با تجویز دارو توام با غذا جلوگیری یا رفع میشود. در اکثر موارد عوارض جانبی بدون درنظرگرفتن شرایط خاص رفع میگردد.

بسته بندی: قرص × ۳۰.

بها: ۶۰۰ ریال.

HYDROCARE

آلرگان ـ آمریکا

ترکیب: آنزیم گیاهی.

موارد استعمال: پاک کردن و نگاهداری لنز در موقعی که لنز روی چشم قرار داده نشده است.

احتیاط: اگر قرص برنگ قهوه‌ای درآمد نباید مورد استفاده قرارگیرد.

بسته بندی: محلول ۲۴۰ میلی‌لیتری + ۱۶ قرص پاک کننده پروتئین.

بها: ۶۳۴ ریال.

HYDROCORTANCYL

روسل ـ فرانسه

ترکیب: پردنیزولون.

موارد استعمال: تمام موارد مصرف کورتونها.

مقدار مصرف و طرز استعمال: برحسب نوع و شدت بیماری متفاوت است.

بسته بندی: قرص ۵ میلی‌گرم × ۳۰.

بها: ۸۸ ریال.

HYDROCORTIFOR

ویفور ـ سویس

ترکیب: ئیدروکورتیزون.

موارد استعمال: ورم ملتحمه غیرعفونی، کراتیت، ایریدوسیکلیت حاد، گلوکوم ثانویه.

مقدار مصرف و طرز استعمال: قطره: هر ۲ ـ ۳ ساعت یک قطره داخل

چشم می‌چکانند. پماد: روزی ۱ــ۳ بار در چشم کشیده شود.

موارد منع استعمال: زخم قرنیه، هرپس، بلفاریت مزمن.

عوارض جانبی: دارو نباید برای مدت طولانی مورد استفاده قرار گیرد.

بسته‌بندی: قطره چشمی ۱ درصد و ۲/۵ درصد ۲/۵ میلی‌لیتر. پماد چشمی ۱ درصد و ۲/۵ درصد ۲/۵ گرم.

بها: قطره ۱ درصد: ۹۸ ریال، ۲/۵ درصد: ۱۲۶ ریال، پماد ۱ درصد: ۴۸ ریال ۲/۵ درصد: ۱۲۰ ریال.

H

HYDROCORTISONE

پ. او. اس فرانسه ـ دوپار ایران

ترکیب: استات هیدروکورتیزون.

موارد استعمال: قطره: کورتیکوتراپی چشم. پماد: درمان خارش و التهاب بیماری های آلرژیک و التهابی پوست.

مقدار مصرف و طرز استعمال: ابتدا ساعتی ۱ــ۲ قطره. سپس روزی ۲ــ۳ بار. پماد: روزی یکبار.

موارد منع استعمال: بیماریهای ویروسی و توبرکولوز چشم.

بسته‌بندی: قطره چشمی ۱ درصد و ۲/۵ درصد ۵ میلی‌لیتر. پماد ۱۵ گرم.

بها: قطره ۱ درصد ۷۰ ریال، ۲/۵ درصد ۶۴ ریال. پماد ۵۹ ریال.

HYDROCORTISONE

روسل ـ فرانسه

ترکیب: ۱۷ هیدروکسی کورتیکوسترون.

موارد استعمال: روماتیسم مزمن، آسم، درماتوز تماسی، اکزما.

مقدار مصرف و طرز استعمال: برحسب و نوع و شدت بیماری متفاوت است.

بسته‌بندی: قرص ۱۰ میلی‌گرم × ۲۵.

بها: ۶۴ ریال.

HYDROMET

مرك شارپ اند دوهم آمریکا ـ ایران

ترکیب: متیل‌دوپا ۲۵۰ میلی‌گرم + هیدروکلروتیازید ۱۵ میلی گرم.

موارد استعمال: درمان فشارخون.

مقدار مصرف و طرز استعمال: روزی ۲ بار، هربار یک قرص که برحسب

وضع بیمار کاهش و یا افزایش داده میشود.
موارد منع استعمال: هپاتیت، سیروز، آنوری، زنان آبستن و شیرده.
عوارض جانبی: خواب‌آلودگی، سرگیجه، احساس سبکی.
بسته بندی: قرص × ۲۵.
بها: ۲۱۱ ریال.

HYDROQUINIDINE
هوده-فرانسه

ترکیب: کلریدرات هیدروکی نیدین.
موارد استعمال: آریتمی اکستراسیستول، تاکی کاردی پاروکسی-ستیک، تاکی کاردی عصبی.
مقدار مصرف و طرز استعمال: روزی ۳ ـ ۱۲ قرص.
بسته بندی: قرص ۲۵۰ میلی‌گرم × ۲۰.
بها: ۱۳۷ ریال.

HYDROSARPAN
سرویه-فرانسه

ترکیب: روبازین ۵ میلی‌گرم + پی‌پراتکل ۵ میلی‌گرم.
موارد استعمال: نارسائی جریان خون محیطی و مغزی، اختلال برگشت خون وریدی.
مقدار مصرف و طرز استعمال: روزی ۲ بار هربار ۲ قرص.
موارد منع استعمال: تجویز همراه با منوآمینواکسیدازها و گانگلیوپلژیکها.
عوارض جانبی: گاهی سرگیجه و عوارض معدی ـ روده‌ای.
بسته بندی: دراژه × ۳۰.
بها: ۴۱۰ ریال.

HYGROTON
گایگی-سویس

ترکیب: در هر قرص: ۱ ـ اکسو ـ ۳ (۳ ـ سولفاموئیل ـ ۴ ـ کلرو ـ فنیل) ـ ئیدروکسی ـ ایزوایندولین = (کلرتالیدون) ۱۰۰ میلی‌گرم.
موارد استعمال: درمان تمام خیزها، فشارخون، پیش‌گیری و درمان توکسیکوز ماههای آخر آبستنی، دیابت بی‌مزه.
مقدار مصرف و طرز استعمال: روزی ۱ ـ ۲ قرص.

احتیاط: در بیماران قلبی و کبدی که تحت معالجه با دیژیتال و هیگروتون هستند باید روزانه ۲ ـ ۶ گرم کلرورپتاسیم تجویز کرد.

بسته بندی: قرص × ۲۰.

بها: ۲۲۰ ریال.

HYGROTON Reserpine

کایگی ـ سویس

H

ترکیب: در هر قرص: ۱ ـ اکسو ـ ۳ ـ (۳ ـ سولفاموئیل ـ ۴ ـ کلروفنیل) ۳ ـ ئیدروکسی ایزوایندولین (کلرتالیدون) ۵۰ میلی‌گرم + رزرپین ۰/۳۵ میلی‌گرم.

موارد استعمال: درمان طولانی فشارخون.

مقدار مصرف و طرز استعمال: دوز اولیه: روزی ۰/۵ ـ ۱ قرص. دوز نگهدارنده: ۰/۵ ـ ۱ قرص ۳ دفعه در هفته.

موارد منع استعمال: آرتریواسکلروز سخت عروق قلبی و مغزی، ضایعات کلیوی.

بسته بندی: قرص × ۲۰.

بها: ۱۸۰ ریال.

HYPAQUE ٪50

وینتروپ آمریکا ـ ایران

ترکیب: دیاتریزوات سدیم ۵۰ درصد.

موارد استعمال: اوروگرافی، آنژیوگرافی، کولانژیوگرافی مستقیم، تی‌توپ کولانژیوگرافی، سربرال آنژیوگرافی، هیستروسالپنکوگرافی، اسپلنوپرتوگرافی، کولانژیوگرافی جلدی، ارتروگرافی، دیسکوگرافی، آئورتوگرافی، ونوگرافی استخوانی.

مقدار مصرف و طرز استعمال: ائورتوگرافی ۳۰ میلی‌لیتر، اوروگرافی و آرتریوگرافی ۲۰ ـ ۳۰ میلی‌لیتر، کولانژیوگرافی مستقیم ۱۰ میلی‌لیتر، آنژیوگرافی مغزی ۸ ـ ۱۲ میلی‌لیتر، هیستروسالینکوگرافی ۸ میلی‌لیتر، ونوگرافی و کولانژیوگرافی تی‌توپ ۱۰ ـ ۲۰ میلی‌لیتر.

موارد منع استعمال: سکته مغزی، میلوگرافی، دوران قاعدگی، عفونت دستگاه تناسلی.

احتیاط: در بیماران آسمی یا بیماریهای آلرژی یا حساس به‌ید باید با احتیاط مصرف شود.

عوارض جانبی: اختلالات عروقی، قلبی، تنفسی، جلدی، عصبی ممکنست پیش آید.

بسته بندی: آمپول ۲۰ میلی‌لیتر × ۱.

بها: ۱۵۰ ریال.

HYPERPAX
آرکوفام ـ دانمارك

ترکیب: آلفا متیل ـ ۳، ۴ ـ دی هیدروکسی دی ـ ۱ ـ فنیل آلانین = آلفا متیل دوپا.

موارد استعمال: درمان فشار خون اصلی.

مقدار مصرف و طرز استعمال: روزی ۲ بار، هربار ۲۵۰ میلی‌گرم.

عوارض جانبی: افسردگی، خشکی دهان.

بسته بندی: قرص ۱۰۰ میلی گرم × ۲۵.

بها: ۱۰۰ ریال.

HYPOBETA 20
مرك شارپ اند دوهم آمریکا ـ ایران

ترکیب: در هر ویال: ویتامین B_1 ۱۰ میلی‌گرم + ویتامین B_2 ۲ میلی‌گرم + B_6، ۱ میلی‌گرم + B_{12}، ۲۰ میکروگرم + نیاسینامید ۱۰۰ میلی‌گرم + پانتنول ۴ میلی‌گرم + عصاره جگر تزریقی ۰/۰۵ سانتی‌مترمکعب (معادل فعالیت ۲۰ میکروگرم ویتامین B_{12} در هر یک سانتیمتر مکعب). مواد غیرفعال: مانیتول ۱۸۰ میکرو-گرم متیل پارابن ۰/۱۵ درصد و پروپیل پارابن ۰/۰۲ درصد بعنوان نگاهدارنده.

موارد استعمال: بری‌بری، آریبوفلاوینوز، پلاگر، عفونت‌ها، هیپرتیرو-ئیدیسم، در دوران نقاهت.

مقدار مصرف و طرز استعمال: روزی ۱ ـ ۲ میلی‌لیتر بصورت تزریق عضلانی.

عوارض جانبی: خارش، تهوع، کهیر، لرز، تب، سردرد.

بسته‌بندی: ویال ۱۰ میلی‌لیتر.

بها: ۷۰ ریال.

HYSTACODE
ویرا ـ ایران

ترکیب: در هر ۱۰۰ میلی‌لیتر: فسفات کدئین ۲۰۰ میلی‌گرم + برم‌فنیرامین مالئات ۴۰ میلی‌گرم + فنیل افرین ۱۰۰ میلی‌گرم + فنیل پروپانولامین ۱۰۰ میلی‌گرم + گلیسیریل گایاکولات ۲ گرم + متیل هیدروکسی بنزوات ۱۰۰ میلی‌گرم + سوربیتول ۲۵ گرم + شربت ساده ۲ گرم.

موارد استعمال: سرفه‌های آلرژیک و سرماخوردگی.

مقدار مصرف و طرز استعمال: روزی ۴ بار، هربار ۱ ـ ۲ قاشق مرباخوری.

بسته‌بندی: شربت ۹۰ میلی‌لیتر.

بها: ۵۶ ریال.

HYTRAST
آندره گربه ـ فرانسه

ترکیب: پروپیل ـ ۱ دیول ۲، ۳ ـ ۱ دی‌یدو ـ ۳، ۵ پیریدون ـ ۴، ۲/۹ میلی‌گرم + دی‌یدو ـ ۳، ۵ پیریدون ـ ۴، ۱/۶ میلی گرم (غلظت ید ۵۰ درصد).

موارد استعمال: برونکوگرافی، فارنگولارنگوگرافی، سیستوگرافی ماگزیلر، اوروگرافی، آنژیوگرافی

بسته‌بندی: فلاکن ۲۰ میلی‌لیتر.

بها: ۱۸۰ ریال.

IBATH
ماکسون آمریکا
ـ تولیدارو ایران

ترکیب: تیمروسال ۰/۰۰۲ درصد + ستیل پیریدینیوم ۰/۰۱ درصد + کلریدرات هیدراستین ۰/۰۰۰۴ درصد + کلریدرات بربرین ۰/۰۰۰۷ درصد + پودر کامفر ۰/۰۴۶ درصد + اسیدبوریک ۱/۶۱۰ درصد + سولفات مس ۰/۰۰۲ درصد + الکل ۰/۰۷ درصد.

موارد استعمال: حساسیت چشم به‌نور آفتاب، گرد و غبار، خستگی چشم در اثر رانندگی یا مطالعه.

مقدار مصرف و طرز استعمال: پیمانه مخصوص را تا نصفه پرکرده محکم روی چشم نگاه میدارند.

بسته‌بندی: محلول چشم‌شوی ۷۱ میلی‌لیتر.

بها: ۴۱ ریال.

IBIAMOX
انستیتو بیوکمیکال
ـ ایتالیا

ترکیب: آموکسی‌سیلین.

مکانیسم اثر: مانند پنی‌سیلین با وقفه آنزیم ترانس پپتیداز و رقابت با آلانین موجب ساخته نشدن جدار سلول و لیزه شدن آن میشود.

موارد استعمال: عفونتهای ناشی از میکربهای گرم مثبت و گرم منفی.

مقدار مصرف و طرز استعمال: بزرگسالان: هر ۸ ساعت ۵۰۰ میلی گرم. خردسالان: هر ۸ ساعت ۱۲۵ میلی‌گرم.

موارد منع استعمال: حساسیت به‌پنی‌سیلین.

بسته‌بندی: کپسول ۲۵۰ میلی‌گرم × ۲۴. شربت ۱/۵ گرم × ۶۰ میلی لیتر. شربت ۳ گرم × ۶۰ میلی‌لیتر. ویال تزریقی ۲۵۰ و ۵۰۰ میلی‌گرم × ۱.

بها: کپسول ۴۵۶ ریال، شربت ۱/۵ گرمی ۱۶۰ ریال ۳ گرمی ۲۹۰

ریال، ویال ۲۵۰ میلی ۸۰ ریال، ۵۰۰ میلی ۱۳۰ ریال.

IBILIX
انستیتوبیو کمیکال ـ ایتالیا

ترکیب: ۷ ـ (ـ آلفا ـ آمینوفنیل استامیدو) ۳ ـ متیل ـ ۳ ـ سفم ـ ۴ ـ کربوکسیلیک.

مکانیسم: با وقفه آنزیم ترانس پپتیداز و رقابت با آلانین موجب ساخته نشدن جدار سلول ولیزه شدن آن میشود.

اثر متقابل: نباید توأم با آنتی‌اسیدها و فورسماید مصرف شود.

موارد مصرف: عفونتهای تنفسی، ادراری، استخوانی، پوستی و نسوج نرم.

مقدار مصرف و طرز استعمال: روزی ۱ ـ ۶ گرم از راه خوراکی منقسم بچند دوز مساوی.

موارد منع استعمال: حساسیت به‌پنی‌سیلین، نارسائی شدید کلیوی.

بسته بندی: کپسول ۲۵۰ و ۵۰۰ میلی‌گرم × ۱۲. شربت ۱۲۵ میلی‌گرم ـ ۵ میلی‌لیتر × ۶۰ میلی‌لیتر. آمپول ۵۰۰ میلی × ۱.

بها: کپسول ۲۵۰ میلی ۴۳۲ ریال، ۵۰۰ میلی ۸۵۰ ریال. شربت ۲۰۰ ریال. آمپول ۱۶۰ ریال.

ICARSAN
ایکارا ایتالیا ـ آترا ایران

ترکیب: در هر ۱۰۰ گرم. دی اتیل آمین سالیسیلات ۱۰ گرم + دی اکسی دی فنیل بوتیل پیرازولن ۵ گرم + متیل تیکوتی نیت ۲ گرم.

موارد استعمال: آرتریت حاد و مزمن، لمباگو، درد و ورم عصبی، گرفتگی عضلانی، تورتیکولی.

مقدار مصرف و طرز استعمال: روزی ۲ ـ ۳ بار هربار کمی از پماد را درمحل مالیده و مالش می‌دهند.

بسته بندی: پماد ۲۵ گرم.

بها: ۴۱ ریال.

ICTERYL
دلالاند ـ فرانسه

ترکیب: ۱ ـ متوکسی ـ ۴ ـ نفتوئیل ـ ۱ ـ پروپیونات منیزیم.

موارد استعمال: خستگیهای کبدی، نارسائیهای کبدی و صفراوی،

اختلالات گوارشی، کولیت با مبدأ کبدی، ناسازگاری و حساسیت غذائی و داروئی، یرقان ها.

مقدار مصرف و طرز استعمال: بزرگسالان: روزی ۲ ـ ۶ قرص قبل از غذا. خردسالان: نصف مقدار فوق.

احتیاط: در یرقان باید بعد از بهبودی مصرف شود.

بسته بندی: قرص × ۲۵.

بها: ۴۲ ریال.

IDO - BECOPLEX
فروسان دانمارك ـ فارمكس ایران

ترکیب: ویتامین B_1 ۵ میلی‌گرم + ویتامین B_2 ۲ میلی‌گرم + ویتامین B_6 ۲ میلی‌گرم + نیکوتینامید ۲۰ میلی‌گرم.

موارد استعمال: خستگی روحی و جسمی، کم شدن وزن، نورالژی، دوران آبستنی و شیردهی.

مقدار مصرف و طرز استعمال: روزی ۳ بار هربار یک قرص.

بسته بندی: قرص × ۳۰.

بها: ۷۰ ریال.

IDO - CAMIN
فروسان دانمارك ـ فارمكس ایران

ترکیب: در هر قرص: ویتامین A ۴۵۰۰ واحد + ویتامین D ۴۵۰ واحد.

موارد استعمال: دوران رشد، دکالسیفیکاسیون، دوران بارداری و شیردهی، درمان و پیشگیری راشی‌تیسم، جلوگیری از فساد دندانها، شکستگی استخوان.

مقدار مصرف و طرز استعمال: بزرگسالان: روزی ۳ دراژه خردسالان: ۲ دراژه.

بسته بندی: دراژه × ۳۰.

بها: ۷۶ ریال.

IDO - TONICUM
فروسان سوئد ـ فارمكس ایران

ترکیب: در هر ۱۰۰ میلی‌لیتر شربت: عصاره جگر ۱۲/۵ گرم + گلیسروفسفات سدیم ۱/۷ گرم + فسفات استریکنین ۵ میلی گرم + منونیترات تیامین ۳۰ میلی گرم.

موارد استعمال: انواع کم‌خونیها، دوران نقاهت، خستگی جسمی و روحی، کمبود اشتها، دوران آبستنی.

مقدار مصرف و طرز استعمال: خردسالان: روزی ۳ بار هربار یک قاشق مرباخوری قبل از هر غذا. بزرگسالان: یک قاشق غذاخوری.

بسته بندی: شربت ۱۲۰ گرم = ۱۰۰ میلی‌گرم.

بها: ۶۸ ریال.

I

ILDAMEN
همبورگ ـ آلمان

ترکیب: ال ـ ۳ ـ (بتا هیدروکسی ـ آلفا ـ متیل ـ فنیل اتیل آمینو) ـ ۳ ـ متوکسی ـ پروپیوفنون.

موارد استعمال: کاردیوپاتی‌های ایسکمیک، آنژین صدری، نارسائی کرونر، انفارکتوس حاد میوکارد.

مقدار مصرف و طرز استعمال: قرص: روزی ۲ ـ ۳ بار، هربار ۱ ـ ۲ قرص. آمپول روزی ۱ ـ ۳ تزریق وریدی.

موارد منع استعمال: نارسائی آئورت.

بسته بندی: قرص ۸ میلی‌گرم × ۳۰. آمپول ۴ میلی‌گرم = ۲ میلی‌لیتر × ۵.

بها: قرص ۱۵۰ ریال، آمپول ۲۱۵ ریال.

ILIADIN
مرک آلمان ـ ایران

ترکیب: محلول مائی کلریدرات ۲ ـ (۴ ـ بوتیل ترتیر ـ ۲ و ۶ ـ دی متیل ـ ۳ هیدروکسی بنزیل) ـ ۲ ـ ایمیدازولین = اوکسی متازولین.

موارد استعمال: بازکردن مجرای بینی در سرماخوردگی‌ها، سینوزیت، فارنژیت.

مقدار مصرف و طرز استعمال: بیماریهای بینی: روزی ۲ ـ ۳ بار، هربار ۲ ـ ۳ قطره.

بسته بندی: قطره ۰/۰۵ درصد و ۰/۰۲۵ درصد ۱۰ میلی‌لیتر.

بها: ۰/۰۵ درصد ۳۲ ریال، ۰/۰۲۵ درصد ۲۹ ریال.

ILOSONE
لی‌لی-آمریکا

ترکیب: اریترومایسین استولیت.

موارد استعمال: عفونتهای ناشی از میکروارگانیسم‌های حساس بخصوص استافیلوکوک، استرپتوکوک همولیتیک و پنوموکوک.

مقدار مصرف و طرز استعمال: خردسالان کمتر از ۲ سال: هر ۶ ساعت ۱۰ میلی‌گرم برای هر کیلوگرم وزن. خردسالان ۲ تا ۷ سال: ۱۲۵ میلی‌گرم هر ۶ ساعت یا ۲۵۰ میلی‌گرم هر ۱۲ ساعت. خردسالان بالاتر از ۷ سال: ۱۲۵ میلی‌گرم هر ۶ ساعت یا ۵۰۰ میلی‌گرم هر۱۲ ساعت. بزرگسالان: ۲۵۰ میلی‌گرم هر ۶ ساعت یا ۵۰۰ میلی‌گرم هر ۱۲ ساعت.

موارد منع استعمال: افراد مبتلا به‌بیماریهای کبدی.

احتیاط و عوارض جانبی: در درمان‌های طولانی، یرقان کله استاتیک مشاهده شده است که احتمالا ناشی از نوعی حساسیت داروئی است.

بسته‌بندی: کپسول ۲۵۰ و قرص ۵۰۰ میلی‌گرم × ۱۲. سوسپانسیون خوراکی ۶۰میلی‌لیتر. قطره ۱۰ درصد ۱۰ میلی‌لیتر.

بها: کپسول ۲۳۴ ریال. قرص ۴۶۸ ریال. شربت ۱۴۱ ریال. قطره ۹۴ ریال.

IMFERON
فایسنس - انگلستان

ترکیب: در هر آمپول ۲ میلی‌لیتر: کمپلکس آهن‌دکستران ۱۰۰ میلی‌گرم.

موارد استعمال: کم‌خونی های حاصل از کمبود آهن، عفونتهای انگلی، آبستنی.

مقدار مصرف و طرز استعمال: از فرمول WD ۰/۳ = آهن لازم تزریقی (W = وزن بدن برحسب پوند. D = درصد کمبود هموگلوبین) حساب میشود.

موارد منع استعمال: بیماریهای عفونی کلیه و آسم.

بسته‌بندی: آمپول ۲ میلی‌لیتر× ۱۰ و ۱۰۰.

بها: ۱۰ عددی ۳۰۰ ریال، ۱۰۰ عددی ۳۰۰۰ ریال.

IMURAN
ولکام ـ انگلستان

ترکیب: آزاتیوپرین.
موارد استعمال: بیمارانی که تحت عمل پیوند عضو قرارگرفته‌اند، هپاتیت مزمن فعال، روماتیسم حاد مفصلی، لوپوس اریتماتوز، پولی آرتریت، آنمی همولیتیک.
مقدار مصرف و طرز استعمال: روزی ۲ تا ۵ میلی‌گرم بازاء هر کیلو وزن بدن.
بسته بندی: قرص ۵۰ میلی‌گرم × ۱۰۰.
بها: ۲۳۰۰ ریال.

INDERAL
آی سی آی ـ انگلستان

ترکیب: کلریدرات ۱ ـ ایزوپروپیل آمینو ـ ۳ (نفتیول اکسی) پروپان ـ ۲ ـ ال = کلریدرات پروپرانولول.
مکانیسم اثر: باعث انسداد گیرنده‌های بتا در اعصاب سمپاتیک میشود.
موارد استعمال: فشارخون‌های اساسی، عصبی و کلیوی، آنژین دوپوا- ترین، تاکیکاردیها و آریتمی‌ها.
مقدار مصرف و طرز استعمال: ازدیاد فشارخونهای شریانی: شروع ۲۰ میلی‌گرم ۳ بار در روز برای مدت ۳ روز. از روز چهارم مقدار دارو به‌سه قرص ۴۰ میلی‌گرم در روز میرسد که بتدریج مقدار دارو اضافه میشود. در سایر موارد ۱۰ ـ ۳ میلی‌گرم ۳ ـ ۴ بار در روز قبل از غذا.
موارد منع استعمال: آسمهای ریوی، بلوکهای قلبی، انفارکتوس و ترومبوز قلب.
احتیاط: در زنان باردار باید با احتیاط مصرف شود.
عوارض جانبی: بیخوابی، اسهال و تهوع گزارش شده است.
بسته بندی: قرص ۱۰ و ۴۰ میلی‌گرم × ۵۰.
بها: ۱۰ میلی ۱۶۴ ریال، ۴۰ میلی ۳۸۰ ریال.

INDOCID
مرك شارپ اند دوهم آمریکا ـ ایران

ترکیب: در هر کپسول ایندومتاسین ۲۵ میلی‌گرم. در هرشیاف ۱۰۰ میلی‌گرم.
موارد استعمال: آرتریت روماتوئید، استئوآرتریت، بیماریهای استحاله‌ای

مفصل، اسپوندیلیت آنکیلوزان، نقرس، اختلالات حاد عضلانی-استخوانی، درد، تب، التهاب، تریسموس.

مقدار مصرف و طرز استعمال: روزی ۳ بار، هربار ۱ــ۲ کپسول بعد از هر غذا.

موارد منع استعمال: اولسر پپتیک.

احتیاط: در فشارخون و اختلالات معدی-رودهای باید با احتیاط مصرف شود.

عوارض جانبی: ممکنست سردرد، سرگیجه، تشنج، افسردگی و گاهی خیز ایجاد کند.

بسته بندی: کپسول × ۳۰، شیاف × ۱۲.

بها: کپسول ۱۵۲ ریال، شیاف ۳۹۲ ریال.

INHAL MYCINE

مسین ـ ایران

ترکیب: اسانس گمنول ۱ گرم + تنطور بنژوان ۲۰ گرم + مانتول ۱ گرم + تنطور اوکالیپتوس ۲۰ گرم + الکل ۶۰ گرم.

موارد استعمال: التهابات و تورم حاد و مزمن مجاری تنفسی و ریوی، سرماخوردگی، گرفتگی مخاط بینی، سینوزیت، گلودرد، گریپ، برنشیت و سایر عوارض ریوی.

مقدار مصرف و طرز استعمال: روزی ۳ بار، هربار یک قاشق مرباخوری در یک ظرف آبجوش یا در حال جوش ریخته بخور میدهند.

بسته بندی: بخور ۶۰ میلی لیتر.

بها: ۳۵ ریال.

INOLIN

تانابی ژاپن ـ فارماشیمی ایران

ترکیب: کلریدرات تری فنوکینول.

موارد استعمال: آسم، آمفیزم، پنوموکونیوز، تنگی نفس، برونشیت.

مقدار مصرف و طرز استعمال: روزی سه بار هربار ۲ قرص میل میشود.

بسته بندی: قرص × ۲۰.

بها: ۱۲۹ ریال.

INOPHYLINE Millot
میلو_فرانسه

ترکیب: تئوفیلین اتیلن دیامین.
موارد استعمال: کوروفاریت، شبه آسمهای قلبی، آسم حقیقی، ورم قلبی یا کلیوی، نارسائی قلبی و تنفسی، برونشیت، برونکوپنومونی.
مقدار مصرف و طرز استعمال: هفته‌ای ۱ـ۲ آمپول وریدی یا عضلانی. روزی ۲ـ۶ دراژه یا ۱ـ۲ شیاف.
بسته بندی: آمپول ۱۰ میلی‌لیتر × ۵، دراژه ۰/۱ گرم × ۵۰، شیاف بزرگسالان × ۱۰.
بها: آمپول ۵۰ ریال، قرص ۷۵ ریال، شیاف ۴۰ ریال.

I

INOPHYLINE Papaverique
میلو_فرانسه

ترکیب: اینوفیلین ۰/۰۶ گرم + پاپاورین ۰/۰۵ گرم
مکانیسم: سبب انبساط عضلات صاف، افزایش قدرت قلبی و تسریع کار کلیه ها میشود.
موارد استعمال: آرتریت، اسپاسم‌های واسکولر، کورونایت، آئورتیت.
مقدار مصرف و طرز استعمال: روزی ۲ـ۶ قرص.
بسته بندی: قرص × ۵۰.
بها: ۵۲ ریال.

INOPHYLINE Sedative
میلو_فرانسه

ترکیب: تئوفیلین منواتانولامین ۰/۰۵ گرم + فنوباربیتال ۰/۰۱ گرم.
موارد استعمال: شبه آسم قلبی، طپش قلب، دیستونی نوروو‌ژتاتیف و عوارض یائسگی.
مقدار مصرف و طرز استعمال: روزی ۲ـ۶ قرص.
بسته بندی: قرص × ۵۰.
بها: ۳۶ ریال.

INOPHYLINE Sedative Supp.
میلو_فرانسه

ترکیب: در هرشیاف: تئوفیلین ۰/۳۶ گرم + آمینوفیلین ۰/۰۹ گرم + فنوباربیتال ۱۰ سانتی‌گرم.
موارد استعمال: آسم، فشارخون، بیخوابیهای قلبی، آمفیزم، آسم

کود کان و برونشیت.
مقدار مصرف و طرز استعمال: روزی یک شیاف هنگام خواب.
بسته بندی: شیاف × ۱۰.
بها: ۴۰ ریال.

INSIDON
کابگی-سویس

ترکیب: در هر دراژه: دی کلریدرات [(H۵ - دی بنزو [f.b] آزپین -۵- ایل [۳- پروپیل] -۴- [ئیدروکسی -۲- اتیل] ۱- پی پرازین ۵۰ میلی گرم.
موارد استعمال: برای کنترل عوارض معدی و روده‌ای، دردهای قلبی، میگرن، نگرانی، اضطراب، خستگی.
مقدار مصرف و طرز استعمال: روزی ۳ دراژه.
احتیاط: با مهارکننده‌های مونوآمین اکسیداز نباید تجویز گردد.
بسته بندی: دراژه × ۳۰.
بها: ۱۷۰ ریال.

INSTENON
لینز-اتریش

ترکیب: در هر آمپول: دی کلریدرات N ، N دی متیل - N، Ń - بیس -[۳-(۳، ۴، ۵ تری متوکسی بنزوکسی) پروپیل] - اتیلن دیامین = هگزوبندین ۱۰ میلی گرم + ۷- (بتا- ئیدروکسی اتیل) - تئوفیلین ۱۰۰ میلی گرم + اسیدو انیلیک دی اتیلامید ۵۰ میلی گرم. در هر دراژه بترتیب: ۲۰ میلی گرم + ۶۰ میلی گرم + ۵۰ میلی گرم.
موارد استعمال: نارسائی عروق مغزی، ناراحتیهای مربوط باعصاب مغـزی- نخاعی، غش.
مقدار مصرف و طرز استعمال: روزی ۱-۲ بار، هربار ۱ آمپول عضلانی دراژه: روزی ۳ بار، هربار ۱-۲ دراژه در موارد شدید بطور توأم میتوان استفاده کرد.
بسته‌بندی: آمپول ۲ میلی لیتر × ۵. دراژه × ۳۰
بها: دراژه ۸۶ ریال. آمپول ۶۰ ریال.

INSULIN
ارگانون هلند ـ ایران

ترکیب: عصاره پانکراس حیوانات.
موارد استعمال: هیپرگلیسمی.
مقدار مصرف و طرز استعمال: برحسب نوع و شدت بیماری متفاوت است.
موارد منع استعمال: تب ناشی از بیماریهای عفونی.
عوارض جانبی: درصورت مصرف بدون رویه باعث هیپوگلیسمی میشود.
بسته‌بندی: ویال ۴۰ واحد = ۱۰ میلی‌لیتر.
بها: ۶۰ ریال.

I

INSULIN BERNA
برنا ـ سویس

ترکیب: انسولین کریستالیزه حاصل از عصاره پانکراس حیوانات.
مکانیسم: موجب عبورگلوکز از دیواره سلولها، مهار لیپاز و درنتیجه کاهش اسید چرب آزاد و بالا رفتن سنتز پروتئین میگردد.
موارد استعمال: هیپرگلیسمی، فوبیتهای دیابتیک.
مقدار مصرف و طرز استعمال: بستگی به‌شدت بیماری دارد.
احتیاط: مصرف بی‌رویه آن سبب شوک هیپوگلیسمی میشود، قبل از مصرف شیشه را بخوبی تکان دهید.
بسته‌بندی: ویال ۱۰ میلی‌لیتر.
بها: ۱۸۵ ریال.

INSULIN N.P.H
ارگانون هلند ـ ایران

ترکیب: انسولین پروتامین خنثی.
موارد استعمال: هیپرگلیسمی.
مقدار مصرف و طرز استعمال: برحسب شدت بیماری متفاوت است.
عوارض جانبی: در صورت عدم پرهیز مناسب هیپوگلیسمی حاصل میشود.
بسته‌بندی: ویال ۴۰۰ واحدی ۱۰ میلی‌لیتر.
بها: ۱۸۵ ریال.

INSULIN PROTAMINE Zine
ارگانون هلند ـ ایران

ترکیب: انسولین پروتامین زینک.
موارد استعمال: هیپرگلیسمی.

مقدار مصرف و طرز استعمال: برحسب شدت بیماری متفاوت است.
عوارض جانبی: در صورت عدم پرهیز مناسب هیپوگلیسمی ایجاد میشود.
بسته بندی: ویال ۴۰ واحدی ۱۰ میلی‌لیتر × ۱.
بها: ۱۸۵ ریال.

INSULIN PROTAMINE ZINC BERNA
برنا ـ سویس

ترکیب: در هرمیلی‌لیتر ۴۰ واحد انسولین پروتامین زینک.
مکانیسم: موجب عبورگلوکز از دیوارهٔ سلولها، مهار لیپاز و درنتیجه کاهش اسید چرب آزاد و بالا رفتن سنتز پروتئین میگردد.
موارد استعمال: درمان طولانی و منظم بیماری قند.
مقدار مصرف و طرز استعمال: بستگی بشدت و ضعف بیماری دارد.
احتیاط: مصرف بی‌رویه آن سبب شوک هیپوگلیسمی میشود، قبل از مصرف شیشه را بخوبی تکان دهید.
بسته بندی: ویال ۱۰ میلی‌لیتر.
بها: ۱۸۵ ریال.

INTAL
فایسنس ـ انگلستان

ترکیب: در هرکپسول: دی‌سدیم کروموگلیکات ۲۰ میلی‌گرم
موارد استعمال: برونشیت و آسم آلرژیک.
مقدار مصرف و طرز استعمال: هر۶ساعت یک کپسول را در دستگاه گذاشته و استنشاق میکنند. در موارد شدید در هر۳ساعت یک کپسول بعد ازمدتی با مقدار کمتری درمان را ادامه میدهند.
احتیاط و عوارض جانبی: بندرت سبب تحریک گلو میشود. در جای خنک و خشک بایستی نگهداری شود.
بسته بندی: کپسول × ۳۰.
بها: ۴۳۵ ریال.

INTESTOPAN
ساندوزسویس ـ پارس ایران

ترکیب: در هرقرص: بروکسی کینولئین ۲۰۰ میلی‌گرم + برو-بنزوکسالدین ۴۰ میلی‌گرم.

موارد استعمال: اسهال با منشأ میکربی، آمیبی و قارچی، گاستروآنتریت، آنتریت، کولیت، دیسانتری میکربی و آمیبی، لامبلیاز، اسهالهای تابستانی، بی‌نظمی‌های روده‌ای متعاقب مصرف آنتی‌بیوتیک‌های خوراکی.

مقدار مصرف و طرز استعمال: عفونت‌های خفیف: روزی ۳ بار، هربار ۲ قرص. عفونت‌های شدید یا حاد: روزی ۳ بار، هربار ۳ـ۴ قرص. آمیبیاز و لامبلیاز: روزی ۳ بار، هربار ۳ـ۴ قرص بمدت ۱۰ روز. خردسالان کوچکتر از ۲ سال: روزی ۳ بار، هربار نصف تا ۱ قرص و در اطفال بزرگتر روزی ۳ بار، هربار ۱ـ۲ قرص.

بسته‌بندی: قرص × ۲۰.

بها: ۴۲ ریال.

INTETRIX

بوفور ـ فرانسه

ترکیب: در هر کپسول: ۵ـ متیل اکسین ۰/۰۵ گرم + ۵ـ متیل ۷ـ بروموا کسین ۰/۲ گرم + ۵ متیل اکسین ان دو دسیل سولفات ۰/۰۵ گرم.

موارد استعمال: اسهالهای حاد با منشأ میکربی، قارچی و آمیبی آنتروکولیت حاد و مزمن آمیبیاز روده‌ای، پیشگیری و درمان وبا.

مقدار مصرف و طرز استعمال: بزرگسالان: روزی ۴ـ۸ کپسول. خردسالان: یک قرص برای هر ۱۰ کیلو وزن بدن.

بسته‌بندی: کپسول × ۲۰

بها: ۱۷۶ ریال.

INTRAIT DE VALERIANE

داسو ـ فرانسه

ترکیب: عصاره والریان ۲ سانتی‌گرم + اسید بنزوئیک ۱۰ سانتی‌گرم.

موارد استعمال: تنظیم حالات اسپاسمودیک، اختلالات نوروو‌ژتاتیف، نوروز، بیخوابیهای خفیف.

مقدار مصرف و طرز استعمال: روزی ۲ـ۳ قاشق مرباخوری، درصورت لزوم تا ۶ قاشق میتوان افزایش داد.

بسته‌بندی: محلول ۹۰ میلی‌لیتر.

بها: ۴۵ ریال.

INTRAIT VALADON
والاس ـ انگلستان

ترکیب: در هر ۱۰۰ میلی‌لیتر: سولفات نئومایسین ۵۰۰ میلی‌گرم + فرامایستین سولفات ۲۵۰ میلی‌گرم + فتالیل سولفاتیازول ۱۰ گرم + کائولن ۱۵ گرم + پکتین ۱/۲۵ گرم.

موارد استعمال: کلیه اسهالهای عفونی.

مقدار مصرف و طرز استعمال: بزرگسالان: ابتدا ۳ قاشق مرباخوری با هم بعداً هر ۶ ساعت یک قاشق. خردسالان: ابتدا ۲ قاشق چایخوری بعداً یک قاشق.

بسته بندی: سوسپانسیون ۱۵۰ میلی‌لیتر.

بها: ۱۲۸ ریال.

INTRAVAL Sodium
می اند بیکر ـ انگلستان

ترکیب: تیوپنتون سدیم.

موارد استعمال: بیحسی کوتاه‌مدت بمدت ۵ ـ ۲۰ دقیقه.

مقدار مصرف و طرز استعمال: ۲ـ۳ میلی‌لیتر از محلول ۵ درصد یا ۲ برابر این حجم از محلول ۲/۵ درصد.

بسته بندی: آمپول ۰/۵ و ۱ گرم × ۵۰.

بها: ۰/۵ گرمی ۱۹۱۴ ریال، ۱ گرمی ۲۹۰۰ ریال.

IODAPHYLINE
میلو ـ فرانسه

ترکیب: یدومتیلات دی اتیل آمینو اتیل تئوفیلین = دی اتامی فیلین.

موارد استعمال: فشارخون، دردهای جلوی قلبی، آئورتیت، کاردیوپاتی روماتیسمی تنگی نفس قلبی ـ کلیوی، آسم، آمفیزم، برونشیت، چاقی.

مقدار مصرف و طرز استعمال: هر ۱۲ ـ ۱۸ روز یک آمپول عضلانی یا وریدی.

بسته بندی: آمپول ۰/۲۵ گرم = ۵ میلی‌لیتر × ۱۲ و ۱۸. قرص ۱۰۰ میلی‌گرم × ۵۰.

بها: آمپول ریال، قرص ۵۰ ریال.

IODOCOL
پ. او. اس فرانسه ـ دوپار ایران

ترکیب: در هر ۱۰۰ میلی‌لیتر: یدور پتاسیم ۰/۵ گرم + کلرور کلسیم ۰/۵ گرم.
موارد استعمال: ضد اسکلروز وضد کدورت عدسی چشم.
مقدار مصرف و طرز استعمال: روزانه ۳ بار، هربار یک قطره در هرچشم می‌چکانند.
بسته‌بندی: قطرهٔ چشمی ۱۰ میلی‌لیتر.
بها: ۳۴ ریال.

IODOGOL
گل ـ ایران

ترکیب: در هرقاشق سوپخوری: ید ۰/۰۴ گرم + فسفات کلسیم ۰/۴ گرم.
موارد استعمال: درد مُفاصل، بیماریهای غدد لنفاوی. بیماریهای مزمن ریوی.
مقدار مصرف: روزی ۱ـ۵ قاشق سوپخوری، خردسالان: ۱ـ۵ قاشق مرباخوری.
بسته‌بندی: شربت ۱۲۰ میلی‌لیتر.
بها: ۴۹ ریال.

IODOGOL PHOSPHATE
گل ـ ایران

ترکیب: درهرقاشق سوپخوری: ید ۰/۰۴ گرم + فسفات کلسیم ۰/۴ گرم.
موارد استعمال: ضعف مزاج، درد مفاصل، امراض غدد لنفاوی و ریوی.
مقدار مصرف و طرز استعمال: خردسالان: روزی ۱ـ۴ قاشق مرباخوری.
بزرگسالان: روزی ۱ ـ ۵ قاشق مرباخوری.
بسته‌بندی: شربت ۱۲۰ میلی‌لیتر.
بها: ۵۹ ریال.

IPESANDRINE
ساندوزسویس ـ پارس ایران

ترکیب: در هرقاشق غذاخوری شربت: الکالوئیدهای توتال اپیکا ۰/۹۹ میلی‌گرم + الکالوئیدهای توتال اوپیوم ۲/۲۲ میلی‌گرم + کلریدرات افدرین ۷/۵ میلی‌گرم. در هر ۲۰ قطره: ترکیبات فوق به ترتیب ۰/۸۳ میلی‌گرم + ۱/۸ میلی‌گرم + ۷/۵

میلی‌گرم.

موارد استعمال: برنشیت مزمن و حاد، اسکلروآمفیزم، گریپ، تراکئو-برونشیت، برونشیوآلوئولیت، سیاسرفه.

مقدار مصرف و طرز استعمال: روزی ۳ بار، هربار یک قاشق غذاخوری شربت یا ۱۵ تا ۳۰ قطره بعد از غذا. خردسالان: ربع تا نصف مقدار بزرگسالان.

بسته‌بندی: شربت ۲۰۰ میلی‌لیتر، قطره ۱۵ میلی‌لیتر.

بها: شربت ۷۷ ریال. قطره ۵۹ ریال.

IPRADOL
لینز-اتریش

ترکیب: در هرآمپول: N، N- بیس - [۲ - (۳، ۴ - دی هیدروکسی فنیل) - ۲ - هیدروکسی اتیل] - هگزامتیلن دیامین سولفات = هگزوپرنالین سولفات ۲ میکروگرم در هرقرص: ۰/۵ میلی‌گرم.

موارد استعمال: حمله، آسم برونشیال، برنشیت حاد و مزمن، آمفیزم ریوی، اسپاسم برونشها.

مقدار مصرف و طرز استعمال: برحسب نوع و شدت بیماری متفاوت است.

بسته‌بندی: آمپول ۲ میلی‌لیتر× ۵، قرص × ۲۰.

بها: آمپول ۳۵ ریال، قرص ۷۴ ریال.

IRACEVIT
کولت نروژ- دارو پخش ایران

ترکیب: هر ۵ گرم ایراسویت: ویتامین C ۵۰۰ میلی‌گرم. هر ۵ گرم ایراسویت فورت ۱۰۰۰ میلی‌گرم.

موارد استعمال: همه موارد استعمال ویتامین C از جمله عفونت‌ها، خونریزیها، آبستنی، شیردهی و تقویت عمومی.

مقدار مصرف و طرز استعمال: روزی ۱-۲ بسته را در آب حل کرده میل میکنند.

بسته‌بندی: گرانول ۵ گرم × ۱۰.

بها: ۵۰۰ میلی ۷۰ ریال، ۱۰۰۰ میلی ۸۲ ریال.

IRCON-OB
لیک‌ساید- آمریکا

ترکیب: در هرقرص: فومارات آهن ۲۵۰ میلی‌گرم + اسید فولیک ۱ میلی‌گرم.

موارد استعمال: کم‌خونیهای آبستنی.
مقدار مصرف و طرز استعمال: روزی ۱ـ۲ قرص.
بسته‌بندی: قرص × ۳۰.
بها: ۹۰ ریال.

IRRIGOR
آرون ـ فرانسه

ترکیب: در هرقرص: کلریدرات ۳ـفنیل ـ ۴ ـ دی اتیل آمینواتیل ۵ـ ایمینو ـ ۱، ۲، ۴ ـ اکسادیازول = ایمولامین ۱۰ میلی‌گرم.
موارد استعمال: تمام اشکال نارسائی کرونری، بیماریهای عروقی اعضاء تحتانی.
مقدار مصرف و طرز استعمال: شروع درمان: روزی ۳ بار، هربار ۲ قرص. ادامه درمان: روزی ۳ قرص.
موارد منع استعمال: دوران بارداری.
بسته‌بندی: قرص × ۴۰.
بها: ۲۱۸ ریال.

ISMELIN
سیبا ـ سویس

ترکیب: در هرقرص: سولفات ۱ [اکتائیدروآز وسینیل ـ ۱] ـ ۲ ـ اتیل گوانیدین = گوانتیدین ۱۰ میلی‌گرم.
مکانیسم اثر: از تخلیه نور آدرنالین از انتهای اعصاب پس عقده‌ای سمپاتیک جلوگیری میکند.
موارد استعمال: هیپرتانسیون خطیر و متوسط ازجمله هیپرتانسیون بدخیم
مقدار مصرف و طرز استعمال: شروع درمان: روزی ۱ قرص. در هرهفته مقدار روزانه را ۱ قرص باید بالا برد.
موارد منع استعمال: نارسائی شدید کلیه ها و عروق کرونر، اولسر پپتیک بیماران مبتلا به‌فئوکرو‌ـرسیتوم.
بسته‌بندی: قرص × ۴۰.
بها: ۱۴۰ ریال.

ISOPTIN
ISOPTIN S
کنول ـ آلمان

ترکیب: در هر قرص : وراپامیل ۴۰ میلی‌گرم. ایزوپتین S : وراپامیل ۴۰ میلی‌گرم + پنتوباربیتال ۲۰ میلی‌گرم.

مواردِاستعمال: آنژین دوپواترین، السکمی قلب. تاکی کاردی‌های فوق بطنی و سنیوزوال، فیبریلاسیون دهلیزی، اکستراسیستول‌ها و کریزهای هیپرتانسیون.

مقدار مصرف و طرز استعمال: بزرگسالان روزی ۳بار هربار ۱ـ۲ دراژه. خردسالان : ۰/۵-۱ دراژه. آمپول : در موارد حاد.

موارد منع استعمال: شوکهای کاردیوژنیک یک آمپول داخل وریدی درصورت لزوم ۲ ـ ۳بار باآهستگی تزریق میشود.

عوارض جانبی: پائین آمدن فشارخون.

بسته‌بندی: قرص ساده وS × ۳۰. آمپول ۲/۲ میلی‌لیتر× ۵.

بها: قرص ساده ۳۰۷ ریال، قرص S ۳۳۰ ریال، آمپول ۱۹۰ ریال.

ISOPTO - ATROPINE
آلکان آمریکا ـ تولیدارو ایران

ترکیب: سولفات آتروپین ۱ درصد + هیــدروکسی پروپیل متیل سلولز ۰/۵ درصد.

موارد استعمال: بعنوان یک داروی میدریاتیک مصرف میشود.

مقدار مصرف و طرز استعمال: روزی ۲ ـ ۳بار، هربار ۱ قطره.

موارد منع استعمال: گلوکوم.

بسته‌بندی: قطره‌استریل چشمی ۵ میلی‌لیتر.

بها: ۴۱ ریال.

ISOPTO - CARPINE
آلکان آمریکا ـ تولیدارو ایران

ترکیب: کلریدرات پیلوکارپین ۲ درصد + هیدروکسی پروپیل متیل سلولز ۰/۵ درصد.

موارد استعمال: گلوکوم.

مقدار مصرف و طرز استعمال: برحسب نوع و شدت بیماری متفاوت است.

بسته‌بندی: قطره استریل چشمی ۱۵ میلی‌لیتر.

بها: ۵۹ ریال.

ISOPTO - CETAMIDE
آلکان آمریکا ـ تولیدارو ایران

ترکیب: سولفاستامید سدیم ۱۵ درصد + هیدروکسی پروپیل متیل سلولز ۰/۵ درصد.

موارد استعمال: کونژونکتیویت‌های حاد و مزمن، پیشگیری از عفونت و آماده کردن محیط استریل.

مقدار مصرف و طرز استعمال: شروع درمان: هر ۲ تا ۴ ساعت ۲ قطره ادامه درمان: هر ۴ ساعت ۲ قطره در هر چشم می‌چکانند.

موارد منع استعمال: حساسیت بدارو.

بسته‌بندی: قطره استریل چشمی ۱۵ میلی‌لیتر.

بها: ۴۱ ریال.

ISOPTO - CETAPRED
آلکان آمریکا ـ تولیدارو ایران

ترکیب: سولفاستامید سدیم ۱۰ درصد + پردنیزولون استات ۰/۲۵ درصد + هیدروکسی پروپیل متیل سلولز ۰/۵ درصد

موارد استعمال: حالات آماسی و آلرژی چشم مثل ورم حاد و مزمن و آلرژیک، بلفاریت وکونژونکتیویت و درکلیه مواردی که کورتیکوستروئیدتراپی توأم با سولفامید تراپی ضرورت دارد.

مقدار مصرف و طرز استعمال: روزی ۴بار، هربار ۲ قطره در هر چشم می‌چکانند.

موارد منع استعمال: مانند سایر داروهای کورتیکوستروئیدی دز عفونتهای ویروسی و توبرکولز چشمی و بیماریهای قارچی و نیز در بیمارانی که به‌سولفامید حساسیت دارند.

بسته‌بندی: قطره استریل چشمی ۵ میلی‌لیتر.

بها: ۸۸ ریال.

ISOPTO -MAXIDEX
آلکان آمریکا ـ تولیدارو ایران

ترکیب: دگزامتازون ۰/۱ درصد + هیدروکسی پروپیل متیل سلولز ۰/۵ درصد.

موارد استعمال: کلیه بیماریهای چشمی که به کورتیکوستروئیدها پاسخ میدهند.

مقدار مصرف و طرز استعمال: در موارد شدید: هر نیم تا یکساعت ۱ ـ ۲ قطره و سپس متناسب با شدت بیماری هر ۲ تا ۴ ساعت.

موارد منع استعمال: بیماریهای ویروسی و قارچی چشم، توبرکولز و عفونت‌های حاد معالجه نشده.
بسته‌بندی: قطره استریل چشمی ۵ میلی‌لیتر.
بها: ۷۶ ریال.

ISORDIL
آیرست ـ آمریکا

ترکیب: ایزوسوربید d نیترات.
موارد استعمال: نارسائی کورونر، آنژین دوپوآترین.
مقدار مصرف و طرز استعمال: روزی یک قرص.
عوارض جانبی: سردرد.
بسته‌بندی: قرص ۵ و ۱۰ میلی‌گرم × ۱۰۰.
بها: ۵ میلی ۲۳۰ ریال، ۱۰ میلی ۳۳۵ ریال.

ISTONIL
زیگفرید ـ سویس

ترکیب: دی‌متاکرین.
موارد استعمال: انواع دپرسیون‌ها.
مقدار مصرف و طرز استعمال: روزی ۱ ـ ۳بار، هربار ۲ قرص. آمپول: روزی ۱ تزریق عضلانی.
موارد منع استعمال: گلوکوم.
بسته‌بندی: قرص ۵۰ میلی‌گرم × ۵۰. آمپول ۲۵ میلی‌گرم × ۱۰.
بها: قرص ۳۰۰ ریال، آمپول ۲۰۰ ریال.

ISUPREL
وینتروپ آمریکا ـ ایران

ترکیب: کلریدرات ایزوپرترنل = ایزوپرنالین با غلظت یک پنج هزارم.
موارد استعمال: شوکهای قلبی، درمان و پیشگیری وقفه قلبی، آریتمی‌های قلبی، پیشگیری و معالجه برنکواسپاسم در دوران بیهوشی.
مقدار مصرف و طرز استعمال: ۱ میلی‌لیتر زیرپوستی یا داخل عضلانی. ۰/۶ میلی‌لیتر داخل وریدی. یک میلی‌لیتر که در ۲۰۰ میلی‌لیتر گلوکز ۵ درصد رقیق شده و به‌میزان یک میلی‌لیتر در دقیقه پرفوزیون میشود. ۰/۱ میلی‌لیتر داخل قلبی.
موارد منع استعمال: مصرف توأم با اپی‌نفرین.
احتیاط: در بیماران هیپرتیروئیدی، دیابت، نارسائی عروق کرونر باید

با احتیاط مصرف شود.
بسته‌بندی: آمپول ۰/۲ میلی‌گرم = ۱ میلی‌لیتر × ۵ و ۱۰.
بها: آمپول ۵ عددی ۲۵۰ ریال، ۱۰ عددی ۱۵۴۵ ریال.

IVERSAL
بایر آلمان - ایران

ترکیب: N - گوانیدو - N - تیواورئیدو - P - کینون دی ایمید = آمبازون ۱۰ میلی‌گرم.
موارد استعمال: پیش‌گیری و درمان موضعی عفونت‌های دهان، گلو، لوزه‌ها، ژنژیویت، استوماتیت، پس از کشیدن دندان و عمل کردن لوزه.
مقدار مصرف و طرز استعمال: روزی ۳ - ۵ بار، هربار یک قرص پس از هر غذا مکیده می‌شود.
بسته‌بندی: قرص × ۱۰۰.
بها: ۱۷۶ ریال.

I

J

JADIT
هوخست آلمان ـ ایران

ترکیب: پماد: ۴ ـ کلر ـ ۲ ـ اکسی ـ اسید بنزوئیک ـ ن ـ بوتیل آمید ـ بوکلوزامید ۱۰ درصد + اسید سالیسیلیک ۲ درصد. محلول: مواد فوق بترتیب: ۱۰ درصد + ۱ درصد.
موارد استعمال: کلیه بیماریهای قارچی پوست مخصوصاً اپیدرموفیتی، تریکوفیتی، میکروسپوری، پتی ریازیس ورزیکولر.
مقدار مصرف و طرز استعمال: روزی ۲ بار بطور موضعی استفاده میشود.
بسته‌بندی: پماد ۲۰ گرم، محلول ۳۰ میلی لیتر.
بها: پماد ۴۶ ریال. محلول ۶۴ ریال.

JADIT H
هوخست آلمان ـ ایران

ترکیب: پماد: ۴ ـ کلر ـ ۲ ـ اکسی ـ اسید بنزوئیک ـ ن ـ بوتیل آمید ـ بوکلوزامید ۲۰ درصد + هیدروکورتیزون استات ۰/۱ درصد. محلول: مواد فوق بترتیب: ۱۰ درصد + ۰/۵ درصد.
موارد استعمال: کلیه بیماریهای قارچی پوست قابل درمان مخصوصاً در مواردیکه با التهاب همراه باشند.
مقدار مصرف و طرز استعمال: روزی ۲ بار بطور موضعی استفاده میشود.
بسته‌بندی: پماد ۵ گرم، محلول ۶ میلی لیتر.
بها: پماد ۴۶ ریال، محلول ۵۹ ریال.

JECTOFER
آسترا ـ سوئد

ترکیب: در هر آمپول: کمپلکس آهن (معادل ۱۰۰ میلی‌گرم) + سوربیتول + اسید سیتریک.
موارد استعمال: کم‌خونی، کمبود آهن.
مقدار مصرف و طرز استعمال: روزی ۱/۵ میلی‌گرم برای هر کیلوگرم وزن بدن بطور تزریق داخل عضلانی.

بسته‌بندی: آمپول ۲ میلی‌لیتر × ۵۰.
بها: آمپول ۲۳۰۰ ریال.

KALDIL
برونوفرانسه ـ
فارماشیمی ایران

ترکیب: تئوفیلین پروپان سولفانات پاپاورین.
مکانیسم اثر: با اثر مستقیم عضلات صاف را منبسط، قدرت انقباض قلب را زیاد و فیلتراسیون کلیوی را افزایش میدهد.
موارد استعمال: بیماریهای عروقی، آترومانوز مغزی یا کرونر.
مقدار مصرف و طرز استعمال: روزی ۳ ـ ۶بار هربار یک قرص.
بسته‌بندی: قرص ۷۵ میلی‌گرم × ۳۰.
بها: ۹۰ ریال.

KALIUM Durules
آسترا ـ سوئد

ترکیب: کلرورپتاسم ۱ گرم.
موارد استعمال: هیپوکالمی.
مقدار مصرف و طرز استعمال: روزی ۲ ـ ۳ قرص.
احتیاط: قرص ها نباید شکسته یا جویده شوند.
بسته‌بندی: قرص × ۲۵۰.
بها: ۲۹۰ ریال.

KALMIN
دکتر پل متادیه فرانسه ـ هورایران

ترکیب: در هرکاشه: آمینوپیرین ۲۵۰ میلی‌گرم + فناستین ۱۰۰ میلی‌گرم + کافئین ۳۰ میلی‌گرم.
موارد استعمال: میگرن، نورالژی، سردردهای معمولی، دندان درد، دردهای روماتیسمی، تب، کوفتگی، خستگی، بیخوابی، درد-های عصبی.
مقدار مصرف و طرز استعمال: یک کاشه درموقع درد.
موارد منع استعمال: اشخاص کمتر از ۱۵ سال.
احتیاط: نباید بیشتر از ۲ ـ ۳ عدد در روز مصرف شود.

بسته‌بندی: کاشه × ۱۰۰.
بها: ۳۵۱ ریال.

KANACILLIN
کنتیناتال فارما ــ بلژیک

ترکیب: ضعیف: بنزیل پنی‌سیلینات پروکائین ۳۰۰ هزار واحد + بنزیل پنی‌سیلینات سدیم ۱۰۰ هزار واحد + سولفات کانامایسین ۱۰۰ میلی‌گرم. قوی: بنزیل پنی‌سیلینات پروکائین ۷۵۰ هزار واحد + بنزیل پنی‌سیلینات سدیم ۲۵۰ هزار واحد + سولفات کانامایسین ۲۵۰ میلی‌گرم.
موارد استعمال: انواع عفونتهای استافیلوکوکی و عفونتهای مجاری ادرار.
مقدار مصرف و طرز استعمال: روزی یک تزریق عضلانی.
موارد منع استعمال: بیماران حساس به پنی‌سیلین.
بسته‌بندی: ضعیف: ویال × ۱ + حلال ۳ میلی‌لیتر. قوی: ویال × ۱ + حلال ۳ میلی‌لیتر.
بها: ضعیف ۶۰ ریال، قوی ۱۱۰ ریال.

KANAMYCIN
می جی ژاپن ــ فارما شیمی ایران

ترکیب: کانامایسین.
موارد استعمال: انواع عفونتهای گوارشی.
مقدار مصرف و طرز استعمال: بزرگسالان: هر ۶ ساعت ۳ کپسول با هم. خردسالان: ۱۲ ــ ۲۵ میلی‌گرم برای هر کیلو وزن بدن.
موارد منع استعمال: نارسائی شدید کلیوی.
عوارض جانبی: عوارض گوشی تا حد کری.
بسته‌بندی: قرص ۲۵۰ میلی‌گرم × ۲۰ شربت ۵۰ میلی‌گرم در هر میلی‌لیتر × ۶۰ میلی‌لیتر.
بها: کپسول ۲۶۰ ریال شربت ۱۷۶ ریال.

Kan-Cinolone
پیرل ــ ایتالیا

ترکیب: در هر ۵ گرم پماد: تریامسینولون استونایدِ ۵ میلی‌گرم + کانامایسین سولفات معادل ۲۵ میلی‌گرم باز.
موارد استعمال: درماتوزهای آلرژیک و التهابی یا عفونی، اولسرهای

K

واریسی، اکزما، فرونکولوز، پیودرمیت.
مقدار مصرف و طرف استعمال: کمی از پماد را روی ضایعه میمالند.
بسته بندی: پماد ۵ گرم.
بها: ۵۹ ریال.

KANORMAL
شرینگ ـ آلمان

ترکیب: صمغی از گروه باسورین + پوست فرانگولا.
موارد استعمال: تنبلی مزمن روده‌ها مخصوصاً یبوست‌های اتونیک و اسپاستیک و انواع مختلط این دو، یبوستهای مربوط به‌شقاق مقعد و بواسیر، یبوستهای غذائی، یبوست‌های ماههای اول آبستنی و یبوست‌های کودکان.
مقدار مصرف و طرز استعمال: صبح و شب ۱ ـ ۲ قاشق مرباخوری را بدون جویدن با کمی آب مخلوط کرده بعد از غذا میل میکنند.
بسته‌بندی: گرانول ۱۰۰ و ۲۵۰ گرم.
بها: ۱۰۰ گرمی ۴۹ ریال، ۲۵۰ گرمی ۹۴ ریال.

KANTREX
بریستول ـ آمریکا

ترکیب: سولفات کانامیسین.
موارد استعمال: عفونت‌های مجاری ادرار، عفونتهای مجاری تنفس، عفونتهای پوست، انساج نرم و پس از عمل جراحی.
مقدار مصرف و طرز استعمال: روزی ۱۵ میلی‌گرم برای هر کیلو وزن بدن بفاصله ۱۲ ساعت.
احتیاط: در مبتلایان به‌ضایعات کلیوی کانامیسین را باید فقط در موارد خیلی ضروری بکار برد.
بسته‌بندی: ویال ۷۵ میلی‌گرم = ۱ میلی‌لیتر. ویال ۰/۵ گرم = ۲ میلی لیتر و ویال ۱ گرم = ۳ میلی‌لیتر × ۱.
بها: ۷۵ میلی‌گرمی ۷۴ ریال، ۰/۵ گرمی ۱۰۳ ریال، ۱ گرمی ۱۸۲ ریال.

KAOLEINE Strepto
میسین ـ ایران

ترکیب: سولفات استرپتومایسین ۹۰ گرم + یدو- کلرواکسی کینولئین ۲ گرم + سولفاسوکسیدین ۴ گرم + یکتیز

K

۱ میلی‌گرم + کائولن ۳ گرم.
موارد استعمال: اسهال‌های باسیلی و آمیبی کلیت‌های داخلی، سوء-هاضمه، اسهالهای مزمن و تابستانی.
مقدار مصرف و طرز استعمال: روزی ۳ بار، هربار ۱ قاشق غذاخوری.
بسته‌بندی: سوسپانسیون ۹۰ میلی‌لیتر.
بها: ۴۵ ریال.

KAOPECTATE
آپجان ـ آمریکا

ترکیب: در هر ۵ میلی‌لیتر: کائولین ۹۸۶ میلی‌گرم + پکتین ۲۲ میلی‌گرم.
موارد استعمال: اسهالهای تابستانی و غیرعفونی.
مقدار مصرف و طرز استعمال: خردسالان ۳ ـ ۶ سال: روزی ۱ ـ ۲ قاشق سوپخوری، ۶ ـ ۱۲ سال: روزی ۲ ـ ۴ قاشق سوپخوری، بیشتر از ۱۲ سال: روزی ۴ قاشق سوپخوری، بزرگسالان: روزی ۴ ـ ۸ قاشق غذاخوری.
بسته‌بندی: شربت ۱۸۰ میلی‌لیتری
بها: ۷۰ ریال.

K

KAPECT
آی دی آی ـ ایران

ترکیب: در هر ۵ میلی‌لیتر: کائولن ۱ گرم + پکتین ۰/۰۵ گرم.
موارد استعمال: درمان انواع اسهال.
مقدار مصرف و طرز استعمال: بزرگسالان: روزی ۳ ـ ۴ بار، هربار ۱ ـ ۲ قاشق غذاخوری. خردسالان: ۱ ـ ۲ قاشق مرباخوری.
بسته‌بندی: سوسپانسیون ۶۰ میلی‌لیتر.
بها: ۶۴ ریال.

KAPECT - P
آی دی آی ـ ایران

ترکیب: پکتین + کائولن + الگزیرپاراگوریک.
موارد استعمال: اسهالهای شدید و پیچش‌دار.
مقدار مصرف و طرز استعمال: بزرگسالان: روزی ۴ بار هربار ۱ ـ ۲ قاشق غذاخوری. خردسالان ۵ ـ ۱۲ ساله: روزی ۴ ـ ۶ بار، هربار ۱ ـ ۲ قاشق مرباخوری. خردسالان ۲ ـ ۵ ساله: نصف قاشق

مرباخوری.
بسته‌بندی: سوسپانسیون ۶۰ میلی‌لیتر.
بها: ۷۰ ریال.

KAPSOVIT
آلن هانبوریز
انگلستان
ـ داروپخش ایران

ترکیب: در هر کپسول: ویتامین A ۲۵۰۰ واحد + ویتامین B_1 ۱ میلی‌گرم + ویتامین B_2 ۰/۵ میلی‌گرم + نیکوتینامید ۷/۵ میلی‌گرم + اسیداسکوربیک ۱۵ میلی‌گرم + ویتامین D ۳۰۰ واحد.
موارد استعمال: درمان کمبود ویتامین‌ها، به‌عنوان مکمل ویتامینی در دوره رشد و بلوغ آبستنی و شیردهی، نقاهت و وقتی که رژیم غذائی محدود است، سوءتغذیه و کم‌غذائی، قبل و بعد از عمل جراحی، در بیماریهای عفونی، کم‌خونی
مقدار مصرف و طرز استعمال: به‌عنوان مکمل ویتامینی: روزی ۱ تا ۳ کپسول. بعنوان درمان: روزی ۳ بار، هربار ۱ یا ۲ کپسول.
بسته‌بندی: کپسول × ۵۰، ۱۰۰
بها: ۵۰ عددی ۶۱ ریال، ۱۰۰ عددی ۱۰۵ ریال.

KATABIOS
فارمیتالیا ـ ایتالیا

ترکیب: ویتامین های $A + D_2 + D_3 + B_1 + B_2 + B_6 + B_{12} + E$ + PP + پانتوتنول.
موارد استعمال: کمبود ویتامین ها، کمک به تغذیه، ضعف، بارداری.
مقدار مصرف و طرز استعمال: بزرگسالان بعنوان پیشگیری: ۱ـ۲ قاشق غذاخوری شربت یا ۴۰ـ۲۰ قطره یا ۱ـ۲ دراژه در روز. بعنوان درمان: ۲ برابر مقادیر فوق. خردسالان: نصف مقدار بزرگسالان
بسته‌بندی: قطره ۲۰ میلی‌لیتر. شربت ۱۲۰ میلی‌لیتر. آمپول ۲ میلی‌لیتر × ۵. دراژه × ۲۰.
بها: قطره ۷۵ ریال. شربت ۸۰ ریال. آمپول ۸۴ ریال. دراژه ۵۰ ریال.

KEFLEX
لی‌لی آمریکا ـ
ایران

ترکیب: سفالکسین مونوهیدرات.
موارد استعمال: عفونتهای میکروبی مجاری تنفسی، ادراری، پوست و نسوج نرم.

K

مقدار مصرف و طرز استعمال: روزی ۱ ـ ۴ گرم از راه خوراکی (دوز معمولی هر ۶ ساعت ۲۵۰ میلی‌گرم).
موارد منع استعمال: حساسیت بدارو.
احتیاط و عوارض جانبی: در موارد استثنائی تهوع، بثورات مختلف، درماتیت و اسهال گزارش شده است. مصرف آن در بیماران حساس به پنی‌سیلین باید با احتیاط توأم باشد.
بسته‌بندی: کپسول ۲۵۰ میلی‌گرم و قرص ۵۰۰ میلی‌گرم × ۱۲
سوسپانسیون ۱۲۵ و ۲۵۰ میلی‌گرم = ۵ میلی‌لیتر × ۶۰ میلی‌لیتر.
قطره ۱۰۰ میلی‌گرم در هر میلی‌لیتر × ۱۰ میلی‌لیتر.
بها: کپسول ۲۵۰ میلی ۵۴۵ ریال، قرص ۵۰۰ میلی ۱۰۰۷ ریال
سوسپانسیون ۱۲۵ میلی ۱۶۳ ریال و ۲۵۰ میلی ۴۸۰ ریال،
قطره ۱۴۶ ریال.

K

KEFLIN
لی‌لی ـ آمریکا

ترکیب: سفالوتین سدیم.
موارد استعمال: عفونت‌های شدید دستگاه تنفسی، ادراری، تناسلی، پوست و بافت‌های نرم، استخوان‌ها و مفاصل، قلب و عروق و در مواردی نظیر پریتونیت‌ها، سپتی‌سمی و سقط‌های عفونی.
مقدار مصرف و طرز استعمال: بزرگسالان: ۲ تا ۱۲ گرم هر ۴ تا ۶ ساعت. خردسالان: ۴۰ تا ۸۰ میلی‌گرم برای هر کیلوگرم وزن بدن در ۲۴ ساعت از راه تزریق وریدی یا عضلانی.
موارد منع استعمال: حساسیت به‌دارو.
احتیاط و عوارض جانبی: در صورت بروز واکنش های آلرژیک مصرف دارو باید قطع گردد. در زنان باردار و بیماران حساس به پنی‌سیلین باید با احتیاط مصرف شود. در مواردیکه بیش از ۶ گرم در روز بمدت بیش از ۳ روز از طریق پرفوزیون مصرف میشود ممکن است سبب آسیب وریدی و ترومبوفلبیت گردد.
بسته‌بندی: ویال ۱ گرم = ۱۰ میلی‌لیتر × ۱.
بها: ۳۰۴ ریال.

KEFLODIN
لی‌لی آمریکا ـ ایران

ترکیب: سفالوریدین.
موارد استعمال: انواع عفونتهای دستگاه تنفسی، ادراری، پوست و انساج نرم.
مقدار مصرف و طرز استعمال: بزرگسالان: روزی ۲ گرم بفاصله ۸ـ۱۲ ساعت. خردسالان: ۵۰ میلی‌گرم برای هر کیلو وزن.
موارد منع استعمال: حساسیت به پنی‌سیلین.
بسته‌بندی: ویال ۲۵۰ و ۵۰۰ میلی و ۱ گرمی.
بها: ۲۵۰ میلی ۱۰۳ ریال، ۵۰۰ میلی ۱۸۷ ریال، ۱ گرمی ۲۶۹ ریال.

KEMICETINE SUCCINATE
کارلواربا ـ ایتالیا

ترکیب: ملح سدیم کلرامفنیکل سوکسینات لیوفیلیزه ۱/۳۷۷ گرم (معادل یک گرم کلرامفنیکل چپ گرد).
موارد استعمال: تب تیفوئیدی، پنومونی، سپتیسمی‌ها، عفونتهای جهاز تناسلی و ادراری، اسهالهای شدید همراه با استفراغ، برونکوپنومونی، گاستریت و گاسترو آنتریت، سالمونلوز، تبهای پاراتیفوئیدی، دیسانتری باسیلی، تیفوس اگزانتماتوز.
مقدار مصرف و طرز استعمال: هر ۶ ساعت یکبار، ۵۰۰ میلی‌گرم محلول بصورت تزریق داخل وریدی یا نخاعی.
بسته‌بندی: ویال ۱ گرم.
بها: ۶۰ ریال.

KENACOMB
اسکوئیب آمریکا ـ ایران

ترکیب: در هرگرم: تریامسینولون استونایدا ۱ میلی‌گرم + سولفات نئومایسین ۲/۵ میلی‌گرم + گرامیسیدین ۰/۲۵ گرم + نیستاتین ۱۰۰۰۰۰ واحد.
موارد استعمال: اریتم به اشکال مختلف، اکتیما، اکزما، پسوریازیس، اکنه، روزاسه، ایکتیوز، پروریگو، درماتیت‌ها، آفتاب‌سوختگی، مونیلیازیس جلدی، لیکن پلان.
مقدار مصرف و طرز استعمال: روزی ۳ـ۴ بار بطور موضعی استعمال می‌شود. کرم برای نواحی باز بدن و محل‌های مرطوب، پماد

K

برای موضعهای خشک و پوسته‌دار.

موارد منع استعمال: بیماریهای ویروسی جلدی، حساسیت بدارو، سل پیشرونده پوست

عوارض جانبی: اختلالات متابولیک وتروفیک پوست.

بسته‌بندی: پماد و کرم ۵ و ۱۵ گرم.

بها: پماد و کرم ۵ گرمی ۸۲ ریال. پماد و کرم ۱۵ گرمی ۱۹۹ ریال.

KENACORT

اسکوئیب آمریکا ــ ایران

ترکیب: تریامسینولون.

موارد استعمال: کولاپسوس قلبی، سندرم وخیم بیماریهای عفونی، سندرم‌آدرنوژنیتال، بیماریهای کلاژن، رماتیسم حاد مفصلی، آرتریت، آرتریت‌پزوریاتیک، لوپوس اریتماتوز، بیماریهای آلرژیک، آسم، خارش، کهیر، اکزمر، سندرم لوفلر، بیماریهای التهابی چشم، بیماریهای التهابی پوست، سرطان‌های لنفاوی، بیماری هوجکین، لوسمی‌میلوئید، میلوم متعدد، گواتر لمفاونیک.

مقدار مصرف و طرز استعمال: برحسب نوع و شدت بیماری از ۲ تا ۳۲ میلی‌گرم و حتی ۶۰ میلی‌گرم در روز تغییر میکند.

موارد منع استعمال: پسیکوز، سل‌قدیمی پیشرونده، بیماریهای ویروسی.

احتیاط: در درمان‌های طولانی مانند همه کورتیکوستروئیدها هر چند یکبار تعیین وزن، اندازه‌گیری قندخون و ادرار، سرعت رسوب گلبولی، رادیوگرافی استخوانها و معده لازم است.

بسته‌بندی: قرص ۱ و ۸ میلی‌گرم × ۵۰، قرص ۴ میلی‌گرم × ۱۰۰.

بها: قرص ۱ میلی ۳۵۰ ریال، ۴ میلی ۹۳۷ ریال، ۸ میلی ۸۷۸ ریال.

KENACORT - A

اسکوئیب آمریکا ــ ایران

ترکیب: درهرگرم پماد: تریامسینولون ۱ میلی‌گرم + گرامیسیدین ۰/۲۵ میلی‌گرم + نئومایسین ۲/۵ میلی‌گرم.

موارد استعمال: درماتوزهای آلرژیک، پسوریازیس، اکزما. بیماریهای التهابی چشم: کونژنکتیویت، کراتیت، التهاب عنبیه و جسم مژگانی.

مقدار مصرف و طرز استعمال: روزی ۲ ــ ۴ بار، در موضع یا چشم بمالند.

موارد منع استعمال: بیماریهای ویروسی پوست، سل پیشرونده.
عوارض جانبی: اختلالات متابولیک و تروفیک پوست.
بسته‌بندی: پماد جلدی ۵ گرم، چشمی ۳/۶ گرم.
بها: پماد جلدی و چشمی ۷۰ ریال.

KETALAR
پارک دیویس آمریکا - ایران

ترکیب: کلریدرات کتامین.
موارد استعمال: بیهوشی عمومی در روشهای تشخیص و جراحی، برقراری بیهوشی قبل از مصرف بیهوشی دهنده‌های عمومی دیگر، مکمل بیهوشی دهنده‌های کم‌قدرت.
مقدار مصرف و طرز استعمال: مقدار مصرف دارو باید برحسب احتیاج بیمار تعیین گردد.
موارد منع استعمال: در اشخاصی که سابقه بیماریهای مغزی عروقی داشته و یا فشارخون آنها در حال استراحت از ۱۶۰ میلیمتر (سیستولیک) و ۱۰۰ میلیمتر (دیاستولیک) بیشتر باشد و همچنین اشخاصی که نارسائی قلبی سخت دارند نباید مصرف گردد. دارو نباید در جراحی حلق و حنجره یا نای مصرف گردد مگر اینکه یک شل کننده عضلانی مناسب همراه با آن بکار رود.
احتیاط: مانند سایر داروهای بیهوشی دهنده عمومی فقط بایستی توسط متخصص بیهوشی مصرف گردد.
بسته‌بندی: ویال ۵۰ میلی‌گرم در هریک میلی‌لیتر × ۱۰ میلی‌لیتر. ویال ۱۰ میلی‌گرم در هریک میلی‌لیتر × ۲۰ میلی‌لیتر.
بها: ۱ میلی ۵۰۰ ریال، ۲۰ میلی ۲۵۰ ریال.

KETRAX
آی‌سی‌آی - انگلستان

ترکیب: لوامیزول.
موارد استعمال: آسکاریس، اکسیور، کرم های قلابدار، تریکو-استرنژیلوئیدیس، استرا کورالیس، تریکوریس.
مقدار مصرف و طرز استعمال: ۱ - ۴ سال: یک قرص. ۵ - ۱۵ سال: ۲ قرص. بزرگسالان: ۳ قرص تواماً در یک دوز واحد.
بسته بندی: قرص × ۳، شربت ۱۵ میلی‌لیتر.

بها: قرص ۸۰ ریال. شربت ۸۴ ریال.

KHELLINE
دلالاند ـ فرانسه

ترکیب: ۲ ـ متیل ـ ۵، ۸ ـ دی متوکسی ـ ۶، ۷ ـ فورانو ـ کورومون.

موارد استعمال: تشنج شدید عضلات صاف مخصوصاً عضلات میزراه و سرخرگهای کرونر، قولنج کلیوی، آنژین دوپوآترین.

مقدار مصرف و طرز استعمال: روزی ۲ بار، هربار یک تزریق عضلانی بمدت ۱۰ روز.

بسته بندی: آمپول ۲ میلی‌لیتر × ۶.

بها: ۴۶ ریال.

KINIDIN Durules
آسترا ـ سوئد

ترکیب: در هر قرص: بی‌سولفات کینیدین معادل ۲۰۰ میلی‌گرم سولفات کینیدین.

موارد استعمال: آریتمی‌های سوپرا و انتریکولر، تاکی‌کاردی پاروکسیمال، تاکی‌کاردی ونتیلاتور.

مقدار مصرف و طرز استعمال: برحسب نوع و شدت بیماری متفاوت است.

توجه: قرص‌ها را نباید جوید بلکه باید بلعید. حداکثر مقدار مصرف روزانه ۲ گرم است.

بسته بندی: قرص × ۱۰۰.

بها: ۱۱۰۰ ریال.

KLIMERCO
آرکوفارم ـ دانمارك

ترکیب: متالن استریل ۲ میلی‌گرم + آموباربیتال ۵۰ میلی‌گرم.

موارد استعمال: اختلالات قاعدگی، عوارض ناشی از یائسگی طبیعی و مصنوعی.

مقدار مصرف و طرز استعمال: ۲ هفته اول: روزی ۳ قرص، ۲ هفته دوم: روزی ۲ قرص، بعدازقاعدگی روزی یک‌قرص بمدت ۵ روز.

بسته بندی: قرص × ۷۵.

بها: ۱۲۵ ریال.

KOMPENSAN
فایزرآمریکا ـ ایران

ترکیب: دی هیدروکسی آلومینیم سدیم کربنات.

موارد استعمال: سوزش و احساس پری معده، هیپراسیدیته و التهاب مزمن معده، تحریک غشاء معدی.

مقدار مصرف و طرز استعمال: ۱ ـ ۲ قرص بین غذاها قبل از خواب یا هنگام بروز درد مکیده شود. شربت: ۱ ـ ۲ قاشق غذاخوری.

عوارض جانبی: گاهی یبوست.

بسته بندی: قرص × ۶۰، سوسپانسیون ۳۵۰ میلی‌لیتر.

بها: قرص ۱۴۱ ریال، سوسپانسیون ۱۹۹ ریال.

KONAKION
روش ـ سویس

ترکیب: ۲ ـ متیل ـ ۳ فیتیل ـ ۴ و ۱ ـ نفتوکینون ـ ویتامین K.

موارد استعمال: خونریزی ناشی از هیپوپروترومبینمی، یرقان انسدادی و اختلالات کبدی و گوارشی ناشی از کمبود ویتامین K.

مقدار مصرف و طرز استعمال: ۱ ـ ۲ آمپول ۱۰ میلی‌گرم یا ۱ قرص جویدنی در خونریزیهای خفیف مصرف میشود.

بسته‌بندی: آمپول ۱۰ میلی‌گرم = ۱ میلی‌لیتر × ۳، آمپول ۱ میلی‌گرم = ۰/۵ میلی‌لیتر × ۳، دراژه جویدنی ۱۰ میلی‌گرم × ۱۰.

بها: آمپول ۱۰ میلی ۷۰ ریال، ۱ میلی ۵۵ ریال، دراژه ۶۵ ریال.

KORSOLIN
باسیلول ـ آلمان

ترکیب: ترکیبات آلدئیدی + مواد پاک کننده.

موارد استعمال: ضدعفونی با اثر توبرکولوسید، اسپوروسید، باکتریسید، ویروسید، فونگیسید برای محیط‌های اتاق، اثاثیه، البسه و وسائل لاستیکی و پلاستیکی.

مقدار مصرف و طرز استعمال: ضدعفونی عمومی: ۱ لیتر محلول در ۴۰۰ لیتر آب، توبرکولوسید: محلول ۲ درصد، مصارف دیگر: ۱ لیتر در ۱۰۰ تا ۲۰۰ لیتر آب.

موارد منع استعمال: مخاط، زخمهای باز.

بسته بندی: محلول ۱ لیتر و ۶ لیتر.

بها: یک لیتری ۴۱۰ ریال، ۶ لیتری ۲۴۰۰ ریال.

KUDROX

کرمس اوربان ــ آمریکا

ترکیب: ژل هیدروکسید آلومینیوم و منیزیم.

موارد استعمال: سوءهاضمه ناشی از افزایش اسیدیته ترشی و درد معده.

مقدار مصرف و طرز استعمال: هر ۶ ساعت یک قاشق غذاخوری.

بسته بندی: شربت ۱۷۸ میلی‌لیتر.

بها: ۱۱۰ ریال.

K

LACTATED RINGER'S (HARTMAN'S)
باکستر-ایران

ترکیب: لاکتات سدیم ۰/۳۱ گرم + کلرورسدیم ۰/۶ گرم + کلرور پتاسیم ۰/۰۳ گرم + کلرور کلسیم ۰/۰۲ گرم + آب‌مقطر مقدار کافی تا ۱۰۰ میلی لیتر.

موارد استعمال: جانشین ساختن مایعات و الکترولیتها.

مقدار مصرف و طرز استعمال: برحسب نوع مصرف متفاوت است.

بسته بندی: محلول ۵۰۰ و ۱۰۰۰ میلی‌لیتر. رینگر لاکتاته با ۵ درصد دکستروز ۱۰۰۰ میلی‌لیتر.

بها: ۵۰۰ میلی ۱۰۴ ریال، یک لیتری ۱۱۷ ریال.

LACTOPHILUS
لیوسانتر فرانسه - آی دی آی ایران

ترکیب: در هرگرم: ۲۵۰ میلیون فرمان لاکتیک زنده لیوفیلیزه.

موارد استعمال: کلیه اسهالهای مختلف و عوارض روده‌ای ناشی از بهم خوردن فلور میکروبی روده.

مقدار مصرف و طرز استعمال: روزی ۲ - ۴ بار، هربار ۱ بسته درکمی شیر یا شربت قند قبل از غذا میل شود.

بسته بندی: بسته ۱/۵ گرم × ۱۰.

بها: ۱۰۵ ریال.

LAMORAN
بهرینگرمانهایم - آلمان

ترکیب: روبازین = آلکالوئید روولفیا.

مکانیسم: سبب آزاد شدن نورآدرنالین و سروتونین از انتهای اعصاب سمپاتیک و در نتیجه باعث انبساط عروق وکاهش فشارخون میشود.

موارد استعمال: اختلال گردش خون سرخرگی و سیاهرگی محیطی،

اختلال گردش خون مغز، اختلال گردش خون رگهای کرونر.

مقدار مصرف و طرز استعمال: ۱ ـ ۳ آمپول وریدی. قرص: روزی ۳ بار، هربار ۱ ـ ۲ قرص.

موارد منع استعمال: انفارکتوس تازه میوکارد، خونریزی تازه مغزی، گلوکوم.

عوارض جانبی: بندرت سرگیجه و عرق کردن و سرخ شدن چهره.

بسته بندی: آمپول ۱۰ میلی‌گرم = ۳ میلی‌لیتر × ۱۰. قرص ۱۰ میلی‌گرم × ۵۰۰.

بها: آمپول ۲۹۲ ریال، قرص ۱۲۵۰ ریال.

LANOXIN

ولکام ـ انگلستان

L

ترکیب: دیگوکسین.

موارد استعمال: کلیه ناراحتی‌های قلبی بویژه نارسائی احتقانی قلب، آریتمی.

مقدار مصرف و طرز استعمال: هر ساعت ۰/۲۵ میلی‌گرم به‌ازاء هر کیلو وزن بدن. بزرگسالان: روزی ۴ـ۶ قرص. مقدار نگهدارنده روزی ۲ قرص.

موارد منع استعمال: تجویز توام با دیورتیک‌ها و تزریق وریدی کلسیم.

عوارض جانبی: استفراغ، اسهال، سردرد، اکستراسیستول بطنی.

بسته بندی: قرص ۰/۲۵ میلی‌گرم × ۱۰۰، آمپول ۲ میلی‌لیتر × ۵.

بها: قرص ۱۰۵ ریال، آمپول ۱۲۰ ریال.

LARGACTIL

اسپسیا ـ فرانسه

ترکیب: ۲ ـ کلرو ـ ۱۰ ـ (۳ ـ دی متیل آمینو پروپیل) فنوتیازین = کلرپرومازین.

موارد استعمال: جلوگیری و درمان شوک تروماتیک، اکلامپسی، دیسمنوره، اختلالات سیستم نباتی، دیستونی ارگانیک، مننژیت، آنسفالیت قبل از مرحله عفونی، قی، سرفه، لارنژیت حاد، درماتوز، نورودرماتیت، اکزما، اریترودرمیک پرمیکوتیک ـ نورالژی.

مقدار مصرف و طرز استعمال: شروع درمان: ۲۵ ـ ۵۰ میلی‌گرم. دوز مؤثر: ۷۵ ـ ۱۵۰ میلی‌گرم، ۳، ۴ بار در روز.

موارد منع استعمال: کوما باربی‌توریک والکلیک.

بسته‌بندی: قرص ۲۵ میلی‌گرم × ۵۰ و ۵۰۰، قرص ۱۰۰ میلی‌گرم × ۱۰۰، قطره ۴ درصد ۱ میلی‌گرم در هر میلی‌لیتر × ۱۰ میلی‌لیتر، شیاف ۲۵ میلی‌گرم × ۵، آمپول عضلانی ۲۵ میلی‌گرم = ۵ میلی‌لیتر × ۱۰، آمپول وریدی ۵۰ میلی‌گرم = ۲ میلی‌لیتر × ۵.

بها: قرص ۲۵ میلی ۵۰ عددی ۶۴ ریال، ۵۰۰ عددی ۵۳۲ ریال. قرص ۱۰۰ میلی ۳۴۱ ریال. قطره ۵۴ ریال. شیاف ۳۳ ریال. آمپول عضلانی ۱۱۷ ریال. آمپول وریدی ۵۹ ریال.

LARODOPA
روش ـ سویس

ترکیب: ۳ ـ (۳، ۴ ـ دی هیدروکسی فنیل ـ L ـ آلانین L ـ دوپا.

موارد استعمال: بیماری پارکینسون.

مقدار مصرف و طرز استعمال: برحسب شدت بیماری متفاوت است.

موارد منع استعمال: مانند تمام سمپاتیکو ـ میمتیک‌ها از قبیل آدرنالین و نورآدرنالین.

احتیاط و عوارض جانبی: موقع درمان با دارو باید از مصرف داروهای وقفه دهنده منوآمینوا کسیداز اجتناب کرد.

بسته بندی: قرص ۵۰۰ × ۵۰.

بها: ۷۵۰ ریال.

LASAN
استی‌فل ـ آمریکا

ترکیب: در پماد، اکسیددوزنک + نشاسته ذرت + وازلین سفید + اسید سالیسیلیک + آنترالن ۴۰ سانتی گرم در خمیر شماره ۲، ۲۰ سانتی گرم در خمیر شماره ۴، ۴۰ سانتی گرم.

موارد استعمال: پسوریازیس.

مقدار مصرف و طرز استعمال: مقدارکمی از پماد یا خمیر را با دست روی پوست می‌مالند.

موارد منع استعمال: التهابات پوستی، نارسائی کلیوی، حساسیت بدارو.

احتیاط: دارو با چشمها نباید تماس پیدا کند، بعد از مصرف دستها

باید کاملا شسته شود.

بسته بندی: پماد و خمیر در قوطی‌های ۵ انسی.

بها: ۲۷۳ ریال.

LASIX
هوخست آلمان ـ ایران

ترکیب: اسید ۴ ـ کلرو ـ ن ـ (۲ ـ فوریل متیل) ـ ۵ ـ سولفامیل آنترانیلیک = فورسماید.

مکانیسم: از جذب مجدد الکترولیت‌ها از لوله‌های کلیوی جلوگیری میکند.

موارد استعمال: خیزهای قلبی، خیز کبدی، کلیوی، آبستنی و مغزی، هیپرتانسیون، آسیت‌های بامنشأ سیروز کبدی، خیزهای ریوی، مسمومیت حاصل از باربیتوریک‌ها.

مقدار مصرف و طرز استعمال: در اغلب موارد تجویز روزانه فقط یک قرص کافیست. در صورت استفاده بیش از ۳ قرص بهتر است مقدار مزبور به ۲ الی ۳ دوز واحد تقسیم و تجویز گردد. برای خردسالان روزانه ۱ ـ ۳ میلی‌گرم برای هر کیلو تجویز میشود.

در خیزهای مغزی و ریوی و موقعی که احتیاج به یک دیورزفوریست از آمپول وریدی یا عضلانی استفاده میشود.

موارد منع استعمال: عدم کفایت حاد کلیه یا آنوری، اغماء کبدی.

احتیاط: در ماههای اول آبستنی و هیدرونفروز با احتیاط تجویز شود.

بسته بندی: قرص ۴۰ میلی‌گرم × ۱۲ و ۲۵۰، آمپول ۲۰ میلی‌گرم = ۲ میلی‌لیتر × ۵.

بها: قرص ۱۲ عددی ۱۱۲ ریال، ۲۵۰ عددی ۲۰۴۸ ریال، آمپول ۱۰۳ ریال.

LASONIL
بایر ـ آلمان

ترکیب: در هر ۱۰۰ گرم: هپارینوئید ۵ هزار واحد + هیارلورونیداز ۱۵ هزار واحد.

موارد استعمال: پیچیدگی مفاصل، کوفتگی، خون‌مردگی، هماتوم، ترومبوفلبیت و ترومبوز سطحی، بواسیر.

مقدار مصرف و طرز استعمال: بسته به وسعت موضع درد روزی ۲ ـ ۳ بار،

هربار ۳-۵ سانتیمتر از پماد مالیده شود. در بواسیر صبح و شب پس از اجابت مزاج در ناحیه مقعد و نیز مقداری توسط کانول باید بداخل مقعد مالیده شود.

بسته بندی: پماد ۴۰ گرم.

بها: ۱۱۰ ریال.

LAUDAMONIUM
هنکل ـ آلمان

ترکیب: آلکیل ـ دی متیل ـ بنزیل آمونیوم کلراید.

موارد استعمال: ضدعفونی پوست، زخم، سوختگی، بریدگی، بهداشت زنان، زایمان، ضدعفونی حمام، وان، دستشوئی.

مقدار مصرف و طرز استعمال: برحسب نوع مصرف متفاوت است.

بسته بندی: محلول ۲۵۰ گرم.

بها: ۸۰ ریال.

L

LAURYLIN
پیرل ـ ایتالیا

ترکیب: استرلوریل پروپیونیل اریترومایسین.

موارد استعمال: اتورینولارنژ، ناراحتی دهان، برونکوپنومولر، ناراحتی قلبی، عفونتهای معدی، روده‌ای، عفونت های دستگاه تناسلی، ادراری، بیماریهای آمیزشی، مننژیت، عفونتهای عروقی، عفونت‌های جلدی و زیر جلدی، سرخک وسرخجه، باکتریمی، بروسلوز، تتانوز.

مقدار مصرف و طرز استعمال: کپسول: هر ۴ یا ۶ ساعت ۱ ـ ۲ عدد
شربت: هر ۴ یا ۶ ساعت ۱ قاشق غذاخوری.

احتیاط: قبل از مصرف شربت شیشه تکان داده شود.

بسته بندی: شربت ۶۰ میلی‌لیتر، کپسول ۲۵۰ میلی‌گرم × ۵۰.

بها: شربت ۱۵۰ ریال، کپسول هر عدد ۱۵ ریال.

LAVORINE
پارک ـ ایران

ترکیب: کلرال هیدراته + اسید سالیسیلیک + اسید فنیک + کلریدرات آمیلوکائین.

موارد استعمال: عفونتهای دهان و گلو، پیوره، خونریزی لثه‌ها، برطرف کردن بوی بد دهان.

مقدار مصرف و طرز استعمال: برای مصارف دندانپزشکی: یک قاشق مرباخوری را در یک لیوان آب جوشیده نیم گرم ریخته و مضمضه می کنند. برای درمان و تسکین گلو درد: نصف قاشق مرباخوری را در یک لیوان آب نیم گرم ریخته و غرغره می کنند.

بسته بندی: محلول ۳۰ میلی‌لیتر.

بها: ۳۵ ریال.

LAXMEL
ماکسون آمریکا ـ تولیدارو ایران

ترکیب: در هر ۱۰۰ میلی‌لیتر: هیدروکسید منیزیم ۸ گرم + اسید سیتریک ۱۰۰ گرم.

مکانیسم اثر: با جذب آب سبب نرم شدن و افزایش حجم مواد باقیمانده در روده میشود.

موارد استعمال: یبوست، ترش کردن، سوختگی و تاول پوست.

مقدار مصرف و طرز استعمال: روزی ۳ بار، هربار ۱ قاشق مرباخوری یا سوپخوری.

بسته بندی: سوسپانسیون ۱۲۰ میلی‌لیتر.

بها: ۲۹ ریال.

LC - 65
آلرگان ـ آمریکا

ترکیب: تیمروسال + ادتات دی سدیم + مواد تامپونه.

موارد استعمال: پاک کردن کنتاکت لنز.

مقدار مصرف و طرز استعمال: یک قطره روی هر یک از لنزها ریخته مدت ۱۵ ـ ۲۰ ثانیه با انگشت مالیده سپس آب می کشند.

بسته بندی: محلول ۱۵ میلی‌لیتر.

بها: ۷۵ ریال.

LEDERCORT
لدرلی آمریکا ـ ایران

ترکیب: در هر قرص: ۹ ـ آلفافلورو ـ ۱۶ ـ آلفائیدروکسی پردنیزولون = فلوئوسینولون استونايد ۴ میلی گرم.

موارد استعمال: آرتریت روماتوئید، بورسیت حاد، آسم برونشیک، رینیت وازوموتور، ادم آنژیونوروتیک، درماتوزهای مختلف.

مقدار مصرف و طرز استعمال: بزرگسالان: مقدار اولیه: روزی ۸ ـ ۲۰

میلی‌گرم موقعی که پاسخ رضایت بخش بدست آمد باید هر ۲ـ۳ روز ۲ میلی‌گرم از دوز داروکاست تا دوز نگهدارنده بدست آید.

موارد منع استعمال: سل حاد، عفونتهای ویروسی.

بسته بندی: قرص ۱ و۲ و ۴ میلی‌گرم × ۳۰.

بها: ۱ میلی ۱۰۵ ریال، ۲ میلی ۱۹۳ ریال، ۴ میلی ۳۵۱ ریال.

LEDERCORT Acetonide
لدرلی آمریکا ـ ایران

ترکیب: پماد و کرم: لدرکورت استونایـد ۰/۱ درصد.

موارد استعمال: درماتیت آتوپیک، درماتیت اکزمائی، درماتیت تماسی درماتیت سبوره‌ای، نورودرماتیت، اکزمای نومولر، خارش فرج و مقعد.

مقدار مصرف و طرز استعمال: روزی ۳ ـ ۴ بار پماد یا کرم را در محل مورد نظر می‌مالند.

بسته بندی: پماد و کرم ۵ گرم.

بها: پماد و کرم ۸۸ ریال.

LEDERKYN
لدرلی آمریکا ـ ایران

ترکیب: در هر قرص: سولفامتوکسی پیریدازین. در هر قاشق مرباخوری سوسپانسیون: استیل سولفامتوکسی پیریدازین معادل ۲۵۰ میلی‌گرم لدرکاین + متیل پارابن ۰/۴۶ میلی‌گرم + پروپیل پارابن ۰/۵۶ میلی‌گرم.

اثر متقابل: تقویت اثر آنتاگونیست‌های اسید فولیک یاداروهای پائین آورنده قند خون.

موارد استعمال: عفونت‌های ادراری، عفونت‌های دستگاه تنفسی فوقانی، دیسانتری باسیلی، عفونت‌های نسوج نرم ناشی از میکربهای حساس به‌سولفامیدها. میکرب‌های گرم منفی و کوکسی‌های گرم مثبت.

مقدار مصرف و طرز استعمال: قرص: بزرگسالان روز اول ۲ قرص، روزهای بعد یک قرص. در عفونت‌های شدید ابتدا ۴ قرص

L

سپس هر ۲۴ ساعت یک قرص.
عوارض جانبی: در بیماران حساس به‌سولفامیدها آلرژی ایجاد میکند.
درمان مسمومیت: تخلیه سریع معده.
بسته‌بندی: قرص × ۱۰۰.
بها: قرص ۷۰۲ ریال.

LEDERMYCIN
لدرلی آمریکا ـ ایران

ترکیب: در هر قاشق مرباخوری شربت: دمتیل کلرتتراسیکلین ۷۵ میلی‌گرم. در هر میلی‌لیتر قطره: ۶۰ میلی‌گرم در هر کپسول ۷۵ و ۱۵۰ میلی‌گرم.
موارد استعمال: سیستیت، ورم گوش، عفونتهای دستگاه ادراری و تناسلی، ذات‌الریه، برونشیت.
مقدار مصرف و طرز استعمال: خردسالان: بطور متوسط روزی ۴ بار، هر بار ۱۵۰ میلی‌گرم. بزرگسالان: برای هر کیلو وزن بدن ۶ـ۱۲ میلی‌گرم در ۲ یا ۴ وعده.
عوارض جانبی: مانند بقیه تتراسیکلین‌ها، استوماتیت، تهوع، اسهال، واژینیت.
موارد منع استعمال: افراد حساس به‌دمکلوسیکلین.
بسته‌بندی: کپسول ۱۵۰ میلی‌گرم × ۱۰۰، ۷۵ میلی‌گرم × ۲۴، شربت ۶۰ میلی‌لیتر، قطره ۱۰ میلی‌لیتر، پماد ۰/۵ درصد ۱۵ گرم.
بها: کپسول ۱۵۰ میلی ۱۰۰ عددی ۱۲۸۸ ریال، ۷۵ میلی ۱۹۸ ریال. شربت ۱۰۵ ریال. قطره ۷۰ ریال. پماد ۴۱ ریال.

LEDERPLEX Cap.
لدرلی آمریکا ـ ایران

ترکیب: در هر کپسول: تیامین منونیترات ۲ میلی‌گرم + ریبوفلاوین ۲ میلی‌گرم + نیاسینامید ۱۰ میلی‌گرم + کلرید رات پیریدوکسین ۰/۲ میلی‌گرم + کلسیم پانتوتنات ۳ میلی‌گرم + کولین ۲۰ میلی‌گرم + اینوزیتول ۱۰ میلی‌گرم + عصارهٔ جگر ۳۴۰ میلی‌گرم + ویتامین B_{12} ۱ میکروگرم بشکلی که در عصاره تخمیر استرپتومیسین وجود دارد.
موارد استعمال: در تمام موارد کمبود ویتامین های گروه B.

L

مقدار مصرف و طرز استعمال: روزی ۲ کپسول.
بسته بندی: کپسول × ۱۰۰.
بها: ۲۱۱ ریال.

LEDERPLEX Syrup
لدرلی آمریکا ـ ایران

ترکیب: در هر ۴ میلی‌لیتر: کلریدرات تیامین ۲ میلی‌گرم + ویتامین B_2 ۰/۲ میلی‌گرم + نیاسینامید ۱۰ میلی‌گرم + ویتامین B_6 ۰/۲ میلی‌گرم + اسید پانتوتنیک ۲ میلی‌گرم + کولین ۲۰ میلی‌گرم + اینوزیتول ۱۰ میلی‌گرم + عصارهٔ جگر ۴۷۰ میلی‌گرم + ویتامین B_{12} ۵ میکرو-گرم.
موارد استعمال: در تمام موارد کمبود ویتامین های گروه B.
مقدار مصرف و طرز استعمال: روزی ۲ قاشق مرباخوری.
احتیاط: دارو را نباید به‌شیر بچه اضافه نمود.
بسته بندی: محلول ۱۲۰ میلی‌لیتر.
بها: ۱۰۵ ریال.

LENTERULES de Gardenal
اسپسیا ـ فرانسه

ترکیب: ۵ ـ اتیل ۵ ـ فنیل باربیتوریک اسید.
موارد استعمال: دیستونی نورووژتاتیف، افسردگی، دردهای اسپاسمی، آسم، میگرن، عوارض ناشی از فشارخون، صرع، کم‌خوابی.
مقدار مصرف و طرز استعمال: روزی ۰/۵ ـ ۲ قرص بدون جویدن بلع می‌شود.
بسته بندی: قرص ۱۰۰ میلی‌گرم × ۲۰.
بها: ۴۰ ریال.

LENTRAT
مدینوا ـ سویس

ترکیب: پنتااریتریتول تترانیترات ۳۰ میلی‌گرم.
موارد استعمال: پیشگیری و درمان آنژین دوپواترین، بعنوان بازکننده عروق کرونر.
مقدار مصرف و طرز استعمال: روزی ۲ بار، هربار ۱ کپسول.
موارد منع استعمال: گلوکوم.

بسته بندی: کپسول میکروگرانول رتارد × ۲۰.

بها: ۱۹۵ ریال.

LENTRAT. A
مدینوا ـ سویس

ترکیب: پنتااریتریتول تترانیترات ۳۰ میلی‌گرم + آموباربیتال ۵۰ میلی‌گرم.

موارد استعمال: پیشگیری و درمان آنژین دوپواترین، بازکننده عروق کرونر، تضعیف حمله آنژین دوپواترین.

مقدار مصرف و طرز استعمال: روزی ۲ بار، هربار ۱ کپسول.

موارد منع استعمال: گلوکوم.

بسته بندی: کپسول میکروگرانول رتارد × ۲۰.

بها: ۲۲۰ ریال.

L

LEPTINOL
لپتی ـ ایتالیا

ترکیب: پردنیزولون.

موارد استعمال: روماتیسم حاد مفصلی، آرتریت، روماتوئید، آسم برونش ها، پورپورآی آلرژیک، لوسمی، لنفوئید حاد و مزمن.

مقدار مصرف و طرز استعمال: برحسب نوع و شدت بیماری از ۵ ـ ۶۰ میلی‌گرم در روز متفاوت است.

بسته‌بندی: قرص ۵ میلی‌گرم × ۵۰.

بها: ۱۱۷ ریال.

LESPENEPHRYL
فرایس ـ فرانسه

ترکیب: لسپنفریل ۱۵ درصد.

موارد استعمال: ازتمی‌های خارج کلیوی، بعنوان دیورتیک و عامل هیپوازتمیک، درمان عوارض نارسائی کلیه.

مقدار مصرف و طرز استعمال: بطور متوسط روزی ۳ بار، هربار ۵۰ـ ۱۰۰ قطره. خردسالان ۲۰ ـ ۵۰ قطره.

بسته‌بندی: قطره ۶۰ میلی‌لیتر.

بها: ۱۸۵ ریال.

LESPENEPHRYL Injectable
فرایس ـ فرانسه

ترکیب: در هر آمپول ۱۰ میلی‌لیتر: فلاوونوئید برابر با ۴ میلی‌لیتر عصاره مائی کاپیتات لسپدزا: ۶ میلی‌گرم.

موارد استعمال: درمان اولیه و اورژانس اورمی، الیگوری، توکسمی‌ها.

مقدار مصرف و طرز استعمال: روزی ۱ ـ ۴ ویال تزریق عضلانی یا وریدی یا پرفوزیون.

احتیاط: از ۶ ویال در روز تجاوز ننماید.

بسته بندی: آمپول عضلانی لیوفیلیزه × ۳.

بها: ۲۸۰ ریال.

LEUCODININE B
لوالوئیس پرت ـ فرانسه

ترکیب: متیل ۴ ـ اکسی فنل لاووبل ۰/۰۱۰.

موارد استعمال: هیپر کرومی ویتی‌لیژینور، ملانوزافید ها.

مقدار مصرف و طرز استعمال: برحسب نوع و شدت بیماری متفاوت است.

بسته بندی: پماد ۳۰ گرم.

بها: ۸۰ ریال.

LEUKERAN
بوروزولکام ـ انگلستان

ترکیب: گاما ـ ۴ ـ دی ـ (۲ ـ کلرواتیـل) آمینو ـ فنیل بوتیریک اسید = کلرامبوسیل.

فارما کولوژی: داروی سیتوتوکسیک و آنتی نئوپلاستیک.

موارد استعمال: لمفومافولیکولر، سارکوم سلولی، اریترودرمی، بیماری هوجکین، لوسمی.

مقدار مصرف و طرز استعمال: ۰/۲ میلی‌گرم برای هر کیلو وزن بدن بمدت ۳ تا ۶ هفته.

موارد منع استعمال: لوکوپنی.

احتیاط: آزمایشهای خونی باید هر هفته انجام شود.

بسته بندی: قرص ۵ میلی‌گرم × ۱۰۰.

بها: ۳۶۰ ریال.

LEVOGLUTAMINE
هوده ـ فرانسه

ترکیب: در هر قرص: گلوتامین چپ گرد ۴۰ میلی گرم.
موارد استعمال: درمان خستگی فکری و جسمی، نقاهت، فشارهای عصبی.
مقدار مصرف و طرز استعمال: خردسالان: روزی ۱ ـ ۲ قرص.
بزرگسالان: روزی ۲ ـ ۳ قرص.
بسته بندی: قرص × ۶۰.
بها: ۱۳۰ ریال.

LEVOPHED
وینتروپ آمریکا ـ ایران

ترکیب: نوراپی‌نفرین.
موارد استعمال: شوک‌های قلبی یا ناشی از خونریزی، شوکهای اعمال جراحی، شوکهای مسمومیت.
مقدار مصرف و طرز استعمال: آمپول: ۴ میلی‌لیتر از محلول یکهزارم را به نیم تا یک لیتر محلول دکستروز ۵ درصد افزوده و فقط بصورت وریدی تزریق می‌شود.
موارد منع استعمال: شوکهای حاصل از ترومبوزهای وریدی روده‌ها.
احتیاط و عوارض جانبی: از استعمال محلولهای نمکی بمنظور رقیق کردن دارو خودداری شود. بعلت اثر شدید دارو در بالا بردن فشار خون و خطر افزایش بیش از حد، قطره‌ها را باید با کنترل دقیق فشارخون تنظیم نمود.
بسته بندی: محلول یکهزارم در آمپول‌های ۴ میلی‌لیتر × ۶.
بها: ۲۱۱ ریال.

LEVSIN - PB
کرمس اوربان ـ آمریکا

ترکیب: در هر میلی‌لیتر: ال ـ هیوسیامین سولفات ۰/۱۲۵ میلی‌گرم + فنوباربیتال ۱۵ میلی‌گرم.
موارد استعمال: دل‌پیچه، دل درد، کولیک.
مقدار مصرف و طرز استعمال: خردسالان: ۱ ـ ۱۰ ساله ۱۴ ـ ۲۸ قطره، بزرگسالان: ۱۸ ـ ۵۶ قطره در روز.
موارد منع استعمال: گلوکوم، ناراحتی قلبی، پروستاتیسم.
احتیاط: شیرخواران.

L

بسته بندی: قطره ۱۵ میلی‌لیتر.

بها: ۱۳۵ ریال.

LIBEROL Ointment
گالاکتینا ـ سویس

ترکیب: اسانس هیوسیامین + الکل سیناپیس + کامفر + گایاگول + سالیسیلات متیل + اسانس تربانتین + پینول + اسانس تیمول + اسانس اکالیپتوس.

موارد استعمال: سرماخوردگی، سینه درد، نورالژی، سیاتیک، لمباگو.

مقدار مصرف و طرز استعمال: مقداری از پماد را بر روی موضع میمالند.

بسته بندی: پماد ۲۰ گرم.

بها: ۶۳ ریال.

LIBRATAR Complex
یوسی‌بی ـ بلژیک

ترکیب: در هر قرص ساده کلربنزوکسامین ۳۰ میلی‌گرم + در هر قرص کمپلکس بیسموت‌سونیترات ۲۵۰ میلی‌گرم + کربنات کلسیم ۱۵۵ میلی‌گرم + ئیدروکسید آلومینیم + کربنات منیزیم.

موارد استعمال: پیشگیری و درمان اولسر معده و اثنی‌عشر، گاستریت‌های ناشی از افزایش اسیدیته معدی، پرکاری سیستم واگ.

مقدار مصرف و طرز استعمال: روزی ۳ بار، هربار ۱ قرص ۱ ـ ۲ ساعت بعد از غذا.

احتیاط: در ۲۴ ساعت نباید بیشتر از ۶ قرص مصرف شود.

بسته بندی: قرص × ۳۰.

بها: قرص ساده ۷۰ ریال، کمپلکس ۱۰۰ ریال.

LIBRAX
روش ـ سویس

ترکیب: لیبریوم ۵ میلی‌گرم + برمور ۱ ـ متیل ـ ۳ ـ بنزیل ـ اونیل اکسی ـ کینو کلیدینیوم = برمور کلیدینیوم ۲/۵ میلی‌گرم.

موارد استعمال: نوروزهای احشائی ناشی از اضطراب و فشار روانی، بیماریهای دستگاه گوارشی و ادراری، تناسلی.

مقدار مصرف و طرز استعمال: برحسب شدت بیماری ۱ ـ ۴ دراژه با

کمی مایع در موقع غذا و هنگام خواب میل شود.

موارد منع استعمال: گلوکوم.

عوارض جانبی: همراه با آنتی‌کولی نرژیکها حالت خواب‌آلودگی ایجاد میکند.

احتیاط: در هیپرتروفی پروستات باید با احتیاط مصرف شود.

بسته بندی: دراژه × ۳۰.

بها: ۱۴۰ ریال.

LIBRIUM
روش ـ سویس

ترکیب: ۷ ـ کلرو ـ ۲ ـ متیل آمینو ـ ۵ ـ فنیل ـ اچ ـ ۳ ـ ۱، ۴ بنزودیازپین ـ ۴ ـ اکسید = کلردی آزپوکسید.

موارد منع استعمال: فشار روحی، اضطراب و هیجان، سردرد و بیخوابی، تورتیکولی، لمباگو، سندرم رادیکولر، فیبروزیت، الکلیسم مزمن، پسیکونوروز.

مقدار مصرف و طرز استعمال: روزی ۲۰ ـ ۴۰ میلی‌گرم. در موارد شدید ۵۰ ـ ۱۰۰ میلی‌گرم در روز. خردسالان و افراد سالخورده آغاز دوران ۱۰ ـ ۵ میلی‌گرم به‌مقادیر منقسم.

بسته بندی: دراژه ۵ میلی‌گرم × ۳۰. دراژه ۱۰ میلی‌گرم × ۲۵.

بها: ۵ میلی ۱۰۰ ریال، ۱۰ میلی ۱۳۰ ریال.

LIMAX
فاربا ـ ایران

ترکیب: اسیدسیتریک + کربنات منیزیم + شکرواسانس.

موارد استعمال: برای لینت مزاج، ضد یبوست و خستگی کبد.

مقدار مصرف و طرز استعمال: بعنوان مسهل تمام بسته و بعنوان ملین یک قاشق سوپخوری ازگرد را تدریجاً در یک لیوان آبجوش حل کرده پس از سرد شدن میل می کنند.

بسته بندی: بسته ۹۲ گرم.

بها: ۱۸ ریال.

LIMOCITRIC Powder
عبیدی ـ ایران

ترکیب: کربنات منیزیم ۶۶/ ۲۶ درصد + اسید سیتریک انیدر ۴۲/۶۶ درصد + شکر ۶۶/ ۳۰ درصد.

مکانیسم: با جذب آب موجب افزایش حجم مواد باقیمانده در روده‌ها و تخلیه آنها میشود.

موارد استعمال: مسهل و ملین.

مقدار مصرف و طرز استعمال: تمام محتوی را در یک لیوان آبجوش حل کرده پس از سرد شدن بتدریج میل می کنند.

بسته بندی: گرد ۷۵ گرم.

بها: ۲۱ ریال،

LIMOLAX
فاریا ـ ایران

ترکیب: اسید سیتریک + کربنات منیزیم + شکروانسانس.

موارد استعمال: یبوست و خشکی مزاج، بی‌اشتهائی، سردرد، قی و سرگیجه.

مقدار مصرف و طرز استعمال: یک بسته را در یک لیوان آبجوش حل کرده بعد از سرد شدن میل میکنند.

بسته بندی: بسته ۹۲ و ۴۶ گرم.

بها: گرد بزرگسال: ۲۱ ریال، خردسال: ۱۵ ریال.

LINCOCIN
آپجان ـ آمریکا

ترکیب: کلریدرات لینکومایسین منوئیدرات.

موارد استعمال: عفونت‌های ناشی از میکرب‌های گرم مثبت و منفی، عفونت‌های دستگاه تنفس و مجاری ادرار، استئومیلیت، سپتی‌سمی، اوتیت، آرتریت‌های عفونی.

مقدار مصرف و طرز استعمال: روزی ۳ ـ ۴ بار هربار ۱ کپسول. آمپول: روزی ۲ بار، هربار ۱ ویال عضلانی یا وریدی.

احتیاط: در نوزادان با احتیاط مصرف شود.

بسته بندی: کپسول ۵۰۰ میلی‌گرم × ۱۰۰، شربت ۲۵۰ میلی‌گرم = ۱ میلی‌لیتر × ۶۰ میلی‌لیتر، محلول استریل درویال ۲ میلی‌لیتر = ۶۰۰ میلی‌گرم.

بها: کپسول ۲۱۰۰ ریال، شربت ۱۴۵ ریال، آمپول ۱۱۷ ریال.

L

LIOMETACEN
کیزی ـ ایتالیا

ترکیب: N ـ متیل ـ دی ـ گلوکامین ایندومتاسین.

اثر متقابل: مصرف توأم آن ایندومتاسین با آسپیرین سبب بی‌اثر شدن آن میشود، در صورت مصرف توأم با داروهای پائین آورنده قند خون باید احتیاط لازم صورت گیرد.

موارد استعمال: دردهای روماتیسمی، آرتریت روماتوئید، اسپوندیلیت، نقرس، استئوآرتریت.

مقدار مصرف و طرز استعمال: روزی ۱ ـ ۲ تزریق عضلانی. در موارد مزمن: یکروز در میان یک تزریق.

موارد منع استعمال: بچه‌های کمتر از ۴ سال، اختلالات روانی، صرع، پارکینسون.

عوارض جانبی: در ابتدای درمان عوارض مغزی همراه سرگیجه، گاهی استوماتیت، خارش، ادم.

احتیاط: در فشارخونهای بالا با احتیاط باید مصرف شود.

بسته بندی: آمپول لیوفیلیزه ۵۰۰ میلی‌گرم + ۲ میلی‌لیتر حلال.

بها: ۱۵۰ ریال.

LIPIODOL Ultra - Fluide
آندره‌گربه ـ فرانسه

ترکیب: استراتیلیک اسید چرب یددار (غلظت ۴۸ درصد).

موارد استعمال: لنفوگرافی، هیستروگرافی، ماموگرافی، کدر کردن سینوسها، سیالوگرافی.

موارد منع استعمال: تزریق وریدی.

بسته بندی: آمپول ۱۰ میلی‌لیتر × ۱.

بها: ۵۸ ریال.

LIPOLIT
داگرا هلند ـ
فاربکس ایران

ترکیب: در هر قرص: متیل تستوسترون ۵ میلی‌گرم + ویتامین E ۵ میلی‌گرم + کلریدرات یوهمبین ۵ میلی‌گرم + کلریدرات افدرین ۳ میلی‌گرم + کافئین ۱۵ میلی‌گرم + لسی‌تین ۵۰ میلی‌گرم + گلیسروفسفات کلسیم ۱۰ میلی‌گرم.

مصرف در دوران آبستنی: ممنوع است.

مقدار مصرف و طرز استعمال: روزی ۳ بار هربار ۱ ـ ۲ قرص.
بسته بندی: قرص × ۲۵.
بها: ۱۷۶ ریال.

LIQUIFILM TEARS
آلرگان ـ آمریکا

ترکیب: پلی‌وینیل الکل ـ لیکوئی فیلم ۱/۴ درصد + کلربوتانول ۰/۵ درصد.
موارد استعمال: خشکی چشم در اثر مصرف طولانی قطره‌های چشمی، خستگی چشم، خارش و سوزش چشم، کراتوکونژونکتیویت سیکا، نارسائی غدد اشکی، خشکی بعد از تراخم و کمبود ویتامینA ، پمفیگوس چشمی.
مقدار مصرف و طرز استعمال: روزی ۳ ـ ۶بار، هربار ۱ ـ ۲ قطره در هر چشم می‌چکانند.
بسته بندی: قطره چشمی ۱۵ میلی‌لیتر.
بها: ۷۵ ریال.

LIQUIFILM Wetting
آلرگان ـ آمریکا

ترکیب: لیکوئی فیلم + کلروربنزآلکونیم + متیل سلولز + کلرورسدیم + کلرور پتاسیم + دی سدیم ادتات.
موارد استعمال: محلول مرطوب کننده عینک نامرئی.
مقدار مصرف و طرز استعمال: بعد از تمیز کردن عینک یک قطره از دارو را روی آن می‌چکانند و سپس در چشم کارگذاشته میشود.
بسته بندی: قطره ۶۰ میلی‌لیتر.
بها: ۹۰ ریال.

LITHOLEN - U
مادوس ـ آلمان

ترکیب: در هر ۱۰۰ میلی‌لیتر: مخلوط هگزاپتاسیم هگزاسدیم پنتاسیترات ۹۹/۸ گرم.
موارد استعمال: انحلال سنگ اسیداوریک یا جلوگیری از تشکیل آن در مجاری ادرار. که بوسیله تغییرPH انجام میگیرد.
مقدار مصرف و طرز استعمال: صبح و ظهر هربار۲/۵ گرم. شب ۵ گرم درآب حل کرده میل شود.

بسته بندی: گرانول ۲۸۰ گرم با پیمانه ۲/۵ گرمی.

بها: ۵۰۰ ریال.

LITRADERM
دسی تین آلمان ـ تولیدارو ایران

ترکیب: استات هیدروکورتیزون ۱ درصد + سولفات نئومایسین ۰/۵ درصد.

موارد استعمال: معالجه درماتیت‌های آلرژیک، آتوپیک، سبوریک و سایر درماتوزها.

مقدار مصرف و طرز استعمال: بمقدار کم برروی موضع میمالند.

موارد منع استعمال: مانند سایر مشابهین در سل پوستی و همچنین در عفونت‌های ویروسی.

بسته بندی: پماد ۵ گرم.

بها: ۱۲۲ ریال.

L

LITRISON
روش ـ سویس

ترکیب: در هر دراژه: د ـ ال ـ متیونین ۱۰۰ میلی‌گرم + تارترات کولین ۱۰۰ میلی‌گرم + ویتامین B_1 ۲ میلی‌گرم + ویتامین B_2 ۲ میلی‌گرم + نیکوتینامید ۶ میلی‌گرم + ویتامین B_6 ۲ میلی‌گرم + پانتنول ۳ میلی‌گرم + بیوتین ۰/۱ میلی‌گرم + ویتامین B_{12} ۰/۶۷ میکروگرم + ویتامین E ۳ میلی‌گرم.

موارد استعمال: محافظت و درمان کبد، بیماریها و ورم عفونی کبد، استحاله چربی، آمیبیاز، آنکیلوستومیاز، بی‌اشتهائی همراه با اختلالات کبدی، جراحی، بیماریهای زنان وزایمان، رادیولوژی.

مقدار مصرف و طرز استعمال: روزی ۳ بار، هربار ۲ ـ ۳ دراژه در موقع غذا.

بسته بندی: دراژه × ۳۰.

بها: ۱۵۵ ریال.

LIVERTONIC
مارین ـ ایران

ترکیب: ویتامین B_1 + ویتامین B_2 + ویتامین PP + ویتامین B_6 + ویتامین B_{12} + عصاره جگر + سیترات فریک آمونیا کال.

موارد استعمال: ضعف، کم خونی، بی اشتهائی.

مقدار مصرف و طرز استعمال: خردسالان: روزی ۲ بار، هربار ۱ قاشق مرباخوری همراه غذا. بزرگسالان: یک قاشق غذاخوری با نهار و شام.

بسته بندی: شربت ۱۷۰ میلی‌لیتر.

بها: ۷۶ ریال.

LOCABIOTAL
سرویه ـ فرانسه

ترکیب: در هر ۱۰۰ گرم: فوزافونژین ۱/۱۸ گرم.

موارد استعمال: سینوزیت، رینیت، رینوفارنژیت، گلو درد، تراکئیت، برونشیت.

مقدار مصرف و طرز استعمال: روزی ۴ بار هربار ۴ دوز بمدت ۴ـ۱۲ روز استنشاق شود.

بسته بندی: آئروسل ۲۰ میلی‌لیتر.

بها: ۲۶۹ ریال.

LOCACORTEN VIOFORM
سیبا ـ سویس

ترکیب: پری والات فلومتازون ۰/۰۲ درصد + یدو کلرئیدرو کسی کینولئین ۳ درصد.

موارد استعمال: پیودرم حاد و نیمه حاد، عفونت‌های قارچی پوست، اکزمای عفونی.

مقدار مصرف و طرز استعمال: روزی ۲ ـ ۳ بار بر روی موضع میمالند.

احتیاط: بر روی بافتهای ملتحمه نباید مالیده شود.

بسته بندی: کرم و پماد ۱۵ گرم.

بها: کرم ۱۲۰ ریال، پماد ۲۰۰ ریال.

LOMOTIL
سرل انگلستان ـ پارس ایران

ترکیب: در هر قرص یا ۵ میلی‌لیتر شربت: کلریدرات دیفنوکسی‌لیت ۲/۵ میلی‌گرم + سولفات آتروپین ۰/۰۲۵ میلی‌گرم.

موارد استعمال: گاستروآنتریت، مسمومیت غذائی، دیسانتری‌باسیلر، سندروم کولون تحریک‌پذیر و فونکسیونل، کولیت بعد از گاستروکتومی، ایلئوستومی، کولیت‌اوالسراتیو.

مقدار مصرف و طرز استعمال: بزرگسالان: ابتدا ۴ قرص، سپس هر ۶

ساعت ۲ قرص. خردسالان ۱ ـ ۳ ساله: روزی ۲ قرص یا ۲ پیمانه شربت، ۳ ـ ۸ ساله: روزی ۳ قرص یا ۳ پیمانه، ۸ ـ ۱۲ ساله: روزی ۴ قرص یا ۴ پیمانه.

احتیاط: در بیماران کبدی یا مصرف کنندگان باربیتوریک بمقدار زیاد باید با احتیاط مصرف شود.

بسته بندی: قرص × ۱۲، شربت ۶۰ میلی‌لیتر.

بها: قرص ۴۷ ریال. شربت ۹۴ ریال.

LONGIFENE

یو. ث. ب ـ بلژیک

ترکیب: بوکلیزین.

موارد استعمال: رینیت‌های آلرژیک، آسم، ادم آنژیونوروتیک، اریتما، کهیر، درماتیت‌های تماسی، حساسیت‌های داروئی و غذائی، خارش، اکزما.

مقدار مصرف و طرز استعمال: روزی ۱ ـ ۴ بار، هربار ۱ قرص. شربت: روزی ۲ ـ ۶ قاشق چایخوری. پماد: ۱ ـ ۳ بار در روز بطور موضعی مصرف می‌شود.

بسته بندی: قرص ۲۵ میلی‌گرم × ۲۵، شربت ۱ درصد ۱۵۰ میلی‌لیتر.

بها: قرص ۵۹ ریال. شربت ۷۰ ریال.

LONGINE

آی دی آی ـ ایران

ترکیب: در هر قرص ۱۰۰: فباربامات ۵۰ میلی‌گرم + دیفباربامات ۳۵ میلی‌گرم + فنوباربیتال ۱۵ میلی‌گرم، در هر قرص ۳۰۰: هر یک از مواد فوق ۳ برابر است.

موارد استعمال: اضطراب‌ها عصبی، نارسائی جزئی روانی، نارسائی پسیکوموتور خردسالان، لرزش.

مقدار مصرف و طرز استعمال: بزرگسالان: روزی ۳ بار، هربار ۱ قرص ۱۰۰ یا ۳۰۰ میلی‌گرم، خردسالان: روزی ۲ ـ ۳ بار، هربار نصف قرص ۱۰۰ میلی‌گرم.

بسته بندی: قرص ۱۰۰ میلی × ۳۰،

بها: قرص ۱۰۰ میلی ۲۱۱ ریال.

LUMINAL
بایر آلمان ـ ایران

ترکیب: فنیل اتیل باربیتوریک اسید.
موارد استعمال: صرع، اکلامپسی، تتانوز، کره خفیف، اسپاسموفیلی، بیخوابیهای سخت، هذیانهای الکلی، مانیا، انفارکتوس قلبی.
مقدار مصرف و طرز استعمال: بزرگسالان: هربار ۴۰ سانتی‌گرم حداکثر تا ۸۰ سانتی‌گرم در روز، در صرع ۵ ـ ۲۰ سانتی‌گرم، بیخوابی ۱۰ ـ ۲۰ سانتی‌گرم، تزریقی بزرگسالان: روزی ۲ ـ ۳ بار، هر بار ۱ ـ ۲ میلی‌لیتر، خردسالان: ۰/۷۵ میلی‌لیتر. شیرخواران: ۰/۳ ـ ۰/۵ میلی‌لیتر.
بسته‌بندی: قرص ۱۰۰ میلی‌گرم × ۱۰۰، آمپول ۲۰۰ میلی‌گرم × ۱۰.
بها: قرص ۱۱۷ ریال. آمپول ۴۷ ریال.

LUMINALETTES
بایر آلمان ـ ایران

ترکیب: در هر قرص فنیل ـ اتیل باربیتوریک اسید ۱۵ میلی‌گرم.
موارد استعمال: کنترل صرع، آسم برونشیک، سیاه‌سرفه، هیپر ـ تیروئیدیسم عوارض یائسگی، اسپاسم.
مقدار مصرف و طرز استعمال: روزی ۲ ـ ۸ قرص برحسب سن و وضع بیمار.
بسته بندی: قرص × ۳۰.
بها: ۱۶ ریال.

LUOSTYL
یوبی‌اس آ ـ فرانسه

ترکیب: کلریدرات دی‌فرمین.
موارد استعمال: اسپاسم دستگاه تناسلی و گوارشی، سوء هضم، کولیک صفراوی و کلیوی،
موارد منع استعمال: پروستاتیسم، گلوکوم، احتباس ادرار.
بسته بندی: کپسول ۲/۵ میلی‌گرم × ۳۰.
بها: ۸۰ ریال.

LUT-OVOCYCLIN
سیبا ـ سویس

ترکیب: در هر آمپول ۱ میلی‌لیتر: لوتوسیکلین (پروژسترون) ۲۰ میلی‌گرم + اووسیکلین (استرادیول دی ـ

پروپیونات) ۲ میلی‌گرم.
موارد استعمال: آمنوره ثانوی، تهدید به‌سقط، سقط مکرر، تشخیص آبستنی.
مقدار مصرف و طرز استعمال: ۲ روز پی در پی آمپول داخل عضله تزریق میشود و سپس همین درمان ۲ روزه باید هماهنگ با دوره قاعدگی تکرار شود. سقط مکرر: روزی ۲ بار تزریق برای چند ماه. تهدید به‌سقط: روزی ۱-۲ آمپول. تشخیص آبستنی: ۲ روز پی در پی یک آمپول داخل عضلانی.
بسته بندی: آمپول × ۲.
بها: ۹۵ ریال.

LYNDIOL 2.5
ارگانون هلند
ـ ایران

L

ترکیب: لینسترنول ۲/۵ میلی‌گرم + مسترنول ۰/۰۷۵ میلی‌گرم.
موارد استعمال: جلوگیری از باروری، دیسمنوره، تنظیم سیکل‌های نامرتب قاعدگی، نازائی فونکسیونل.
مقدار مصرف و طرز استعمال: از روز پنجم قاعدگی هر شب ۱ قرص تا ۲۱ روز بعد.
احتیاط: هر سه ماه یکبار باید معاینه فیزیکی بعمل آید. نزد زنان سیگاری یا غیر فعال باید آزمایش ترومبوز انجام شود. در بیماران دیابتی، صرعی، میگرن و فشارخون با احتیاط باید مصرف شود.
موارد منع استعمال: تومورهای تحت اثر استروژن، ترومبوفلبیت، ترومبوآمبولی.
بسته بندی: قرص × ۲۲.
بها: ۷۰ ریال.

LYSO - 6
فرایس ـ فرانسه

ترکیب: کلریدرات لیزوزیم ۲۰ میلی‌گرم + ویتامین B_6 ۱۰ میلی‌گرم.
موارد استعمال: آفت، ژنژیویت، استوماتیت، ضایعات و التهابات دهان و دندان، گلو و حنجره.
مقدار مصرف و طرز استعمال: بزرگسالان: روزی ۶-۸ قرص. خردسالان:

روزی ۴ــ۶ قرص بتدریج بمکند.
بسته بندی: قرص × ۲۰.
بها: ۹۰ ریال.

LYSOPAINE
فرانسیس تراپوتیک ــ فرانسه

ترکیب: لیزوزیم ۵ میلی‌گرم + پاپائین ۲ میلی‌گرم.
موارد استعمال: عفونتهای حلق، دهان و حنجره.
مقدار مصرف و طرز استعمال: روزی ۴ــ۶ قرص می‌مکند.
بسته بندی: قرص × ۲۴.
بها: ۹۰ ریال.

L

MAALOX
روررـ آمریکا

ترکیب: در هر قرص یا هر قاشق مرباخوری سوسپانسیون: ئیدروکسید آلومینیوم و منیزیم ۰/۴ گرم.
موارد استعمال: گاستریت و اولسرهای معده و روده.
مقدار مصرف و طرز استعمال: نیمساعت قبل از نهار و شام ۲ ـ ۴ قرص جویده شود، سوسپانسیون: یک قاشق غذاخوری نیمساعت قبل از نهار و شام.
بسته‌بندی: قرص × ۱۰۰ ، سوسپانسیون ۱۵۵ میلی‌لیتر.
بها: قرص ۱۱۷ ریال. سوسپانسیون ۱۱۸ ریال.

M

MACMIROR
پولی ـ ایتالیا

ترکیب: نی‌فوراتل.
موارد استعمال: عفونتهای واژینال و لوکوره ناشی از میکرب تریکوموناـ مونیلیا.
مقدار مصرف و طرز استعمال: شبی یکعدد بمدت ۱۰ روز استعمال شود. خوراکی: روزی سه بار، هربار یک قرص میل شود.
بسته‌بندی: قرص واژینال × ۱۰، قرص خوراکی × ۲۰.
بها: قرص واژینال و خوراکی ۱۳۸ ریال.

MACRODANTIN
ابتون ـ آمریکا

ترکیب: نیتروفورانتوئین.
موارد استعمال: پیلونفریت و سیستیت حاصل از میکروبهای حساس به دارو.
مقدار مصرف و طرز استعمال: بزرگسالان: روزی ۴ بار، هربار ۵۰ـ ۱۰۰ میلی‌گرم، خردسالان: روزی ۵ میلی‌گرم برای هر کیلوگرم وزن بدن در ۴ بار.

موارد منع استعمال: آنوری، الیگوری و نارسائی شدید کلیوی، اطفال کمتر از یکماه.

عوارض جانبی: تهوع، استفراغ.

احتیاط: در زنان باردار و شیرده باید با احتیاط تجویز شود.

بسته بندی: کپسول ۵۰ و ۱۰۰ میلی‌گرم × ۳۰.

بها: ۵۰ میلی ۲۴۶ ریال، ۱۰۰ میلی ۴۵۹ ریال.

MADOPAR
روش–سویس

ترکیب: ۳–(۳، ۴–دی هیدروکسی فنیل)–ال–آلانین = لوودوپا ۱۰۰ میلی‌گرم + کلریدرات ۱–دی ال–سریل–۲–(۲، ۳، ۴–تری هیدروکسی بنزیل) هیدرازین = کلریدرات بن‌سرازید ۲۸/۵ میلی‌گرم.

موارد استعمال: پارکینسون.

موارد منع استعمال: مصرف توام با سمپاتومی متیک‌ها، جوانان زیر ۲۵ سال.

بسته بندی: کپسول ۱۲۵ و ۲۵۰ میلی‌گرم × ۳۰.

بها: ۱۲۵ میلی ۴۲۰ ریال. ۲۵۰ میلی ۷۵۰ ریال.

MADRIBON
ایتون–آمریکا

ترکیب: ۲ و ۴ دی‌متوکسی–۶–سولفانیلامیدو–۱ و ۳–دیازین = سولفادی متوکسین.

موارد استعمال: عفونت‌های مجاری تنفسی، مجاری ادرار، انواع عفونت‌های موضعی.

مقدار مصرف و طرز استعمال: ابتدا ۲ قرص و سپس روزی ۱ عدد یا ابتدا دو قطره برحسب هر کیلو از وزن بچه و سپس روزی یک قطره برحسب هر کیلو وزن.

موارد منع استعمال: در هفته اول تولد و نوزادان زودرس و در موارد عدم تحمل به‌سولفامیدها یا ضایعات پیشرفته بافت کبدی و نارسائی کلیوی.

عوارض جانبی: عوارض گوارشی، پوستی. در صورت پیدایش جوش یا سرخی باید دارو فورا قطع شود.

بسته‌بندی: قرص ۰/۵ گرم × ۲۵۰.
بها: قرص ۲۱۲۵ ریال.

MAGEL
تولیدارو ـ ایران

ترکیب: سوسپانسیون: هیدروکسید آلومینیم + هیدروکسید منیزیم + سیمتیکن قرص: هیدروکسید آلومینیم + تری‌سیلیکات منیزیم + سیمتیکن.
موارد استعمال: ترشی و سوزش معده، نفخ شکم، درمان سوءهاضمه‌های ناشی از افزایش اسید معده و افراط در غذا و مشروبات الکلی، گاستریت‌ها، زخم معده و اثنی‌عشر، هرنی دیافراگماتیک.
مقدار مصرف و طرز استعمال: نیم تا یک قاشق سوپخوری از سوسپانسیون یا ۲ تا ۴ قرص بطور جویدنی نیم تا یکساعت بعد از هر غذا و شب موقع خواب همراه با کمی آب یا شیر.
موارد منع استعمال: مانند سایر فرآورده‌های ضد اسید از مصرف آن در بیماران مبتلا به‌نارسائی پیشرفته کلیه باید خودداری شود.
بسته‌بندی: سوسپانسیون ۱۸۰ میلی‌لیتر، قرص × ۴۸.
بها: سوسپانسیون ۷۶ ریال. قرص ۷۰ ریال.

M

MAGNEX
ماکسون آمریکا ـ تولیدارو ایران

ترکیب: ئیدروکسید آلومینیم + تری‌سیلیکات منیزیم + کربنات منیزیم.
موارد استعمال: ترشی معده، تهوع و استفراغ، سوءهاضمه، نفخ‌شکم، اسهال.
مقدار مصرف و طرز استعمال: روزی ۱ ـ ۳ بار، هربار ۱ قرص همراه با مقداری آب جویده شود.
بسته‌بندی: قرص × ۸۰.
بها: ۱۴۱ ریال.

MAJEPTIL
اسپسیا ـ فرانسه

ترکیب: ۲ ـ دی‌متیل سولفاموئیل ۱۰ ـ ۳ ـ (۴ ـ متیل پیپرازین) پروپیل فنوتیازین = تیوپرازین دی‌متان سولفونات.
موارد استعمال: شیزوفرنی حاد و مزمن، توهم، تیرگی شعور، اختلالات

روانی ناشی از صرع، پسیکوز.

مقدار مصرف و طرز استعمال: شروع درمان: روزی ۵ میلی‌گرم، ادامه درمان: هر ۲ـ۳ روز ۵ میلی‌گرم که حداکثر تا ۳۰ـ۴۰ میلی‌گرم میرسد.

موارد منع استعمال: داروهای دپرسان تنفسی و باربیتوریک‌ها را نباید بطور توام تجویز کرد.

بسته بندی: قرص ۱ میلی‌گرم × ۵۰. قرص ۱۰ میلی‌گرم × ۱۰۰. قطره ۴ درصد ۱۰ میلی‌لیتر. آمپول ۱۰ میلی‌گرم = ۱ میلی‌لیتر × ۱۰.

بها: قرص ۱ میلی ۳۲ ریال، ۱۰ میلی ۳۸۶ ریال، قطره ۹۱ ریال، آمپول ۱۲۳ ریال.

MAL HISTINE

دوپار ـ ایران

ترکیب: بروموفنیر آمین مالئات.

مکانیسم: با عمل رقابتی با هیستامین در قرارگرفتن روی گیرنده‌های هیستامینی مانع از اثر آن میگردد.

موارد استعمال: آلرژیهای داروئی و غذائی، بیماری سرم، خارش دیابتیک، آسم آلرژیک و برنشیتهای آسمی، میگرن، سرفه، سردردهای آلرژیک.

مقدار مصرف و طرز استعمال: بزرگسالان: روزی ۲ـ۳ بار، هر بار ۰/۵ـ۱ قرص. خردسالان: نصف مقدار بزرگسالان.

عوارض جانبی: خواب‌آلودگی.

احتیاط: در هنگام مصرف دارو باید از رانندگی یا کار کردن با ماشین ها خودداری شود.

بسته بندی: قرص ۴ میلی‌گرم × ۲۰.

بها: ۷۰ ریال.

MANDRAX

روسل ـ فرانسه

ترکیب: متاکوالون ۲۵۰ میلی‌گرم + کلریدرات دی فنیدرامین ۲۵ میلی‌گرم.

موارد استعمال: انواع بیخوابی ها.

مقدار مصرف و طرز استعمال: ۱ کپسول ۲۰ دقیقه قبل از خواب.

موارد منع استعمال: بیماریهای پیشرفته کبدی.
احتیاط: مثل همه خواب‌آورها بهتر است با الکل مصرف نشود.
بسته بندی: کپسول × ۱۲.
بها: ۷۰ ریال.

MANNITOL IN WATER

باکستر ـ ایران

ترکیب: مانیتول در محلولهای آب مقطر.
موارد استعمال: کاهش فشار داخل جمجمه و مغز، تقلیل فشار داخل کره چشم بعد از امتحان با داروهای میوتیک، افزایش دبی ادراری، جلوگیری از الیگوری به‌سبب ایسکمی.
مقدار مصرف و طرز استعمال: برحسب نوع مصرف متفاوت است.
موارد منع استعمال: آنوری، نارسائی قلب، خونریزی مغزی، کمبود آب و الکترولیتها.
احتیاط: ممکنست در اثر سرد شدن، بلورهای مانیتول بوجود آید که با گرم کردن دوباره بحال اول برمیگردد.
بسته بندی: محلول ۱۰ درصد و ۲۰ درصد × ۵۰۰ میلی‌لیتر.
بها: ۱۰ درصد ۱۳۲/۵ ریال، ۲۰ درصد ۱۹۶ ریال.

M

MANUSEPT

باسیلول ـ آلمان

ترکیب: ارتوفنیل‌فنل + مواد محافظ و پاک کننده پوست.
موارد استعمال: ضد عفونی و پاک کردن دستها برای اعمال جراحی، ضدعفونی پوست بدن.
مقدار مصرف و طرز استعمال: ۲ میلی‌لیتر با کمی آب مخلوط کرده بمدت ۲ دقیقه دستها را بشویند.
بسته بندی: محلول ۱۰۰۰ گرم.
بها: ۴۶۰ ریال.

MARCIDERM

کلن بیلا فرانسه ـ فارماشیمی ایران

ترکیب: صابون: اسید استیک ۰/۳ گرم + اسید تارتریک ۰/۷ گرم + اسید بنزوئیک ۰/۱ گرم + اسید سالیسیلیک ۰/۲ گرم مایع: اسید استیک ۰/۷۵ گرم + ارتوهیدروکسی کینولئین سولفات ۰/۲۵ گرم + اسید سالیسیلیک ۰/۵ گرم + سدیم لوریل

سولفات ۵ گرم + پروپیونات سدیم ۰/۲۵ گرم + اسید تارتریک ۱/۷۵ گرم + اسیدبوریک ۰/۶ گرم.

موارد استعمال: اکزما، خارش، کهیر، آکنه، سبوره، پیودرمیت، سرمازدگی، سوختگی، آفتابزدگی، درمیت‌ها، شستشوی مهبل و فرج، شقاق پستان، شوره سر.

مقدار مصرف و طرز استعمال: با صابون یا محلول ۱۰ – ۲۰ درصد رقیق شده بطور موضعی شستشو داده شود.

بسته بندی: صابون ۹۰ گرم. محلول ۲۵۰ میلی‌لیتر.

بها: صابون ۷۱ ریال. محلول ۷۰ ریال.

MARPLAN
روش ـ سویس

ترکیب: ۱ ـ بنزیل ـ ۲ ـ (۵ ـ متیل ـ ۳ ـ ایزوکسازولیل ـ کربونیل) هیدرازین = ایزوکاربوکسازید.

موارد استعمال: پسیکوزها، نوروزهای حاد، دپرسیون‌های آندوژن، اسکیزوفرنی.

مقدار مصرف و طرز استعمال: برحسب نوع و شدت بیماری متفاوت است.

موارد منع استعمال: بیماریهای کبدی.

بسته بندی: قرص ۱۰ میلی‌گرم × ۵۰.

بها: ۲۰۰ ریال.

MASSE CREAM
ارتوـ انگلستان

ترکیب: ۹ ـ آمینو آکریدین پیروات ۰/۰۶۹۵ درصد + آلانتوئین ۲۱ درصد + ۸ ـ هیدروکسی کینولئین سولفات.

موارد استعمال: آماده کردن نوک پستان قبل از زایمان، آماده کردن نوک پستان بعد از زایمان و دوره شیردادن، در تمام مواردیکه خراش یا بریدگی در سطح بدن باشد، در مورد عرق سوز بچه‌ها یا برای جلوگیری از عرق سوز.

مقدار مصرف و طرز استعمال: روزی یک یا دوبار در محل میمالند. بهتر است برای جلوگیری از شقاق پستان هر دفعه بعد از شیردادن مقداری از کرم را روی پستان بمالند.

بسته بندی: کرم ۲۸ گرم.

بها: ۱۵۰ ریال.

MAXADRYL
ماکس ـ ایران

ترکیب: هر قاشق مرباخوری: کلریدرات دیفنیدرامین ۱۰ میلی‌گرم.

موارد استعمال: خارش، کهیر، تنگی نفس.

مقدار مصرف و طرز استعمال: خردسالان: روزی ۳ بار، هربار ۱ قاشق مرباخوری. بزرگسالان: روزی ۳ـ۴ بار، هربار ۱ قاشق سوپخوری.

بسته بندی: شربت ۱۲۰ میلی‌لیتر.

بها: ۴۷ ریال.

MAXADRYL EXP.
ماکس ـ ایران

ترکیب: در هر ۱۰۰ میلی‌لیتر: کلریدرات دیفنیدرامین ۲۸۱/۵ میلی‌گرم + آمونیوم کلراید ۲/۷۵ گرم + سیترات سدیم ۱/۱۴۰۵ گرم + کلروفرم ۴۵۲ میلی‌گرم + مانتول ۲۲/۷۵ میلی گرم + الکل ۲/۲۵ میلی‌لیتر + محلول آمارانت ۰/۱۶ میلی‌لیتر.

موارد استعمال: برونشیت حاد و مزمن، سیاه‌سرفه، سرفه‌های تحریکی و ناشی از حساسیت.

مقدار مصرف و طرز استعمال: روزی ۳ـ۴ بار هربار یک قاشق سوپخوری. خردسالان: نصف مقدار فوق.

بسته بندی: شربت ۱۲۰ میلی‌لیتر.

بها: ۴۷ ریال.

MEDIHALER ISO
ریکر ـ انگلستان

ترکیب: در هر میلی‌لیتر محلول: ایزوپرنالین سولفات دی هیدرات میکرونیزه ۴ میلی‌گرم. در هر میلی‌لیتر قوی. ایزوپرنالین سولفات دی هیدرات میکرونیزه ۲۰ میلی‌گرم. در هر میلی‌لیتر اپی: تارترات آدرنالین میکرونیزه ۱۴ میلی‌گرم.

مکانیسم اثر: با تحریک گیرنده‌های سمپاتیک موجب اتساع ششها میشود.

موارد استعمال: آسم برونش ها، برونشیت مزمن، اسپاسم برونشها.

مقدار مصرف و طرز استعمال: بستگی به‌نوع و شدت بیماری دارد.
عوارض جانبی: مصرف زیاد آن باعث طپش قلب میشود.
بسته بندی: فلاکنهای ۴۰۰ دوزی.
بها: ضعیف ۲۷۳ ریال، قوی: ۳۲۰ ریال، ابی ۳۰۰ ریال.

MEDOMINE
گایگی-سویس

ترکیب: در هـر قرص: سیکلوهپتنیل-اتیل مـالـونیـل اوره-هپتاباربیتون ۲۰۰ میلی‌گرم.
موارد استعمال: بیخوابی‌های پسیکوژن، بیخوابی‌های ناشی از پیری، پسیکوپاتی خوش خیم، بیماریهای عفونی مزمن.
مقدار مصرف و طرز استعمال: بزرگسالان: یک قرص نیمساعت قبل از خواب. خردسالان: ربع تا نصف قرص.
بسته بندی: قرص × ۱۰.
بها: ۸۰ ریال.

M

MEDROL
آپجان-آمریکا

ترکیب: متیل پردنیزولون.
موارد استعمال: بیماریهای کولاژن، بیماریهای آلرژی، درماتوزهای عمومی، التهابهای حاد و مزمن، بیماریهای لنفاتیک نئوپلاستیک کولیت السراتیوونفروز.
مقدار مصرف و طرز استعمال: شروع درمان: روزی ۰/۵ - ۹۶ میلی‌گرم ادامه درمان: روزی ۲ - ۲۰ میلی‌گرم.
موارد منع استعمال: عفونت‌های قارچی سیستمیک- در دورانی که بیمار تحت درمان با این داروست نباید برضد آبله واکسینه شود. اختلال آب و الکترولیت‌ها، اختلال گوارشی، اختلال عصبی.
عوارض جانبی: سندرم کوشینگ و عوارض حاصل از مصرف کلیه کورتیکوستروئیدها.
بسته بندی: قرص ۴ میلی‌گرم × ۵۰.
بها: ۴۴۰ ریال.

MEDROL Medules
آپجان ـ آمریکا

ترکیب: استات متیل پردنیزولون.
موارد استعمال: عوارض روماتیسمی، درماتیت، حساسیت و آلرژی، بیماریهای چشمی و تنفسی، اختلالات خونی، حالات ورم، اختلالات معدی ـ روده‌ای.
مقدار مصرف و طرز استعمال: برحسب نوع و شدت بیماری متفاوت است.
عوارض جانبی و موارد منع استعمال: مشابه داروی قبلی.
بسته بندی: کپسول ۴ میلی‌گرم × ۳۰.
بها: ۲۶۰ ریال.

MEDROL VERIDERM
آپجان ـ آمریکا

ترکیب: در هرگرم: استات متیل پردنیزولون ۲/۵ میلی‌گرم.
موارد استعمال: درماتیت‌های تماسی و آتوپیک، اکزماهای آلرژیک درماتیت سبورئیک، نورودرماتیت.
موارد منع استعمال: آبله مرغان.
مقدار مصرف و طرز استعمال: مقدار کمی پماد در محل بمالند.
بسته بندی: پماد ۷/۵ گرم با اپلیکاتور.
بها: ۱۰۳ ریال.

MEGACILLIN
شمی گروننتال آلمان ـ تهران شیمی ایران

ترکیب: کلمیزول پنی‌سیلین G یک میلیون واحد.
موارد استعمال: عفونتهای ناشی از میکرب‌های حساس به پنی‌سیلین.
مقدار مصرف و طرز استعمال: روزی یک ویال عضلانی.
بسته بندی: ویال × ۱.
بها: ویال یک عددی ۵۳ ریال.

MEGACILLINE FORT
شمی گروننتال آلمان ـ تهران شیمی ایران

ترکیب: پنی‌سیلین G سدیک ۳۶۰۰۰۰۰ واحد + پنی‌سیلین کلمیزول ۴۰۰ هزار واحد + کلریدرات لیدوکائین ۴۰ میلی‌گرم.
موارد استعمال: کلیه عفونتهائیکه احتیاج به‌مقدار زیاد پنی‌سیلین از

طریق تزریق عضلانی باشد. مانند عفونتهای گوش، حلق، بینی، دستگاه تنفس و سوزاک.

مقدار مصرف و طرز استعمال: روزی ۱ ـ ۲ تزریق عضلانی.

بسته بندی: ویال ماده خشک + یک آمپول آب‌مقطر ۵ میلی‌لیتر.

بها: ۱۱۴ ریال.

MELADININE
پرومدیکا ـ فرانسه

ترکیب: آموئیدین.

موارد استعمال: درمان قطعی ویتی‌لیگو.

مقدار مصرف و طرز استعمال: برحسب نوع و شدت بیماری متفاوت است.

بسته‌بندی: محلول ضعیف ۰/۱ درصد و قوی ۰/۷۵ درصد. قرص ۰/۵۷ میلی‌گرم × ۳۰.

بها: محلول ضعیف ۷۲ ریال. قوی ۹۲ ریال. قرص ۱۰۵ ریال.

M

MELLERIL
ساندوز ـ سویس

ترکیب: کلریدرات تیوریدازین.

موارد استعمال: روانپزشکی: اسکیزوفرنی، پسیکوزمانیاک، پسیکوزـ های اگزوژن و اندوژن. طب عمومی: هیجان و اضطراب موجود در اختلالات جسمی روانی و بیخوابی‌هائی که در برابر داروهای خواب‌آور مقاوم هستند، بیماریهای سالمندان. طب خردسالان: بی‌نظمی‌هائی که در رفتار اطفال ایجاد میشود، حالت تهاجم، خشم و غضب، بیقراری شدید و غیره که منجر به‌عدم انطباق آنان با محیط می‌شود.

مقدار مصرف و طرز استعمال: روانپزشکی: در موارد شدید ۱۰۰ ـ ۶۰۰ میلی‌گرم و در موارد خفیف ۲۵ ـ ۱۵۰ میلی‌گرم. طب عمومی: ۱۰ـ ۳۰ میلی‌گرم، بیماری سالمندان ۳۰ ـ ۱۰ میلی‌گرم. طبّ اطفال: ۱۰ ـ ۳۰ میلی‌گرم، در اطفال کوچکتر ۱/۵ میلی‌گرم برای هر کیلوگرم از وزن بدن در روز.

عوارض جانبی: خیزولوکوپنی بطور موقتی و زودگذر و آگرانولوسیتوز بندرت.

بسته بندی: قرص ۱۰ میلی‌گرم × ۲۵. قرص ۲۵ میلی‌گرم × ۵۰. قرص ۱۰۰ میلی‌گرم × ۲۵.

بها: قرص ۱۰ میلی ۸۵ ریال، ۲۵ میلی ۱۲۰ ریال، ۱۰۰ میلی ۲۶۰ ریال.

MELSEDIN
بوتس انگلستان ـ پارس ایران

ترکیب: کلریدرات متاکوالون ۱۵۰ میلی‌گرم.

موارد استعمال: بیخوابی بهرعلت.

مقدار مصرف و طرز استعمال: بزرگسالان: ۱ـ۲ قرص هنگام خواب خردسالان: نصف مقدار فوق.

عوارض جانبی: گاهی عادت به‌دارو، ناراحتیهای گوارشی، سردرد، سرگیجه و بثورات جلدی.

بسته بندی: قرص × ۱۰.

بها: ۳۰ ریال.

M

MENTHAN
پارک ـ ایران

ترکیب: اسانس اوکالیپتوس + اسانس موسکاد + اسانس‌سدر + تیمول + مانتول + اسانس تربانتین + سالیسیلات متیل + کامفر.

موارد استعمال: درکلیه موارد زکام بخصوص هنگامیکه ناراحتی و درد در قسمت فوقانی سینه یا اطراف گلو مشاهده شود.

مقدار مصرف و طرز استعمال: لایه نازکی از پماد را در موضع گذارده بخوبی مالش دهند.

بسته بندی: پماد ۱۰ گرم.

بها: ۱۸ ریال.

MEPYRAL
لپتی ایتالیا ـ ایران

ترکیب: در هر ۱۰۰ میلی‌لیتر: مالئات مپیرامین ۶۰۰ میلی‌گرم.

موارد استعمال: سرفه‌های تحریکی، سرفه‌های بدون علت مشخص، سیاه‌سرفه.

مقدار مصرف و طرز استعمال: خردسالان: روزی ۳ بار، هربار یک قاشق مرباخوری. بزرگسالان: روزی ۳ بار، هربار یک قاشق سوپخوری.

بسته بندی: شربت ۱۲۰ میلی‌لیتر.

بها: ۴۹ ریال.

MEPYRAL EXP.
لپتی ایتالیا ـ ایران

ترکیب: در هر ۱۰۰ میلی‌لیتر شربت: پیریل آمین مالئات ۱۶۷ میلی‌گرم + کلرور آمونیوم ۲۵۰۰ میلی‌گرم + فسفات کدئین ۱۰۰ میلی‌گرم + کلروفرم ۵۰ میلی‌گرم.

موارد استعمال: گریپ، سرفه‌های تحریکی، فارنژیت، لارنژیت، پنومونی و برونکوپنومونی.

مقدار مصرف و طرز استعمال: خردسالان بزرگتر از ۷ سال: هر ۴ ساعت ۰/۵ تا یک قاشق مرباخوری. بزرگسالان: هر ۳ ساعت ۱ ـ ۲ قاشق مرباخوری.

بسته بندی: شربت ۱۲۰ میلی‌لیتر.

بها: ۵۹ ریال.

MERVAN
کنتینانتال فارما ـ بلژیک

ترکیب: قرص: ۴ آلیل اکسی ـ ۳ ـ کلروفنیل استیک اسید ۵۰۰ میلی‌گرم. آمپول: ۴ ـ آلیل اکسی ـ ۳ ـ کلروفنیل استیک دومونواتانولامین ۱۶۶/۶ میلی‌گرم + کلریدرات لیدوکائین ۱۰ میلی‌گرم + الکل بنزیلیک ۱۵ میلی‌گرم.

موارد استعمال: امراض مزمن روماتیسمی، آرتریت روماتوئید، بورسیت، لمباگو، سیاتیک، نورالژی.

مقدار مصرف و طرز استعمال: شروع درمان: روزی ۳ بار، هربار ۲ قرص. ادامه درمان: روزی ۳ بار، هربار یک قرص.

بسته بندی: قرص × ۲۴. آمپول ۵ میلی‌لیتر × ۶.

بها: قرص ۲۲۰ ریال. آمپول ۲۲۰ ریال.

MESOPIN and MESOPIN PB
اندو ـ آمریکا

ترکیب: در هر قرص و هر ۵ میلی‌لیتر شربت مزوپین: متیل ـ برمورهوماتروپین ۵ میلی‌گرم. در هر ۵ میلی‌لیتر شربت PB: مزوپین ۵ میلی‌گرم + فنوباربیتال ۱۵ میلی‌گرم.

موارد استعمال: نفخ، تهوع، یبوست، اتساع شکم، اسپاسم مجاری صفراوی، کولون اسپاسمودیک، گاستریت، اسپاسمهای ناشی از

زخم معده.

مقدار مصرف و طرز استعمال: شربت روزی ۳ــ۴ بار، هربار یک قاشق چایخوری قبل از غذا و موقع خواب. قرص: روزی ۳ــ۴ بار، هربار ۱ــ۲ قرص قبل از غذا.

بسته بندی: قرص ساده و PB × ۱۰۰ ، شربت ساده و PB ۴ اونسی.

بها: قرص ساده ۲۶۰ ریال، شربت ساده ۹۳ ریال، قرص PB ۳۰۰ ریال، شربت PB ۱۰۵ ریال.

METACEN
کیزی ـ ایتالیا

ترکیب: در هر کپسول ۲۵ میلی: ایندومتاسین ۲۵ میلی‌گرم + هیدروکسید آلومینیوم. ۷۰ میلی‌گرم + تری سیلیکات منیزیوم ۱۰۰ میلی‌گرم + استارات منیزیوم ۵ میلی‌گرم. در هر کپسول ۵۰ میلی بترتیب: ۵۰ میلی‌گرم + ۴۵ میلی‌گرم + ۱۰۰ میلی‌گرم + ۵ میلی‌گرم.

اثر متقابل: مصرف توأم ایندومتاسین با آسپیرین سبب بی‌اثر شدن آن میشود، در صورت مصرف توأم با داروهای پائین آورنده قندخون باید احتیاط لازم صورت گیرد.

موارد استعمال: آرتریت روماتوئید، اسپوندیلیت، نقرس، استئوآرتریت.

مقدار مصرف و طرز استعمال: روزی ۳ بار: هربار ۱ــ۲ کپسول بعد از غذا. شیاف: روزی ۱ــ۲ عدد استعمال شود.

موارد منع استعمال: زخم معده و اثنی‌عشر، خردسالان کمتر از ۱۴ سال، حساسیت بدارو، پارکینسون، صرع.

عوارض جانبی: سرگیجه، گاهی بی‌اشتهائی، تهوع، دردهای معدی، اسهال، تشنج، افسردگی.

احتیاط: در فشارخون و اختلالات معدی روده‌ای باید با احتیاط مصرف شود.

بسته بندی: کپسول ۲۵ میلی‌گرم × ۲۵ ، ۵۰ میلی‌گرم × ۲۰. شیاف × ۶۰.

بها: کپسول ۲۵ میلی ۱۰۴ ریال، ۵۰ میلی ۱۵۰ ریال، شیاف ۱۵۰ ریال.

METATONE
پارك دیویس آمریکا ـ ایران

ترکیب: در هر ۱۰۰ میلی‌لیتر شربت: گلیسروفسفات استریکنین ۰/۰۰۸ گرم + گلیسروفسفات کلسیم ۰/۸ گرم + گلیسروفسفات پتاسیم ۰/۸ گرم + گلیسروفسفات سدیم ۰/۴ گرم + گلیسروفسفات منگنز ۰/۱ گرم + ویتامین B_1 ۱۴ میلی‌گرم.

موارد استعمال: بی‌اشتهائی، ضعف، کلروز، خستگی فکری، تقویت عمومی در دوران نقاهت.

مقدار مصرف و طرز استعمال: روزی ۲ـ۳ بار هربار ۱ـ۲ قاشق مرباخوری قبل از غذا.

بسته بندی: شربت ۱۸۰ میلی‌لیتر.

بها: ۵۹ ریال.

METHALAX
مینا ـ ایران

ترکیب: ۴، ۴ دی‌استوکسی دی‌فنیل، پیریدیل ۲ ـ متان = بیساکودیل.

مکانیسم اثر: پس از ورود در روده موجب تحریک و افزایش حرکات دودی روده‌ها میشود.

موارد استعمال: یبوست، اختلالات گوارشی قبل و بعد از عمل جراحی، آماده کردن برای تنقیه‌باریم، تسهیل اجابت مزاج نزد بیماران بواسیری.

مقدار مصرف و طرز استعمال: هر ۲۴ ساعت یک قرص، شیاف: روزی ۱ ـ ۶ عدد استعمال می‌شود.

موارد منع استعمال: دل درد، دردهای حاد، جراحی شکم.

بسته بندی: شیاف خردسالان و بزرگسالان × ۵. قرص × ۲۵.

بها: شیاف خردسالان ۲۹ ریال، بزرگسالان ۳۵ ریال. قرص ۴۵ ریال.

METHERGIN
ساندوز سویس ـ پارس ایران

ترکیب: مالئات متیل ارگومترین.

موارد استعمال: پیشگیری و درمان خونریزی‌های بعد از زایمان، تسریع مرحله سوم زایمان، برگرداندن رحم بحالت اولیه، عمل سزارین، کورتاژ، منوراژی و متروراژی.

مقدار مصرف و طرز استعمال: در پیشگیری و درمان خونریزیهای بعد از

زایمان ۰/۵ میلی‌لیتر تزریق وریدی یا ۱ میلی‌لیتر تزریق عضلانی بلافاصله پس از خروج جفت. در تسریع مرحله سوم زایمان ۰/۵ تا ۱ میلی‌لیتر تزریق داخل وریدی در موقع پیدایش شانه جلو و عقبی بچه. در خونریزیهای بعد از زایمان یا کوچک نشدن رحم ۱-۲ قرص یا ۱۰-۲۰ قطره ۳ بار در روز در سه یا چهار روز اول بعد از زایمان.

موارد منع استعمال: موقع اتساع گردن رحم و در مواردیکه انقباضات اولیه و یا ثانویه رحم کافی نباشد.

بسته‌بندی: قرص ۰/۱۲۵ میلی‌گرم × ۲۵ قطره: هر قطره = ۰/۱ میلی‌گرم × ۱۰ میلی‌لیتر، آمپول. ۰/۲ میلی‌گرم = ۱ میلی‌لیتر × ۳.

بها: قرص ۹۷ ریال. قطره ۶۴ ریال. آمپول ۳۵ ریال.

M

METHOPRIM - S
روزا - ایران

ترکیب: تریمتوپریم ۸۰ میلی‌گرم + سولفامتوکسازول ۴۰۰ میلی‌گرم.

مکانیسم اثر: از سنتز اسید فولیک جلوگیری کرده آنرا به‌دی هید روفولیک و تترا هیدروفولیک تبدیل میکند.

اثر متقابل: نباید توأم با آنتی اسیدها و بیحس کننده‌های موضعی و داروهای حاوی اسید فولیک مصرف شود.

موارد استعمال: عفونتهای مجاری تنفسی، گوارشی، ادراری و تناسلی، پوستی و جلدی.

مقدار مصرف و طرز استعمال: روزی ۲ بار، هربار ۲ قرص.

موارد منع استعمال: ضایعات شدید کبدی و نارسائی شدید کلیوی، دیسکرازی خونی.

عوارض جانبی: گاهی سرگیجه، استفراغ، بثورات جلدی.

بسته‌بندی: قرص × ۲۰.

بها: ۲۶۰ ریال.

METHOTRAXATE
لدرلی ـ آمریکا

ترکیب: A ـ متوپترین.
مکانیسم اثر: آنتاگونیست اسید فولیک است. سرطانهای ناشی از سلولهای بدخیم مغز استخوان و پوست.
موارد استعمال: شیمی درمانی سرطان خون.
مقدار مصرف و طرز استعمال: برحسب نوع وشدت بیماری متفاوت است.
بسته‌بندی: قرص ۲/۵ میلی × ۱۰۰، آمپول ۵ میلی و ۲۵ میلی = ۲ میلی‌لیتر × ۱.
بها: قرص ۱۲۵۰ ریال، آمپول ۵ میلی ۳۸۰ ریال ۵۰ میلی ۵۵۵ ریال.

METORCIN
ماکسون آمریکا ـ تولیدارو ایران

ترکیب: برمیدرات دکسترومتورفان + کلریدرات فنیل افرین + کلرورآمونیم + اسیدآسکوربیک.
موارد استعمال: مسکن سرفه، نرم کننده ترشحات.
مقدار مصرف و طرز استعمال: روزی ۴ قاشق مرباخوری.
بسته بندی: شربت ۱۲۰ میلی‌لیتر.
بها: ۷۷ ریال.

METORPAN
مینا ـ ایران

ترکیب: در هر ۱۰۰ میلی‌لیتر: دکسترومتورفان ۳۰۰ میلی‌گرم + کلرفنیرآمین مالئات ۴۰ میلی‌گرم + فنیل پروپانولامین ۱۰۰ میلی‌گرم + فنیل افرین ۱۰۰ میلی‌گرم + پتاسیم گایاکول‌سولفونات ۸۸۰ میلی‌گرم.
موارد استعمال: زکام، سرفه‌های حاد و مزمن، لارنژیت، تراکئیت، پنومونی، برونکوپنومونی، سرفه های تشنجی.
مقدار مصرف و طرز استعمال: بزرگسالان: روزی ۴ بار، هربار ۱ ـ ۲ قاشق مرباخوری، خردسالان: نصف مقدار بزرگسالان.
بسته بندی: شربت ۱۲۰ میلی‌لیتر.
بها: ۷۷ ریال.

M

METOVIT
عبیدی ـ ایران

ترکیب: در هر کپسول: متیونین ۱۱۰ میلی‌گرم + کولین بی تارترات ۲۴۰ میلی‌گرم + اینوزیتول ۸۳ میلی‌گرم + تیامین ۳ میلی‌گرم + ویتامین B_2 ۳ میلی‌گرم + نیکوتینامید ۱۰ میلی‌گرم + ویتامین B_6 ۲ میلی‌گرم + پانتنول ۲ میلی‌گرم + ویتامین B_{12} ۲ میکروگرم + عصاره کبد ۳۰ میلی‌گرم.

موارد استعمال: سیروز، هپاتیت، سوء‌تغذیه، الکلیسم، هیپرلیپیدمی.

مقدار مصرف و طرز استعمال: روزی ۱ کپسول یا بیشتر.

بسته‌بندی: کپسول × ۳۰.

بها: ۱۰۵ ریال.

MEXAFORM
سیبا ـ سویس

ترکیب: در هر قرص: یدو کلروئیدرو کسی کینولئین ۲۰۰ میلی‌گرم + ۵، ۷ ـ فنانترولین ۵، ۶ ـ کینون ۲۰ میلی‌گرم + برمورا کسی فنونیوم ۲ میلی‌گرم. در هر ۲۰ قطره: یدو کلرو- ئیدرو کسی کینولئین ۸۰ میلی‌گرم + ۴، ۷ فنانترولین ۵، ۶ ـ کینون ۸ میلی‌گرم.

موارد استعمال: انواع اسهالها بخصوص عفونتهای روده‌ای ناشی از باکتریها و پروتوزوئرها در موارد حاد و مزمن.

مقدار مصرف و طرز استعمال: خردسالان: روزی ۵ قطره بازاء هر کیلو وزن. بزرگسالان: روزی ۳ بار، هربار یک قرص. در موارد سخت هربار ۲ قرص.

موارد منع استعمال: هیپرتیروئیدیسم، حساسیت به ید.

بسته‌بندی: قرص × ۲۰. قطره خوراکی اطفال ۳۰ میلی‌لیتر.

بها: قرص ۱۰۵ ریال. قطره ۱۲۵ ریال.

MEXASE
سیبا ـ سویس

ترکیب: در هر قرص: بروملین ۵۰ میلی‌گرم + آمیلاز ۵ میلیون میکرو واحد + تریپسین ۲۵۰۰ میکروواحد + کیموتریپسین ۱۲۰۰ میکرو واحد + لیپاز ۳۰ هزار میکرو واحد + اسید دئیدرو- کولیک ۲۵ میلی‌گرم + یدوئیدرو کسی کینولئین ۱۰۰ میلی‌گرم + ۴، ۷ ـ فنانترولین ۵، ۶ کینون.

موارد استعمال: سوءهاضمه ناشی از کمبود آنزیم، یبوست، اسهال، کم کاری عوامل معدی ـ روده‌ای.
مقدار مصرف و طرز استعمال: روزی ۳ بار، هر بار ۱ ـ ۲ قرص.
موارد منع استعمال: هیپرتیروئیدیسم، حساسیت به‌ید.
بسته بندی: قرص × ۲۰.
بها: ۱۶۰ ریال.

MICORENE
گایگی ـ سویس

ترکیب: کروتتامید + کروپروپامید. در هر آمپول: از هرکدام ۷/۵ میلی‌گرم در هر پرل: از هرکدام ۵۰ میلی‌گرم. در هر میلی‌لیتر قطره: ازهرکدام ۷/۵ میلی‌گرم.
موارد استعمال: آمپول: در مسمومیت‌های مختلف، جراحی و بیهوشی، نارسائی تنفسی و بیماریهای ریوی. پرل و قطره: در تنگی‌نفس و دیس پنه ایرسیون و ناراحتی تنفسی در ارتفاعات.
مقدار مصرف و طرز استعمال: آمپول: ۰/۵-۳ میلی‌لیتر یک یا چند دفعه در روز داخل ورید. پرل: روزی ۳ ـ ۵ پرل در چند نوبت. قطره ـ بزرگسالان: ۴۰ قطره ۳ بار در روز. خردسالان: ۶ ـ ۱۵ قطره ۳ ـ ۵ بار در روز.
بسته بندی: آمپول: ۱/۵ میلی‌لیتر × ۵. پرل × ۳۰. قطره ۱۵ میلی‌لیتر.
بها: آمپول ۶۷ ریال. پرل ۱۳۵ ریال. قطره ۹۰ ریال.

MICROGYNON 30
شرینگ آلمان ـ ایران

ترکیب: دی نورژسترول ۰/۱۵ میلی‌گرم + اتنی‌نیل استرادیول ۰/۰۳ میلی‌گرم.
مکانیسم: علاوه بر ضخیم کردن مخاط دهانه رحم از رشد تخمکها نیز جلوگیری میکند.
موارد استعمال: جلوگیری از آبستنی.
مقدار مصرف و طرز استعمال: از روز پنجم قاعدگی روزی ۱ قرص بمدت ۲۱ روز متوالی.
موارد منع استعمال: سردردهای میگرنی، اختلال وریدی، ورم رگها.
عوارض جانبی: سرگیجه، سردرد، احساس سنگینی در سینه‌ها، اختلال

M

در وزن.
بسته بندی: قرص × ۲۱.
بها: ۸۴ ریال.

MICROLAX
لاباز ـ فرانسه

ترکیب: لوریل سولفواستات سدیم ۴۵ میلی گرم + اسید سوربیک ۵ میلی گرم + پلی اتیلن گلیکول ۶۲۵ میلی گرم + سیترات تری سدیک هیدرات ۴۵ میلی گرم + سوربیتول ۴/۴۶۵ گرم.
موارد استعمال: تخلیه سریع رکتوم، یبوستهای مزمن، آماده کردن بیمار برای رکتوسکوپی و سیگموئیدوسکوپی.
مقدار مصرف و طرز استعمال: یک تیوب را وارد رکتوم کرده و ماده درون آنرا بداخل فشار می دهند.
بسته بندی: تیوب ۵ میلی لیتر × ۶.
بها: ۱۱۰ ریال.

M

MIDALGAN
میدی فرانسه ـ آترا ایران

ترکیب: در هر ۱۰۰ گرم: نیکوتینات متیل ۱/۵ گرم + سالیسیلات گلیکول ۵ گرم + مفنزین ۱۰ گرم + دی کلریدرات هیستامین ۰/۱ گرم + کاپسی سین ۰/۱ گرم.
موارد استعمال: درد روماتیسمی، تصلب گردن، کمردرد، نورالژی، سیاتیک.
مقدار مصرف و طرز استعمال: مقدار کمی از پماد را در محل می مالند.
بسته بندی: پماد ۴۰ گرم.
بها: ۵۳ ریال.

MIDICEL
پارک دیویس آمریکا ـ ایران

ترکیب: سولفامتوکسی پیریدازین.
موارد استعمال: عفونتهای مجاری ادرار، عفونتهای دستگاه تنفسی فوقانی، دیسانتری باسیلی، عفونتهای ناشی از میکروبهای گرم منفی و کوکسی های گرم مثبت.
مقدار مصرف و طرز استعمال: بزرگسالان: روز اول ۲ قرص، روزهای بعد ۱ قرص. خردسالان: بازاء هر ۱۰ کیلوگرم وزن بدن روز

اول ربع قرص روزهای بعد یک هشتم قرص.

موارد منع استعمال: حساسیت به‌سولفامیدها و ضایعات پیشرفته بافت کبدی و نارسائی‌های کلیوی.

عوارض جانبی: عوارض گوارشی و پوستی و در صورت پیدایش بثورات جلدی باید دارو فوراً قطع شود.

بسته بندی: قرص ۰/۵ گرم × ۱۰۰.

بها: ۱۰۰ عددی ۵۸۵ ریال.

MIDY BISMUTH GEL
میدی فرانسه ـ آترا ایران

ترکیب: در هر ۱۰۰ گرم: سوکربنات بیسموت ۲۰ گرم + متیل پلی سیلوکسان ۱ گرم.

موارد استعمال: اولسرهای گاستریت، کولیت، ازوفاژیت دیس پپسی.

مقدار مصرف و طرز استعمال: بزرگسالان: روزی ۳ ـ ۶ قاشق مرباخوری خردسالان: روزی ۱ ـ ۳ قاشق مرباخوری.

بسته بندی: ژل ۲۲۰ گرم.

بها: ۳۲۸ ریال.

MIDY POMMADE
آترا ـ فرانسه

ترکیب: در هر ۱۰۰ گرم: آدرنالین + کلریدرات آمیلن ۱ گرم + اتوفروم ۱ گرم + عصاره خالص مارن‌دند ۲/۵ گرم + عصاره هاماملیس ۰/۵ گرم.

موارد استعمال: درمان بواسیر.

مقدار مصرف و طرز استعمال: روزی ۲ بار صبح و شب، قبل و بعد از اجابت مزاج.

بسته بندی: پماد همراه با اپلیکاتور ۴۰ گرم.

بها: ۴۷ ریال.

MIGRIL
بوروزولکام ـ انگلستان

ترکیب: در هر قرص: تارترات ارگوتامین ۲ میلی‌گرم + کلریدرات سیکلیزین ۵۰ میلی‌گرم + ئیدرات کافئین ۱۰۰ میلی‌گرم.

موارد استعمال: پیشگیری و درمان میگرن.

مقدار مصرف و طرز استعمال: باظهور اولین علائم حمله ۱ ـ ۲ قرص و

بعد بفاصله هر نیمساعت ۰/۵ ـ ۱ قرص.

احتیاط: برای رفع هر حمله بیش از ۶ قرص در روز و بیش از ۱۲ قرص در هفته نباید میل شود.

موارد منع استعمال: بیماریهای عروق خونی محیطی، بیماریهای کرونر، هنگام آبستنی.

بسته بندی: قرص × ۱۰.

بها: ۱۳۵ ریال.

MIGRISTENE
اسپسیا ـ فرانسه

ترکیب: دی‌متیل سولفاموئیل ۱۰ ـ (۲ دی‌متیل آمینو پروپیل) فنوتیازین = دی متوتازین.

موارد استعمال: انواع میگرنها، تظاهرات آلرژیک پوستی و تنفسی، بیماریهای دستگاه گوارشی، اختلالات وازوموتور.

مقدار مصرف و طرز استعمال: روزی ۱ ـ ۴ بار، هربار ۱ قرص بمدت ۴ روز، شیاف روزی ۲ عدد.

موارد منع استعمال: هنگام رانندگی.

عوارض جانبی: خواب‌آلودگی.

بسته بندی: کپسول ۲۰ میلی‌گرم × ۲۰. شیاف ۵۰ × ۱۰.

بها: کپسول ۱۱۴ ریال. شیاف ۱۲۳ ریال.

M

MILGAMMA
آنکرمان ـ آلمان

ترکیب: در هر کپسول: ویتامین B_1 ۱۵۰ میلی‌گرم + ویتامین B_6 ۱۰۰ میلی‌گرم + ویتامین B_{12} ۲۵۰ گاما + آدنوزین ۵ ـ منو ـ فسفریک اسید ۲ میلی‌گرم. در هر آمپول بترتیب: ۱۰۰ میلی‌گرم + ۱۰۰ میلی‌گرم + ۱۰۰۰ گاما + ۱۰ میلی‌گرم + لیدو ـ کائین ۲۰ میلی‌گرم.

موارد استعمال: نورالژی، میگرن، بیماری‌های روماتیسمی.

مقدار مصرف و طرز استعمال: کپسول: روزی ۳ ـ ۴ بار، هربار یک کپسول. آمپول: روزی یک تزریق عضلانی.

بسته بندی: کپسول × ۲۰ آمپول ۲ میلی‌لیتر × ۳.

بها: کپسول و آمپول ۱۴۰ ریال.

MILIBIS
وینتروپ آمریکا ــ ایران

ترکیب: اکسی‌بیسموت ــ پارا ــ ان گلیکو بی‌آرسول.
موارد استعمال: آمیبیاز داخل روده‌ای و دیسانتری باسیلی.
مقدار مصرف و طرز استعمال: بزرگسالان: روزی ۳ بار، هربار ۱ ــ ۲ قرص بمدت ۸ روز. خردسالان: نصف مقدار فوق بمدت ۸ روز.
موارد منع استعمال: حساسیت به‌آرسنیک.
بسته بندی: قرص ۲۵۰ میلی‌گرم × ۵۰.
بها: ۱۵۸ ریال.

MINA BRONCHE Adultes
مینا ــ ایران

ترکیب: کلروفرم ۰/۴ گرم + سنه‌گا ۱ گرم + تیم ۰/۶ گرم + امتیک ۰/۰۱۲۵ گرم + بنزوات سدیم ۲ گرم + کامفوسولفونات سدیم ۱/۲ گرم + کلرورآمونیم ۰/۸ گرم + دی کامفو سولفونات تیامین ۰/۱۲ گرم + سولفوگایاکولات پتاسیم ۱/۵ گرم.
موارد استعمال: سرفه‌های حاد و مزمن دستگاه تنفس، سرفه‌های تحریکی و احتقانی، سرفه‌های خشک.
مقدار مصرف و طرز استعمال: روزی ۳ ــ ۴ بار، هربار ۱ قاشق سوپخوری.
بسته بندی: شربت ۱۲۰ میلی‌لیتر.
بها: ۴۷ ریال.

MINA BRONCHE Enfant
مینا ــ ایران

ترکیب: در هر ۱۰۰ میلی‌لیتر: برمورسدیم ۰/۵ گرم + بنزوات سدیم ۰/۷۵ گرم + شربت کاپیلر ۱۰ گرم + شربت کوکولیکولت ۲۰ گرم + شربت تلو ۴۰ گرم + سدیم کامفو-سولفونات ۰/۲۱ گرم + سولفاگایاکولات پتاسیم ۰/۵ گرم + کلروفرم.
موارد استعمال: انواع برونشیت و لارنژیت، سرفه‌های خشک و حاد، ضدعفونی مجاری تنفسی وگریپ، سوزش سینه وگلو، گرفتگی صدا، سیاه‌سرفه، اسپاسم عضلات دستگاه تنفسی.
مقدار مصرف و طرز استعمال: خردسالان تا یکساله: روزی ۴ ــ ۶ بار، هربار ۱ قاشق چایخوری. خردسالان ۱ ــ ۳ ساله: روزی ۴ بار،

هر بار ۱ قاشق مرباخوری.

بسته بندی: شربت ۹۰ میلی‌لیتر.

بها: ۴۱ ریال.

MINACETAMIDE
مینا ـ ایران

ترکیب: در هر ۱۰۰ میلی‌لیتر: محلول سولفاستامید ۲۰ گرم.

موارد استعمال: ضدعفونی چشم، ورم ملتحمه آماسهای گوناگون چشم، قرحه قرنیه.

مقدار مصرف و طرز استعمال: روزی ۳ بار، هربار ۲ قطره در هر چشم می‌چکانند.

بسته بندی: قطره چشمی ۱۰ میلی‌لیتر.

بها: ۲۹ ریال.

MINADEX
گلاکسوانگلستان ـ داروپخش ایران

ترکیب: در هر ۱۰۰ میلی‌لیتر: ویتامین A ۶۰ هزار واحد + ویتامین D ۱۰ هزار واحد + آهن و سیترات آمونیوم ۳ گرم + گلیسرو فسفات کلسیم ۰/۵ گرم + گلیسروفسفات پتاسیم ۰/۰۵ گرم + سولفات منگنز ۰/۰۱ گرم + سولفات مس ۰/۰۱ گرم.

موارد استعمال: نقاهت‌های پس از بیماری‌های حاد یا عمل جراحی، بیحالی و ناتوانی، کمبود ویتامین‌ها و مواد معدنی ناشی از کاهش اشتها، اختلالات معدی ـ روده‌ای.

مقدار مصرف و طرز استعمال: شیرخواران: ۶ ماهه تا ۲ ساله: روزی ۳ بار، هربار ربع تا نصف قاشق مرباخوری. خردسالان: روزی ۳ بار، هربار ۱ـ۲ قاشق مرباخوری. بزرگسالان: روزی ۳ بار یا بیشتر هربار ۲ قاشق مرباخوری بعد از هر غذا.

بسته بندی: شربت ۱۷۰ میلی‌لیتر.

بها: ۴۱ ریال.

MINAINHALER
مینا ـ ایران

ترکیب: در هر ۱۰۰ میلی‌لیتر: مانتول ۱ گرم + تنطوربنژوان ۲۰ گرم + تنطوراوکالیپتوس ۲۰ گرم + الکل ۹۰ درجه.

موارد استعمال: گریپ، سرماخوردگی، گلودرد، گرفتگی و التهابات بینی،

سینوزیت، ترا کئیت، برونشیت.
مقدار مصرف و طرز استعمال: روزی ۳ ـ ۴ بار، هربار ۱ قاشق مرباخوری را در آبجوش ریخته ۱۰ ـ ۱۵ دقیقه بخور می‌دهند.
احتیاط: در ضمن بخور، چشمها باید بسته باشد و مدت ۲۰ دقیقه از سرما محفوظ بماند.
بسته بندی: بخور ۵۰ میلی‌لیتر.
بها: ۴۲ ریال.

MINALGIN Adult
مینا ـ ایران

ترکیب: اسید استیل سالیسیلیک ۳۹۰ میلی‌گرم + کلرفنیر- امین مالئات ۲ میلی‌گرم + اسید آسکوربیک ۵۰ میلی‌گرم + کافئین ۳۰ میلی‌گرم.
موارد استعمال: آنفلوانزا، گریپ، تب، دردهای مفصلی، عضلانی، کوفتگی.
مقدار مصرف و طرز استعمال: بزرگسالان: هر ۴ ـ ۶ ساعت ۱ ـ ۲ قرص
خردسالان: ربع یا نصف مقدار فوق.
موارد منع استعمال: زخم و ورم دستگاه گوارش.
بسته بندی: قرص × ۲۰۰.
بها: ۳۵۱ ریال.

MINALGIN Enfant
مینا ـ ایران

ترکیب: اسید استیل سالیسیلیک ۸۰ میلی‌گرم + کلرفنیر امین مالئات ۰/۵ میلی‌گرم + ویتامین C ۲۵ میلی‌گرم.
موارد استعمال: سرماخوردگی، آنفلوانزا، عفونتهای قسمت فوقانی دستگاه تنفسی.
مقدار مصرف و طرز استعمال: روزی ۳ ـ ۶ بار، هربار ۱ ـ ۲ قرص.
بسته بندی: قرص × ۲۰۰.
بها: ۲۳۴ ریال.

MINOCIN
لدرلی ـ آمریکا

ترکیب: کلریدرات مینوسیکلین.
مکانیسم اثر: با ممانعت از ورود اسید ریبونوکلئیک بداخل ریبوزوم

M

سبب اختلال درساختن پروتئین میشود.

موارد استعمال: عفونتهای میکربی مقاوم به‌آنتی بیوتیکها بخصوص تتراسیکلین ها.

مقدار مصرف و طرز استعمال: بزرگسالان: با دو کپسول شروع و سپس هر ۱۲ ساعت یک عدد (در موارد خفیف هر ۲۴ ساعت یک عدد). شربت خردسالان: شروع با یک قاشق مرباخوری سپس هر ۱۲ ساعت نصف قاشق.

عوارض جانبی: سرگیجه که با ادامه درمان برطرف میشود.

بسته بندی: کپسول ۱۰۰ میلی‌گرم × ۴۸، شربت ۵۰ میلی‌گرم = ۵ میلی‌لیتر × ۴۰ میلی‌لیتر.

بها: کپسول هر عدد ۴۷ ریال، شربت ۲۰۰ ریال.

MINTEZOL

مرک شارپ اند دوهم آمریکا ـ ایران

ترکیب: تیابندازول ۵۰۰ میلی‌گرم.

موارد استعمال: آلودگی انگلی روده، استرونژیلوز، آسکاریدوز، ابتلاء بکرمهای قلابدار، کرمک، تریکیوروز، لاروِمهاجر پوستی، آلودگی به‌تریشین.

مقدار مصرف و طرز استعمال: برای هر ۱۰ کیلو وزن بدن نیم قرص پس از صرف شام کامل، روز بعد نیز تکرار میشود.

موارد منع استعمال: بارداری.

عوارض جانبی: سرگیجه، تهوع، دل‌آشوبه.

بسته بندی: قرص جویدنی × ۱۰۰.

بها: ۸۲۰ ریال.

MIOTIN

دوپارفرانسه ـ ایران

تمام خواص مشابه Pilocarpine است.

بها: ۵۰ ریال.

MITOMYCIN

کیوا. هاکو. کوگیو ـ ژاپن

ترکیب: اکتینومایسین.

موارد استعمال: لوسمی حاد و مزمن، بیماری هوچکین، کارسینوم، سارکوم، تومورهای سرطانی.

مقدار مصرف و طرز استعمال: ۶۰ میلی‌گرم بمدت ۳۰ روز تزریق داخل وریدی.

موارد منع استعمال: لکوپنی‌ها.

احتیاط: شمارش خونی هر چند یکبار باید انجام شود.

بسته بندی: آمپول ۲ میلی‌گرم × ۱.

بها: ۱۵۸ ریال.

MOBILAT
لوئیت پولد ـ آلمان

ترکیب: عصاره سورنال خالص ۱ گرم + استرموکوپلی‌ساکاریدپلی سولفوریک اسید ۲ گرم + اسید سالیسیلیک ۲ گرم.

موارد استعمال: برای درمان ضایعات ضربه‌ای، التهابی و دژنراتیو مفاصل، لیگمانها، تاندونها و عضلات.

مقدار مصرف و طرز استعمال: نواری از پماد بطول ۵ تا ۱۵ سانتیمتر در محل آسیب دیده پوست، یک یا چند بار در روز مالیده میشود.

بسته بندی: پماد ۵۰ گرم.

بها: ۲۱۳ ریال.

M

MOBUTAZON
بنزون ـ دانمارك

ترکیب: ۱ ـ فنیل ـ ۳، ۵ ـ دی اکسو ـ ۴ ـ ان ـ بوتیل ـ پیرازولیدین.

موارد استعمال: آرتریت روماتوئید، اسپوندیلوآرتریت، آرتروز، لمباگو.

مقدار مصرف و طرز استعمال: شروع درمان: روزی ۲ بار هر بار ۲ قرص بعد از غذا. ادامه درمان: ۱ قرص.

موارد منع استعمال: بیماریهای خونی.

عوارض جانبی: گاهی حساسیت جلدی.

بسته بندی: قرص ۲۵۰ میلی‌گرم × ۲۰.

بها: ۱۴۰ ریال.

MODENOL
بهرینگرسانهایم ـ آلمان

ترکیب: در هر دراژه ایزوبوتیل ئیدروکلروتیازید ۳/۳ میلی‌گرم + رزرپین ۰/۰۷ میلی‌گرم + رسینامین ۰/۰۷ میلی‌گرم + روبازین ۰/۷ میلی‌گرم.

موارد استعمال: انواع ازدیاد فشارخون شریانی.

موارد منع استعمال: نارسائی‌های شدید کلیوی، حساسیت به‌سولفونامیدها هیپوکالمی مقاوم در برابر درمان.

عوارض جانبی: سرگیجه، تپش قلب، عرق کردن و خستگی زیاد عوارض گوارشی، تهوع.

احتیاط: بیماران مبتلا به‌زخم‌معده، برونشیت و آسم با احتیاط مصرف شود.

بسته بندی: دراژه × ۵۰.

بها: ۱۸۲ ریال.

MODITEN

اسکوئیب آمریکا ـ ایران

ترکیب: کلریدرات فلوفنازین.

موارد استعمال: اضطراب، تشویش، نگرانی‌های روزانه، مشکلات رفتار اطفال، بیماریهای روانی، شیزوفرنی، استفراغ های روانی.

مقدار مصرف و طرز استعمال: بزرگسالان: روزی یک قرص. در بیماران مبتلا به‌شیزوفرنی روزانه ۷۵ میلی‌گرم. خردسالان: ۱ ــ ۲ قطره برای هر کیلو وزن در ۲۴ ساعت.

موارد منع استعمال: حساسیت به‌فنوتیازینها، مسمومیت حاد با الکل.

عوارض جانبی: سرگیجه، چرت.

بسته بندی: قرص ۱، ۲ میلی‌گرم × ۱۰۰، الیگزیر ۴۰ قطره = ۱ میلی‌گرم × ۱۵ میلی‌لیتر.

بها: قرص ۱ میلی ۳۰۰ ریال، قرص ۲ میلی ۴۲۰ ریال، قطره ۵۳ ریال.

MODURETIC

مرک شارپ‌انددوهم ـ آمریکا

ترکیب: آمیلوراید ۵ میلی گرم + هیدروکلروتیازید ۵۰ میلی‌گرم.

موارد استعمال: نارسائی احتقانی قلب، هیپرتانسیون، سیروز کبدی، آسیت و ورم.

مقدار مصرف و طرز استعمال: برحسب نوع بیماری متفاوت است.

موارد منع استعمال: بچه‌ها، مادران‌شیرده، آنوری، نارسائی کلیوی، نفروپاتی، دیابتیک.

عوارض جانبی: آنورکسی تهوع و استفراغ.

بسته بندی: قرص × ۱۰۰ .
بها: ۱۰۶۶ ریال.

MOGADON
روش ـ سویس

ترکیب: ۱ ، ۳ ـ دی هیدرو ـ ۷ ـ نیترو ۵ ـ فنیل ۲ ـ ۱ ، ۴ ـ بنزودیازپین ـ ۲ ـ اون ـ نیترازپام .
موارد استعمال: بیخوابی بهرعلت.
مقدار مصرف و طرز استعمال: خردسالان: نیم تا یک قرص . بزرگسالان: روزی یک قرص .
بسته بندی: قرص ۵ میلی گرم × ۱۰ .
بها: ۶۵ ریال.

MOLAR SODIUM LACTATE
باکستر ـ ایران

ترکیب: لاکتات سدیم ۱/۸۷ گرم + آب مقطر مقدار کافی تا ۱۰۰ میلی لیتر (غلظت سدیم ۱۶۷ ، کلرور ۱۶۷ میلی اکی والان).
موارد استعمال: نارسائی کلیوی، بی‌آبی شدید بدن، عفونتهای شدید همراه ستوز، دیابت قندی، سوء تغذیه، مسمومیتهای داروئی و شیمیائی.
مقدار مصرف و طرز استعمال: ۶۰ میلی لیتر پارکیلو از راه تزریق وریدی، زیرجلدی، درون صفاقی.
عوارض جانبی: احتمال بروز آلکالوز.
بسته بندی: محلول ۵۰۰ میلی لیتر.
بها: ۱۰۳ ریال.

MOL-IRON
وایت ـ امریکا

ترکیب: در هر کپسول: سولفات فرو ۳۹۰ میلی گرم + اکسید مولیبدن ۶ میلی گرم معادل با ۸۰ میلی گرم آهن خالص.
موارد استعمال: کم‌خونیهای ناشی از فقر آهن.
مقدار مصرف و طرز استعمال: بزرگسالان: روزی یک کپسول. در کم‌خونیهای شدید: روزی دو کپسول. خردسالان: نصف مقدار فوق.

بسته بندی: کپسول × ۳۰.
بها: ۱۴۴ ریال.

MONOTREAN
لوئیت پولد ـ آلمان

ترکیب: در هر قرص: کلریدرات کینین ۰/۱ گرم + پاپاورین - بازیک ۰/۰۴ گرم.
موارد استعمال: سرگیجه‌های عصبی و لابیرنتی، سرگیجه میگرنی، سندرم‌منیر، سرگیجه منوپوز و سردردهای عروقی.
مقدار مصرف و طرز استعمال: روزی ۳ بار، هربار ۱ ـ ۲ دراژه بمدت ۵ ـ ۶ هفته.
بسته بندی: قرص × ۳۰.
بها: ۲۶۰ ریال.

MORATEN
برنا ـ سویس

ترکیب: ویروس خفیف شده شوارتز.
موارد استعمال: پیش‌گیری از ابتلا به‌بیماری سرخک.
مقدار مصرف و طرز استعمال: ۰/۵ میلی‌لیتر زیر جلد و یا داخل عضله.
موارد منع استعمال: مانند مشابهین در ابتلاء به‌عفونت حاد یا دوره کمون بیماری‌های عفونی، لوسمی و یا بیماریهای عمومی وخیم، تجویز کورتیکوستروئیدها و یا داروهای آنتی‌متابولیک، درمان با اشعه ایکس، درسه‌ماه اول آبستنی، درکودکان مبتلا به‌صرع.
احتیاط و عوارض جانبی: هشت روز پس از تزریق واکسن ممکن است درجه حرارت بالا رفته و تا ۳۹ درجه سانتی‌گراد برسد و یا اینکه علائم خفیف بیماری سرخک ظاهر گردد.
بسته بندی: ۱ میلی‌لیتر با سرنگ و حلال مخصوص.
بها: ۲۰۰ ریال.

MORVIRENE
یوسی بی ـ بلژیک

ترکیب: در هر قرص: اسید دی‌استیل پیروکاتشیک ۵۰۰ میلی- گرم. در هر آمپول: اسید پیروکاتشیک ۱ گرم.
موارد استعمال: التهاب روماتیسمی، آرتریت روماتوئید، روماتیسم پورپورا.

مقدار مصرف و طرز استعمال: قرص ـ خردسالان: روزی ۴ـ۶ بار، هربار یک قرص. بزرگسالان: روزی ۸ـ۱۲ بار، هربار یک قرص. آمپول ـ بزرگسالان: روزی ۱ـ۲ بار، هربار ۱ آمپول عضلانی.

موارد منع استعمال: عفونت شدید کلیه ها.

بسته بندی: قرص × ۲۰. آمپول ۱ میلی لیتر × ۶.

بها: قرص ۵۴ ریال. آمپول ۱۶۰ ریال.

MUCINUM
اینوترا ـ فرانسه

ترکیب: ترکیبی از مواد عضوی «دیاستازهای امعائی ـ لوزالمعدی و صفرا» و گیاهان صمغی.

موارد استعمال: تقویت غدد امعائی، افزایش حرکات دودی روده‌ها، تسهیل عبور مواد دفع شدنی.

مقدار مصرف و طرز استعمال: روزی ۰/۵ ـ ۲ قرص برحسب سن.

بسته بندی: قرص × ۳۶.

بها: ۳۵ ریال.

MUCOLIN
آی دی آی ـ ایران

ترکیب: ۵ ـ کاربوکسی متیل سیستئین.

موارد استعمال: برنشیت حاد ومزمن، اتساع برنش، سل ریوی، نارسائی مزمن تنفسی، رینوفارنژیت، سینوزیت. نزله، گوش درد.

مقدار مصرف و طرز استعمال: روزی ۳ بار، هربار ۲ کپسول که بعداً به یکی کاهش مییابد. شربت روزی ۳ بار، هربار ۲ـ۴ قاشق مرباخوری.

موارد منع استعمال: مبتلایان به زخم معده و اثنی عشر.

عوارض جانبی: در دوز بالا باعث گاسترالژی، تهوع و اسهال میشود.

بسته بندی: کپسول × ۱۶. شربت ۹۰ میلی لیتر.

بها: ۹۸ ریال.

MULTIBIONTA Cap.
مرک آلمان ـ ایران

ترکیب: ویتامین A ۲۵۰۰ واحد + ویتامین B_1 ۱ میلی گرم + ویتامین B_2 ۱/۵ میلی گرم + نیکوتینامید ۱۵ میلی گرم

+ پانتوتنات کلسیم ۵ میلی‌گرم + ویتامین B_6 ۲۰ میلی‌گرم + ویتامین B_{12} ۱ میکروگرم + ویتامین C ۵۰ میلی‌گرم + ویتامین D_3 ۵۰۰ واحد + ویتامین E ۲ میلی‌گرم + ویتامین P ۱۰ میلی‌گرم.

موارد استعمال: علائم کمبود ویتامین‌های فوق، احساس ضعف و خستگی، بیخوابی، تحریک‌پذیری عصبی، کمی مقاومت دربرابر بیماریهای عفونی، دوران رشد، آبستنی و شیردهی.

مقدار مصرف و طرز استعمال: پیشگیری: روزی ۱ ـ ۲ کپسول. درمان: روزی ۳ ـ ۶ کپسول.

بسته بندی: کپسول × ۲۰.

بها: ۵۷ ریال.

MULTIBIONTA eff.
مرك آلمان ـ ایران

ترکیب: ویتامین A ۳۰۰ واحد + ویتامین B_1 ۲ میلی‌گرم + ویتامین B_2 ۲/۵ میلی‌گرم + بیوتین ۳۰ میلی‌گرم + نیکوتینامید ۲۰ میلی‌گرم + پانتوتنات کلسیم ۸ میلی‌گرم + ویتامین B_6 ۴ میلی‌گرم + ویتامین B_{12} ۲ میکروگرم + ویتامین C ۱۰۰ میلی‌گرم + ویتامین E ۲/۵ میلی‌گرم + ویتامین P ۱۰ میلی‌گرم.

موارد استعمال: مشابه داروی قبل.

مقدار مصرف و طرز استعمال: پیشگیری: روزی ۱ قرص. درمان: روزی ۲ قرص در آب حل کرده میل شود.

بسته بندی: قرص جوشان × ۱۰.

بها: ۷۰ ریال.

MULTIFUNGIN
کنول ـ آلمان

ترکیب: محلول و پماد: ۵ برموسالیسیل ـ ۴ کلرانیلید ۲ درصد + سالیسیلات سونتول ۱ درصد. گرد: ۵ برموسالیسیل ـ ۴ ـ کلرانیلید ۲ درصد.

موارد استعمال: ضدقارچ، ضد خارش، ضد میکروب.

مقدار مصرف و طرز استعمال: محلول: روزی چندبار روی پوست میمالند. پماد: روزی ۲ ـ ۳ بار روی ناحیه مبتلا میمالند. پودر: در مورد ضایعات قارچی پا در داخل جوراب و کفش میپاشند.

بسته بندی: محلول ۲۰ گرم. پماد ۲۵ گرم. پودر ۵۰ گرم.
بها: محلول ۱۴۰ ریال. پماد ۱۲۰ ریال. پودر ۱۲۳ ریال.

MULTINE
عبیدی ـ ایران

ترکیب: در هر میلی‌لیتر: ویتامین A ۵ هزار واحد + ویتامین C ۲۵ میلی‌گرم + ویتامین B_1 ۲ میلی‌گرم + ویتامین B_2 ۱ میلی‌گرم + ویتامین B_6 ۴ میلی‌گرم + ویتامین D_3 هزار واحد + ویتامین E ۳ میلی‌گرم + ویتامین PP ۲۰ میلی‌گرم + پانتنول ۱۰ میلی‌گرم + بیوتین ۰/۱ میلی‌گرم.
موارد استعمال: خردسالان: جهت رشد منظم استخوان‌بندی، دوره نقاهت بیماریهای فصلی، تغذیه مصنوعی، بیماریهای عفونی، زنان باردار و شیرده که در آنها احتیاجات ویتامینی بدن افزایش پیدا کرده. بزرگسالان: آنورکسی، رژیم نامتعادل، اختلالات مزمن گوارشی.
مقدار مصرف و طرز استعمال: خردسالان: روزی ۳ بار، هربار ۵ ـ ۱۵ قطره. بزرگسالان: روزی ۳ بار، هربار ۱۵ ـ ۲۰ قطره.
بسته بندی: قطره ۱۵ میلی‌لیتر.
بها: ۶۴ ریال.

M

MULTISANOSTOL
بیک گلدن ـ آلمان

ترکیب: در هر ۵ میلی‌لیتر: ویتامین A ۱۲۰۰ واحد + ویتامین D ۱۰۰ واحد + ویتامین B_1 ۱ میلی‌گرم + ویتامین B_2 ۱ میلی‌گرم + ویتامین B_6 ۰/۵ میلی‌گرم + ویتامین C ۵۰ میلی‌گرم + ویتامین E ۱ میلی‌گرم + ویتامین PP ۵ میلی‌گرم + پانتنول ۲ میلی‌گرم + گلوکونات کلسیم ۲۵ میلی‌گرم + فسفولاکتات کلسیم ۲۵ میلی‌گرم.
موارد استعمال: عوارض ناشی از کمبود ویتامینهای فوق.
مقدار مصرف و طرز استعمال: برحسب سن روزی ۱ ـ ۴ قاشق مرباخوری
بسته بندی: شربت ۲۰۰ گرم.
بها: ۱۵۰ ریال.

MULTI-TABS
فروسان دانمارک ـ فارمکس ایران

ترکیب: ویتامین A + ویتامین D_3 + ویتامین E + ویتامین K + ویتامین B_1 + ویتامین B_2 + ویتامین B_5 + ویتامین B_6 + ویتامین B_{12} + ویتامین PP + اسیدفولیک + ویتامین C .

موارد استعمال: سوءتغذیه دوران نقاهت، دوران بارداری و شیردهی .

مقدار مصرف و طرز استعمال: روزی یک قرص بعد از نهار.

بسته بندی: قرص × ۲۰ .

بها: ۱۴۱ ریال.

MYALGINE Ointment
عبیدی ـ ایران

ترکیب: سالیسیلات دی اتیل آمین ۱۰ درصد + کامفر ۵ درصد + تربانتین ۶ درصد + مانتول ۵ درصد + اکالیپتوس ۳ درصد + تیمول ۰/۳ درصد .

موارد استعمال: دردهای حاد و مزمن عضلانی و مفاصل، روماتیسم، نقرس، دردهای عصبی، سیاتیک، لمباگو.

مقدار مصرف و طرز استعمال: روزی ۳ ـ ۴ بار مقدار کمی از پماد را بر روی موضع درد میمالند.

بسته بندی: پماد ۲۰ گرم .

بها: ۳۵ ریال.

M

MYAMBUTOL
لدرلی آمریکا ـ ایران

ترکیب: دی کلریدرات ۲ ، ۲ (اتیلن دی ایمینو) دی ـ ۱ ـ بوتانول ـ اتامبوتول.

موارد استعمال: ضد سل .

مقدار مصرف و طرز استعمال: روزی یک قرص .

عوارض جانبی: نقصان برگشت پذیر بینائی .

بسته بندی: قرص ۴۰۰ میلی گرم × ۱۰۰ .

بها: ۱۴۰۴ ریال.

MYCIDON
میسین ـ ایران

ترکیب: در هر قرص : مالئات کلرفنیرامین ۰/۰۷۵ میلی گرم + اسید استیل سالیسیلیک ۸۰ میلی گرم + فناستین ۱۶ میلی گرم .

موارد استعمال: عوارض ناشی از سرماخوردگی، بعنوان مسکن دردها .

مقدار مصرف و طرز استعمال: خردسالان: روزی ۴ـ۶ بار، هربار ۱ قرص. بزرگسالان: هر ۴ ساعت ۱ قرص.

بسته بندی: قرص × ۲۵۰.

بها: قرص خردسالان: ۱۰۰۰ عدد ۱۴۰۴ ریال. قرص بزرگسالان: ۱۰۰۰ عدد ۲۳۴۰ ریال.

MYCIGUENT
آپجان ـ آمریکا

ترکیب: در هر گرم پماد: سولفات نئومایسین ۵ میلی‌گرم.

موارد استعمال: ناراحتی‌های عفونت پوست، عوارض عفونی چشم.

مقدار مصرف و طرز استعمال: پماد جلدی: روزی ۳ بار، هربار مقدار کمی پماد را بعد از تمیزکردن موضع در محل قرار میدهند.
پماد چشمی: روزی ۳ بار در چشم استعمال شود.

بسته بندی: پماد جلدی ۱۴ گرم. پماد چشمی ۳/۵ گرم.

بها: پماد جلدی ۶۸ ریال. چشمی ۳۱ ریال.

MYCIL
بی دی اچ انگلستان
ـ داروپخش ایران

ترکیب: پماد: کلروفنزین ۰/۵ درصد. گرد: کلروفنزین ۱ درصد.

موارد استعمال: درمان عفونت قارچی تنه، کشاله ران و پا، عرق‌سوز.

مقدار مصرف و طرز استعمال: بعد از شستن و خشک کردن ناحیه مورد نظر لایه‌ای از پماد را برروی آن می‌مالند. درمان حداقل بمدت یک هفته است.

بسته بندی: پماد ۳۰ گرم.

بها: پماد ۳۳ ریال.

MYCODECYL
تراپلیکس ـ فرانسه

ترکیب: اسیداندسی لی‌نیک ۱۰ گرم + اندسیلنات زنک ۱۰ گرم.

موارد استعمال: اپی درمومیکوزها، ضایعات قارچی انتها و بین انگشتان، پتی ریازیس.

مقدار مصرف و طرز استعمال: روزی ۱ ـ ۲ بار بطور موضعی استعمال میشود.

بسته بندی: پماد ۳۰ گرم.

بها: ۲۷ ریال.

M

MYCOSTATIN
اسکوئیب آمریکا ـ ایران

ترکیب: نیستاتین.

موارد استعمال: عفونتهای مونیلیائی (کاندیدا آلبیکانس) مهبل و مقعد، برفک، واژینیت مونیلیائی، مونیلیاز جلدی و روده‌ای، بلاستومیکوز، هیستوپلاسموز، کوکسیدیوئیدومیکوز.

مقدار مصرف و طرز استعمال: قرص خوراکی: روزی ۳ـ۴ قرص. قرص واژینال: یکی صبح، یکی شب در مهبل میگذارند. گرد: بعد از افزودن ۱۱ میلی‌لیتر آب جهت برفک روزی ۴ـ۳ بار، هربار یک قطره، پماد: روزی ۳ـ۲ بار در موضع میمالند.

موارد منع استعمال: حساسیت بدارو.

بسته بندی: قرص خوراکی × ۱۲، قرص واژینال × ۱۵. پماد ۱۵ گرم. قطره خوراکی محتوی ۱۲ دوز.

بها: قرص خوراکی ۷۶ ریال، قرص واژینال ۶۰ ریال، قطره خوراکی ۴۷ ریال، پماد ۶۰ ریال.

M

MYLANTA
پارک دیویس ـ انگلستان

ترکیب: هیدروکسید منیزیم ۲۰۰ میلی‌گرم + هیدروکسید آلومینیوم ۲۰۰ میلی‌گرم + سیمتیکون ۲۰ میلی‌گرم.

موارد استعمال: کاهش سریع ترشی معده، نفخ، اولسرهای گاستریک و گاسترودوئودونال، گاستریت ها، سوءهاضمه های ناشی از ترشح زیاد اسید معده.

مقدار مصرف و طرز استعمال: ۱ـ۲ قرص جویدنی در بین غذاها و قبل از خواب میل میشود.

بسته بندی: قرص جویدنی × ۲۴.

بها: ۴۷ ریال.

MYLERAN
بوروزولکام ـ انگلستان

ترکیب: در هر قرص: ۱، ۴ ـ دی متان سولفونوکسی بوتان = بوسولفان.

موارد استعمال: لوسمی میلوئید.

مقدار مصرف و طرز استعمال: دوره اول درمان بمدت ۶ـ۷ ماه روزی ۴ میلی‌گرم. تا دوره دوم درمان ۶ ـ ۱۸ ماه فاصله. بعد از درمان

دوره دوم تا مدت زیادی قرصها قطع میشود و بعد درمان نگهدارنده روزی ۳ میلی‌گرم بمدت ۱۵ ماه انجام میگیرد.

احتیاط: این دارو باید به‌آنهائی که در بیمارستان بستری هستند تجویز گردد. در غیر اینصورت شمارش کامل گلبولها باید بطور منظم انجام گیرد.

بسته بندی: قرص ۲ میلی‌گرم × ۱۰۰.

بها: ۵۴۰ ریال.

MYSOLINE
آی‌سی‌آی ـ انگلستان

ترکیب: ۵ ـ اتیل ـ ۵ ـ فنیل ـ هگزاهیدرو پیریمیدین ـ ۴، ۶ ـ دیون = پیریمیدون ۱۲۵ میلی‌گرم.

موارد استعمال: صرع گراندمال و صرع پسیکوموتور (صرع گیجگاهی یا تامپورال) و فوکال یا جکسونین. همچنین غالباً در صرع پتی‌مال نیز مؤثر است.

مقدار مصرف و طرز استعمال: شروع درمان: روزی ۱۲۵ میلی‌گرم نصف قرص هنگام غروب به‌بیمار داده میشود و این مقدار برای سه روز ادامه مییابد، از روز چهارم نصف قرص صبح و نصف قرص شب به‌بیمار داده میشود و از روز هفتم مقدار دارو بتدریج اضافه میگردد تا مریض کاملا کنترل شود. معمولا دوز کنترل کننده مؤثر بین ۱/۵ـ۲ گرم در روز (۸ـ۶ قرص) میباشد.

عوارض جانبی: بندرت ممکن است در انعقاد خون زنان باردار اختلالی بوجود آورد. در این صورت توصیه میشود دارو در ماههای آخر آبستنی توأم با ویتامین K₁ تجویز گردد.

بسته بندی: قرص × ۱۰۰ و ۱۰۰۰.

بها: ۱۰۰ عددی ۱۳۰ ریال، ۱۰۰۰ عددی ۱۱۳۰ ریال.

MYSTECLIN - V
اسکوئیب آمریکا ـ ایران

ترکیب: کپسول: تتراسیکلین فسفاتـه ۲۵۰ میلی‌گرم + نیستاتین ۲۵۰ هزار واحد. در هر میلی‌لیتر قطره: تتراسیکلین فسفاته ۱۰۰ میلی‌گرم + آمفوتریسین B ۲۰ میلی‌گرم. در هر میلی‌لیتر شربت: تتراسیکلین فسفاته ۱۲۵ میلی‌گرم + آمفوتریسین

B ۲۵ میلی‌گرم.

موارد استعمال: کوکسی های گرام مثبت، کوکسی های گرم منفی، باسیل های گرام مثبت، باسیل های گرم منفی، اسپیروکتها بورلیا، ترپونما پالیدوم، ریکتزیاها، ویروس های بزرگ، پروتوزوئرها.

مقدار مصرف و طرز استعمال: بزرگسالان: هر ۶ ساعت یک کپسول

خردسالان: روزی ۲۰ ـ ۴۰ میلی‌گرم برای هر کیلو وزن از قطره یا شربت.

موارد منع استعمال: زنان باردار، حساسیت به‌یکی از ترکیبات فوق.

عوارض جانبی: سندرم فانکونی.

بسته بندی: کپسول × ۱۰۰. قطره ۱۰ میلی‌لیتر. شربت ۶۰ میلی‌لیتر.

بها: کپسول هر عدد ۱۱ ریال. شربت ۱۰۰ ریال. قطره ۷۶ ریال.

M

NALDECOL
بریستول ـ آمریکا

ترکیب: در هر قاشق مرباخوری شربت: کلریدرات فنیل پروپانولامین ۲۰ میلی‌گرم + کلریدرات فنیل افرین ۵ میلی‌گرم + سیترات تولوگزامین ۷/۵ میلی‌گرم + مالئات کلرفنیرامین ۲/۵ میلی‌گرم در هر قرص بترتیب: ۳۰ میلی‌گرم + ۱۰ میلی‌گرم + ۱۵ میلی‌گرم + ۵ میلی‌گرم.

موارد استعمال: احتقان سینوسها، گرفتگی و آبریزش بینی، علائم حساسیت به گرده گیاهان.

مقدار مصرف و طرز استعمال: خردسالان: روزی ۳ بار، هربار نصف قرص یا هر ۳ـ۴ ساعت نصف قاشق چایخوری شربت. بزرگسالان: روزی ۳ بار، هربار یک قرص یا هر ۳ـ۴ ساعت یک قاشق چایخوری شربت.

موارد منع استعمال: فشارخون شدید، هیپرتیروئیدیسم، دیابت شدید.

احتیاط: امکان دارد ایجاد منگی نماید.

NABASONE
آرآی تی ـ بلژیک

ترکیب: سولفات نئومایسین ۵ میلی‌گرم + باسی‌تراسین ۵۰۰ واحد + هیدروکورتیزون ۱۰ میلی‌گرم + پارافین مایع ۳۰۰ میلی‌گرم.

موارد استعمال: التهاب، بلفاریت، ورم ملتحمه حاد، کراتیت، درمان موضعی ایریتیس، اپی‌اسکلریت، اسکلریتیس، زخم قرنیه، عفونت و اکزمای گوش خارجی.

مقدار مصرف و طرز استعمال: روزی ۴ـ۶ مرتبه بطور موضعی مصرف شود.

موارد منع استعمال: هرپس قرنیه.

بسته‌بندی: پماد ۲/۵ گرم.

بها: ۸۸ ریال.

موارد منع استعمال: نوزادان کمتر از یکسال
عوارض جانبی: فتوفوبی، گاهی رنگ کوری، ازدیاد فشار جمجمه در کودکان.
بسته بندی: قرص ۵۰۰ میلی‌گرم × ۲۰.
بها: ۲۲۵ ریال.

NAPHTAZOLINE
پ اواس فرانسه ـ دوپار ایران

ترکیب: در هر ۱۰۰ میلی‌لیتر: نیترات نفتازولین ۰/۱ گرم.
موارد استعمال: کونژونکتیویت، احتقان و تحریک ملتحمه، تظاهرات آلرژی، بلفاریت، ورم پلکها.
مقدار مصرف و طرزاستعمال: هر ۲ـ۳ ساعت ۱ـ۲ قطره در چشم می‌چکانند.
بسته بندی: قطره چشمی ۰/۱ درصد ۱۰ میلی‌لیتر.
بها: ۴۱ ریال.

NAPHTAZOLINE ANTIHISTAMINE
دوپار ـ ایران

ترکیب: در هر ۱۰۰ میلی‌لیتر: نیترات نفتازولین ۰/۱ گرم + آنتازولین ۰/۲۵ گرم.
موارد استعمال: مانند نفتازولین ساده.
مقدار مصرف و طرزاستعمال: مانند نفتازولین ساده.
بسته بندی: قطره چشمی ۱۰ میلی‌لیتر.
بها: ۴۷ ریال.
بسته بندی: قرص × ۱۰۰. شربت ۳۰ میلی‌لیتر.
بها: ۱۰۰ عددی ۶۷۵ ریال. شربت ۶۳ ریال.

NALISSINA
مدیکامنتا ـ ایتالیا

ترکیب: ۱ ـ اتیل ـ ۷ ـ متیل ـ ۱، ۸ نفتی ریدین ـ ۴ ـ اون ـ ۳ کاربوکسیلیک اسید = نالیدیکسیک اسید.
موارد استعمال: عفونتهای حاد و مزمن دستگاه تناسلی، پیلونفریت، سیستیت، سیستوپیلیت، اورتریت.
مقدار مصرف و طرز استعمال: بزرگسالان: هر ۶ ساعت ۱ـ۲ قرص خوراکی بمدت ۱ـ۲ هفته. خردسالان: ۵۰ میلی‌گرم برای هر کیلو وزن بدن در روز.

NATABEC
بارك دیویس آمریکا ـ ایران

ترکیب: ویتامین A ۴هزار واحد + ویتامین B_1 ۳ میلی‌گرم + ویتامین B_2 ۲ میلی‌گرم + ویتامین B_6 ۳ میلی‌گرم + ویتامین B_{12} ۵ میکروگرم + ویتامین C ۵۰ میلی‌گرم + ویتامین D ۴۰۰ واحد + نیاسینامید ۱۰ میلی‌گرم + اسیدفولیک ۰/۲۵ میلی‌گرم + کربنات کلسیم ۶۰۰ میلی‌گرم + سولفات فرو ۱۵۰ میلی‌گرم.

موارد استعمال: مکمل ویتامین و مواد معدنی برای دوران بارداری و شیردهی.

مقدار مصرف و طرز استعمال: روزی یک کپسول و یا بیشتر.

بسته بندی: کپسول × ۲۵.

بها: ۲۵ عددی ۸۸ ریال.

NATIDIGOXINE
ناتیول ـ فرانسه

ترکیب: دیگوکسین.

موارد استعمال: در تمام مواردی که به‌درمان بادیژیتالین خوراکی با اثری سریع نیاز است.

مقدار مصرف و طرز استعمال: روزی ۳ ـ ۴ قرص. در موارد فوری: تزریق داخل وریدی.

موارد منع استعمال: کندی ضربان قلب، تاکی کاردی بطنی، اکستراسیستولهای منظم و نامنظم، سندرم استوکس آدامس.

احتیاط: چون دفع دارو سریع است باید روزانه مصرف شود.

بسته بندی: قرص ۰/۲۵ میلی‌گرم × ۴۰ آمپول وریدی ۰/۵ میلی‌گرم = ۲ میلی‌لیتر × ۶.

بها: قرص ۷۰ ریال. آمپول ۵۵ ریال.

NATISEDINE
ناتیول ـ فرانسه

ترکیب: فنیل ـ اتیل ـ باربیتورات‌دوکینیدین.

موارد استعمال: طپش قلب، درد ناحیه قلب، پیشگیری از بروز اکستراسیستول، فیبریلاسیون، اختلال نظم قلب در دوران انفارکتوس، اضطراب، هیجان، عصبانیت.

مقدار مصرف و طرز استعمال: بزرگسالان: روزی ۱-۳ قرص. خردسالان: روزی ربع تا یک قرص.

N

بسته بندی: کپسول ۵۰ میلی‌گرم × ۵۰.
بها: ۵۵۰ ریال.

NATUSAN
بنزون ـ دانمارک

ترکیب: مشتقات اسید بوریک.
موارد استعمال: انواع سوختگیها.
مقدار مصرف و طرز استعمال: لایه نازکی از پماد را در محل ضایعه می‌مالند.
بسته بندی: پماد ۵۰ گرم.
بها: ۱۵۳ ریال.

NAUTAMINE
دلاگرانژ ـ فرانسه

ترکیب: تئوفیلینات دی‌فنیدرامین.
موارد استعمال: تهوع و استفراغ ناشی از مسافرت، آبستنی.
مقدار مصرف و طرز استعمال: ۱ ـ ۲ قرص قبل از شروع مسافرت و نیمساعت قبل از هر غذای اصلی در ضمن مسافرت. خردسالان: نصف مقدار فوق.
بسته بندی: قرص × ۵۰۰.
بها: ۵۵۴ ریال.

N

بسته بندی: قرص ۰/۱ میلی‌گرم × ۲۰.
بها: ۸۸ ریال.

NATULAN
روش ـ سویس

ترکیب: کلریدرات ـ P ـ (N'ـ متیل ـ N ـ ایزوپروپیل) ـ بنزامید.
موارد استعمال: بازدارنده تکثیر سلولی با اثر اختصاصی بر بیماری هوجکین.
مقدار مصرف و طرز استعمال: برحسب نوع و شدت بیماری متفاوت است.
موارد منع استعمال: دوران آبستنی و ضایعات پیشرفته کلیه و کبد.

NAVIDREX
سیبا ـ سویس

ترکیب: در هر قرص: دی‌اکسید ۱ ـ ۱ سیکلو پنتیل متیل ـ ۳ کلرو ـ ۶ ـ سولفامیل ـ ۷ دی ئیدرو ـ ۳ ـ ۴ بنزوتیادیازین ۱ ـ ۲ ـ ۴ = سیکلوپنتیازید ۰/۵ میلی‌گرم.

موارد استعمال: نارسائی قلب، ورم نفروپاتی، ورم کبدی، ورم آبستنی، چاقی، زیادی فشارخون.

مقدار مصرف و طرز استعمال: شروع: روزی یک قرص. درمان طولانی: روزی نصف‌قرص. ادامه درمان: هر ۲ ـ ۳ روز نصف قرص.

بسته بندی: قرص × ۲۰.

بها: ۶۰ ریال.

NEG GRAM
وینتروپ آمریکا ـ ایران

ترکیب: ۱ ـ اتیل ـ ۷ ـ متیل ـ ۱، ۸، نفتی‌ریدین ـ ۴ ـ اون ـ ۳ ـ کاربولیک اسید = نالیدیکسیک اسید.

موارد استعمال: انواع عفونتهای حاد و مزمن ادراری و روده‌ای مخصوصاً عفونتهای گرم منفی.

مقدار مصرف و طرز استعمال: روزی ۴ بار، هربار ۲ قرص.

موارد منع استعمال: سه‌ماهه اول آبستنی، کودکان کمتر از یکماه.

احتیاط: در صورت استعمال طولانی آزمایشهای خونی و کبدی باید انجام شود.

عوارض جانبی: اختلال در تشخیص رنگ، حساسیت به‌نور، ازدیاد فشار جمجمه در کودکان.

بسته بندی: قرص ۵۰۰ میلی‌گرم × ۲۸، سوسپانسیون ۵ میلی‌لیتر = ۳۰۰ میلی‌گرم × ۱۲۰ میلی‌لیتر.

بها: قرص ۳۸۰ ریال، سوسپانسیون ۲۲۸ ریال.

NEMBUTAL
ابوت ـ آمریکا

ترکیب: فنوباربیتال سدیم.

موارد استعمال: بی‌خوابی‌ها، صرع، حالات هیجانی.

مقدار مصرف و طرز استعمال: بزرگسالان: روزی ۱ ـ ۲ کپسول ۱۰۰ میلی‌گرم. خردسالان: روزی ۱ ـ ۲ کپسول ۵۰ میلی‌گرم.

N

عوارض جانبی: ممکنست ایجاد عادت کند.
احتیاط: در تجویز به‌مبتلایان هیپرتیروئیدی، دیابت و کم‌خونی دقت بعمل آید.
بسته بندی: کپسول ۱۰۰ میلی‌گرم × ۱۰۰، کپسول ۵۰ میلی‌گرم × ۱۰۰، محلول تزریقی ۵۰ میلی‌لیتر.
بها: کپسول ۱۰۰ میلی ۱۹۰ ریال، ۵۰ میلی ۱۴۵ ریال. آمپول ۱۲۰ ریال.

NEOBAR
مرک ـ آلمان

ترکیب: سولفات باریم مخصوص برای آزمایشهای رادیولوژیک دستگاه هاضمه.
موارد استعمال: برای نمایش و یا پرکردن برجستگیهای دستگاه گوارش.
مقدار مصرف و طرز استعمال: برای نمایش مخاط: ۱۵۰ گرم گرد را در ۱۵۰ میلی‌لیتر آب ریخته بهم زده و میل می‌نمایند. برای پر کردن کامل: ۱۵۰ گرم گرد را در ۱۵۰ میلی‌لیتر آب ریخته بهم میزنند و بعد ۱۵۰ تا ۲۰۰ میلی‌لیتر دیگر آب اضافه کرده میل میکنند.
بسته بندی: گرد ۱۵۰ گرم.
بها: ۱۵۰ گرمی ۵۴ ریال.

NEO CODION
بوشارا ـ فرانسه

ترکیب: کامفوسولفونات کدئین ۱۲/۵ میلی‌گرم + کامفوسولفونات کدتیلین ۱۲/۵ میلی‌گرم + تیوکل ۱۰۰ میلی‌گرم + عصاره موگرندلیا ۲۰ میلی‌گرم + عصاره مواری سیموم ۱۰ میلی‌گرم + عصاره موماروب بلان ۳۰ میلی‌گرم.
موارد استعمال: سرفه های اسپاسمودیک و رفلکسی، لارنژیت، تراکئیت، سرفه های تحریکی، آسم، آمفیزم، برونشیت مزمن.
مقدار مصرف و طرز استعمال: خردسالان: روزی ۰/۵ـ۲ قرص بزرگسالان: روزی ۲ ـ ۴ قرص قبل از غذا.
بسته بندی: قرص × ۳۰.

N

بها: ۵۴ ریال.

NEO CODION Adult
بوشارا ـ فرانسه

ترکیب: در هر ۱۰۰ گرم: ویتامین C ۱/۲۵ گرم + کدئین کامفوسولفونات ۰/۰۸ گرم + کداتیلین کامفوسولفونات ۰/۰۶ گرم + بروموفرم ۰/۰۱ گرم + تنطور ریشه آکونیت ۰/۰۵ گرم + آب لوریه‌سریز ۲/۵ گرم + سولفات منیزیم ۰/۶۲ گرم + شربت اپیکاکوانا ۲۵ گرم + شربت تلو ۳۰ گرم + الکل ۹۰ درجه ۳ گرم + گلیسرین ۱/۴ گرم.

موارد استعمال: سرفه‌های ناشی از استعمال دخانیات، لارنژیت، تراکئیت، لارنژوتراکئیت، سرفه های عصبی و تحریکی، آنفلوانزا آسم برونشیال، آمفیزم ریوی، برنشیت حاد و مزمن.

مقدار مصرف و طرز استعمال: روزی ۳ ـ ۴ بار، هربار یک قاشق غذاخوری.

موارد منع استعمال: خردسالان و نوزادان.

بسته‌بندی: شربت ۱۸۰ میلی‌لیتر.

بها: ۱۱۵ ریال.

NEO CODION Enfant
بوشارا ـ فرانسه

ترکیب: در هر ۱۰۰ گرم: ویتامین C ۰/۷۵ گرم + کامفو سولفونات کدئین ۰/۰۶ گرم + کامفوسولفونات کداتیلین ۰/۰۳ گرم + برموردسدیم ۱ گرم + بنزوات سدیم ۱ گرم + تنطور دروزرا ۱ گرم + تنطور گراندلیا + تنطوربلادن ۰/۰۳ گرم + سولفات منیزیم ۰/۴۳ گرم + برگ‌سنه + سرپوله + برگ کوکولیکو + شربت کاپیلر + شربت بم‌دوتلو ۲۵ گرم + شربت اپیکا ۴۷/۴۵ گرم.

موارد استعمال: سرفه‌های اسپاسمودیک، سرفه های عصبی، لارنژیت، لارنکوتراکئیت.

مقدار مصرف و طرز استعمال: روزی ۳ بار، هربار برحسب سن یک قاشق مرباخوری یا سوپخوری.

بسته‌بندی: شربت خردسالان ۹۰ میلی‌لیتر.

بها: ۵۸/۵ ریال.

NEO CORTEF Eye, Ear
آپجان ـ آمریکا

ترکیب: سولفات نئومایسین + استات هیدرو- کورتیزون.

موارد استعمال: درمان و معالجه التهابات یا پیشگیری عفونتهای قسمت قدامی چشم، بیماریهای التهابی مجرای گوش.

مقدار مصرف و طرز استعمال: قطره چشمی: روزی ۳ ـ ۴ بار، هربار ۱ ـ ۲ قطره، قطره گوش: ۲ ـ ۳ قطره، پماد چشمی: روزی ۱ ـ ۳ بار، پماد گوش: روزی ۳ ـ ۴ بار.

موارد منع استعمال: سل، عفونتهای حاد چرکی و قارچی چشم، عفونتهای ویروسی قرنیه و مخاط چشم.

بسته بندی: قطره ۱/۵ درصد و ۰/۵ درصد ۵ میلی‌لیتر. پماد ۰/۵ درصد و ۱/۵ درصد ۳/۵ گرم.

بها: قطره ۱/۵ درصد ۱۳۵ ریال، ۰/۵ درصد ۸۵ ریال. پماد ۰/۵ درصد ۵۹ ریال، ۱/۵ درصد ۷۴ ریال.

NEO - CORTEF Ointment
آپجان ـ آمریکا

ترکیب: در هرگرم پماد یک درصد: استات- هیدروکورتیزون ۱۰ میلی‌لیتر+ نئومایسین سولفات. در هرگرم پماد ۲/۵ درصد: هیدروکورتیزون ۳/۵ میلی‌لیتر+ نئومایسین سولفات.

موارد استعمال: آلرژیها و اگزماهای پوستی.

مقدار مصرف و طرز استعمال: روزی ۱ ـ ۳ بار، هربار مقدارکمی از پماد را روی موضع میمالند.

بسته بندی: پماد ۱ درصد ۵ و ۱۰ گرم، ۲/۵ درصد ۵ گرم.

بها: ۱ درصد ۵ گرمی ۵۶ ریال، ۱۰ گرمی ۱۰۹ ریال، ۲/۵ درصد ۲۱۰ ریال.

NEO - CYTAMEN
گلاکسو انگلستان ـ داروپخش ایران

ترکیب: آمپولهای نئوسیتامن ۱۰۰۰ و ۲۰۰۰ بترتیب دارای محلول استریل ۱۰۰۰ و ۲۰۰۰ میکروگرم

هیدروکسوکبالامین ـ ویتامین B_{12}.

موارد استعمال: آنمی پرنیسیوز، دژنراسیون تحت حاد نخاع شوکی، تظاهرات مغزی ناشی از کمبود ویتامین B_{12}، کم‌خونی ما کروسیتر تغذیه‌ای، نورالژی ها.

مقدار مصرف و طرز استعمال: شروع: ۱۰۰۰ میکروگرم، ۲ـ۳ بار در هفته تا بهبود بیماری مشهود شود. در ۲ـ۴ تزریق اول میتوان ۲۰۰۰ میکروگرم بکار برد. ادامه: ۱۰۰۰ میکروگرم در ماه.

بسته‌بندی: آمپول ۱۰۰۰ × ۵ و ۱۰۰ آمپول ۲۰۰۰ × ۵ و ۱۰۰

بها: ۱۰۰۰ میلی ۵ عددی ۱۰۵ ریال، ۱۰۰ عددی ۲۱۰۰ ریال، ۲۰۰۰ میلی ۵ عددی ۱۱۷ ریال، ۱۰۰ عددی ۲۳۴۰ ریال.

NEO DECADRON

مرك شارپ اند دوهم
آمریکا ـ ایران

ترکیب: دگزامتازون فسفات سدیم + نئومایسین.

موارد استعمال: کلیه ضایعات قسمت قدامی چشم، نورودرماتیت موضعی، درماتیت سبوریک، اوتیت خارجی.

مقدار مصرف و طرز استعمال: روزی ۲ـ۳ بار پماد استعمال شود.

موارد منع استعمال: سل چشمی، آبله و آبله مرغان.

بسته‌بندی: پماد چشمی ۳/۵ گرمی.

بها: ۷۰ ریال.

NEODIACINE

دیامان ـ فرانسه

ترکیب: سولفات نئومایسین.

موارد استعمال: بیماریهای ناشی از میکرب‌های حساس به‌نئومایسین.

مقدار مصرف و طرز استعمال: بزرگسالان: روزی ۶ـ۸ قرص خردسالان: روزی ۲ـ۴ قرص یا ۴ـ۸ پیمانه. شیرخواران: روزی ۱ـ۲ قرص یا ۲ـ۴ پیمانه.

موارد منع استعمال: افراد حساس به‌نئومایسین. مصرف طولانی.

بسته‌بندی: قرص ۲۵۰ میلی‌گرم × ۱۶. پودر ۲۵ گرم معادل ۱/۲۵ گرم نئومایسین باز.

بها: قرص ۲۱۸ ریال. پودر ۸۲ ریال.

NEO - DRIL
سیسین ـ ایران

ترکیب: پرومتازین.
موارد استعمال: تمام حالات حساسیت و آنافیلاکسی.
مقدار مصرف و طرز استعمال: بزرگسالان: روزی ۳ بار، هربار یک قاشق مرباخوری. خردسالان: ۱ ـ ۳ قاشق چای‌خوری.
بسته بندی: شربت ۱۲۰ میلی‌لیتر.
بها: ۴۲ ریال.

NEOFORTAMINE
ویرا ـ ایران

ترکیب: در هر ۱۰۰ میلی‌لیتر: سیترات دوفرآمونیا کال ۵ گرم + ویتامین B_{12} ۱۰۰۰ گاما.
موارد استعمال: انواع کم خونیها، بی‌اشتهائی، ضعف‌اعصاب، آستنی.
مقدار مصرف و طرز استعمال: روزی ۳ بار، هربار یک قاشق سوپخوری.
بسته بندی: شربت ۱۲۰ میلی‌لیتر.
بها: ۳۵ ریال.

NEOGYNON
شرینگ ـ آلمان

N

ترکیب: نورژسترول ۰/۲۵ میلی‌گرم + اتی‌نیل استرادیول ۰/۰۵ میلی‌گرم.
موارد استعمال: جلوگیری از آبستنی، دیسمنوره بدون علت عضوی، آندومتریوز، نازائی فونکسیول، بی‌نظمی‌های قاعدگی (قاعدگیهای مکرر یا زیاد).
مقدار مصرف و طرز استعمال: در اولین دوره درمان روزی ۱ قرص از روز پنجم تا ۲۵ قاعدگی.
موارد منع استعمال: سرطان پستان یا سرطان مجاری تناسلی، فیبروئید.
بسته بندی: قرص × ۲۱.
بها: ۷۰ ریال.

NEO - HEPACON
دلکن ـ آمریکا

ترکیب: در هر ۱۰۰ میلی‌لیتر: ویتامین B_1 ۷ میلی‌گرم + ویتامین B_2 ۴ میلی‌گرم + ویتامین B_6 ۷ میلی‌گرم + ویتامین PP ۸۰ میلی‌گرم + ویتامین B_{12} ۱۰۰ میکروگرم + آهن ۴۱۰ میلی‌گرم + کبالت ۱/۴ میلی‌گرم + منگنز ۱/۷ میلی‌گرم + مس ۲/۸

میلی‌گرم + عصاره جگر ۷۰ گرم + عصاره طحال ۱۵ گرم + عصاره مخاط معده ۷ گرم + هیستیدین ۱۶۰ میلی‌گرم + آرژینین ۷۰ میلی‌گرم + متیونین ۶۵ میلی‌گرم + تریپتوفان ۶۴ میلی‌گرم + تیرونین ۱۷۰ میلی‌گرم + تریوزین ۱۴۰ میلی‌گرم + اسید گلوتامیک ۲۰۰ میلی‌گرم.

موارد استعمال: هیپوپروتئینمی، کمبود ویتامین های فوق، کم‌خونیهای مختلف، آبستنی، سوختگیها، کمی اشتها.

مقدار مصرف و طرز استعمال: بزرگسالان: روزی ۴ بار، هربار ۱ قاشق سوپخوری در نصف استکان آب. خردسالان: روزی ۴ بار، هربار یک قاشق چایخوری.

بسته بندی: شربت ۱۰ میلی‌لیتر.

بها: ۷۳ ریال.

NEO - KLIMASTILBEN

ابو-اتریش

ترکیب: دینسترول ۰/۰۳ میلی‌گرم + متیل - تستوسترون ۴ میلی‌گرم + تئوبرومینوم پوروم ۶۶ میلی‌گرم + فنیل - اتیل باربیتوریک اسید ۱۵ میلی‌گرم + کاربا کول ۰/۵ میلی‌گرم.

موارد استعمال: کلیه عوارض ناشی از یائسگی طبیعی یا مصنوعی.

مقدار مصرف و طرز استعمال: روزی ۲ ـ ۳ بار، هر بار ۱ ـ ۲ قرص.

بسته بندی: دراژه × ۲۰.

بها: ۵۳ ریال.

NEO -MEDROL Veriderm

آپجان-آمریکا

ترکیب: سولفات نئومایسین ۲/۵ میلی‌گرم + مدرول = استات متیل پردنیزولون ۵ میلی‌گرم.

موارد استعمال: درماتیتهای تماسی، نورودرماتیت، اگزماآلرژیک، کهیر، درماتیت سبوریک.

مقدار مصرف و طرز استعمال: روزی ۳ بار، هربار مقدار کمی از پماد را بعد از تمیز کردن موضع روی پوست میمالند.

موارد منع استعمال: سل و عفونتهای پوستی.

بسته بندی: پماد ۰/۲۵ درصد ۷/۵ گرم.

بها: ۸۹ ریال.

NEO-MEDROL ACNE Lotion
آپجان ـ آمریکا

ترکیب: در هر میلی‌لیتر: مدرول ـ استات ـ متیل پردنیزولون ۲/۵ میلی‌گرم + سولفات نئومایسین ۵ میلی‌گرم + کلرهیدرکسید آلومینیوم کمپلکس ۱۰۰ میلی‌گرم + گوگرد کلوئیدال ۵۰ میلی‌گرم.

موارد استعمال: آکنه ولگاریس، آکنه روزاسه، درماتیت سبورئیک.

مقدار مصرف و طرز استعمال: پس از تمیز کردن موضع یک یا دومرتبه در روز میمالند.

موارد منع استعمال: عفونت های جلدی.

احتیاط: از تماس با چشم خودداری شود.

بسته بندی: محلول ۲۵ میلی‌لیتری.

بها: ۱۵۲ ریال.

NEO-MERCAZOLE
شرینگ ـ انگلستان

ترکیب: در هر قرص: کاربی‌مازول ۵ میلی‌گرم.

موارد استعمال: ازدیاد ترشح غده تیروئید.

مقدار مصرف و طرز استعمال: برحسب نوع و شدت بیماری روزی ۱ - ۱۲ قرص.

موارد منع استعمال: زنان شیرده.

احتیاط و عوارض جانبی: در اثر مصرف با مقادیر زیادتر از حدلازم امکان بروزهیپوتیروئیدیسم میرود که با کم کردن مقدار دارو از بین میرود.

بسته بندی: قرص × ۱۰۰.

بها: ۱۴۷ ریال.

NEOMIN
گلاکسو انگلستان
ـ داروپخش ایران

ترکیب: در هر ۲ قاشق مرباخوری شربت: نئومایسین ۱۲۵ میلی‌گرم.

موارد استعمال: گندزدائی برای تدارک بیمار جهت جراحی معده و روده، دیسانتری ناشی از سوشهای مختلف شیگلا، اسهال کودکان.

مقدار مصرف و طرز استعمال: روزانه ۵۰ میلی‌گرم برای هر کیلو وزن که بدفعات متعدد داده می‌شود.

بسته بندی: شربت ۶۰ میلی‌لیتر.

بها: ۵۹ ریال.

NEOMYCINE + HYDROCORTISONE

پ اواس فرانسه ـ دوپار ایران

ترکیب: در هر ۱۰۰ میلی‌لیتر: استات هیدروکورتیزون ۱ گرم + سولفات نئومایسین ۰/۳۵ گرم.

موارد استعمال: ضایعات التهابی قسمت قدامی چشم، کراتیت، اگزمای پلکها، بلفاریت، ایریتیس، گلوکوم ثانویه.

مقدار مصرف و طرز استعمال: موارد شدید: هر ۱ ـ ۲ ساعت ۱ ـ ۲ قطره در چشم می‌چکانند. موارد خفیف: روزی ۳ ـ ۴ بار، هربار ۱ ـ ۲ قطره در چشم می‌چکانند.

موارد منع استعمال: بیماریهای ویروسی چشم.

بسته بندی: قطره چشمی ۲/۵ میلی‌لیتر.

بها: ۴۷ ریال.

N

NEO - PECT

میسین ـ ایران

ترکیب: کلریدرات دی‌فن هیدرامین ۰/۲۷ گرم + کلرورآمونیوم ۲/۶۳ گرم + نیترات سدیم ۱/۱ گرم + کلروفرم ۰/۳ میلی‌لیتر.

موارد استعمال: سرفه و التهابات مجاری تنفس.

مقدار مصرف و طرز استعمال: روزی ۳ ـ ۴ بار، هربار ۱ ـ ۲ قاشق مرباخوری.

بسته بندی: شربت ۱۲۰ میلی‌لیتر.

بها: ۵۳ ریال.

NEOPHERINE

پ اواس فرانسه ـ دوپار ایران

ترکیب: کلریدرات فنیل افرین.

موارد استعمال: قطره چشمی: معاینه ته‌چشم، ابریتیس و ایریدوسیکلیت، اووئیت هیپرتانسیو، گلوکوم مزمن. قطره بینی: سرماخوردگی، رینیت حاد و مزمن، زکام یونجه، سینوزیتها، احتقان شیپور- استاش.

مقدار مصرف و طرز استعمال: قطره چشمی: ۱ ـ ۲ قطره در هر چشم می‌چکانند. قطره بینی: خردسالان: ۱ ـ ۳ قطره هر ۳ ـ ۴ ساعت. بزرگسالان: ۳ ـ ۴ قطره هر ۳ ـ ۴ ساعت در هر بینی می‌چکانند.

بسته بندی: قطره چشمی ۳ درصد، ۵ درصد و ۱۰ درصد ۱۰ میلی‌لیتر. قطره‌بینی ۰/۲۵ درصد و ۱ درصد.

بها: قطره چشمی ۳ درصد ۷۶ ریال، ۵ درصد ۸۲ ریال، ۱۰ درصد ۸۸ ریال. قطره بینی ۰/۲۵ درصد ۴۱ ریال ۱ درصد ۴۷ ریال.

NEO - SYNEPHRINE
وینتروپ آمریکا ـ ایران

ترکیب: لـوو ـ ۱ ـ (متـا ـ هیدروکسی فنیـل) ـ ۲ ـ متیل آمینو اتانول = کلریدرات فنیل افرین.

موارد استعمال: سرماخوردگی، آبریزش بینی، رینیت بعلت عوامل مختلف، سینوزیت حاد و مزمن، تب یونجه، آلرژی، خونریزی بینی، بسته بودن لوله استاش و آماده کردن بینی برای جراحی.

مقدار مصرف و طرز استعمال: ۱ ـ ۳ قطره در هر سوراخ بینی می‌چکانند.

احتیاط: در بیماران مبتلا به‌فشارخون و یا ضایعات قلبی ـ عروقی پیشرفته و یا هیپرتیروئیدی باید با احتیاط مصرف شود.

بسته بندی: قطره بینی ۰/۲۵، ۰/۵ و ۱ درصد ۳۰ میلی‌لیتر.

بها: ۰/۲۵ درصد ۴۷ ریال، ۰/۵ درصد ۵۳ ریال، ۱ درصد ۵۹ ریال.

NEO - TIZID
کارلوارباـ ایتالیا

ترکیب: کلسیم متـان سولفـونـات ایزونیکوتینیک هیدرازیـد ۵۰ میلی‌گرم.

موارد استعمال: درمان سل و برونشیت‌های مزمن و بطور کلی در عفونت‌های میکوباکتریوم.

مقدار مصرف و طرز استعمال: بطور متوسط: روزی ۸ ـ ۱۴ قرص.

بسته بندی: قرص × ۵۰.

بها: ۲۵ ریال.

NEO - VOGAN
مرک ـ آلمان

ترکیب: در هر کپسول: ویتامین A ۵۰ هزار واحد.

موارد استعمال: بیماری بازدو، لاغری، ناراحتیهای جهاز هاضمه،

N

شبکوری، ریزش مو، ضایعات ناخن.
مقدار مصرف و طرز استعمال: روزی ۱ ـ ۲ کپسول.
بسته بندی: کپسول × ۲۰.
بها: ۱۵۰ ریال.

NERISONA
NERISONA C
شرینگ آلمان ـ ایران

ترکیب: ۶ آلفا، ۹ ـ دی فلوئورو ـ ۱۱ بتا ـ هیدروکسی ـ ۱۶ آلفا ـ متیل ـ ۲۱ ـ والریل اوکسی ـ ۱، ۴ ـ پرگنادین ـ ۳، ۲۰ ـ دیون = دی فلوکورتولون ۰/۱ درصد نریزونا C: دی فلوکورتولون + کلرکینالدول.
موارد استعمال: درماتیت تماسی، اکزمای شغلی و تماسی، نورودرماتیت، پسوریازیس، لوپوس اریتماتوز.
مقدار مصرف و طرز استعمال: روزی ۲ ـ ۳ بار لایه نازکی از پماد را میمالند.
موارد منع استعمال: سل پوستی و سیفلیس پوست، بیماریهای ویروسی جلدی.
عوارض جانبی: مانند سایر کورتیکوئیدها در صورتیکه برای مدت طولانی بکار رود باعث آتروفی موضعی، اتساع رگها، تغییرات آکنه شکل پوست میگردد.
بسته بندی: پماد، کرم و پماد چرب ۳۰ گرم، نریزوناC فقط پماد.
بها: ۳۰۰ ریال.

NESDONAL
اسپسیا ـ فرانسه

ترکیب: منوسدیم ۵ ـ اتیل ۵ ـ (۱ ـ متیل بوتیل) تیوباربی‌تورات = تیوپنتال سدیم.
موارد استعمال: بیحسی در جراحی عمومی و جراحی توراسیک.
مقدار مصرف و طرز استعمال: تزریق داخل وریدی.
موارد منع استعمال: جراحی سر وگردن، نارسائی شدید احشائی، جراحی اطفال.
بسته بندی: ویال ۱ و ۰/۵ گرم × ۲۰.
بها: ویال ۱ گرمی ۸۰۳ ریال، ۰/۵ گرمی ۶۱۴ ریال.

N

NEULEPTIL
اسپسیا ـ فرانسه

ترکیب: ۲ ـ سیانو ـ ۱۰ ـ ۳ ـ (۴ ـ هیدروکسی پیپریدینو) پروپیل ـ فنوتیازین = پروپری‌سیازین.

موارد استعمال: عدم تعادل دستگاه عصبی نباتی، اختلالات خلقی و رفتاری، عقب‌افتادگان روانی، افراد الکلیک، افسردگی خفیف، دردهای پسیکوسوماتیک.

مقدار مصرف و طرز استعمال: پیرمردان: از ۵ تا ۳۰ میلی‌گرم. بزرگسالان: ۳۰ ـ ۷۰ میلی‌گرم. خردسالان: ۱ میلی‌گرم برای هر سال از سن. کوچکتر از ۱۰ سال: روزی ۱ میلی‌گرم، بعد از ۳ روز ۲ میلی‌گرم اضافه میشود تا به ۱۰ میلی‌گرم برسد.

عوارض جانبی: خواب‌آلودگی.

بسته بندی: کپسول ۱۰ میلی‌گرم × ۵۰، قطره ۴ درصد ۱۰ میلی‌لیتر.

بها: کپسول ۱۴۰ ریال. قطره ۹۱ ریال.

NEUROBION
مرك آلمان ـ ایران

ترکیب: در هر آمپول: ویتامین B_1 ۱۰۰ میلی‌گرم + ویتامین B_6 ۱۰۰ میلی‌گرم + ویتامین B_{12} ۱۰۰۰ میکروگرم. در هر دراژه: ویتامین B_1 ۱۰۰ میلی‌گرم + ویتامین B_2 ۲۰۰ میلی‌گرم + ویتامین B_{12} ۲۰۰ میکروگرم.

موارد استعمال: پلی‌نوریت‌ها، نورالژیها، متعاقب جراحی دیسک بین مهره‌ای.

مقدار مصرف و طرز استعمال: در موارد شدید: تزریق روزانه یک آمپول تا برطرف شدن علائم حاد بیماری و سپس هفته‌ای ۲ ـ ۳ تزریق. دراژه: روزی ۳ ـ ۶ عدد.

احتیاط: تزریق داخل وریدی ممکن است بیمار را دچار حادثه آلرژیک نسبت به‌ویتامین B_1 بنماید و از نظر پیشگیری تزریق باید با کمال آهستگی انجام گیرد.

بسته بندی: آمپول × ۳. دراژه × ۱۰۰.

بها: آمپول ۱۰۵ ریال. دراژه ۵۸۵ ریال.

N

NEUROCHOLINE
تولیدارو-ایران

ترکیب: سیتیدین دی‌فسفات کولین.

موارد استعمال: بیهوشی در اثر ضربه‌های مغزی و جراحیهای مغز، شوک مغزی آنسفالوپاتی حاد، بیهوشی سمی و متابولیک، بهوش آوردن سریع بیمار در جریان بیهوشی با مواد مخدر و هوش بر، نوروپاتی‌های با منشأ عصبی.

مقدار مصرف و طرز استعمال: برحسب شدت ضربه متفاوت است.

موارد منع استعمال: خونریزی یا مشکوک به‌خونریزی مغزی.

بسته‌بندی: آمپول ۱۰۰ میلی‌گرم × ۵.

بها: ۵۱۵ ریال.

NEUROGLUTAMINE
ابو-اتریش

ترکیب: ال (+)-گلوتامیک اسید.

موارد استعمال: ضعف و اختلال حافظه، نوروز، عوارض مغزی ناشی از زیادی فشارخون، دیستروفی پیشرونده عضلانی در صرع.

مقدار مصرف و طرز استعمال: روزی ۳-۱۲ قرص یا ۱-۴ قاشق مرباخوری ازگرانول در ۳ قسمت مساوی.

بسته‌بندی: قرص ۰/۵ گرم × ۱۰۰، گرانول ۶۶/۵درصد × ۱۰۰ گرم.

بها: قرص ۱۴۹ ریال. گرانول ۱۵۰ ریال.

NEUROLIBRINE
آی دی آی-ایران

ترکیب: کلرو-۱، ۳-دی هیدرو-۱ متیل-۵ فنیل-۲N-۱، ۴ بنزودیازپین-۲ اون = دیازپام.

موارد استعمال: فشار عصبی، تشویش و نگرانی، بیخوابی، پسیکونوروز خستگی، الکلیسم حاد، اسپاسم عضلانی.

مقدار مصرف و طرز استعمال: برحسب نوع و شدت بیماری متفاوت است.

موارد منع استعمال: مصرف توام با الکل، حساسیت به‌دارو، گلوکوم.

عوارض جانبی: سرگیجه، خشکی دهان، هیپرتانسیون، کاهش قدرت رانندگی.

بسته‌بندی: کپسول ۲، ۵ و ۱۰ میلی‌گرم × ۱۲.

بها: ۲ میلی ۳۵ ریال، ۵ میلی ۵۹ ریال، ۱۰ میلی ۸۴ ریال.

NEUTRAPHYLLINE
هوده ـ فرانسه

ترکیب: در هر قرص: ۲ ـ دی ئیدروکسی پروپیل ـ ۷ ـ تئوفیلین = دیپروفیلین ۱۵۰ میلی‌گرم. در هر آمپول: ۳۰۰ میلی‌گرم. در هر شیاف بزرگسالان ۴۰۰ میلی‌گرم. در هر شیاف خردسالان ۱۵۰ میلی‌گرم.

موارد استعمال: بعنوان برونکودیلاتاتور، آنالپتیک، دیورتیک، اسپاسمولیتیک.

مقدار مصرف و طرز استعمال: روزی ۱ ـ ۲ تزریق داخل وریدی یا عضلانی آمپول، ۳ ـ ۶ قرص، ۱ ـ ۲ شیاف.

بسته بندی: آمپول ۳ میلی‌لیتر × ۶. قرص × ۳۰. شیاف خردسالان × ۶. شیاف بزرگسالان × ۶.

بها: آمپول ۴۶ ریال. قرص ۳۶ ریال. شیاف خردسالان ۲۱ ریال، شیاف بزرگسالان ۴۱ ریال.

NEUTRAPHYLLINE
Phenobarbital
هوده ـ فرانسه

ترکیب: در هر قرص: دیپروفیلین ۰/۱۶ گرم + فنوباربیتال ۰/۰۱ گرم. در هر شیاف: دیپروفیلین ۰/۴ گرم + فنوباربیتال ۰/۰۶ گرم.

موارد استعمال: اختلالات نوروو‌ژتاتیو، اختلالات و تحریکات دستگاه اعصاب مرکزی، حالات پریشانی، بیخوابیها.

مقدار مصرف و طرز استعمال: قرص: روزی ۳ ـ ۶ عدد. شیاف: روزی ۱ ـ ۳ عدد.

بسته بندی: قرص × ۳۰. شیاف × ۶.

بها: قرص ۳۶ ریال. شیاف ۴۱ ریال.

NEUTRAPHYLLINE
Papavérine Phenobarbital
هوده ـ فرانسه

ترکیب: در هر قرص: دیپروفیلین ۰/۱۵ گرم + کلریدرات پاپاورین ۰/۰۴ گرم + فنوباربیتال ۰/۰۱ گرم. در هر شیاف دیپروفیلین ۰/۴ گرم + کلریدرات پاپاورین ۰/۰۸ گرم + فنوباربیتال ۰/۰۶ گرم.

موارد استعمال: اختلالات کرونر، آنژین دوپواترین، نارسائی بطن چپ، افزایش فشار شریانی، آسم، تنگی نفس.

مقدار مصرف و طرز استعمال: قرص: روزی ۳ـ۶ عدد. شیاف: روزی ۱ـ۳ عدد.

بسته بندی: قرص × ۲۵. شیاف × ۶.

بها: قرص ۵۰ ریال شیاف ۴۶ ریال.

NEUTROGENA
فرومونت ـ بلژیک

ترکیب: تری اتانولامین + گلیسرین (با ۷/۵ pH).

موارد استعمال: مخصوص شستشوی پوست و مو.

بسته بندی: صابون ۱۰۰ گرم.

بها: ۸۸ ریال.

NEW C-TAB
لپتی ایتالیا ـ ایران

ترکیب: ویتامین C.

موارد استعمال: اسکوربوت، بیماریهای عفونی، خونریزی از لثه‌ها، دوران رشد و نمو، دوران آبستنی و شیردادن برای ازدیاد قوای بدن.

مقدار مصرف و طرز استعمال: بزرگسالان: روزی ۲ـ۳ قرص. خردسالان: روزی ۱ـ۲ قرص.

بسته بندی: قرص جوشان ۱ گرم × ۱۰.

بها: ۵۹ ریال.

NEW PECTOVITE
لپتی ایتالیا ـ ایران

ترکیب: در هر ۱۰۰ میلی‌لیتر: گلیسریل گایاکولات ۲ گرم + بنزوات سدیم ۲ گرم + عصاره مایع تولو ۱/۴ گرم + کلرپروفن پیریلامین ۱۰ میلی‌گرم + دکسترومتورفان ۱۰۰ میلی گرم. در هر قرص: فنیل اتیل باربیتوریک اسید ۱۵ میلی‌گرم + دکسترومتورفان ۲۱ میلی‌گرم + ترپین هیدرات ۱۴۰ میلی‌گرم + بنزوات سدیم ۱۵۰ میلی‌گرم.

موارد استعمال: گریپ، سرفه‌های تشنجی، لارنژیت، تراکئیت، برونشیت حاد، پنومونی، پلورزی.

مقدار مصرف و طرز استعمال: روزی ۳ بار، هربار ۱ قرص. شربت هر ۳ ساعت یک قاشق غذاخوری.

N

بسته بندی: شربت ۱۲۰ میلی‌لیتر. قرص × ۶.
بها: شربت ۵۳ ریال، قرص ۱۴ ریال.

NIBIOL FORT
دبا ـ فرانسه

ترکیب: در هر قرص: نیترو ـ ۵ ـ ئیدروکسی ۸ کینولئین ۱۰۰ میلی‌گرم.
موارد استعمال: پیلونفریت، سیستیت‌های معمولی و باقیمانده از جراحی، مثانه عفونت یافته، آدنومهای عفونی، پروستاتیت.
مقدار مصرف و طرز استعمال: روزی ۳ ـ ۴ بار، هربار ۲ قرص بمدت ۱۵ تا ۲۰ روز.
بسته بندی: قرص × ۵۰.
بها: ۱۵۵ ریال.

NICICALCIUM
هپاترول ـ فرانسه

ترکیب: گلوکونات کلسیم ۰/۵ گرم + نیکوتینات کلسیم ۰/۰۲ گرم + ویتامین C ۰/۱ گرم + کلرورمنیزیم ۰/۱ گرم.
موارد استعمال: زنان آبستن و بانوان شیرده، خردسالان، دوران رشد، نقاهت.
مقدار مصرف و طرز استعمال: روزی ۱ ـ ۲ عدد در آب حل کرده بعد از غذا میل شود.
بسته بندی: آمپول ۱۰ میلی‌لیتر × ۱۸.
بها: ۱۷۱ ریال.

NICOBION - 500
لوبات‌وبوانو ـ فرانسه

ترکیب: آمید نیکوتی‌نیک = ویتامین PP.
موارد استعمال: اختلالات دستگاه هاضمه، اختلالات جلدی ـ عصبی و روانی، پیشگیری و درمان اختلالات ناشی از درمان با طلا یا آنتی‌توبرکولوزها.
مقدار مصرف و طرز استعمال: روزی ۱ ـ ۲ قرص.
بسته بندی: قرص ۵۰۰ میلی‌گرم × ۳۰.
بها: ۸۶ ریال.

N

NICOREX
ویرا-ایران

ترکیب: در هر ۱۰۰ گرم: نیکتامید ۲۵ گرم.
مکانیسم: نیکتامید با تحریک و حساس کردن مرکز تنفس به Co_2 و نیز تحریک سینوس کاروتید تنفس را تشدید میکند.
موارد استعمال: اختلالات قلبی و تنفس، برونشیتها، آبستنی، غش و سنکوب، خفگی نوزادان و خفگی ناشی از مسمومیتها.
مقدار مصرف و طرز استعمال: روزی ۳ بار هر بار ۲۰ ــ ۵۰ قطره.
بسته بندی: قطره‌خوراکی ۲۵ درصد ۱۵ میلی‌لیتر.
بها: ۲۹ ریال.

NICOTHERM
ابو-اتریش

ترکیب: هگزیل نیکوتی‌نیک.
موارد استعمال: آکروسیانوز، اختلال ناشی از فلج اعصاب محیطی، اختلال در اعصاب مویرگها، سرمازدگی پوست، آرتریت روماتوئید.
مقدار مصرف و طرز استعمال: پماد بصورت ورقه نازکی روی ضایعه گذاشته شود. اثر دارو معمولاً ۱۰ دقیقه بعد از مصرف ظاهر میشود.
احتیاط: از تماس دارو با چشمها باید جلوگیری شود.
بسته بندی: پماد ۲/۵ درصد ۲۵ گرم.
بها: ۳۳ ریال.

NICYL
لومات‌ویوانو-فرانسه

ترکیب: آمپول: نیکوتینات سدیم ۵۰ سانتی‌گرم، قرص: اسید- نیکوتینیک ۱ سانتی‌گرم.
موارد استعمال: اشکال مختلف سردرد، میگرن، آمبولی عروق کوچک، آکروسیانوز، روماتیسمهای وازوموتور، ترومبوز شریان و ورید مرکزی شبکیه، گلوکوم مزمن، نوریت سمی.
مقدار مصرف و طرز استعمال: روزی ۰/۵ ــ ۴ آمپول از راه عضلانی یا زیرجلدی. قرص: روزی ۲ ــ ۳۰ عدد.
احتیاط: واکنشهای شخصی بخصوص در مواردی که از راه وریدی مصرف میشود باید در نظرگرفته شوند.

N

عوارض جانبی: سرخی صورت، پورپورآ، کهیر، تهوع، استفراغ، اسهال.
بسته بندی: قرص × ۲۰۰. آمپول ۱ میلی‌لیتر × ۸.
بها: قرص ۵۴ ریال. آمپول ۳۷ ریال.

NICYL B6
لوبات وبوانو ــ فرانسه

ترکیب: در هر قرص: اسید نیکوتینیک ۰/۰۲ گرم + ویتامین B_6 ۰/۲۵ گرم.
موارد استعمال: تصلب شرائین، افزایش مقدار کلسترول خون، ضایعات قلبی عروقی، اختلالات متابولیک دوران پیری.
مقدار مصرف و طرز استعمال: روزی ۲ ــ ۴ بار، هربار ۱ قرص.
بسته بندی: قرص × ۲۰.
بها: ۱۲۵ ریال.

NICYL Papaverine
لوبات وبوانو ــ فرانسه

ترکیب: در هر قرص: اسید نیکوتی نیک ۱ گرم.
موارد استعمال: آنژین دوپوآترین، سردرد ناشی از افزایش فشارخون، میگرن، آرتریت، آکروسیانوز، روماتیسم وازوموتور.
مقدار مصرف و طرز استعمال: روزی ۲ ــ ۳ بار هربار ۱ ــ ۳ قرص.
بسته بندی: قرص × ۱۰۰.
بها: ۹۶ ریال.

NIKETHON
مینا ــ ایران

ترکیب: نیکتامید ۲۵ درصد.
موارد استعمال: تنظیم کننده ضربان قلب، محرک تنفسی، دپرسیون‌های تنفسی.
مقدار مصرف و طرز استعمال: روزی ۳ بار، هربار ۲۰ ــ ۴۰ قطره.
موارد منع استعمال: تاکی کاردی و بیماری‌هائی که محرک‌های تنفسی برای آنها مضر است.
بسته بندی: قطره خوراکی ۱۵ میلی‌لیتر.
بها: ۲۹ ریال.

N

NISOLON
لپتی ایتالیا ـ ایران

ترکیب: در هر ۱۰۰ میلی‌لیتر: استات ۹ ـ آلفا فلوروپردنیزولون ۲/۵ میلی‌گرم + کلریدرات افدرین ۵۰۰ میلی‌گرم + نیترات نافازولین ۱۲۵ میلی‌گرم.

موارد استعمال: رینیت حاد و مزمن، رینیت آلرژیک، سینوزیت، ورم مخاط بینی بعد از اعمال جراحی.

مقدار مصرف و طرز استعمال: بصورت اسپری: هر ۴ـ۳ ساعت یکبار در هر سوراخ بینی چکانده شود. بصورت قطره: هر ۳ـ۴ ساعت ۱ ـ ۲ قطره در هر سوراخ بینی چکانده می‌شود.

بسته بندی: قطره بینی ۱۵ میلی‌لیتر.

بها: ۶۳ ریال.

NITROCONTIN
ناپ ـ انگلستان

ترکیب: گلیسریل تری نیترات.

مکانیسم: با شل کردن عضلات صاف مویرگها موجب گشادی آنها شده و خون بیشتری به‌قلب میرسد.

موارد استعمال: آنژین صدری، آسم آئورتیت و کاردیاک.

مقدار مصرف و طرز استعمال: روزی ۲ بار، هر بار یک قرص می‌مکند.

موارد منع استعمال: آنمی، کمی فشارخون.

احتیاط: قرص ها نباید بلعیده یا جویده شوند.

بسته بندی: قرص ۶/۴ و ۲/۴ میلی‌گرم × ۱۰۰.

بها: ۶/۴ میلی ۴۰۰ ریال، ۲/۴ میلی ۳۴۰ ریال.

NITROL
کرمس اوربان ـ آمریکا

ترکیب: نیتروگلیسیرین.

موارد استعمال: جلوگیری و درمان حملات قلبی.

مقدار مصرف و طرز استعمال: در ابتدا نیم‌اینچ پماد را توسط کاغذ مخصوص روی قلب می‌مالند، سپس هر ۴ ساعت به ۴ ساعت نیم‌اینچ اضافه کرده تا بمقدار مطلوب که معمولاً ۲ اینچ است برسد. مقدار مطلوب را میتوان قبل از شروع سردرد مشخص نمود.

موارد منع استعمال: آنمی، کمی فشارخون.

بسته بندی: پماد ۲ درصد ۲۸ گرم.
بها: ۱۷۰ ریال.

NITROLENT
مدینوا ـ سویس

ترکیب: نیتروگلیسیرین روتارد ۲/۵ میلی‌گرم.
موارد استعمال: پیشگیری و درمان حملات آنژین دوپواترین و بازکننده عروق کرونر.
مقدار مصرف و طرز استعمال: روزی ۲ بار، هربار یک کپسول قبل از غذا بلعیده شود.
موارد منع استعمال: گلوکوم.
عوارض جانبی: سردرد بسیار خفیف و کاهش فشارخون.
بسته بندی: کپسول میکروگرانول روتارد × ۳۰.
بها: ۲۵۰ ریال.

NITROLINGUAL
پل بوسکمپ ـ آمریکا

ترکیب: نیتروگلیسیرین.
موارد استعمال: جلوگیری و درمان حملات قلبی.
مقدار مصرف و طرز استعمال: بشکل اسپری استنشاق میشود.
بسته بندی: اسپری ۰/۴ میلی‌گرم.
بها: ۲۵۰ ریال.

NITRONG
اتیکالز ـ آمریکا

ترکیب: در هر قرص نیتروگلیسیرین ۲/۶ میلی‌گرم.
مکانیسم: با شل کردن عضلات صاف مویرگها موجب گشادی آنها شده خون بیشتری به‌قلب میرسد.
موارد استعمال: آنژین صدری.
مقدار مصرف و طرز استعمال: بعد از مکیده شدن در زیر زبان بمدت ۱۰ ـ ۱۲ ساعت تأثیر درمانی دارد.
بسته بندی: قرص × ۱۰۰.
بها: ۴۳۰ ریال.

NIVAQUINE
اسپسیا ـ فرانسه

ترکیب: ۷ ـ کلرو ۴ ـ (۴ ـ دی‌اتیل آمینو ۱ ـ متیل بوتیل‌آمینو) کینولئین = کلروکین.

موارد استعمال: مالاریای حاد، آمیبیاز کبدی، لامبیلیاز، لوپوس ـ اریتماتوز، بیماریهای کولاژن، پلی‌آرتریت.

مقدار مصرف و طرز استعمال: برحسب شدت بیماری متفاوت است.

بسته بندی: قرص ۱۰۰ میلی‌گرم × ۲۰، آمپول ۳۰۰ میلی‌گرم = ۳ میلی‌لیتر × ۵.

بها: قرص ۲۴ ریال. آمپول ۶۰ ریال.

NOBACTER
شانترو ـ فرانسه

ترکیب: ترکیبات صابون + تری کلر کاربانیلید ۱ درصد.

موارد استعمال: ضدعفونی پوست، جوش صورت، شوره موی سر، ریزش مو.

طرز استعمال: پوست یا موی سر را شستشو می‌دهند.

بسته بندی: صابون ۱۰۰ گرم.

بها: ۱۰۵ ریال.

N

NOLVADEX
آی‌سی‌آی ـ انگلستان

ترکیب: تاموکسی‌فن.

موارد استعمال: سرطان پستان زنان.

مقدار مصرف و طرز استعمال: برحسب شدت عارضه متفاوت است.

بسته بندی: قرص × ۳۰.

بها: ۱۰۴۳ ریال.

NOOTROPIL
یوسی‌بی ـ بیژیک

ترکیب: ۲ ـ پیرولیدون استامید = پیراستام.

موارد استعمال: ضعف حافظه، آستنی، اختلالات عادتی، ضربه‌های مغزی، الکلیسم مزمن و اعتیاد، کوما، کودکان کند ذهن.

مقدار مصرف و طرز استعمال: بزرگسالان: ۱۵ روز اول روزی ۳ بار، هربار ۲ کپسول با هم بعداً هربار یک کپسول بمدت سه‌ماه.
خردسالان: ۳۰ ـ ۵۰ میلی‌گرم برای هر کیلو.

بسته بندی: کپسول ۴۰۰ میلی‌گرم × ۶۰ آمپول ۱ گرم = ۵ میلی‌لیتر ×

۱۲.

بها: کپسول ۷۱۰ ریال، آمپول ۵۸۰ ریال.

NORGESIC

ریکر–فرانسه

ترکیب: ارفنادرین سیترات ۳۵ میلی‌گرم + پاراستامول ۴۵۰ میلی‌گرم.

اثر متقابل: تجویز توأم اُرفنادرین با پروپوکسی‌فن منجر به‌افزایش عوارض جانبی عمومی هر دو میگردد.

موارد استعمال: فیبروزیت، میوزیت، میالژی، کمردرد بامنشاء عضلانی یا روانی، تورتیکولی حاد، کشیدگی و پیچ خوردگی عضلات، رگ‌برگ شدن و دررفتگی‌های مفصلی، دردهای ناشی از دیسک در رفته بین مهره‌ای، دردهای عضلانی حاصل از ورزش‌های شدید، دیسمنوره، سردردهای تانسیونل، دردهای عضلانی ناشی از آنفلوآنزا.

مقدار مصرف و طرز استعمال: روزی ۳ بار، هربار ۲ قرص.

عوارض جانبی: بیقراری، تیرگی شعور و گاهی توهم.

بسته بندی: قرص × ۱۰.

بها: ۲۷۰ ریال.

N

NORLESTRIN Fe

پارك دیویس آمریکا – ایران

ترکیب: در هر قرص زرد: نوراتیندرون استات ۱ میلی‌گرم + اتینیل استرادیول ۰/۰۵ میلی‌گرم. در هر قرص قهوه‌ای: فومارات‌آهن ۷۵ میلی‌گرم.

موارد استعمال: جلوگیری از آبستنی.

مقدار مصرف و طرز استعمال: از پنجمین روز قاعدگی روزانه یک قرص زرد رنگ و بعد از اتمام آخرین قرص روزانه یک قرص قهوه‌ای همراه با شام یا قبل از خواب.

موارد منع استعمال: ترومبوفلبیت، ترومبوآمبولی، آپوپلکسی سوبرال، اختلال کبدی، سرطان پستان، خونریزی غیرعادی.

بسته بندی: دربسته‌های ۲۸ قرصی شامل ۲۱ قرص زرد و ۷ قرص قهوه‌ای.

بها: ۹۴ ریال.

NORMACIDINE
اوا ـ ایران

ترکیب: کلریدرات پاپاورین ۰/۰۴ درصد + ویتامین B_1 ۰/۱ درصد + سولفات آتروپین ۰/۰۱ درصد + فنوباربیتال ۱ درصد + هیدروکسید آلومینیم ۵ درصد + کائولن ۵ درصد + تری‌سیلیکات منیزیم ۵ درصد + کربنات منیزیم ۳۰ درصد + دیاستاز مالت ۱ درصد + پانکراتین ۱ درصد + کربنات کلسیم ۱۴/۵ درصد + بیکربنات سدیم ۳۷/۳ درصد + اسانس مانتول ۰/۰۵ درصد.

موارد استعمال: ترشی و سوزش معده، اسپاسم پیلور، کمک به درمان زخم معده و سوءهاضمه.

مقدار مصرف و طرز استعمال: یک قاشق مرباخوری را در یک لیوان آب یا بیشتر حل کرده و بعد از غذا یا موقع خواب میل میکنند.

بسته بندی: گرد ۱۰۰ گرم.

بها: ۱۱۸ ریال.

N

NORMAL SALINE
باکستر ـ ایران

ترکیب: کلرورسدیم ۰/۹ گرم + آب‌مقطر مقدار کافی تا ۱۰۰ میلی‌لیتر (غلظت سدیم ۱۵۴، کلرور ۱۵۴ میلی‌اکی‌والان).

موارد استعمال: نگهداری تعادل مایعات خارج سلولی، آلکالوز، شوک جراحی یا طبی، اسیدوزدیابتی، خونریزی شدید، نارسائی شدید غده سورنال.

مقدار مصرف و طرز استعمال: معمولا بین ۱ ـ ۳ لیتر از راه پرفوزیون وریدی.

احتیاط: در بیماران قلبی، کبدی، کلیوی یا مبتلایان به‌سوءتغذیه با احتیاط مصرف شود.

بسته بندی: محلول ۵۰۰ و ۱۰۰۰ میلی‌لیتر.

بها: ۵۰۰ میلی ۷۶ ریال، یک‌لیتری ۸۷/۵ ریال.

NORMOGASTRYL
یوپ‌اس آ_فرانسه

ترکیب: در هر قرص جوشان: بیکربنات سدیم ۰/۱۷ گرم + برموسدیم‌انیدر ۰/۲۵ گرم + سولفات‌سدیم انیدر ۰/۲۸۵ گرم + بنزوات‌سدیم ۰/۱۲ گرم + فسفات دی‌سدیک‌انیدر ۰/۱۹۵ گرم.

موارد استعمال: سوء هاضمه، آئروفاژی، اسپاسمهای گوارشی، نارسائیهای کبدی.

مقدار مصرف و طرز استعمال: روزی ۳ بار، هربار ۱ قرص را در نصف لیوان آب حل کرده میل میکنند.

بسته بندی: قرص جوشان × ۴۰.

بها: ۵۵ ریال.

NORMOLIT
آی دی آی_ایران

ترکیب: الکترولیتهای لازم برای بدن.

موارد استعمال: جبران آب و الکترولیتهای بدن در اسهال و استفراغ.

مقدار مصرف و طرز استعمال: هر بسته را در ۲۵۰ میلی‌لیتر آب حل کرده و بتدریج میل می کنند.

بسته بندی: بسته ۲۰ گرم × ۶.

بها: ۷۲ ریال.

NORPRAMIN
لیک‌ساید_آمریکا

ترکیب: کلریدرات دزیپرامین.

اثرمتقابل: ۱ — اثر پائین آورنده فشارخون ناشی ازگوانتیدین بعلت مصرف توام با دزیپرامین خنثی میشود. گفته میشود دوگزپین نسبت به‌دزیپرامین اثر ضدگوانتیدین کمتری دارد. ۲ — فعالیت آنتی کلینرژیک دزیپرامین ممکن است باعث تضاد با اثر پروپرانولول روی عضله قلب گردد.

موارد استعمال: انواع دپرسیونها.

مقدار مصرف و طرز استعمال: شروع: روزی ۱۵۰ میلی‌گرم در ۳ بار که بعد از پیدایش علائم بهبودی کاهش مییابد تا به ۵۰ میلی‌گرم در روز برسد.

موارد منع استعمال: تجویز همراه با داروهای وقفه دهنده منوآمین-

اکسیداز، بیمارانی که نسبت به‌این دارو حساسند، انفارکتوس‌-میوکارد تازه و کسانیکه گوانتیدین مصرف میکنند.
احتیاط: در ناراحتی‌های قلبی عروقی، گلوکوم، اسپاسم‌اورترال، کسانی که داروهای تیروئیدی مصرف می‌کنند، زنان آبستن و در مبتلایان به‌صرع باید با احتیاط مصرف شود.
عوارض جانبی: مشابه آنتی کلینرژیک‌ها.
بسته بندی: قرص ۲۵ و ۵۰ میلی‌گرم × ۳۰.
بها: ۲۵ میلی ۲۳۴ ریال، ۵۰ میلی ۳۵۱ ریال.

NORTRILEN
لوندبک ـ دانمارك

ترکیب: نورتری‌پتی‌لین.
اثر متقابل: به‌نورپرامین مراجعه شود.
موارد استعمال: انواع دپرسیون‌ها.
مقدار مصرف و طرز استعمال: روزی ۳ بار، هربار ۲۵ میلی‌گرم. بالاتر از ۶۰ سال هربار ۱۰ میلی‌گرم.
موارد منع استعمال: گلوکوم، مسمومیت حاد، اختلالات قلبی.
عوارض جانبی: خشکی دهان، تاکی کاردی، سرگیجه.
بسته بندی: کپسول ۱۰ و ۲۵ میلی‌گرم × ۵۰.
بها: ۱۰ میلی ۸۰ ریال ۲۵ میلی ۱۰۰ ریال.

NOVACYL
لومات‌وبوانو ـ فرانسه

ترکیب: ان ـ اکسی ـ نیکوتی نات‌اتانولامین.
موارد استعمال: افزایش چربی و کلسترول، بیماری‌آترومانوز.
مقدار مصرف و طرز استعمال: دز حمله‌ای: روزی ۳ بار، هربار ۲ کپسول دز نگهدارنده: روزی ۲ بار، هربار ۲ کپسول بمدت ۲۰ روز.
بسته بندی: کپسول ۶۷۰ میلی‌گرم × ۶۰.
بها: ۳۰۰ ریال.

NOVALGINE
هوخست آلمان ـ ایران

ترکیب: ۱ ـ فنیل ـ ۲ و ۳ ـ دیمتیل ـ ۵ ـ پیرازولون ـ ۴ ـ متیل آمینو متان سولفونات سدیم = متامپیرون = دی پیرون.
موارد استعمال: سردرد، تب‌آنفلوآنزا، نورالژی، دردهای سیاتیک و

N

روماتیسمی، قولنج های کلیوی و کبدی، دردهای آنژین صدری، دردهای زایمان، دیسمنوره، دردهای بعد و قبل از اعمال جراحی، پلی‌آرتریت، دردهای ناشی از ضربه، شکستگی و سوختگی و اعمال جراحی دندانپزشکی.

مقدار مصرف و طرز استعمال: درمان از راه خوراکی ـ بزرگسالان: روزی ۳ ـ ۴ بار، هربار ۱ ـ ۲ قرص یا ۲۰ ـ ۴۰ قطره. خردسالان: برحسب سن روزی ۳ بار، هربار ۵ ـ ۱۵ قطره. درمان از راه خارجی ـ بزرگسالان: ۳ تا ۴ شیاف در روز. خردسالان: برحسب سن نیم تا یک شیاف. درمان تزریقی ـ بزرگسالان: برحسب نوع درد ۱ ـ ۳ بار، هربار ۴ تا ۶ میلی‌لیتر وریدی. خردسالان: برحسب نوع درد و سن ۱ ـ ۳ بار، هربار ۲ میلی‌لیتر در عضله تزریق شود.

عوارض جانبی و احتیاط: همانند ACEFALGINE است.

بسته‌بندی: قرص ۰/۵ گرم × ۲۵۰ آمپول ۱ گرم = ۲ میلی‌لیتر × ۱۰۰ آمپول ۲/۵ گرم = ۵ میلی‌لیتر × ۱۰۰، قطره ۰/۵ گرم = ۱ میلی‌لیتر × ۱۰ میلی‌لیتر.

بها: قرص، ۲۵۰ عددی ۷۳۲ ریال. آمپول ۲ میلی ۱۱۰۰ ریال، ۵میلی ۱۹۹۱ ریال. قطره ۳۳ ریال.

NOVOTHYRAL

مرک ـ آلمان

ترکیب: L ـ تری یدوتیروئین (T_3) ۲۰ میکروگرم + L ـ تترایدوتیرونین (T_4) ۱۰۰ میکروگرم.

موارد استعمال: تنظیم اعمال غده تیروئید، میکزودم، کرتینیسم، گواتر ساده.

مقدار مصرف و طرز استعمال: برحسب شدت بیماری متفاوت است.

احتیاط و عوارض جانبی: بندرت اختلالاتی بصورت کم‌خوابی، عصبانیت و ناراحتی قلبی دیده میشود. بهتر است مقدار درمانی بعد از صبحانه میل شود.

بسته‌بندی: قرص × ۲۰.

بها: ۸۹ ریال.

NOZINAN
اسپسیا ـ فرانسه

ترکیب: متوکسی ـ ۳ (دی متیل‌آمینو ـ ۳ متیل ـ ۲ پروپیل ـ ۱۰ فنوتیازین چپ گرد) ـ لوومپرومازین.

موارد استعمال: عدم تعادل دستگاه عصبی نباتی، اختلالات قلبی عروقی، تنفسی، روماتیسمی، معدی روده‌ای، افسردگی خفیف، دردهای پسیکوسوماتیک، پسیکاستنی، آلرژیهای جلدی، سرفه، تنگی نفس، استفراغ.

مقدار مصرف و طرز استعمال: روزی ۳ بار، هربار ۱ ـ ۲ قرص.

عوارض جانبی: خواب‌آلودگی مختصر.

بسته‌بندی: قرص ۲ میلی‌گرم × ۵۰. قرص ۲۵ میلی‌گرم × ۲۰. آمپول ۲۵ میلی‌گرم = ۲ میلی‌لیتر × ۱۰.

بها: قرص ۲ میلی ۷۰ ریال. قرص ۲۵ میلی ۱۶۹ ریال. آمپول ۱۶۹ ریال.

NTR
وینتروپ آمریکا ـ ایران

ترکیب: نئوسینفرین ۰/۰۵ درصد + تنفادیل مشتق از کلریدرات تنیل ـ دیامین ۰/۰۱ درصد + کلرور رکلینا مشتق از بنزآلکونیوم محلول یک در پنجهزار.

موارد استعمال: درمان علامتی سرماخوردگی، رینیت‌های آلرژیک، انسداد بینی.

مقدار مصرف و طرز استعمال: ۳ ـ ۴ قطره در هر بینی می‌چکانند.

احتیاط: در بیماریهای قلبی پیش رفته باید با احتیاط مصرف نمود.

بسته‌بندی: قطره‌بینی ۲۰ میلی‌لیتر.

بها: ۵۹ ریال.

NUTRIPLEX
آی دی آی ـ ایران

ترکیب: در هر کپسول یا ۵ میلی‌لیتر شربت: ویتامین A ۳۰۰۰ واحد + ویتامین B_1 ۱۵ میلی‌گرم + ویتامین B_2 ۱۵ میلی‌گرم + ویتامین B_6 ۷ میلی‌گرم + ویتامین B_{12} ۶ میکروگرم + ویتامین D_3 ۵۰۰ واحد + ویتامین E ۱۰ میلی‌گرم + نیکوتینامید ۱۵۰ میلی‌گرم.

موارد استعمال: الکلیسم، بیماری مزمن، سوءتغذیه، جراحی، آنورکسی،

N

خستگی، عصبانیت و ضعف.
مقدار مصرف و طرز استعمال: کپسول: روزی یکعدد بعد از صبحانه،
شربت: یک قاشق مرباخوری.
بسته‌بندی: کپسول × ۴۰، شربت ۲۰۰ میلی‌لیتر.
بها: کپسول ۱۱۷ ریال. شربت ۱۶۴ ریال.

NUTRISAL
ارتو ـ انگلستان

ترکیب: دکستروزانیدر ۸۲/۷۵ درصد + کلرورسدیم ۵ درصد + فسفات پتاسیم منوبازیک ۰/۲۵ درصد + فسفات انیدر ۶ درصد + آکاسیا ۱ درصد + آلبومین تخم‌مرغ ۵ درصد + کلرور منگنز ۰/۰۰۰۰۲۱ درصد.
موارد استعمال: درمان نازائی، مواردی که تعداد اسپرم در سانتیمتر مکعب کم است، مواقعی که تحرک اسپرم کم است، مواردی که پ هاش واژن خیلی اسیدی است، نازائیهائی که درواژن هیچگونه نقص عضوی یا بیماری نیست.
مقدار مصرف و طرز استعمال: یک پیمانه از دارو را در ۱۴۰ گرم آب ولرم حل کرده بکمک پوار مخصوص واژن را شستشو میدهند.
بسته‌بندی: پودر شامل ۶ بسته ۴/۷ گرم.
بها: ۱۲۰ ریال.

N

NUTRIZYM
مرك آلمان ـ ایران

ترکیب: قسمت قشری: بروملین ۵۰ میلی‌گرم قسمت مرکزی: پانکراتین ۴۰۰ میلی‌گرم + صفرای گاو ۳۰ میلی‌گرم.
موارد استعمال: اختلال در هضم مواد چربی، قندی و پروتئینی ناشی از نارسائی ترشح خارجی پانکراس، هیپراسیدیته متعاقب جراحی معده و روده.
مقدار مصرف و طرز استعمال: روزی ۳ بار، هربار یک دراژه همراه غذا.
بسته‌بندی: دراژه × ۳۰.
بها: ۱۳۵ ریال.

OBLIVON Elixir
شرینگ ـ انگلستان

ترکیب: متیل پنتی‌نول.
موارد استعمال: بیخوابی اطفال بعلل مختلف.
مقدار مصرف و طرز استعمال: روزی ۱ ـ ۲ قاشق مرباخوری.
عوارض جانبی: با مقدار زیاد عوارضی مشابه مسمومیت با الکل را دارد.
بسته بندی: شربت ۱۰۰ میلی‌لیتر.
بها: ۶۳ ریال.

OBRON
فایزر آمریکا ـ ایران

ترکیب: ویتامین A ۵هزار واحد + ویتامین D ۵۰۰ واحد + ویتامین B_1 ۳ میلی‌گرم + ویتامین B_2 ۲ میلی‌گرم + ویتامین B_6 ۱۰ میلی‌گرم + ویتامین B_{12} ۲ میلی‌گرم + ویتامین C ۵۰ میلی‌گرم + نیاسینامید ۲۰ میلی‌گرم + پانتوتنات کلسیم ۱ میلی‌گرم + کربنات کلسیم ۵۹۳ میلی‌گرم + سولفات آهن ۱۱۲ میلی‌گرم + منگنز ۰/۳۳ میلی‌گرم + منیزیم ۱ میلی‌گرم + پتاسیم ۱/۷ میلی‌گرم + روی ۰/۴ میلی‌گرم + کلسیم ۲۳۷ میلی‌گرم + آهن ۳۳ میلی‌گرم.
موارد استعمال: مکمل غذائی در دوران رشد، نقاهت، بارداری، شیردهی.
مقدار مصرف و طرز استعمال: روزی ۱ ـ ۳ بار، هربار ۱ کپسول همراه با غذا.
بسته بندی: کپسول × ۳۰.
بها: ۱۰۵ ریال.

ODDIBIL

روژربلون فرانسه
ـ فارماشیمی ایران

ترکیب: در هر قرص فوماریاافی‌سینالیس میکرونیزه ۰/۲۵ گرم.

موارد استعمال: نارسائی‌های کبدی و صفراوی، سنگ‌صفرا، اختلال گوارشی ناشی از قولنج کبدی، ورم کیسه صفرا، تنبلی کیسه صفرا، میگرن‌هائیکه مبدأ آنها کبد و صفرا باشد.

مقدار مصرف و طرز استعمال: یک قرص قبل از هر غذا یک قرص هنگام خواب.

بسته بندی: قرص × ۴۰.

بها: ۲۱۱ ریال.

OESTRADIOL

ویفور ـ سویس

ترکیب: بنزوات‌استرادیول.

موارد استعمال: عقیمی و دیسمنوره ناشی از هیپوپلازی تخمدان، اختلال در عادت ماهانه، هیپومنوره، الیگومنوره، آندومتریت.

مقدار مصرف و طرز استعمال: برحسب شدت بیماری متفاوت است.

بسته بندی: آمپول ۵ میلی‌گرم = ۱ میلی‌لیتر × ۶.

بها: ۷۰ ریال.

OESTROFORM

بی دی اچ انگلستان ـ
داروپخش ایران

ترکیب: در هر آمپول: بنزوات استرادیول.

موارد استعمال: آمنوره، هیپومنوره، الیگومنوره، دیسمنوره، سترونی.

مقدار مصرف و طرز استعمال: آمنوره: ۵ میلی‌گرم داخل عضله برای دو هفته متوالی تا خونریزی قاعدگی شروع شود. بعد درمان بطور متناوب با مقادیر کمتر انجام میگیرد. دیسمنوره: ۵ میلی‌گرم دوبار در هفته برای، ۲ هفته اول در عرض ۲ یا ۳ دوره اول ماهانه در مواردیکه همراه با هیپوپلازی رحمی است. سترونی: ۵ میلی‌گرم، ۲ بار در هفته برای ۲ هفته اول دوره ماهانه بین دوقاعدگی در مواردیکه سترونی ناشی از هیپوپلازی رحمی باشد. در مواردی که این حالت ناشی از فقدان تخمک گذاری باشد ۱۰ میلی‌گرم داخل عضله در حدود روز دهم دوره ماهانه تزریق میشود.

بسته بندی: آمپول روغنی ۵ هزار واحد × ۵

بها: ۱۵۸ ریال.

O . F .
پ. او. اس فرانسه ــ دوپاراپران

ترکیب: استات ۹ آلفافلوئوروئیدروکورتیزون ۰/۱ گرم + کلریدرات ـ اکسی تتراسیکلین ۱ گرم + اکسیپیان تا ۱۰۰ گرم.
موارد استعمال: کونژونکتیویت‌ها، کراتیت‌ها، اسکلریت واپی اسکلریت، گل مژه، بلفاریت.
مقدار مصرف و طرز استعمال: شروع درمان: روزی ۴ـ۶بار. ادامه درمان: روزی ۱ ـ ۳ بار در چشم استعمال شود.
موارد منع استعمال: عفونت‌های ویروسی، عفونت‌های قارچی و توبر- کولوز چشم.
بسته‌بندی: پماد چشمی ۵ گرم.
بها: ۴۷ ریال.

OLEOSORBATE 80
شیبره ــ فرانسه

ترکیب: در هر ۱۰۰ میلی‌لیتر: الئوسوربات ۸۰ و ۰/۵ گرم
موارد استعمال: رینیت‌های خشک و کروتوز، بوشن‌سرومن، تامپون ـ های خلفی، بعد از عمل جراحی بینی و سینوس.
مقدار مصرف و طرز استعمال: رینیت‌های خشک و کروتوز: روزی ۵بار، هربار ۵ـ۶ قطره. بوشن سرومن: ۵ تا ۶ قطره برای مدت ۵ـ۶ روز.
بسته‌بندی: قطره ۱۰ میلی‌لیتر.
بها: ۳۴ ریال.

OLETRON
بایر آلمان ــ ایران

ترکیب: آلدوفرم ۲۵۰ میلی‌گرم + یدکلرا کسی کینولئین ۱۵۰ میلی‌گرم + کلروربنزالکونیوم ۱۰ میلی‌گرم.
موارد استعمال: اسهالهای غیراختصاصی، کولیت، حالات سوءهاضمه، اسهال‌خونی آمیبی.
مقدار مصرف و طرز استعمال: بزرگسالان: روزی ۳بار، هربار ۲ ـ ۳ قرص. خردسالان ۴ـ۱۲ ساله: روزی ۳بار، هربار یک قرص. خردسالان ۱ ـ ۳ ساله: روزی ۲ بار، هربار ۱ قرص.

O

احتیاط: درمان طولانی با دارو مخصوصاً با دوزهای بالا باید زیرنظر پزشک انجام گیرد.

بسته‌بندی: قرص × ۱۰۰.

بها: ۲۳۴ ریال.

OMNACILIN

بهرینگ هوخست آلمان ـ ایران

ترکیب: پنی‌سیلین پروکائین G ۷۵ درصد + پنی‌سیلین G سدیم ۲۵ درصد + امنادین خشک.

موارد استعمال: کلیه بیماریهای عفونی ناشی از میکروبهای حساس به پنی‌سیلین.

مقدار مصرف و طرز استعمال: بزرگسالان: روزی ۲ بار، ۴۰۰ تا ۸۰۰ هزار واحد تزریق عضلانی. خردسالان: روزی ۲ بار، ۲۰۰ تا ۴۰۰ هزار واحد تزریق عضلانی. تزریقات را میتوان در صورت لزوم بفاصله هر ۸ ساعت تکرار کرد.

موارد منع استعمال: افراد حساس به پنی‌سیلین.

بسته‌بندی: ویالهای ۴۰۰ هزار و ۸۰۰ هزار واحدی همراه با ۲ میلی‌لیتر آمپول آب‌مقطر.

بها: ۴۰۰ هزار ۳۲ ریال، ۸۰۰ هزار ۴۰ ریال.

O

OMNIBIONTA

مرك ـ آلمان

ترکیب: در هر کپسول قرمز: ویتامین A ۲۵۰۰ واحد + ویتامین B_1 ۴ میلی‌گرم + ویتامین B_2 ۲ میلی‌گرم + ویتامین PP ۲۰ میلی‌گرم + پانتوتنات کلسیم ۵ میلی‌گرم + ویتامین B_6 ۲ میلی‌گرم + ویتامین B_{12} ۲ میکروگرم + ویتامین C ۵۰ میلی‌گرم + ویتامین D_3 ۵۰۰ واحد + ویتامین E ۴ میلی‌گرم + ویتامین H ۲۰ میلی‌گرم + ویتامین K_4 ۲ میلی‌گرم + ویتامین P ۱۰ میلی‌گرم. در هر کپسول نارنجی: مس + منگنز + آهن + کبالت + نیکل + منیزیم + کلسیم + فسفر + روی + سیلیسیم + تیتان + مولیبدن + فلوئور + ید + گلیکوکول.

موارد استعمال: بی‌اشتهائی، عصبانیت، فرسودگیهای جسمی و فکری.

مقدار مصرف و طرز استعمال: روزی ۱ ـ ۲ کپسول دوبل.

بسته‌بندی: کپسول نارنجی × ۳۰ + کپسول قرمز × ۳۰.
بها: ۲۳۰ ریال.

ONCOVIN
لی‌لی - آمریکا

ترکیب: وین کریستین سولفات.
موارد استعمال: لوسمی حاد کودکان.
مقدار مصرف و طرز استعمال: ۰/۰۵ تا ۰/۱۵ میلی‌گرم برای هر کیلوگرم وزن بدن در هفته بشکل تزریق داخل وریدی.
موارد منع استعمال: بیماران مبتلا به‌لوکوپنی و عفونت‌های میکروبی.
احتیاط: دارو باید در یخچال نگهداری شود.
عوارض جانبی: بروز نفروپاتی حاد اسید اوریک در موارد استثنائی، اختلالات عصبی عضلانی وگاهی آلوپسی قابل برگشت.
بسته‌بندی: ویال‌های ۱ میلی‌گرم همراه با حلال.
بها: ۱۰۸۰ ریال.

ONE DROP ONLY
اتومولر آلمان - ایران دراگ ایران

ترکیب: مواد ضدعفونی کننده همراه با فلوئورین و روغنهای اتریک.
موارد استعمال: جلوگیری از عفونتهای گلو و دهان، بوی بددهان، گلودرد، التهاب و ورم‌لوزه‌ها.
مقدار مصرف و طرز استعمال: یک قطره را در یک لیوان ریخته روزی ۲ بار دهان شویه یا غرغره می‌کنند.
بسته‌بندی: محلول ۱۱ میلی‌لیتر.
بها: ۷۵ ریال.

ONOPROSE
اونوژاپن - فارماشیمی ایران

ترکیب: در هر کپسول: اونوپروز ۵ میلی‌گرم.
موارد استعمال: هماتوم، عوارض شکستگی، اووتریت، فلبیت، آبسه، التهاب لگن، سینوزیت، لارنژیت، ورم بیضه و تخمدان.
مقدار مصرف و طرز استعمال: روزی ۳ـ۴ بار، هربار ۱ـ۲ کپسول.
بسته‌بندی: کپسول × ۲۰.
بها: ۲۱۱ ریال.

ONOTON
وینتروپ آمریکا ـ ایران

ترکیب: آنزیمهای پانکراس (ترپپسین، آمیلوپسین، لیپاز) ۱۷۵ میلی‌گرم + همی‌سلولاز ۵۰ میلی‌گرم + عصاره صفراوی گاو ۲۵ میلی‌گرم.

موارد استعمال: سوءهاضمه بعلت نارسائی پانکراس، گاسترو آنتریت مزمن، دیس پپسی های پوتریفکتیو و فرمانتاتیو، نارسائی هضم چربیها و نشاسته، نفخ های شکم، قبل از رادیوگرافی بمنظور پاک کردن شکم از گازها.

مقدار مصرف و طرز استعمال: روزی ۳ بار، هربار ۱ ـ ۲ قرص بلافاصله بعد از غذا.

بسته‌بندی: قرص × ۶۰.

بها: ۱۴۱ ریال.

O - PEN
تولیدارو ـ ایران

ترکیب: پتاسیم‌فنوکسی‌متیل پنی‌سیلین.

موارد استعمال: پنومونی ناشی از پنوموکوک و استرپتوکوک، دیفتری، سوزاک، مننژیت، مننگوکوکسیک، سیفیلیس، تب زایمان، آندوکاردیت باکتریال تحت حاد، بادسرخ، سلولیت و جلوگیری از عوارض آن درقلب و کلیه ها.

مقدار مصرف و طرز استعمال: بزرگسالان: روزی ۳ ـ ۴ بار، هربار ۱ قرص. خردسالان از ۶ سال ببالا: ۲ قاشق مرباخوری شربت یا روزی ۳ ـ ۴ بار، هربار ۱ قرص. شیرخواران و نوزادان: روزی ۳ ـ ۴ بار، هربار ۱ تا ۲۰ قطره و یا نصف قاشق مرباخوری شربت.

موارد منع استعمال: حساسیت به پنی‌سیلین.

بسته‌بندی: کپسول ۱/۲۵ مگا × ۴۸. قرص ۵۰۰ هزار واحدی × ۱۲ شربت ۶۰ میلی‌لیتر. قطره ۱۰ میلی‌لیتر.

بها: کپسول ۷۸۷ ریال. قرص ۸۴ ریال. شربت ۸۲ ریال. قطره ۶۳ ریال.

O

OPTALIDON
ساندوزسویس ـ پارس ایران

ترکیب: آمیدوپیرین ۱۲۵ میلی‌گرم + اسید ایزوبوتیل آلیل باربیتوریک ۵۰ میلی‌گرم + کافئین ۲۵ میلی‌گرم.
موارد استعمال: سردرد و سایر ناراحتی‌های حاصله از سرماخوردگی، آنفلوانزا، دندان درد، دردهای قاعدگی، دردهای عصبی، درد-های رماتیسمی و سیاتیک.
مقدار مصرف و طرز استعمال: ۱ـ۲ قرص که این مقدار را میتوان پس از نیم ساعت تکرار کرد.
احتیاط: نباید از ۶ قرص در روز تجاوز شود.
بسته‌بندی: قرص × ۱۰.
بها: ۱۹ ریال.

OPTREX
اپترکس ـ انگلستان

ترکیب: در هر ۱۰۰ میلی‌لیتر: اسیدبوریک ۲ گرم + بورات سدیم ۰/۵ گرم + آلانتوئین ۰/۰۵ گرم + کلربوتول ۰/۰۲ گرم + سولفات روی ۰/۰۰۴ گرم.
موارد استعمال: سرخی چشم ناشی از نور، گرما، شنا، کونژونکتیویت، بلفاریت.
مقدار مصرف و طرز استعمال: بعد از ریختن دارو در طشتک مخصوص در روی چشم میگیرند.
احتیاط: دارو نباید بیش از ۲ دقیقه با چشم تماس داشته باشد.
بسته‌بندی: محلول چشم‌شوی ۱۱۰ میلی‌لیتر.
بها: ۴۰ ریال.

ORABILIX
آندره گربه ـ فرانسه

ترکیب: اتیل ـ ۲ (تری یویدو ـ ۲، ۴، ۶ بوتیریلامینو ـ فنیل) ـ ۳ آکریلات دوسدیم = بونامیودیل (غلظت ید ۵۷/۶ درصد).
موارد استعمال: کله سیستوگرافی.
بسته‌بندی: کپسول ۰/۷۵ گرم × ۶.
بها: ۱۴۰ ریال.

ORADEXON
ارگانون هلند ـ ایران

ترکیب: دکسامتازون.
موارد استعمال: آسم برونشیک، آگرانولوسیتوز، آنسفالیت، رماتیسم ـ مفصلی، لوسمی بعنوان ضد درد، ضد تب، ضد حساسیت.
مقدار مصرف و طرز استعمال: قرص: روزی ۴ عدد. آمپول: قابل تزریق در ورید، عضله، مفصل.
احتیاط: در بیماران مبتلا به دیابت انسیپید، سل، استئوپورز، اختلالات روانی، بیماران قلبی، فشارخون، نارسائی کلیوی با احتیاط مصرف شود.
عوارض جانبی: مانند کورتیکوستروئیدها سبب اولسر معده، کاهش پتاسیم، عفونت، وقفه رشد میشود.
موارد منع استعمال: هیپرتانسیون، اولسر سندروم کوشینگ.
بسته‌بندی: قرص ۰/۵ میلی‌گرم × ۱۰۰، آمپول ۵ میلی‌گرم = ۱ میلی‌لیتر × ۱.
بها: قرص ۲۱۱ ریال، آمپول ۶۴ ریال.

ORALIT
تولیدارو ـ ایران

ترکیب: سدیم ۳۰ میلی اکی‌والان در لیتر + پتاسیم ۲۰ میلی اکی ـ والان در لیتر + کلسیم ۶ میلی اکی‌والان در لیتر + منیزیم ۱ میلی اکی‌والان در لیتر + کلرور ۲۶ میلی اکی والان در لیتر + فسفات ۵ میلی اکی‌والان در لیتر + لاکتات ۶ میلی اکی ـ والان در لیتر + سولفات ۱ میلی اکی‌والان در لیتر + سیترات ۱۹ میلی اکی‌والان در لیتر + کلسیم ۷۵ میلی‌اکی‌والان در لیتر.
موارد استعمال: برقراری تعادل الکترولیتی از دست رفته در اثر اسهال یا استفراغ.
مقدار مصرف و طرز استعمال: محتوی هر پاکت را در نیم بطر (۲۵۰ میلی‌لیتر) آب‌جوشیده سرد شده حل کرده ۱ تا ۳ لیتر در روز بتدریج میل می کنند.
بسته‌بندی: پاکت ۲۰ گرم × ۴.
بها: ۵۹ ریال.

ORANABOL
فارمیتالیا ـ ایتالیا

ترکیب: در هر قرص: ۴ـ ئیدروکسی ۱۷ـ آلفا ـ متیل ـ تستوسترون ـ اُکسی مسترون.
موارد استعمال: ضعف، کاشکسی، کم‌رشدی، بی‌اشتهائی.
مقدار مصرف و طرز استعمال: خردسالان: روزی ۰/۱ و ۰/۲ میلی‌گرم برای هر کیلو وزن. بزرگسالان: حداقل مقدار ۲۰۰ میلی‌گرم بمدت ۱۰ ـ ۱۵ روز.
بسته‌بندی: قرص ۵ میلی‌گرم × ۲۰.
بها: ۱۱۰ ریال.

ORANGEN
رزا ـ ایران

ترکیب: اسید آسکوربیک.
موارد استعمال: اسکوربوت، کم‌خونی، شکستگی، سوءتغذیه، عفونت.
مقدار مصرف و طرز استعمال: روزی ۱ ـ ۲ بسته را در آب حل کرده میل میکنند.
بسته‌بندی: بسته ۵۰۰ میلی‌گرم و ۱۰۰۰ میلی‌گرم × ۱۰.
بها: ۵۰۰ میلی ۶۴ ریال، ۱۰۰۰ میلی ۸۲ ریال.

ORBENIN
بیچام ـ انگلستان

ترکیب: ۳ ـ (۲ ـ کلروفنیل) ـ ۵ متیل ایزوکسازول ـ ۴ ییل ـ پنی‌سیلین سدیم = کلوکساسیلین.
موارد استعمال: درمان عفونتهای ناشی از اجرام گرم مثبت بخصوص استافیلوکوکهای مقاوم، کورک، کفگیرک، دمل، زخمهای عفونی، اوتیت، پنومونی، سپتی‌سمی، استئومیلیت.
مقدار مصرف و طرز استعمال: بزرگسالان: روزی ۲۵۰ ـ ۵۰۰ میلی‌گرم هر ۶ ساعت یکساعت قبل از غذا. خردسالان کمتر از دوسال: ربع مقدار بزرگسالان. ۲ ـ ۱۰ ساله: نصف مقدار بزرگسالان.
موارد منع استعمال: حساسیت به پنی‌سیلین، تزریق زیرملتحمه.
عوارض جانبی: گاهی اسهال.
بسته‌بندی: کپسول ۲۵۰ میلی‌گرم × ۱۲، ۵۰۰ میلی × ۱۰۰، شربت (۱۲۵ میلی‌گرم = ۵ میلی‌لیتر) × ۶۰ میلی‌لیتر. ویال ۲۵۰ میلی‌گرم × ۱۰، ۵۰۰ میلی × ۱۰.

O

بها: کپسول ۲۵۰ میلی ۱۸۰ ریال، ۵۰۰ میلی ۲۹۷۰ ریال، شربت ۱۱۴ ریال، ویال، ۲۵۰ میلی ۵۵ ریال، ۵۰۰ میلی ۸۰ ریال.

OREX
لپتی ایتالیا ـ ایران

ترکیب: در هر ۱۰۰ گرم: کلریدرات تتراکائین ۰/۵ گرم + اسید ـ بوریک ۳ گرم + اکسیپیان تا ۱۰۰ گرم.
موارد استعمال: تسکین انواع گوش دردها.
مقدار مصرف و طرز استعمال: خردسالان: پس از تمیز کردن گوش روزی ۳ـ۴ بار، هربار ۲ قطره. بزرگسالان: روزی ۳ـ۴ بار، هربار ۴ قطره.
بسته‌بندی: قطره ۱۵ میلی‌لیتر.
بها: ۴۳ ریال.

ORGABOLIN
ارگانون هلند ـ ایران

ترکیب: اتیل استرنول.
موارد استعمال: متاستازهای سرطان پستان، نقاهت، پائین بودن وزن، عدم رشد، شکستگی‌ها، استئوپورز، بی‌اشتهائی، همراه درمان با کورتیکوستروئیدها.
مقدار مصرف و طرز استعمال: قطره: یک قطره برای هر کیلو وزن. قرص: روزی ۳ عدد.
احتیاط: در زنان جوان، بیماران مبتلا به‌نارسائی قلبی یا کلیوی، دیابتی، فشارخون و صرع باید با احتیاط مصرف شود.
عوارض جانبی: تهوع، احتباس آب و نمک، اختلال عادت ماهیانه، اختلالات کبدی.
موارد منع استعمال: مانند تمام آنابولیکها در دوران آبستنی و سرطان پروستات و پستان، اختلال شدید کبدی.
بسته‌بندی: قطره ۵ میلی‌لیتر. قرص ۲ میلی‌گرم × ۲۰.
بها: قرص ۱۱۷ ریال. قطره ۵۹ ریال.

O

ORNICETIL
لژه ـ فرانسه

ترکیب: در هر آمپول لیوفیلیزه: آلفا کتوگلوتارات ـ ال (+) اورنی‌ـ تین.

موارد استعمال: آنسفالوپاتی، کوماهپاتیک، ایکتر.
مقدار مصرف و طرز استعمال: روزی ۴ـ۶ آمپول و در موارد خطرناک ۱۰ـ۱۲ آمپول. تزریق باینصورت است که ابتدا آمپول را در ۲۰ میلی‌لیتر آب‌مقطر حل کرده سپس با ۱۰۰ تا ۲۵۰ میلی‌لیتر سرم فیزیولژی مخلوط میکنند و با سرعت ۴۰ قطره در دقیقه در ورید تزریق میکنند.
بسته‌بندی: آمپول ۵ گرم + حلال ۲۰ میلی‌لیتر × ۱.
بها: ۴۵۰ ریال.

ORTHANGIN
پرومونتا ـ آلمان

ترکیب: عصاره گراتاگوس + عصاره کونوولاریامایالیس.
موارد استعمال: اختلالات کاردیوواسکولر فونکسیونل، تپش قلب، تاکی‌کاردی، استنوکاردی.
مقدار مصرف و طرز استعمال: هر ۸ ساعت ۲۰ ـ ۳۰ قطره.
بسته‌بندی: قطره خوراکی ۲۰ میلی‌لیتر.
بها: ۱۲۰ ریال.

OSADRINE
لوئیت‌پولد ـ آلمان

ترکیب: در هر آمپول: فنوپیرازون ۰/۷۵ گرم + دی‌متیل آمینو- فنیل دی‌متیل پیرازولون ۰/۷۵ گرم + کلریدرات پاراآمینو بنزول دی‌اتیل آمینواتانول ۰/۰۳۵ گرم، در هر دراژه: فنوپیرازون ۰/۱۲۵ گرم + دی‌متیل آمینوفنیل دی‌متیل پیرازولون ۰/۱۲۵ گرم + اسید پاراآمینو بنزوئیک ۰/۰۲۵ گرم.
موارد استعمال: روماتیسم، کشش عضلات، تب، درد.
مقدار مصرف و طرز استعمال: خردسالان، روزی ۳-۶ دراژه. بزرگسالان: روزی ۳ـ۴ بار، هربار ۲ تا ۳ دراژه یا روزی ۱ـ۲ آمپول عضلانی.
عوارض جانبی: تاکی‌کاردی، تهوع.
بسته‌بندی: آمپول ۵ میلی‌لیتر × ۳. دراژه × ۲۰.
بها: آمپول ۱۵۰ ریال. دراژه ۱۱۸ ریال.

O

OSPOLOT
بایر ـ آلمان

ترکیب: تتراهیدرو ۲ ـ سولفاموئیل فنیل ـ ۱ و ۲ تیازین ۱ و ۱ ـ دی‌اکسید = سولتی آمین.

موارد استعمال: صرع لوب تامپورال (حملات پسیکوموتور)، صرع ـ ژاکسونی، گراندمال.

مقدار مصرف و طرز استعمال: بزرگسالان و جوانان بیش از ۱۴ سال بطور متوسط ۲۰۰ ـ ۶۰۰ میلی‌گرم. اطفال کمتر از ۲ سال روزی ۱۰۰ میلی‌گرم، ۲ ـ ۶ سال ۱۵۰ میلی‌گرم، ۶ ـ ۱۰ ساله: ۳۰۰ ـ ۴۵۰ میلی‌گرم، ۱۰ ـ ۱۴ ساله: ۳۰۰ ـ ۶۰۰ میلی‌گرم.

موارد منع استعمال: عدم کفایت نمایان کلیه.

بسته‌بندی: قرص ۵۰ و ۲۰۰ میلی‌گرم × ۵۰.

بها: ۵۰ میلی ۱۰۰ ریال، ۲۰۰ میلی ۲۴۰ ریال.

OSTOCALCIUM
گلاکسو انگلستان ـ داروپخش ایران

ترکیب: در هر قرص: ویتامین D ۵۰۰ واحد + فسفات کلسیم ۳۲۵ میلی‌گرم + لاکتات سدیک کلسیم ۱۶۲ میلی‌گرم.

موارد استعمال: دوران آبستنی وشیردهی، افزایش تقاضای فیزیولوژیک کلسیم، پوک استخوانی.

مقدار مصرف و طرز استعمال: خردسالان: روزی ۳ بار، هربار ۱ ـ ۲ قرص. بزرگسالان: روزی ۳ بار، هربار ۲ ـ ۳ قرص یا بیشتر.

بسته‌بندی: قرص × ۵۰۰.

بها: ۲۹۳ ریال.

OTIMARINE
مارین ـ ایران

ترکیب: اکسی کینولئین سولفات + بنزوکائین + فنازون + گلیسیرین.

موارد استعمال: انواع گوش دردها، التهابات و احتقان ناشی از اوتیت ـ های ساده و چرکی.

مقدار مصرف و طرز استعمال: روزی ۳ ـ ۶ بار هربار ۳ ـ ۴ قطره در هر گوش می‌چکانند.

بسته‌بندی: قطره‌گوشی ۱۵ میلی‌لیتر.

بها: ۳۲ ریال.

OTI - NOL
پارك ـ ایران

ترکیب: سولفاستامیدسدیک + کلریدرات آمیلو کائین.
موارد استعمال: گوش دردهای چرکی، اوتیت‌ها و تسکین دردهای گوش.
مقدار مصرف و طرز استعمال: روزی ۳ بار، هربار ۴ تا ۵ قطره در هر گوش می‌چکانند.
بسته‌بندی: قطره گوشی ۱۵ میلی‌لیتر.
بها: ۲۹ ریال.

OTOCOL Goutte
ویرا ـ ایران

ترکیب: کلرامفنیکل ۵ گرم + پروپیلن گلیکول ۹۵ گرم.
موارد استعمال: کورک مجرای گوش، اوتیت حاد چرکی، ماستوئیدیت
مقدار مصرف و طرز استعمال: ۱۰ قطره در انتهای گوش می‌چکانند.
بسته‌بندی: قطره ۱۰ میلی‌لیتر.
بها: ۳۲ ریال.

OTOGIN
مینا ـ ایران

ترکیب: سولفانیلامید ۵ گرم + اوره ۱۰ گرم + کلربوتانول ۳ گرم.
موارد استعمال: اوتیت داخلی و خارجی، بوشن، کورک گوش، گوش ـ درد، ورم گوش، کمک بجوش خوردن پرده صماخ.
مقدار مصرف و طرز استعمال: روزی ۴ ـ ۶ بار، هربار ۲ ـ ۴ قطره در هر گوش می‌چکانند.
بسته‌بندی: قطره گوشی ۱۰ میلی‌لیتر.
بها: ۳۲ ریال.

OTRIVIN
سیبا ـ سویس

ترکیب: کلریدرات (ترسیربوتیل ـ دی متیل فنیل‌متیل) ـ ایمیدازولین = کلریدرات اکسی‌متازولین.
موارد استعمال: سرماخوردگی و سینوزیت.
مقدار مصرف و طرز استعمال: خردسالان: روزی ۱ ـ ۲ بار، هربار ۱ ـ ۲ قطره نیم در هزار. بزرگسالان: روزی ۱ تا چندبار، هربار ۲ ـ ۳ قطره یک در هزار در هرسوراخ بینی می‌چکانند.
بسته‌بندی: قطره ۰/۵ و ۱ در هزار ۱۰ میلی‌لیتر.

O

بها: ۰/۵ در هزار ۴۳ ریال، ۱ در هزار ۵۰ ریال.

OUABAINE ARNAUD
ناتیول ـ فرانسه

ترکیب: اوآبائین = استروفانتین G.

موارد استعمال: نفخ حاد ریه، نارسائی قلبی، آسم‌های قلبی، اتساع قلب.

مقدار مصرف و طرز استعمال: آمپول: روزی یک آمپول وریدی. محلول: روزی ۵۰ قطره منقسم بدو قسمت مساوی قبل از هر غذا میل شود.

موارد منع استعمال: کاهش شدید قدرت قلبی، کسانی که تحت درمان با دیژیتال هستند.

احتیاط: تجویز مقدار کامل دیژیتالین باید ۲۴ ساعت پس از آخرین آمپول اوآبائین باشد.

بسته‌بندی: محلول ۲۰ میلی‌گرم = ۵۰ قطره × ۱۰ میلی‌لیتر. آمپول ۱ میلی‌لیتر × ۶.

بها: قطره ۷۰ ریال، آمپول ۷۲ ریال.

O

OVOCYCLINE M
سیبا ـ سویس

ترکیب: در هر آمپول میکروکریستالن: منوبنزوات ـ استرادیول ۱۰ میلی‌گرم.

موارد استعمال: آمنوره، اولیگومنوره، دیسمنوره، آندومتریت بعد از زایمان و بعد از سقط، بیماریهای عروقی محیطی، شقاق پستان.

مقدار مصرف و طرز استعمال: آمنوره: تزریق داخل عضلانی ۳ـ ۵ میلی‌گرم برای ۵ـ۶ بار با فواصل ۳ روزه. دیسمنوره: تزریق ۱ میلی‌گرم داخل عضله تا ۵ بار در نیمه اول دوره عادت‌ماهانه. اندومتریت: روزی ۱-۲ میلی‌گرم داخل عضله. بیماریهای عروقی محیطی: هر ۳ـ۴ هفته ۱ آمپول درعضله.

بسته‌بندی: آمپول میکروکریستالن × ۱.

بها: ۱۱۰ ریال.

OVRAL
وایت ـ آمریکا

ترکیب: نورژسترول ۰/۵ میلی‌گرم + اتی‌نیل استرادیول ۰/۰۵ میلی‌گرم.
موارد استعمال: جلوگیری از آبستنی.
مقدار مصرف و طرز استعمال: از روز پنجم قاعدگی تا ۲۱ روز بعد.
موارد منع استعمال: سرطان پستان.
بسته‌بندی: قرص × ۲۱.
بها: ۷۰ ریال.

OVULEN 50
سرل انگلستان ـ پارس ایران

ترکیب: اتی‌نودیول دی‌استات ۱ میلی‌گرم + اتی‌نیل استرادیول ۵۰ میکروگرم.
موارد استعمال: مانند سایر قرص های ضدآبستنی خوراکی در خونریزی فونکسیونل رحمی، متروپاتی خونریزی دهنده، منوراژی، متروراژی، سایر ناراحتیهای قاعدگی، دیسمنوره، هیجانات قبل از قاعدگی، آمنوره، الیگو منوره، هیپومنوره، تعویق انداختن قاعدگی.
مقدار مصرف و طرز استعمال: بعنوان ضدآبستنی خوراکی: یک‌قرص از روز پنجم قاعدگی بمدت ۲۱ روز. خونریزی فونکسیونل رحمی: یک قرص در روز پنجم قاعدگی بمدت ۲۱ روز. درمان تا ۳ دوره پی‌درپی ادامه می‌یابد. در خونریزی‌های شدید یا نامنظم تا ۶ قرص در روز. تعویق انداختن قاعدگی: میتوان با ادامه مصرف روزانه قرص بعد از دوره ۲۱ روزه قاعدگی را به تعویق انداخت. بانوانی که قرص مصرف نمی کنند بایستی یک قرص در روز مصرف نمایند و شروع آن هم نبایستی کمتر از ۵ روز به‌قاعدگی باشد.
موارد منع استعمال: سرطان بعلت هورمون، سابقه یرقان راجعه ایدیوپاتیک، سابقه عوارض ترومبو آمبولیک مشتمل بر بیماریهای عروق مغزی.
عوارض جانبی: تهوع، استفراغ، علائم گوارشی، خونریزی نامنظم واژینال، آمنوره پیگمانتاسیون جلدی و سایر ناراحتی‌ها، تغییرات

O

در پستان‌ها و وزن بدن، میگرن و دپرسیون. نتایج بعضی از تست‌های آزمایشگاهی هم ممکنست تغییر نماید.

بسته بندی: قرص × ۲۱.

بها: ۶۴ ریال.

OVULE VAGICOL
ویرا ـ ایران

ترکیب: کلرامفنیکل ۵۰۰ میلی‌گرم.

موارد استعمال: عفونتهای مزمن رحمی، لوکوره.

مقدار مصرف و طرز استعمال: شبی ۱ اوول قبل از خواب استعمال شود.

بسته بندی: اوول × ۶.

بها: ۱۰۰ ریال.

OXAINE-M
وایت ـ آمریکا

ترکیب: در هر قاشق مرباخوری: اکسواتازائین درژل اکسید ـ آلومینیوم ۱۰ میلی‌گرم.

موارد استعمال: بی‌حس کننده موضعی، ضد اسید، مرهم در درمان ـ اوزوفاژیت مزمن، گاستریت، اولسر دوازدهه و سندرم کولون.

مقدار مصرف و طرز استعمال: روزی ۴ بار، هربار ۱ ـ ۲ قاشق مرباخوری یکربع قبل از غذا.

عوارض جانبی: سرگیجه، خواب‌آلودگی.

بسته بندی: سوسپانسیون ۳۴۰ میلی‌لیتر.

بها: ۱۸۰ ریال.

OXIPOR VHC
وایت هال ـ آمریکا

ترکیب: محلول دترژان کربن + اسیدسالیسیلیک + بنزوکائین + الکل اتیلیک ۸۱ درصد.

موارد استعمال: پسوریازیس.

مقدار مصرف و طرز استعمال: روزی ۲ بار پس از تمیز کردن موضع در محل بمالند.

احتیاط: از تماس دارو با چشم و مخاط خودداری شود.

بسته بندی: محلول ۶۰ گرم.

بها: ۲۷۰ ریال.

OXYFERRISCORBONE SODIQUE
تراپلیکس ـ فرانسه

ترکیب: کمپلکس فریکوفروزوسدیک اسید ۲ ـ ۳ دی‌استـو ـ ۱ ـ گلـوکـونیـک ۱۵ میلی‌گرم + کمپلـکس فریکوسدیک اسید آلوکسانیک ۱۵ میلی‌گرم.

موارد استعمال: درمان اولسر معده و اثنی‌عشر.

مقدار مصرف و طرز استعمال: روزی یک تزریق محتوی ۱ ـ ۲ شیشه بطور داخل عضلانی و عمیق (دوره درمان ۱۰ تا ۲۰ روز است).

احتیاط: آمپول نباید با ویتامین ث و بروموروآتروپین و کلسیم و منیزیم مخلوط شود.

بسته بندی: آمپول خشک × ۵ و ۱۰۰ + حلال ۳ میلی‌لیتر × ۵ و ۱۰۰.

بها: ۵ عددی ۱۱۰ ریال، ۱۰۰ عددی ۱۵۵۵ ریال.

OXYSEROL
مرز ـ آلمان

ترکیب: زاج + تارترات اسید ـ ان ـ هگزیل رزورسینول + پاراآمینو- بنزوئیل آمینواتانول.

موارد استعمال: اکسیوروز، خارش دستگاه تناسلی زنان و مقعد، اکزماهای مقعدی.

مقدار مصرف و طرز استعمال: هر روز صبح زود و شبها قبل از خواب بوسیله کانول مخصوص مقداری دارو وارد مقعد شود.

بسته بندی: پماد کانول‌دار ۲۰ گرم.

بها: ۲۵ ریال.

OXYFERRISCORBONE SODIQUE ATROPINE
تراپلیکس ـ فرانسه

ترکیب: کمپلکس فریکوزوسدیک اسید ۲ ـ ۳ دی‌استـو ـ ۱ ـ گلـوکـونیک ۱۵ میلی‌گرم + کمپلکس فریکوسدیک اسیدآلوکسانیک ۱۵ میلی‌گرم + سولفات آتروپین ۰/۵ میلی‌گرم.

موارد استعمال: درمان اولسر معده و اثنی‌عشر.

مقدار مصرف و طرز استعمال: روزی یک تزریق محتوی یک و یا دو شیشه بطور داخل عضلانی و عمیق (دوره درمان ۱۰ تا ۲۰ روز است).

احتیاط: در بیماران مبتلا به‌فشارخون برای احتراز از اثر آتروپین در ازدیاد فشارخون شریانی بهتر است از نوع ساده دارو استفاده شود.

بسته بندی: آمپول خشک × ۵ + حلال ۳ میلی‌لیتر × ۵.

بها: ۱۱۰ ریال.

OXYPEL
فارابی ـ ایران

ترکیب: هگزیل رزورسینول ۰/۰۵ درصد + کلریدرات پروکائین ۰/۱۵ درصد + ارتواکسی کینولئین سولفات ۰/۰۶ درصد + فرمالدئید ۰/۱۵ درصد + استوتارترات آلومینیم ۱ درصد.

موارد استعمال: درمان موضعی انگلهای روده بخصوص اکسیور.

مقدار مصرف و طرز استعمال: بعد از پر کردن کانول وارد مقعد شود.

مدت درمان: ۱۸ روز.

بسته بندی: پماد ۲۰ گرم.

بها: ۲۶ ریال.

PABEX
مارین ـ ایران

ترکیب: ویتامین B_1 ۱۰۰ میلی‌گرم + ویتامین B_2 ۴۰ میلی‌گرم + ویتامین B_6 ۴۰ میلی‌گرم + ویتامین B_{12} ۱۰۰ گاما + نیکوتینامید ۴۰۰ میلی‌گرم + پانتوتنات سدیم ۶۰ میلی‌گرم.

موارد استعمال: بری‌بری، ضعف اعصاب، پلاگر، نوریت، پلی‌نوریت، آبستنی، دیابت.

مقدار مصرف و طرز استعمال: بزرگسالان: روزی ۳ بار، هربار ۲ قاشق مرباخوری. خردسالان: ۱ قاشق مرباخوری.

بسته‌بندی: شربت ۱۲۵ میلی‌گرم.

بها: ۸۲ ریال.

PADERYL
کلن بیلا فرانسه ـ فارما شیمی ایران

ترکیب: در هر قرص یا هر (۵ میلی‌لیتر شربت): برمیدرات پاپاورین ۱۵ میلی‌گرم (۵ میلی‌گرم) + برمیدرات کدئین ۲۰ میلی‌گرم (۷/۵ میلی‌گرم) + کلریدرات دوفنیل لینامات دودی‌اتیل آمینو ـ اتانول ۱۵ میلی‌گرم (۱/۲۵ میلی‌گرم) + عصاره بلادون ۲/۲۵ میلی‌گرم (۰/۷۵ میلی‌گرم) + عصاره ژوسکیام ۱۰ میلی‌گرم (۳/۲۵ میلی‌گرم) + وازلین ۳۰ میلی‌گرم + هیدروکسی ـ ۴ ـ بنزوات دومتیل (۹ میلی‌گرم) + هیدروکسی ـ ۴ ـ بنزوات دوپروپیل (۱ میلی‌گرم).

موارد استعمال: سرفه، تشنج عضلات صاف نایژه‌ها، سیاه‌سرفه، بیخوابیها، اختلالات عصبی زمان یائسگی.

مقدار مصرف و طرز استعمال: بزرگسالان: روزی ۱ ـ ۳ قرص در فواصل غذا. شربت ـ از ۲/۵ ـ ۷ سال: روزی ۱ ـ ۳ قاشق مرباخوری، ۱۰ سال: ۳ ـ ۵ قاشق مرباخوری، ۱۰ ـ ۱۵ سال: ۴ ـ ۶

P

قاشق مرباخوری. بزرگسالان: روزی ۶ــ۱۲ قاشق مرباخوری.
موارد منع استعمال: خردسالان کوچکتر از ۳۰ ماه.
عوارض جانبی: خواب‌آلودگی.
بسته‌بندی: قرص × ۳۰. شربت ۱۵۰ میلی‌لیتر.
بها: قرص ۵۹ ریال. شربت ۴۹ ریال.

PADUTIN
PADUTIN Retard
بایرــ آلمان

ترکیب: کالیکرئین.
موارد استعمال: اختلالات گردش خون محیطی، آرتریواسکلروز اوبلیتران، ترومبو آنژئیت اوبلیتران، گانگرن دیابتی، بیماری رینو، تغییرات تروفیک انساج، سرمازدگی، تسریع در التیام، زخمهای ناشی از سوختگی و عفونت.
مقدار مصرف و طرز استعمال: روزی ۲ بار، هربار یک قرص. یک دوره درمان با پادوتین روتارد شامل ۱۵ ــ ۲۰ تزریق روزی ۱ آمپول درعمق عضله سرینی است.
احتیاط: پادوتین روتارد را باید با حلال خودش مصرف کرد نه با آب مقطر.
بسته‌بندی: قرص ۱۰ واحد × ۲۰. آمپول ۱۰ واحد × ۵. پادوتین روتارد ۴۰ واحد + ۱/۵ میلی‌لیتر حلال × ۵.
بها: قرص ۱۰۰ ریال. آمپول ساده ۶۷ ریال روتارد ۲۲۰ ریال.

P

PALADAC
پارک دیویس آمریکا ــ ایران

ترکیب: در هر ۵ میلی‌لیتر: ویتامین A ۵۰۰۰ واحد + ویتامین B_1 ۳ میلی‌گرم + ویتامین B_2 ۳ میلی‌گرم + ویتامین B_6 ۱ میلی‌گرم + ویتامین B_{12} ۵ میکروگرم + ویتامین D ۴۰۰ واحد + نیاسینامید ۲۰ میلی‌گرم + اسید پانتوتنیک ۵ میلی‌گرم.
موارد استعمال: پیشگیری و درمان کمبود ویتامینی در کودکان و بزرگسالان.
مقدار مصرف و طرز استعمال: شیرخواران. روزی نصف قاشق مرباخوری خردسالان و بزرگسالان: روزی یک قاشق مرباخوری یا بیشتر.
بسته‌بندی: شربت ۱۲۰ میلی‌لیتر.

بها: ۸۲ ریال.

PALAPRIN FORT
شرینگ ـ انگلستان

ترکیب: پلی اکسی آلومینات استیل سالیسیلیک = آلوکسی پرین.
موارد استعمال: در تمامی موارد مصرف سالیسیلاتها.
مقدار مصرف و طرز استعمال: روزی ۳ ـ ۴ بار، هربار ۱ ـ ۲ قرص.
موارد منع استعمال: حساسیت به‌سالیسیلاتها.
بسته بندی: قرص × ۱۰۰.
بها: ۲۰۰ ریال.

PALITREX
بریستول ـ آمریکا

ترکیب: سفالکسین منوهیدرات.
موارد استعمال: عفونتهای دستگاه تنفسی، پوست و انساج نرم دستگاه تناسلی ـ ادراری.
مقدار مصرف و طرز استعمال: روزی ۱ ـ ۴ گرم در ۶ دوز مساوی، خردسالان: ۲۵ ـ ۱۰۰ میلی‌گرم بازاء هر کیلو وزن در روز.
موارد منع استعمال: نارسائی شدید کلیوی.
بسته بندی: کپسول ۲۵۰ و ۵۰۰ میلی‌گرم × ۱۰۰، شربت ۱/۵ و ۳ گرم × ۶۰ میلی‌لیتر، قطره ۱ گرم × ۱۰ میلی‌لیتر.
بها: کپسول ۲۵۰ میلی هر عدد ۴۰ ریال، ۵۰۰ میلی ۷۰ ریال، شربت ۱/۵ گرم ۲۴۰ ریال، ۳ گرم ۴۱۰ ریال، قطره ۱۴۰ ریال.

PANBETINE Forte
لپتی ایتالیا ـ ایران

ترکیب: در هر دراژه: ویتامین B_2 ۱۰ میلی‌گرم + ویتامین B_6 ۱۲ میلی‌گرم + منونیترات ویتامین B_1 ۱۵ میلی‌گرم + ویتامین B_{12} ۲۰ میکروگرم + پانتوتنات کلسیم ۲۰ میلی‌گرم + نیکوتینامید ۵۰ میلی‌گرم.
موارد استعمال: کمبود ویتامین B کمپلکس، بی‌اشتهایی، خستگی، نارسائی کبد، دوران نقاهت پس از درمان با آنتی‌بیوتیکها.
مقدار مصرف و طرز استعمال: خردسالان: برحسب وزن بدن بزرگسالان: روزی ۲ ـ ۳ دراژه.

P

بسته بندی: دراژه × ۲۰. شربت ۸۰ میلی‌لیتر.
بها: قرص ۴۴ ریال. شربت ۶۲ ریال.

PANCORTIN B_6
PANCORTIN PEDIATRIC
ریختر ـ ایتالیا

ترکیب: عصارهٔ قسمت قشری غده فوق کلیوی (بدون آدرنالین) ۱۲ واحد + ویتامین B_6 ۵۰ میلی‌گرم. خردسالان: عصاره قشری ۸ واحد + ویتامین B_6 ۲۰ میلی‌گرم.
موارد استعمال: استفراغ های آبستنی و بعد از اعمال جراحی، مسمومیت‌های داخلی و خارجی، عفونتها و اسهال‌های شدید.
خردسالان: گاستروآنتریت‌های فصلی، اسهال‌های شدید، استفراغ های استنمیک.
مقدار مصرف و طرز استعمال: روزی یک آمپول عضلانی یا وریدی.
بسته بندی: آمپول ۱ میلی‌لیتر × ۳.
بها: بزرگسالان: ۱۱۲ ریال. خردسالان: ۸۳ ریال.

PANCREFLASH
فرانسیس تراپوتیک ـ فرانسه

ترکیب: ترپسین + عوامل آمیلولی تیک + لیپاز + آنزیم‌های مترشحه آسپرژیلوس + صفرا.
موارد استعمال: سوءهاضمه ناشی از بدکارکردن معده یا کیسه صفرا، گاستر کتومی.
مقدار مصرف و طرز استعمال: روزی ۲ بار، هربار ۱ قرص قبل از غذا.
بزرگسالان: روزی ۲ بار، هربار ۱ ـ ۲ قرص.
بسته بندی: دراژه × ۶۰.
بها: ۲۰۰ ریال.

PANGADUINE
مارتین ـ فرانسه

ترکیب: در هر ۱۰۰ گرم: عصاره جگر ۸۳ میلی‌گرم + متیل آرسنیات سدیم ۱۶ میلی‌گرم + گلیسروفسفات سدیم ۶۶ میلی‌گرم + کاروتن ۰/۲ میلی‌گرم + ویتامین D ۰/۰۰۱۶ میلی‌گرم.
موارد استعمال: تسریع رشد، کم‌خونی، کمبود قوا و ضعف بدنی ناشی از فعالیت زیاد، کمبود اشتها.

P

مقدار مصرف و طرز استعمال: روزی ۱ قاشق مرباخوری.
بسته بندی: شربت ۳۰۰ میلی‌لیتر.
بها: ۹۳ ریال.

PANOXYL
استی‌فل ـ آمریکا

ترکیب: پلی‌اکسی اتیلن لوریل‌اتر ۶ درصد + الکل کلوئیدال ـ منیزیم آلومینیم سیترات ۴۰ درصد + هیدروکسی پروپیل اتیل سلولز + اسیدسیتریک + بنزوئیل پراکسید ۵ درصد در شماره ۵ و ۱۰ درصد در شماره ۱۰.
موارد استعمال: پیشگیری و درمان جوشهای صورت.
مقدار مصرف و طرز استعمال: بعد از شستشوی صورت با آب و صابون مقدارکمی از پماد را روی جوشها بمالند این عمل یکبار قبل از خواب و چند بار روزانه انجام میشود.
موارد منع استعمال: حساسیت بدارو.
احتیاط: نباید دارو با چشم یا دهان تماس پیدا کند.
بسته بندی: پماد در لوله‌های ۱/۵ اونسی.
بها: ۲۳۴ ریال.

PANTO CREAM
مینا ـ ایران

ترکیب: در هر ۱۰۰ گرم: پانتنول ۵ گرم + فلوئوسینولون ـ استونایید ۰/۰۲۵ گرم + اکسیددوزنگ ۵ گرم.
موارد استعمال: درماتیت تماسی، اکزمای شغلی سبوریک، پسوریازیس، سوختگی سطحی، گزش حشرات.
مقدار مصرف و طرز استعمال: روزی ۲ ـ ۳ بار روی پوست بمالند.
موارد منع استعمال: سل پوستی، سیفلیس، عفونتهای قارچی یا ویروسی.
بسته بندی: کرم ۲۰ گرم.
بها: ۱۳۳ ریال.

PANZYNORM
نوردمارک ـ آلمان

ترکیب: در هر دراژه: پانکراتین ۱۱۰ میلی‌گرم + عصاره معده ۱۰۰ میلی‌گرم + صفرای گاو ۴۰ میلی‌گرم.
موارد استعمال: اختلالات گوارشی بویژه کمبود پانکراتین، بیماریهای

کبدی و صفراوی، سوءهضم تخمیری، عدم تشکیل آنزیمها.
مقدار مصرف و طرز استعمال: ۱ـ۲ دراژه بعد از هر غذا، در موارد سخت ۴ـ۳ دراژه میل کنند.
بسته‌بندی: دراژه × ۱۰۰۰.
بها: ۲۵۰۰ ریال.

PARACODINE
کنول ـ آلمان

ترکیب: بی‌تارتارات پاراکدئین ۲ درصد + عصاره فعال گیاهان خلط‌آور.
موارد استعمال: برونشیت، سیاه‌سرفه، تراکئیت، فارنژیت، لارنژیت، آمفیزم، سل ریوی و تنگی‌نفس مربوط به‌دژنرسانس عضله قلب.
مقدار مصرف و طرز استعمال: خردسالان: روزی ۳ بار، هربار ۰/۵ ـ ۱ قاشق مرباخوری. بزرگسالان: روزی ۳ بار، هربار ۱ـ۲ قاشق مرباخوری.
بسته‌بندی: شربت ۱۲۰ میلی‌لیتر.
بها: ۱۲۹ ریال.

PARADRYL
فروسان دانمارک ـ
فارمکس ایران

ترکیب: بتا ـ (دی فنیل متوکسی) ـ اتیل تری متیل آمونیـــم ـ بروماید.
موارد استعمال: سرفه‌های تحریکی و آلرژیک، برونشیت، لارنژیت، پنومونی، آسم، برنشاکتازی.
مقدار مصرف و طرز استعمال: خردسالان: روزی ۳ ـ ۴ قاشق چایخوری. بزرگسالان: روزی ۳ قاشق مرباخوری.
بسته‌بندی: شربت ۱۰۰ میلی‌لیتر.
بها: ۷۶ ریال.

PARAFLEX
سیلاگ‌شمی ـ
سویس

ترکیب: در هر قرص: ۵ ـ کلروبنزاکسازول = کلربنزوکسازون.
موارد استعمال: میالژی، روماتیسم عضلانی، لومباگو، فیبروزیت، آرتریت روماتوئید.
مقدار مصرف و طرز استعمال: خردسالان تا ۶ ساله: روزی ۳ ـ ۴ بار،

هربار ربع تا ۱ قرص، ۶ساله به‌بالا: روزی ۳-۴ بار، هربار ۱ قرص. بزرگسالان: روزی ۳-۴ بار، هربار ۱-۲ قرص.
بسته بندی: قرص ۲۵۰ میلی‌گرم × ۲۰.
بها: قرص ۱۲۰ ریال.

PARAGARINE
مارین-ایران

ترکیب: آگاراگار+ پارافین مایع + فنل‌فتالئین.
موارد استعمال: انواع یبوست‌ها مخصوصاً در زنان باردار، پیرمردان، بیماران بواسیری و یبوست اشخاص جراحی شده.
مقدار مصرف و طرز استعمال: بزرگسالان: شب موقع خواب ۱-۲ قاشق سوپخوری میل کنند. خردسالان: روزی نصف تا یک قاشق مرباخوری.
احتیاط: در جای خنک نگهداری شود و قبل از مصرف شیشه را تکان دهند.
بسته بندی: امولسیون ۲۰۰ میلی‌لیتر.
بها: ۴۷ ریال.

PARAMOL
ریتا-ایران

ترکیب: استیل پارا آمینوفنل = پاراستامول ۵۰۰ میلی‌گرم.
موارد استعمال: سردرد، دندان درد، دردهای روماتیسمی، درد اعصاب، دردهای عضلانی، کمردرد و دردهای ماهیانه زنان.
مقدار مصرف و طرز استعمال: بزرگسالان: ۱-۲ قرص هر سه الی چهار ساعت. خردسالان ۶ تا ۱۲ ساله: روزی ۳-۴بار، هربار ۱ قرص.
بسته بندی: قرص ۴ عددی × ۵۰.
بها: ۲۸۰ ریال.

PARAXIN
بهرینگر مانهایم
آلمان- تهران فارما
ایران

ترکیب: در هر ۶۰ میلی‌لیتر شربت: پانتوتنات کلسیم ۷۵ میلی‌گرم + ویتامین B_1 ۰/۰۱۵ میلی‌گرم + اسیدفولیک ۵/۶۲۶ میلی‌گرم + کلرامفنیکل ۱/۵ گرم. در هر کپسول: آنورین ۳ میلی‌گرم + لاکتوفلاوین ۳ میلی‌گرم + اسید نیکوتینامید ۲۰ میلی‌گرم +

پانتوتنات کلسیم ۵ میلی‌گرم + ویتامین B_{12} ۰/۰۰۱ میلی‌گرم + ویتامین B_6 ۱ میلی‌گرم + کلرامفنیکل ۲۵۰ میلی‌گرم.

موارد استعمال: عفونت‌های سالمونلا، عفونت‌های دستگاه گوارش، میزراه، کیسه و مجاری صفرا و دستگاه تنفس.

مقدار مصرف و طرز استعمال: برحسب نوع و شدت بیماری متفاوت است.

موارد منع استعمال: زردی همولیتیک و بیماریهای خون بویژه پانمیلوپاتی.

بسته بندی: شربت ۶۰ میلی‌لیتر. کپسول ۲۵۰ میلی‌گرم × ۱۲ و ۲۵۰. قطره گوشی ۵ درصد ۶ میلی‌لیتر.

بها: شربت ۹۴ ریال. کپسول ۱۲ عددی ۱۰۵ ریال، ۲۵۰ عددی ۱۷۵۷ ریال. قطره گوشی ۵۹ ریال.

PARAZOLINE SUSPENSION

عبیدی ـ ایران

ترکیب: در هر قاشق سوپخوری: فورازولیدون ۵۰ میلی‌گرم + عصاره اوپیوم ۵ میلی‌گرم + کائولن ۳ گرم + پکتین ۲۲۵ میلی‌گرم + اسانس انیس ۲۰ میلی‌گرم.

موارد استعمال: ضدعفونی روده‌ها در اسهالهای باسیلی و گاستروآنتریت‌ها.

مقدار مصرف و طرز استعمال: بزرگسالان: روزی ۴ بار هربار ۲ قاشق سوپخوری، خردسالان ۰/۵ ـ ۱ قاشق.

بسته بندی: شربت ۶۰ میلی‌لیتر.

بها: ۶۲ ریال.

PAREGUAN

عبیدی ـ ایران

ترکیب: هر یک قاشق غذاخوری: الگزیرپارگوریک ۲ گرم + سولفاسوکسیدین ۲ گرم + کائولن ۳ گرم + پکتین ۰/۲۲۵ گرم

در هر قرص: تنطور اپیوم ۰/۰۵ میلی‌لیتر + سولفاسوکسیدین ۵۰۰ میلی‌گرم.

موارد استعمال: اسهالهای باسیلی، گاستروانتریتهای اپیدمیک، اسهالهای تابستانی، اسهال اطفال بامنشأ نامعلوم.

مقدار مصرف و طرز استعمال: خردسالان: هر ۴ ساعت ۱ بار، هربار نصف تا ۲ قاشق مرباخوری. بزرگسالان: روزی ۴ـ۵ بار، هربار ۱ تا ۲ قاشق غذاخوری.

احتیاط: ۱ ـ مقادیر فوق به‌نسبتی که اسهال خفیف‌تر میشود، کم میگردد. ۲ ـ بیش از ۷ روز نباید معالجه با این دارو را ادامه داد.

بسته بندی: سوسپانسیون ۹۰ میلی‌لیتر. قرص × ۱۰۰.

بها: سوسپانسیون ۷۰ ریال. قرص ۲۳۴ ریال.

PARLODEL
ساندوز ـ سویس

ترکیب: ۲ ـ برومو ـ آلفا ـ ارگو کریپتین = بروموکریپتین.

موارد استعمال: ترشح زیاد شیر توأم با آمنوره یا بدون آن، کاهش هورمون پرولاکتین در اثر اختلالات قاعدگی، قطع شیر.

مقدار مصرف و طرز استعمال: روزی ۲ـ۳ بار، هربار نصف قرص همراه غذا بمدت ۱۴ روز.

موارد منع استعمال: سرطان غده هیپوفیز.

عوارض جانبی: در ابتدای درمان گاهی تهوع، سرگیجه، کاهش فشار خون نزد بیماران آمبولیک.

احتیاط: دارو حتما باید با غذا مصرف شود.

بسته بندی: قرص ۴/۵ میلی‌گرم × ۳۰.

بها: ۹۰۰ ریال.

PARMAL
عبیدی ـ ایران

ترکیب: در هر میلی‌لیتر شربت: مالئات پیریلامین ۷ میلی‌گرم، در هر قرص: ۳۵ میلی‌گرم.

موارد استعمال: برنشیت، سرفه های تحریکی، سرفه های آلرژیک.

مقدار مصرف و طرز استعمال: روزی ۳ قاشق غذاخوری.

بسته بندی: شربت ۱۲۰ میلی‌لیتر. قرص ۵۰۰ عددی.

بها: شربت ۵۳ ریال، قرص ۴۶۸ ریال.

PASSAL
لپتی ایتالیا ـ ایران

ترکیب: در هر قرص: آسپیرین ۳۰۰ میلی‌گرم + فناستین ۲۰۰ میلی‌گرم + فنیل اتیل‌مالونیل اوره ۲۵ میلی‌گرم + کافئین ۵۰ میلی‌گرم.
موارد استعمال: سردرد، دندان درد، گریپ، سرماخوردگی، دردهای ماهانه زنان.
مقدار مصرف و طرز استعمال: خردسالان بزرگتر از ۶ سال: روزی ۰/۵ - ۱ قرص. بزرگسالان: روزی ۱ - ۲ قرص.
بسته بندی: قرص × ۱۰۰.
بها: ۸۲ ریال.

PASSIBROMINE
اپوشیمیوترابی ـ فرانسه

ترکیب: در هر ۱۰۰ گرم فنوباربیتال ۰/۱۵ گرم + آمیدوپیرین ۰/۳۱ گرم + برمور کلسیم ۳ گرم + برمورسدیم ۶ گرم + عصاره والریان ۲۳ گرم + عصاره پاسیفلور ۴ گرم + تنطور اوبه‌پین ۴ گرم.
موارد استعمال: بیخوابیها، خستگی فکر، صرع، حمله‌های تشنجی، اضطراب، اختلالات اعصاب.
مقدار مصرف و طرز استعمال: در بیخوابیها ۱ ـ ۲ قاشق مرباخوری شب قبل از خواب. درسایر موارد روزی ۵ قاشق مرباخوری بین غذا.
بسته بندی: شربت ۱۲۵ میلی‌لیتر.
بها: ۵۹ ریال.

PASSIFLORINE
سارپ ـ فرانسه

ترکیب: فرآورده‌ای از گیاه پاسیفلورا انکارناتا ۸/۷ گرم + عصاره بید سفید ۴/۳۵ گرم + گراتاگوس اکسی کانتا ۸/۷ گرم.
موارد استعمال: تحریک شدید و نامنظم عصبی، نورآستنی، اضطراب، طپش قلب و تاکیکاردی ناشی از اختلال عصبی، سرگیجه و بیخوابی.
مقدار مصرف و طرز استعمال: روزی ۲ بار، هربار ۱ ـ ۴ قاشق مرباخوری
بسته بندی: شربت ۱۲۵ میلی‌لیتر
بها: ۹۰ ریال.

PASUMA Forte
مرك ـ آلمان

ترکیب: در هر دراژه: متیل تستوسترون ۵ میلی‌گرم + استات توکوفرول ۳ میلی‌گرم + کلریدرات یوهمبین ۳ میلی‌گرم + گلیسرو فسفات استریکنین ۰/۳۵ میلی‌گرم + کافئین ۱۵ میلی‌گرم + کلریدرات افدرین ۱ میلی‌گرم. آمپول: پروپیونات تستوسترون ۱۰ میلی‌گرم + استات آلفاتوکوفرول ۲۰ میلی‌گرم + گلیسرو- فسفات یوهمبین ۸ میلی‌گرم + گلیسرو فسفات استریکنین ۰/۵ میلی‌گرم.

موارد استعمال: خستگیهای جسمی و روانی، ضعف قوای جنسی.

مقدار مصرف و طرز استعمال: دراژه: روزی ۳ بار، هربار ۱ ـ ۲ دراژه بعد از غذا. آمپول: روزی یک عدد داخل عضله تزریق میشود.

بسته‌بندی: دراژه × ۱۰۰، آمپول × ۵.

بها: دراژه ۲۳۴ ریال. آمپول ۷۰ ریال.

PAVULON
ارگانون هلند ـ ایران

ترکیب: بروسور پانکرونیوم.

موارد استعمال: شل کردن عضلات در جراحیها، جراحی شکم، مقعد، چشم، شکستگی.

مقدار مصرف و طرز استعمال: خردسالان: ۰/۰۲ ـ ۰/۰۸ میلی‌گرم برای هر کیلو وزن. بزرگسالان: بین ۴ ـ ۶ میلی‌گرم تزریق وریدی (این مقدار معادل ۲۰ ـ ۳۰ میلی‌گرم توبوکوراین است).

موارد منع استعمال: بیماران مبتلا به‌میاستنی نارسائی شدید کلیوی.

احتیاط: در بیماران مبتلا به‌فشارخون باید با احتیاط مصرف شود. در مصرف بیش از حد باید از ۲/۵ میلی‌گرم متیل سولفات- نئوستیگمین همراه با ۱/۲ میلی‌گرم سولفات آتروپین همراه با رسپیراتور استفاده نمود.

عوارض جانبی: افزایش تعداد نبض و بازده قلب، کاهش فشار داخلی کره چشم.

بسته‌بندی: آمپول ۴ میلی‌گرم ـ ۲ میلی‌لیتر × ۱۰.

بها: ۴۵۰ ریال.

P

PAXEDIN
بوتس انگلستان ـ
پارس ایران

ترکیب: کدئین فسفات ۸ میلی‌گرم + اسید استیل سالیسیلیک ۲۶۰ میلی‌گرم + فناستین ۲۶۰ میلی‌گرم.
موارد استعمال: مسکن و ضد تب قوی، در سرماخوردگی، روماتیسم، دندان درد، دیسمنوره و دردهای بعد از جراحی و زایمان.
مقدار مصرف و طرز استعمال: بزرگسالان: روزی ۳ بار، هربار ۱ ـ ۲ قرص. خردسالان: روزی ۳ بار، هربار نصف تا ۱ قرص.
موارد منع استعمال: کودکان کمتر از ۵ سال.
بسته‌بندی: قرص ۱۰ عددی × ۲۰.
بها: هر عدد ۲ ریال.

PAXIDAL
والاس ـ انگلستان

ترکیب: پارا ـ استیل آمینوفنل ۳۲۵ میلی‌گرم + مپروبامات ۱۳۵ میلی‌گرم + کافئین ۶۵ میلی‌گرم.
موارد استعمال: بیخوابی، ناراحتی عصبی، روماتیسم عضلانی، دردهای عضلانی، درد و هیجان دوران قاعدگی و یائسگی.
مقدار مصرف و طرز استعمال: روزی ۱ ـ ۳ قرص.
بسته‌بندی: قرص × ۵۰.
بها: ۱۳۰ ریال.

P

PCB
شوئه ـ فرانسه

ترکیب: هپاتیک لیوفیلیزه + ویتامین P ۵۰ میلی‌گرم + ویتامین C ۱۰۰ میلی‌گرم + ویتامین B_6 ۵۰ میلی‌گرم + ویتامین B_{12} ۱۰۰ گاما.
موارد استعمال: فقر غذائی، آنمی هپاتیت، سیروز، نوروپاتی، ضعف عمومی.
مقدار مصرف و طرز استعمال: روزی ۱ ـ ۲ آمپول عضلانی یا وریدی.
بسته‌بندی: آمپول × ۵.
بها: ۲۳۰ ریال.

PECTAMED
مرك آلمان ـ ایران

ترکیب: در هر میلی‌لیتر: کلریدرات افدرین ۱۰ میلی‌گرم + کلریدرات آمونیوم ۲۰ میلی‌گرم + عصاره تیم + پریمه‌ور + سانتول.

موارد استعمال: سرفه‌های اسپاسمودیک و تحریکی، برنشیت و ضایعات مجاری تنفسی، سرفه‌های ناشی از استعمال دخانیات.

مقدار مصرف و طرز استعمال: بزرگسالان: روزی ۳ـ۴ بار، هربار ۱۵ ـ ۲۰ قطره، خردسالان: روزی ۳ ـ ۴ بار، هربار ۵ـ ۱۵ قطره، شیرخواران: روزی ۳ ـ ۴ بار، هربار ۳ ـ ۵ قطره.

بسته بندی: قطره خوراکی ۱۵ میلی‌لیتر.

بها: ۳۵ ریال.

PECTAMOL
بی‌دی‌اچ انگلستان ـ داروپخش ایران

ترکیب: در هر قاشق مرباخوری: سیترات اکسلادین ۱۰ میلی‌گرم.

موارد استعمال: برونشیت، سرفه‌های خشک، سخت و تحریکی.

مقدار مصرف و طرز استعمال: خردسالان: روزی ۴ بار، هربار ۰/۵ ـ ۱ قاشق مرباخوری. بزرگسالان: روزی ۴ بار، ۱ـ۲ قاشق مرباخوری.

بسته بندی: شربت ۶۰ میلی‌لیتر.

بها: ۵۳ ریال.

PECTO BE - BE
لپتی ایتالیا ـ ایران

ترکیب: بنزوات سدیم ۱/۱۲ گرم + برمور سدیم ۰/۵۵ گرم + عصارهٔ مایع دروزرا ۱/۱۲ گرم + تنطور بلادن ۰/۳۸ گرم + عصارهٔ مایع بالسام‌تلو ۱/۷ گرم + عصارهٔ مایع پرسیاوش ۱/۱۲ گرم + آب کلروفرمه ۱۰ میلی‌لیتر.

موارد استعمال: سرفه، سیاه‌سرفه، پنومونی، برونشیت کودکان، گریپ.

مقدار مصرف و طرز استعمال: خردسالان تا ۳ سال: هر ۲ ـ ۶ ساعت نصف قاشق چای‌خوری. خردسالان ۳ ـ ۷ سال هر ۳ ساعت ۱ قاشق چای خوری.

بسته بندی: شربت ۹۰ میلی‌لیتر.

بها: ۴۳ ریال.

PECTO - BROM

ترکیب: شربت: فسفات کدئین ۶۰ میلی‌گرم + بروموفرم ۴۰۰ میلی‌گرم + فنوباربیتال ۱۰۰ میلی‌گرم + تنطور آکونیت

P

۱/۵ گرم + تنطور اپیکا ۱ گرم + تنطور دروزرا ۴۳۰ میلی‌گرم + عصارهٔ مایع سربوله ۲ گرم + عصارهٔ مایع سنه ۷/۵ گرم + اکسیپیان تا ۱۰۰ گرم.

موارد استعمال: سرفه‌های تشنجی و متوالی، برنشیت، لارنشیت، گریپ، سیاه‌سرفه.

مقدار مصرف و طرز استعمال: روزی ۳ ـ ۶ قاشق غذاخوری.

بسته بندی: شربت ۱۲۰ میلی‌لیتر.

بها: ۴۹ ریال.

PECTOCODE
عبیدی ـ ایران

ترکیب: در هر اونس: بنزوات سدیم ۰/۸۳ گرم + گایاکو- سولفونات پتاسیم ۰/۶ گرم + برمورسدیم ۰/۶۵ گرم + فسفات کدئین ۰/۰۶۵ گرم + تنطور اپیکا ۰/۱۵ گرم + تنطور آکونیت ۰/۱۵ گرم + عصارهٔ مایع تولو ۱ گرم + عصاره مایع کاپیلر ۱ گرم + الکل ۰/۳ گرم + کلروفرم ۰/۱ گرم + اسید بنزوئیک ۰/۰۴۵ گرم در هر قرص کدئین ۱۵ میلی‌گرم + فنوباربیتال ۱۰ میلی‌گرم + ئیدرات‌ترپین ۱۵۰ میلی‌گرم + بنزوات سدیم ۱۵۰ میلی‌گرم + کدئین خالص ۱۵ میلی‌گرم + فنوباربیتال ۱۰ میلی‌گرم + ترپین هیدراته ۱۵۰ میلی‌گرم + بنزوات سدیم ۲۵۰ میلی‌گرم.

موارد استعمال: سرفه‌های ناشی از سرما خوردگی، برنشیتهای حاد، پنومونی، برنکو پنومونی و سرفه‌های تشنجی.

مقدار مصرف و طرز استعمال: شربت ـ خردسالان: ۶ ـ ۱۲ سال: هر ۴ ساعت ۱ قاشق مرباخوری. بزرگسالان: هر ۴ ساعت ۲ قاشق مرباخوری. قرص ـ بزرگسالان: روزی ۲ بار، هربار ۱ قرص خردسالان: نصف مقدار فوق.

احتیاط: شربت برای خردسالان کمتر از ۳ سال تجویز نمیشود.

بسته بندی: شربت ۱۲۰ میلی‌لیتر. قرص × ۶.

بها: شربت ۷۰ ریال، قرص هربسته ۶ عددی ۴۵ ریال.

P

PECTOGOL
گل - ایران

ترکیب: در هر قاشق سوپخوری: کدئین ۰/۲۵ گرم + کره اوزوت ۰/۱ گرم + ۲ قطره الـکلاتـورریشه آکونیت + لاکتو- فسفات دوشو.

موارد استعمال: سینه درد، سرفه، التهاب دستگاه تنفس، برنشیت حاد و مزمن.

مقدار مصرف و طرز استعمال: خردسالان ۳ - ۸ سال: روزی ۳ - ۴ قاشق مرباخوری. خردسالان ۷ - ۱۵ سال: روزی ۳ - ۴ قاشق غذاخوری: بزرگسالان: روزی ۳ - ۴ قاشق سوپخوری.

بسته بندی: شربت ۱۲۰ میلی‌لیتر.

بها: ۵۳ ریال.

PECTOMYCINE
میسین - ایران

ترکیب: در هر قرص: کدئین ۱ سانتی‌گرم + ئیدرات ترپین ۵ سانتی‌گرم + اسانس تربانتین ۳ سانتی‌گرم در هر ۵ میلی‌لیتر شربت: کلریدرات پرومتازین ۵ میلی‌گرم + فسفات کـدئین ۱۰ میلی‌گرم + کلریدرات فنیل افرین ۵ میلی‌گرم + گایاکوسولفونات - پتاسیم ۴۴ میلی‌گرم + عصاره برگ اپیکا + کلروفرم + الکل ۷ درصد.

موارد استعمال: برنشیت حاد و مزمن، برونکوپنومونی، سینه درد و سرفه‌های سخت، گرفتگی سینه و کلیه عوارض دستگاه تنفسی.

مقدار مصرف و طرز استعمال: قرص: روزی ۳ - ۴ بار، هربار ۱ - ۲ عدد. شربت: روزی ۳ - ۶ بار، هربار ۱ قاشق مرباخوری.

بسته بندی: قرص × ۲۰. شربت ۹۰ میلی‌گرم.

بها: قرص ۳۰ ریال. شربت ۵۶ ریال.

PECTONE SYRUP
مینا - ایران

ترکیب: بنزوات سدیم + برمورسدیم + کامفوسولفونات - سدیم + سولفوگایاکولات پتاسیم + تنتورآکونیت + شربت کدئین ۲۰ درصد.

موارد استعمال: لارنژیت، فارنژیت، تراکئیت، پنومونی، برنکوپنومونی

مقدار مصرف و طرز استعمال: خردسالان بزرگتر از ۳ سال: روزی ۳ - ۶

بار، هربار یک قاشق مرباخوری. بزرگسالان: روزی ۳-۴ بار، هربار یک قاشق غذاخوری.

موارد منع استعمال: کودکان کوچکتر از ۳ سال.

بسته بندی: شربت ۱۲۰ میلی لیتر.

بها: ۴۹ ریال.

PECTON TAB.
مینا - ایران

ترکیب: در هر قرص: گایاکول سولفونات پتاسیم ۱۲۵ میلی گرم + کلریدرات فنیل افرین ۸ میلی گرم + ترپین ۱۰۰ میلی گرم + کلرفنیر امین مالئات ۲ میلی گرم + کلرور آمونیم ۱۶۵ میلی گرم.

موارد استعمال: سرفه های دردناک، برونشیت، سرماخوردگی.

مقدار مصرف و طرز استعمال: بزرگسالان: هر ۴-۶ ساعت ۲ قرص (حداکثر تا هشت قرص).

بسته بندی: قرص × ۲۰۰.

بها: ۴۶۸ ریال.

PECTORAMIN
رامین - ایران

ترکیب: در هر ۱۰۰ میلی لیتر: کدئین فسفات ۰/۰۵ گرم + کلرفنیر امین مالئات ۰/۰۴ گرم + تیوکول ۱/۵ گرم + محلول تلو ۱۰ میلی لیتر.

موارد استعمال: سرفه و سینه درد مخصوصاً در مواردی که این عوارض همراه با ازدیاد هیستامین باشد.

مقدار مصرف و طرز استعمال: بزرگسالان: روزی ۴ بار هربار یک قاشق سوپخوری. کودکان از هفت سال ببالا: روزی ۴ بار هربار یک قاشق مرباخوری.

عوارض جانبی: مصرف زیاد آن باعث خواب‌آلودگی میشود.

بسته بندی: شربت ۱۲۰ میلی لیتر.

بها: ۴۷ ریال.

PECTORAMIN ENFANT
رامین ـ ایران

ترکیب: در هر ۱۰۰ میلی‌لیتر: کلرفنیرامین مالئات ۰/۰۲ میلی‌گرم + تیوکول ۰/۵ گرم + محلول تلو ۱۰ میلی‌لیتر.

موارد استعمال: سرفه وسرماخوردگی، گریپ و تشنجات برونش‌ها و گلو، تحریکات مخاط بینی.

مقدار مصرف و طرز استعمال: روزی سه بار یک قاشق مرباخوری بعد از هر غذا.

بسته بندی: شربت ۱۰۰ میلی‌لیتر.

بها: ۴۱ ریال.

PEKA
تولیدارو ـ ایران

ترکیب: پکتین ۱ گرم + کائولن ۲۰ گرم.

موارد استعمال: اسهال، گاستریت، انتریت، کولیت.

مقدار مصرف و طرز استعمال: بزرگسالان. ابتدا دو قاشق غذاخوری و بعد از هربار اجابت مزاج ۱ ـ ۲ قاشق غذاخوری. خردسالان: ابتدا دو قاشق مرباخوری و بعد از هربار اجابت مزاج ۱ ـ ۲ قاشق مرباخوری.

بسته بندی: سوسپانسیون ۱۲۰ میلی‌لیتر.

بها: ۶۴ ریال.

P

PEKA - P
تولیدارو ـ ایران

ترکیب: P پکتین ۰/۴۵ گرم + کائولن ۲۰ گرم + الکسیر پارگوریک ۲۰ میلی‌لیتر.

موارد استعمال: نرم کردن روده‌های آزرده و آسیب دیده، اسهالهای ناشی از انواع میکربها.

مقدار مصرف و طرز استعمال: روزی ۳ ـ ۴ بار، هربار، ۱ ـ ۲ قاشق مرباخوری.

بسته بندی: سوسپانسیون ۱۲۰ میلی‌لیتر.

بها: ۷۰ ریال.

PENADUR L-A
وایت ـ آمریکا

ترکیب: بنزاتین پنی‌سیلین.

مکانیسم: پنی‌سیلین با وقفه آنزیم ترانس پپتیداز و رقابت با آلانین موجب ساخته نشدن جدار میکرب و لیزه شدن آن میشود.

موارد استعمال: عفونتهای استرپتوکوکسی و کلیه عفونتهائی که به پنی‌سیلین حساسند.

مقدار مصرف و طرز استعمال: برحسب نوع و شدت بیماری متفاوت است. (معمولا ماهی یک تزریق).

موارد منع استعمال: حساسیت به پنی‌سیلین.

بسته‌بندی: ویال ۱/۲۰۰۰ و ۲/۴۰۰۰ واحدی × ۱.

بها: ۱/۲۰۰۰ واحدی ۷۵ ریال، ۲/۴۰۰۰ واحدی ۱۰۵ ریال.

PENBRITIN
بیچام ـ انگلستان

ترکیب: آلفا ـ آمینوبنزیل پنی‌سیلین = آمپی‌سیلین.

موارد استعمال: عفونتهای دستگاه گوارش، مجاری تنفسی، مجاری ادراری.

مقدار مصرف و طرز استعمال: کپسول ـ بزرگسالان: در عفونتهای شدید: ۵۰۰ میلی‌گرم هر ۴ ـ ۶ ساعت، عفونتهای خفیف: ۲۵۰ میلی‌گرم هر ۴ ـ ۶ ساعت. خردسالان: روزی ۲۵ ـ ۵۰ میلی‌گرم برای هر کیلو وزن. شربت: خردسالان ۵ ـ ۱۰ سال: ۱۲۵ ـ ۲۵۰ میلی‌گرم هر ۶ ساعت، ۲ ـ ۵ سال: ۱۲۵ میلی‌گرم هر ۶ ساعت، تا ۲ سال: ۶۲/۵-۱۲۵ میلی‌گرم هر ۶ ساعت. آمپول: ۵۰۰ میلی‌گرم هر ۴-۶ ساعت بصورت عضلانی، وریدی، پرفوزیون. خردسالان: ۲۵ - ۵۰ میلی‌گرم برای هر کیلو وزن در روز، ۵-۱۰ سال: ۱۲۵ - ۲۵۰ میلی‌گرم هر ۶ ساعت، ۲ - ۵ سال: ۱۲۵ میلی‌گرم هر شش ساعت، تا ۲ سال: ۶۲/۵-۱۲۵ میلی‌گرم هر شش ساعت.

موارد منع استعمال: حساسیت به پنی‌سیلین.

عوارض جانبی: گاهی اسهال خفیف و بثورات پوستی.

بسته‌بندی: کپسول ۲۵۰ میلی‌گرم × ۸، ۵۰۰ میلی‌گرم × ۱۰۰. شربت ۱۲۵ و ۲۵۰ میلی‌گرم = ۵ میلی‌لیتر × ۶۰ میلی‌لیتر. ویال

P

۲۵۰ میلی‌گرم × ۱۰ ویال، ۵۰۰ میلی‌گرم × ۱۰. ۱ گرمی × ۱ ، قطره ۱۰ میلی‌لیتر.

بها: کپسول ۲۵۰ میلی ۱۰۳ ریال، ۵۰۰ میلی هر عدد ۲۳ ریال. شربت ساده ۱۰۵ ریال. شربت فورت ۱۸۷ ریال. ویال ۲۵۰ میلی ۳۶ ریال، ۵۰۰ میلی ۷۵ ریال ، قطره ۷۰ ریال.

PENICILLINE
هوخست ـ آلمان

ترکیب: ملح سدیم بنزیل پنی‌سیلین.

موارد استعمال: کلیه عفونتهای ناشی از میکروب‌های حساس به پنی‌سیلین.

مقدار مصرف و طرز استعمال: تزریق وریدی: یک میلیون واحد هر ۶ـ۸ ساعت. پرفوزیون: ۱۰ تا ۲۰ میلیون واحد هر ۶ـ۸ ساعت. تزریق داخل عضلانی: ۱ میلیون واحد هر ۶ـ۸ ساعت. تزریق داخل نخاعی: ۵۰۰ واحد در هر میلی‌لیتر مایع نخاعی برای ۲۴ ساعت. مصرف چشم پزشکی: ۵ تا ۱۰ هزار واحد در هر میلی‌لیتر بشکل تزریق زیر ملتحمه‌ای.

احتیاط: بعد از انجام تست مصرف گردد.

بسته‌بندی: ویال ۲۰۰ هزار واحد × ۱۰۰، ویال ۵۰۰ هزار واحد × ۱۰. ویال ۱ میلیون واحد × ۱۰، ویال ۱۰ میلیون واحد × ۱.

بها: ۲۰۰ هزار ۴۷ ریال، ۵۰۰ هزار ۵۹ ریال ۱ میلیون ۸۲ ریال، ۱۰ میلیون ۷۰ ریال.

PENICILLINE G.K
اسکوئیب آمریکا ـ ایران

ترکیب: پنی‌سیلین ژپتاسیم کریستال.

موارد استعمال: عفونتهای حساس به‌پنی‌سیلین، آندوکاردیت، سپتی‌سمی.

مقدار مصرف و طرز استعمال: برحسب شدت بیماری ۱ ـ ۱۰ میلیون واحد.

موارد منع استعمال: حساسیت به‌پنی‌سیلین.

عوارض جانبی: شوک آنافیلاکسی.

بسته‌بندی: ویال‌های ۱ و ۵ میلیون واحدی.

P

بها: ویال ۱ میلیونی ۱۶ ریال، ۵ میلیونی، ۴۷ ریال.

PENILENTE
نوو-دانمارك

ترکیب: بنزیل پنی‌سیلین سدیم ۳۰۰ هزار واحد + پروکائین پنی‌سیلین ۳۰۰ هزار واحد + بنزاتین پنی‌سیلین ژ ۶۰۰ هزار واحد.
موارد استعمال: کلیه عفونتهای حساس به‌پنی‌سیلین.
مقدار مصرف و طرز استعمال: روزی ۱-۲ تزریق عضلانی.
موارد منع استعمال: حساسیت به‌دارو.
بسته بندی: آمپول ۱/۲ میلیون واحد و ۲/۴ میلیون واحد × ۱.
بها: ۱/۲ میلیون واحد ۴۵ ریال، ۲/۴ میلیون واحد ۱۰۵ ریال.

PENIMOX
لوگانو-سویس

ترکیب: آموکسی سیلین تری هیدرات.
موارد استعمال: کلیه عفونتهای حساس به‌آنتی‌بیوتیک فوق.
مقدار مصرف و طرز استعمال: خردسالان: روزی ۳ بار هربار ۱۲۵ میلی‌گرم. بزرگسالان: دوبرابر مقدار خردسالان.
بسته بندی: کپسول ۲۵۰ و ۵۰۰ میلی‌گرم × ۸. شربت ۱۲۵ و ۲۵۰ میلی‌گرم = ۵ میلی‌لیتر × ۳۴ میلی‌لیتر. قطره ۱۰۰ میلی‌گرم = ۱۰ میلی‌لیتر.
بها: کپسول ۲۵۰ میلی هر عدد ۱۹ ریال، ۵۰۰ میلی ۳۶ ریال، شربت ۱۲۵ میلی ۱۶۰ ریال، ۲۵۰ میلی ۲۸۰ ریال. قطره ۱۳۰ ریال.

P

PENIMYCIN
آی دی آی-ایران

ترکیب: آمپی سیلین انیدر.
مکانیسم: مانند پنی‌سیلین با وقفه آنزیم ترانس‌پپتیداز و رقابت با آلانین موجب ساخته نشدن جدار سلول و لیزه شدن آن میشود.
موارد استعمال: کلیه عفونتها و باکتریهای حساس به‌آنتی‌بیوتیک فوق.
مقدار مصرف و طرز استعمال: کپسول هر ۶ ساعت یک عدد. شربت: هر ۶ ساعت یک قاشق مرباخوری.

موارد منع استعمال: حساسیت به‌پنی‌سیلین.

بسته‌بندی: کپسول ۲۵۰ و ۵۰۰ میلی‌گرم × ۱۲ شربت خردسالان ۱/۵ گرم و ۳ گرم ۶۰ میلی‌لیتر.

بها: ۲۵۰ میلی ۱۶۴ ریال، ۵۰۰ میلی ۲۸۱ ریال، شربت ۱۲۵ میلی‌گرم ۱۱۷ ریال، شربت ۲۵۰ میلی‌گرم ۱۸۷ ریال.

PENTAERYTHRIT

ابو-اتریش

ترکیب: پنتااریتریتیل تترانیترات.

موارد استعمال: آنژین دوپوآترین، هیجان قلبی، آرتریواسکلروز، میگرن آسم برونشیال.

مقدار مصرف و طرز استعمال: معمولا ۲-۴ قرص زیرزبان گذاشته می‌مکند.

بسته‌بندی: قرص ۲۰ میلی‌گرم × ۳۰.

بها: ۴۰ ریال.

PENTHRANE

ابوت-آمریکا

ترکیب: متوکسی فلوران.

موارد استعمال: بیهوش کننده عمومی.

مقدار مصرف و طرز استعمال: در آنالژزی: تنفس متناوب بخار ۰/۳ - ۰/۸ درصد توصیه میشود. در بیهوشی دارو همراه با اکسیژن و اکسید نیتروژن حداقل ۵۰ درصد مصرف میشود. پس از یکساعت بیهوشی غلظت ۰/۲ - ۰/۴ درصد با جریان ۵ لیتر در دقیقه کافی است.

موارد منع استعمال: در اشخاصی که پس از مصرف داروهای هالوژنه یرقان یا تب‌های غیرقابل توجیه ناشی از نکروز کبد پیدا کرده‌اند.

احتیاط: در ماه نباید بیش از یکبار مصرف شود در زایمان با غلظت ۰/۳ مصرف شود.

بسته‌بندی: محلول ۱۲۰ میلی‌لیتر.

بها: ۱۴۵۰ ریال.

PENTREXYL
بریستول ـ آمریکا

ترکیب: تری ئیدرات آمپی‌سیلین.

موارد استعمال: عفونتهای دستگاه تنفسی، پوست و انساج نرم، دستگاه گوارشی و ادراری.

مقدار مصرف و طرز استعمال: خردسالان: هر ۶ ساعت ۱۰ ـ ۵۰ میلی‌گرم بازاء هرکیلو وزن. بزرگسالان: هر ۶ ساعت ۲۵۰ میلی‌گرم.

احتیاط: ایجاد آلرژی نزد اشخاص حساس به پنی‌سیلین.

بسته بندی: کپسول ۲۵۰ و ۵۰۰ میلی‌گرم × ۱۰۰. سوسپانسیون ۲۵۰ میلی‌گرم = ۵ میلی‌گرم × ۶۰ میلی‌لیتر. در هر میلی‌لیتر قطره: معادل ۱۰۰ میلی‌گرم × ۱۰ میلی‌لیتر. آمپول (سدیم آمپی‌سیلین) ۲۵۰ و ۵۰۰ میلی‌گرم × ۱ و ۱۰۰۰ میلی‌گرم × ۱.

بها: ۲۵۰ میلی ۱۲۹۰ ریال، ۵۰۰ میلی ۲۲۵۰ ریال. سوسپانسیون ۱۰۵ ریال. قطره ۸۲ ریال. آمپول ۲۵۰ میلی ۳۶ ریال، ۵۰۰ میلی ۸۲ ریال، آمپول یک گرمی ۱۴۴ ریال، شربت فورت ۱۸۷ ریال.

PENTRICINE
ایبسا ـ سویس

ترکیب: آمپی‌سیلین.

موارد استعمال: عفونتهای تنفسی، گوارشی، تناسلی ـ ادراری، عفونتهای نسوج نرم و پوست.

موارد منع استعمال: حساسیت به پنی‌سیلین.

بسته بندی: کپسول ۲۵۰ میلی‌گرم × ۸، ۵۰۰ میلی‌گرم × ۱۰۰، شربت ۱۲۵ میلی‌گرم = ۵ میلی‌لیتر × ۶۰ میلی‌لیتر.

بها: کپسول ۲۵۰ میلی ۸۸ ریال، ۵۰۰ میلی ۲۰۰۰ ریال، شربت ۱۰۰ ریال.

PEPSAMAR
وینتروپ آمریکا ـ ایران

ترکیب: در هر ۱۰۰ میلی‌لیتر: هیدروکسید آلومینیوم ۶ گرم. در هر قرص ۳۳۰ میلی‌گرم.

موارد استعمال: اولسرهای پپتیک، هیپراسیدیته، ترش کردن یا سوزش معده در خانمهای باردار، بمنظور جلوگیری از عوارض معدی کورتن ها.

مقدار مصرف و طرز استعمال: اولسرهای پپتیک: ۲ ــ ۳ قاشق مرباخوری یا ۲ ــ ۴ قرص بعد از غذا جویده یا خورده شود هیپراسیدیته معده: ۱ ــ ۲ قاشق مرباخوری یا ۱ ــ ۲ قرص نیم تا یک ساعت بعد از غذا.

بسته بندی: شربت ۲۴۰ میلی‌لیتر. قرص × ۵۰.

بها: شربت ۷۶ ریال. قرص ۵۹ ریال.

PERBULIN
ایمونو ـ اتریش

ترکیب: محلول ۱۶ درصد گاماگلوبولین انسانی.

مکانیسم: موجب افزایش سطح مقاومت بدن میشود.

موارد استعمال: پیشگیری و درمان بیماریهای عفونی بخصوص سیاهسرفه

مقدار مصرف و طرز استعمال: ۰/۲ میلی‌گرم برای هر کیلووزن بدن.

موارد منع استعمال: تزریق وریدی.

احتیاط: در حرارت ۲ + تا ۸ + درجه سانتی‌گراد نگهداری شود.

عوارض جانبی: واکنشهای جلدی، گاهی سردرد، اسهال.

بسته بندی: ویال لیوفیلیزه ۳۲۰ میلی‌گرم + حلال ۲ میلی‌لیتر.

بها: ۴۸۰ ریال.

PERCORTENE
سیبا ـ سویس

ترکیب: استات دزوکسی کورتیکوسترون.

موارد استعمال: فرسودگی سیستم عصبی نباتی، کمی فشارخون، آستنی بخصوص در دوران نقاهت، بیماری آدیسون و عدم کفایت خفیف غدد فوق کلیوی.

مقدار مصرف و طرز استعمال: زیرزبانی: ۱ ــ ۲ لنگت ۵ میلی‌گرم در روز تزریقی ۵، ۱۰ یا ۲۰ میلی‌گرم داخل عضله در روز یا یکروز در میان.

بسته‌بندی: لنگت ۵ میلی‌گرم × ۲۰، آمپول تزریقی ۵ میلی‌گرم × ۵. آمپول تزریقی روغنی ۱۰ میلی‌گرم × ۵.

بها: لنگت ۱۷۴ ریال. آمپول ۵ میلی ۱۶۵ ریال، آمپول روغنی ۵ میلی ۱۰۰ ریال، آمپول ۲۵ میلی ۵۵ ریال.

PERGONAL
سرونو ـ ایتالیا

ترکیب: FSH ۷۵ واحد + LH ۷۵ واحد.

مکانیسم: FSH در زنان سبب تخمک‌گذاری و ترشح استروژن و در مردان سبب تحریک بافت مولد اسپرماتوژنز است و LH در زنان رسیدن فولیکول را تسهیل و موجب ازدیاد پروژسترون و در مردان سبب تحریک نسج بینابینی بیضه‌ها میشود.

موارد استعمال: اولیگوآستنو ـ اسپرمی، بزرگی تخمدانها، بی‌نطفه بودن منی.

مقدار مصرف و طرز استعمال: برحسب نوع وشدت بیماری متفاوت است.

بسته بندی: ویال لیوفیلیزه + حلال ۱ میلی‌لیتر × ۱.

بها: ۳۸۰ ریال.

PERIACTIN
مرک شارپ انددوهم
آمریکا ـ ایران

ترکیب: کلریدرات سیپروهپتادین.

موارد استعمال: افزایش اشتها، درمان آلرژی، آسم، سردردهای میگرنی.

مقدار مصرف و طرز استعمال: قرص: روزی ۳ بار، هربار ۱ ـ ۲ عدد.

شربت: روزی ۳ بار، هربار ۱ قاشق مرباخوری قبل از غذا.

موارد منع استعمال: اطفال کمتر از ۲ سال.

عوارض جانبی: خواب‌آلودگی، بندرت تحریک سیستم اعصاب مرکزی.

بسته بندی: قرص ۴ میلی‌گرم × ۲۰. شربت ۵ میلی‌لیتر = ۲ میلی‌گرم × ۱۱۴.

بها: شربت ۱۰۰ ریال. قرص ۷۰ ریال.

PERIHEMIN
لدرلی آمریکا ـ ایران

ترکیب: در هر کپسول: ویتامین B_{12} با فاکتورانترنسک کنسانتره ۰/۵ واحد خوراکی + فومارات آهن ۱۶۸ میلی‌گرم + اسید فولیک ۰/۸۵ میلی‌گرم + اسیداسکوربیک ۵۰ میلی‌گرم.

موارد استعمال: درمان کم‌خونیهای هیپوکرم و هیپرکرم.

مقدار مصرف و طرز استعمال: خردسالان بیشتر از ۱۲ سال و بزرگسالان:

روزی ۳ بار، هربار ۱ کپسول همراه با غذا یا بعد از غذا.

بسته بندی: کپسول × ۱۰۰.

P

بها: ۴۱۰ ریال.

PERITONEAL DIALYSIS 7
باکستر–ایران

ترکیب: دکستروز ۱/۵ گرم (دیالیز صفاقی ۷ درصد حاوی ۷ گرم) + استات سدیم ۰/۶۱ گرم + کلرورسدیم ۰/۵۵ گرم + کلرور کلسیم ۰/۲۷ گرم + کلرور منیزیم هگزاهیدرات ۰/۰۱۵ گرم + بی‌سولفیت سدیم کمتر از ۰/۰۱ گرم (دیالیز صفاقی ۷ درصد کمتر از ۰/۰۲ گرم) + آب‌مقطر مقدار کافی تا ۱۰۰ میلی‌لیتر.

موارد استعمال: نارسائی حاد کلیوی، مسمومیت حاد، ادم شدید ناشی از ضعف قلب، هیپرکالسمی، هیپرپتاسمی، هیپراورمی، هیپوکالسمی، هیپو ناترمی، کوما هپاتیک، اسیدوز متابولیک.

مقدار مصرف و طرز استعمال: برحسب نوع مصرف متفاوت است.

موارد منع استعمال: عفونت حفره صفاقی و جراحی تازه یاوسیع بطنی.

بسته بندی: محلول یک لیتری.

بها: ۱۱۷ ریال.

PERMITIL Chronotabs
وایت–آمریکا

ترکیب: فلوفنازین روتارد.

موارد استعمال: اختلالات رفتاری، ترس، عدم تمرکز فکری و علائم افسردگی همراه با هیجان، اختلالات مزمن که استرس و هیجان توأم با هم وجود دارد مانند سوءهاضمه، نورودرماتیت، آسم، هیجانات قبل از قاعدگی، آرتریت، فشارخون.

مقدار مصرف و طرز استعمال: روزی ۱ قرص.

موارد منع استعمال: بیماران کوماتوز و حالات شدید افسردگی.

احتیاط و عوارض جانبی: بندرت ممکن است بیخوابی، گیجی، منگی، تاری چشم، خشکی دهان، ناراحتی اپی‌گاستریک، یبوست و حالت تهوع بصورت خفیف مشاهده شود که پس از یک هفته خودبخود از بین میرود.

بسته بندی: قرص ۱ میلی‌گرم × ۳۰.

بها: ۱۴۴ ریال.

P

PERNEXIN
شرینگ آلمان – ایران

ترکیب: در هر ۱۰۰ میلی‌لیتر شربت: عصاره جگر ۳ گرم + ویتامیز B_{12} ۴۰ میکروگرم + ویتامین B_1 ۱۵ میلی‌گرم + ویتامین B_2 ۱۰ میلی‌گرم + ویتامین B_6 ۵ میلی‌گرم + پانتوتنات کلسیم ۱۲ میلی‌گرم + نیکوتینامید ۱۶۰ میلی‌گرم + گلوکونات فرو ۳۴۰ میلی‌گرم + گلیسرو فسفات سدیم ۱۰۰۰ میلی‌گرم. در هر کپسول به‌ترتیب: ۱۵۰ میلی‌گرم + ۰/۰۰۲ میلی‌گرم + ۰/۷۵ میلی‌گرم + ۰/۵ میلی‌گرم + ۰/۲۵ میلی‌گرم + ۰/۶ میلی‌گرم + ۸ میلی‌گرم + ۱۷ میلی‌گرم + ۵۰ میلی‌گرم.

موارد استعمال: نقاهت، حالات ضعف و ناتوانی، زود خسته شدن، عدم تمرکز فکری، حالات کمبود ویتامین ب، نقصان مخفی آهن، آبستنی، شیردادن، بعد از اعمال جراحی و بیماریهای سخت، بی‌اشتهائی، کم‌خونی ثانوی بعد از بیماریهای عفونی و اعمال جراحی، درسنین رشد و نمو و هنگام آبستنی و شیردادن.

مقدار مصرف و طرز استعمال: روزی ۳ بار، هربار یک قاشق سرباخوری یا یک کپسول بعد از غذا.

بسته‌بندی: الگزیر ۲۵۰ میلی‌لیتر. کپسول × ۲۰.

بها: الگزیر ۱۶۰ ریال، کپسول ۱۰۵ ریال.

P

PERSANTIN
بهرینگر اینگلهایم آلمان – تولیدارو ایران

ترکیب: ۲، ۶– بیس (دی‌اتانول آمینو) – ۴، ۸ – دی‌پیپریدینو – پیریمید و (۵، ۴ – d –) پیریمیدین = دی‌پیریدامول.

موارد استعمال: نارسائیهای حاد و مزمن عروق کرونر، انفارکتوس میوکارد، اختلالات قلبی افراد مسن.

مقدار مصرف و طرز استعمال: روزی ۳ بار، هر بار یک دراژه ۷۵ میلی‌گرم در فواصل بین غذا بمدت ۳ – ۶ ماه. درمان: با دراژه ۲۵ میلی‌گرم ادامه داده شود که در ابتدا ۲ دراژه روزی ۳ بار، هربار یک عدد و سپس روزی ۳ بار، هربار یک دراژه بمدت کافی تجویز میشود. درمان با دارو باید بطور مداوم برای ماهها و حتی چندین سال ادامه داده شود.

عوارض جانبی: ممکن است اثراتی مانند سردرد و یا احساس فشار

در سر شود که معمولا بر طرف میگردد.
بسته بندی: دراژه ۲۵ میلی‌گرم × ۲۰. دراژه ۷۵ میلی‌گرم × ۱۵. آمپول ۱۰ میلی‌گرم × ۵.
بها: دراژه ۲۵ میلی ۷۰ ریال، دراژه ۷۵ میلی ۱۵۸ ریال. آمپول ۷۷ ریال.

PERSUMBRAX
بهرینگر اینگلهایم آلمان ـ تولیدارو ایران

ترکیب: دی پیریدامول = پرزانتین ۲۵ میلی‌گرم + اکسازپام = آدومبران ۱۰ میلی‌گرم.
مکانیسم: باعث دپرسیون هیپوتالاموس و بصل النخاع میشود.
موارد استعمال: فشار عصبی، بیقراری سندرمهای دردناک، عوارض پوستی با مبدا عصبی، دردهای قبل از دوران یائسگی، بیخوابی.
مقدار مصرف و طرز استعمال: بعنوان مسکن: روزی ۳ـ۴ قرص، برای بیخوابی: ۱ ـ۲ قرص یک ساعت قبل از خواب.
بسته بندی: قرص × ۲۰.
بها: ۱۴۱ ریال.

PERTRANQUIL
لپتی ایتالیا ـ ایران

ترکیب: در هر قرص: مپروبامات ۴۰۰ میلی‌گرم.
موارد استعمال: فشار عصبی، بیقراری، سندرومهای دردناک، عوارض پوستی با مبدأ عصبی، دردهای قبل از دوران یائسگی، بیخوابی.
مقدار مصرف و طرز استعمال: بزرگسالان: بعنوان مسکن روزی ۳ـ۴ قرص. برای بیخوابی ۱ ـ۲ قرص یک ساعت قبل از خواب.
بسته بندی: قرص × ۱۲.
بها: ۱۸ ریال.

PERVINCAMINE
دوس ـ فرانسه

ترکیب: عصاره آلکالوئید گیاه‌لپتی پروانش = وینکامین.
موارد استعمال: درمان نارسائی‌های مغزی.
مقدار مصرف و طرز استعمال: روزی ۴ ـ ۶ بار، هربار یک قرص.
بسته بندی: قرص ۱۰ میلی‌گرم × ۲۰.

P

بها: ۳۰۰ ریال.

PERVONE
میلسوفرانسه ـ فارماشیمی ایران

ترکیب: وانکامین (عصاره گیاهی وینکامینور).
موارد استعمال: علائم مغزی ناشی از اختلالات عروقی، عفونتهای عروقی مغزی، سردردها، ایسکمی مغزی، عوارض سکته مغزی، صدای گوش.
مقدار مصرف و طرز استعمال: مدت یک‌ماه روزی ۳ بار، هربار ۲ قرص بعدا روزی ۴ بار، هربار یک قرص.
بسته‌بندی: قرص ۱۰ میلی‌گرم × ۲۰.
بها: ۲۷۸ ریال.

PHENERGAN
اسپسیا ـ فرانسه

ترکیب: ۱۰ ـ (۲ ـ دی‌متیل آمینو پروپیل) فنوتیازین = پرومتازین
مکانیسم: با عمل رقابتی با هیستامین روی گیرنده‌های هیستامینی قرارگرفته مانع اثر آن میگردد.
موارد استعمال: خارش، اکزما، درماتیت، اریتما، حساسیت ناشی از سموم، عدم تحمل داروئی، آسم آلرژی، کوریزااسپاسمودیک، افزایش ترشح برنشها، ورم ریه، برنشیت حاد، انواع سرفه‌ها.
مقدار مصرف و طرز استعمال: روزی ۲ ـ ۴ بار، هربار ۱ قرص یا ۱ تا ۵ قاشق چایخوری شربت. آمپول: روزی ۱ ـ ۲ تزریق.
عوارض جانبی: خواب‌آلودگی.
بسته‌بندی: قرص ۲۵ میلی‌گرم × ۲۰. شربت ۱ میلی‌گرم = ۱ میلی‌لیتر × ۱۲۵ میلی‌لیتر. آمپول ۵۰ میلی‌گرم = ۲ میلی‌لیتر × ۵.
بها: قرص ۲۵ ریال. شربت ۵۰ ریال. آمپول هر عدد ۱۲ ریال.

PHENERGAN CREME
اسپسیا ـ فرانسه

ترکیب: پرومتازین.
موارد استعمال: خارش، نورودرماتیتهای محدود، هرپس، پروریگو، درماتیتهای ناشی از تماس با حشرات یا گیاهان، اریتما، سوختگیهای وسیع، تحریکات جلدی ناشی از اشعه‌ایکس.
مقدار مصرف و طرز استعمال: روزی ۳ ـ ۴ بار بصورت ورقه‌ای نازک

P

روی پوست مالیده می‌شود.
بسته‌بندی: کرم ۲ درصد ۳۰ گرم.
بها: ۲۹ ریال.

PHENERGAN EXPECTORANT
اسپسیا ـ فرانسه

ترکیب: در هر میلی‌لیتر: پرومتازین ۵ میلی‌گرم + گایاکول‌استر ۴۵ میلی‌گرم + عصاره نرم ایپکاکوآنا ۳ میلی‌گرم.
موارد استعمال: برنشیتهای حاد و تراکئوبرونشیت، سرفه‌های آلرژیک، رینیت‌های وازوموتور، سرفه‌های آنفلوآنزا، عفونت‌های دستگاه تنفسی فوقانی.
مقدار مصرف و طرز استعمال: روزی ۲ ـ ۴ بار، هربار، ۱ ـ ۳ قاشق مرباخوری.
بسته‌بندی: شربت ۱۲۵ میلی‌لیتر.
بها: ۶۴ ریال.

PHENICOL
دوپار ـ ایران

ترکیب: در هر میلی‌لیتر قطره: کلرامفنیکل ۴ میلی‌گرم.
موارد استعمال: عفونتهای چشمی حساس به‌آنتی‌بیوتیک فوق.
مقدار مصرف و طرز استعمال: روزی ۴ بار، هربار ۱ ـ ۲ قطره در چشم می‌چکانند.
بسته‌بندی: قطره چشمی ۱۰ میلی‌لیتر.
بها: ۵۳ ریال.

PHENOLAGARINE
ویرا ـ ایران

ترکیب: محلول پارافین + فنل‌فتالئین + آگارآگار.
موارد استعمال: یبوست بانوان باردار و مبتلایان به‌بواسیر.
مقدار مصرف و طرز استعمال: ۱ ـ ۲ قاشق سوپخوری شب موقع خواب میل شود.
موارد منع استعمال: حساسیت به‌آگارآگار.
بسته‌بندی: شربت ۲۲۰ میلی‌لیتر.
بها: ۴۷ ریال.

P

PHILLIPS
Milk Of Magnesia
وینتروپ آمریکا ـ ایران

ترکیب: در هر ۱۰۰ میلی‌لیتر: هیدروکسید منیزیم ۸/۵ گرم.
موارد استعمال: بزرگسالان: بعنوان ملین و آنتی اسید. خردسالان: برای جلوگیری و درمان نفخ شکم، سوزش معده، استفراغ.
مقدار مصرف و طرز استعمال: آنتی اسید: ۱ ـ ۳ قاشق چایخوری محلول در کمی آب. بعنوان ملین: ۲ ـ ۴ قاشق غذاخوری در یک لیوان آب. کودکان کمتر از یکسال: ۵ ـ ۱۰ قطره. ۳ ساله: ۱۰ ـ ۲۰ قطره. ۷ ساله: نصف قاشق چایخوری.
بسته بندی: شربت ۱۲۰ و ۳۶۰ میلی‌لیتر.
بها: کوچک ۲۹ ریال، بزرگ ۵۹ ریال.

PHISOHEX
وینتروپ آمریکا ـ ایران

ترکیب: هگزاکلروفن.
موارد استعمال: در جراحیها بمنظور اسکراپ، درمان عفونتهای استافیلوکوکسی پوستی کودکان، شستشوی دست در جراحی‌ها
موارد منع استعمال: در زخمهای باز و سوختگی‌ها.
احتیاط: بعد از شستشو، دستها با آب بخوبی شستشو داده شود.
بسته بندی: گالن برای بیمارستانها و اطاق عمل، محلول ۲ و ۵ اونسی.
بها: ۲ اونسی ۷۳ ریال، ۵ اونسی ۱۴۵ ریال، گالن ۱۰۵۰ ریال.

P

PHOSELLITE - B
زیگفرید ـ سویس

ترکیب: در هر قرص: سدیم آلفا اکسی بنزیل فسفی نیکم ۱۰۰ میلی‌گرم + ویتامین B_1 ۵ میلی‌گرم.
موارد استعمال: هنگام کارهای فکری و علمی، وحشت و اضطراب، نقاهت بعد از اعمال جراحی، بعد از زایمان و امراض عفونی.
مقدار مصرف و طرز استعمال: روزی ۱ ـ ۳ بار، هربار ۱ قرص یا ۱ آمپول.
بسته بندی: قرص × ۵۰، آمپول ۲ میلی‌لیتر × ۵.
بها: قرص ۱۲۰ ریال، آمپول ۸۵ ریال.

PHOSPHALUGEL
بیوترا کس ـ فرانسه

ترکیب: ژل فسفات آلومینیوم.
موارد استعمال: گاستریت. ترشی زمان آبستنی، کولیت، آنترو کولیت.
مقدار مصرف و طرز استعمال: روزی ۱ ـ ۳ بار، هربار ۱ ـ ۲ بسته را در آب حل کرده میل می کنند.
بسته بندی: بسته ۲۰ گرم × ۲۵.
بها: ۱۹۵ ریال.

PHOS VI QUINE
رامین ـ ایران

ترکیب: گلیسرو فسفات‌سدیم ۲/۵ گرم + تیامین منونیترات ۰/۰۵ گرم + ریبوفلاوین ۰/۰۱۷۵ گرم + اسید نیکوتینیک ۰/۱ گرم + تنطورکن کینا ۱/۵ میلی‌لیتر + تنطورنواومیک ۱ میلی‌لیتر + الکل اتیلیک ۱۰ میلی‌لیتر.
موارد استعمال: ضعف عمومی و اعصاب، خستگی ناشی ازکار زیاد، کم‌خونی.
مقدار مصرف و طرز استعمال: خردسالان: روزی ۲ ـ ۳ بار، هربار ۱ قاشق مرباخوری. بزرگسالان: روزی ۲ ـ ۳ بار، هربار نصف پیمانه داخل جعبه.
بسته بندی: شربت ۲۰۰ میلی‌لیتر.
بها: ۷۶ ریال.

PHYSIO - HEPATOL
لپتی ایتالیا ـ ایران

ترکیب: در هر دراژه: فسفریل اتانولامین ۱۰۰ میلی‌گرم + پتاسیم اوروتات ۵۰ میلی‌گرم + کولین اوروتات ۱۰۰ میلی‌گرم + متیونین ۱۰۰ میلی‌گرم + پانتوتنات کلسیم ۵ میلی‌گرم + ویتامین B_1 ۳ میلی‌گرم + ویتامین B_2 ۲ میلی‌گرم + ویتامین B_6 ۲/۵ میلی‌گرم + ویتامین PP ۲۰ میلی‌گرم + ویتامین E ۵/۷ میلی‌گرم + ویتامین B_{12} ۱۰ گاما + ویتامین A ۱۰۰۰ واحد.
موارد استعمال: هپاتیت حاد و تحت حاد، نارسائی کبد در جریان آبستنی، بیماری‌های مجاری صفراوی، بیماریهای پوستی (کهیر اکزما و غیره)، مسمومیتهای شغلی.
مقدار مصرف و طرز استعمال: خردسالان: روزی ۲ دراژه. بزرگسالان:

روزی ۴ دراژه.

بسته بندی: دراژه × ۲۵.

بها: ۷۰ ریال.

P.I.E.M
هپاترل ــ فرانسه

ترکیب: در هر قرص: پاراآمینوسالیسیلات هیدرازید اسید- ایزونیکوتینیک ۴۰۰ میلی‌گرم.

موارد استعمال: سل ریوی، عفونتهای اولیه و ثانویه ریه‌ها.

مقدار مصرف و طرز استعمال: خردسالان: ۱ قرص برای هر ۵ کیلوگرم وزن در روز. بزرگسالان ۱ قرص برای هر ۱۰ کیلوگرم وزن در روز.

بسته بندی: قرص × ۵۰۰.

بها: ۱۲۰۰ ریال.

PILKA
ریما ــ سویس

ترکیب: عصاره دروزرا + تیم + پنگیکولا.

موارد استعمال: سرفه‌های تحریکی، سرفه معتادین به‌دخانیات، تراکئیت، سرفه‌های مکرر، برنشیت، زکام یونجه، سیاه‌سرفه.

مقدار مصرف و طرز استعمال: شیرخواران تا ۵ سال: روزی چندبار، هربار ۲ ــ ۳ قطره، بالاتر از ۵ سال: روزی چندبار، هربار ۶ ــ ۱۰ قطره، بزرگسالان: روزی چندبار، هربار ۱۰ ــ ۲۰ قطره.

بسته بندی: قطره خوراکی ۱۰ میلی‌لیتر.

بها: ۵۰ ریال.

PILOCARPINE
ب اواس فرانسه ــ دوپار ایران

ترکیب: نیترات پیلوکارپین.

موارد استعمال: گلوکوم حاد و مزمن، عوارض هیپرتانسیو، ضایعات ضربه‌ای، سندروم ادی، بر طرف کردن میدریاز.

مقدار مصرف و طرز استعمال: قطره: روزی ۳ ــ ۷ بار، هربار ۱ ــ ۲ قطره در چشم می‌چکانند. پماد: شب در چشم استعمال می‌شود.

احتیاط: گاهی سبب حساسیت سطح ملتحمه میشود.

بسته‌بندی: قطره چشمی ۱ درصد، ۲ درصد و ۳ درصد ۱۰ میلی‌لیتر، پماد ۲ درصد ۵ گرم.

بها: قطره ۱ درصد ۴۷ ریال، ۲ درصد ۵۰ ریال، ۳ درصد ۵۳ ریال. پماد ۴۱ ریال.

PILOCARPINE Chibret

شیبره ـ فرانسه

ترکیب: نیترات پیلوکارپین.

موارد استعمال: هیپرتونی چشم.

مقدار مصرف و طرز استعمال: روزی ۳ ـ ۶ بار، هربار ۱ ـ ۲ قطره.

بسته‌بندی: قطره چشمی ۱ درصد و ۲ درصد ۱۰ میلی‌لیتر.

بها: ۱ درصد ۳۵ ریال، ۲ درصد ۴۱ ریال.

PIMAFUCIN

مایکوفارم هلند ـ ایران

ترکیب: در هر قرص واژینال: پیماریسین ۲۵ میلی‌گرم + کلریدرات بنزالکونیوم ۱ میلی‌گرم.

موارد استعمال: انواع مختلف لوکوره ناشی ازکاندیدا آلبیکانس و تریکوموناواژینالیس.

مقدار مصرف و طرز استعمال: هر شب بمدت ۲۰ روز یک قرص را در عمق واژن قرار می‌دهند.

بسته‌بندی: قرص واژینال × ۲۰ + آپلیکاتور. پماد چشمی ۳ گرم. دراژه × ۲۰.

بها: قرص واژینال ۱۵۲ ریال. پماد ۴۷ ریال. دراژه ۴۲۲ ریال.

PIMAFUCORT

مایکوفارم ـ هلند

ترکیب: پیماریسین ۱۰ میلی‌گرم + سولفات نئومایسین ۳/۵ میلی‌گرم + هیدروکورتیزون ۱۰ میلی‌گرم.

موارد استعمال: اکزما، درماتیت، کهیر، عوارض پوستی ناشی از باکتری‌ها و قارچ‌ها.

مقدار مصرف و طرز استعمال: روزی ۲ ـ ۳ بار استعمال شود.

بسته‌بندی: پماد ۵ گرم.

بها: ۱۱۷ ریال.

PIPERAZINE MIDY

میدی فرانسه ـ آترا ایران

ترکیب: در هر ۱۰۰ گرم: پیپرازین ۳/۵ گرم.

موارد استعمال: نقرس، سنگ کلیه، روماتیسم مزمن، دردهای سیاتیکی و لمباگو.

مقدار مصرف و طرز استعمال: حملات حاد: روزی ۳ـ۶ قاشق چایخوری. حملات مزمن: ۱ـ۳ قاشق چایخوری را در نصف لیوان آب حل کرده میل می کنند.

بسته بندی: گرانول ۱۰۰ گرم.

بها: ۶۴ ریال.

PIPTAL Drop

لیک‌ساید ـ آمریکا

ترکیب: در هرمیلی لیتر: برمورپی پنزولات ۴ میلی گرم + فنوباربیتال ۶ میلی گرم.

مکانیسم: آنتی کولینرژیکها با رقابت با استیل کولین در قرارگرفتن روی گیرنده‌های موسکارینی اعصاب پاراسمپاتیک از اثرات استیل کولین در روی این اعضاء جلوگیری میکند.

موارد استعمال: درد و اسپاسم در کولیک نوزادان اسپاسم پیلور زخم معده و اثنی عشر، کاردیواسپاسم.

مقدار مصرف و طرز استعمال: روزی ۴ بار، هربار ۰/۵ میلی لیتر معادل ۱۶ قطره قبل از هر وعده شیر.

موارد منع استعمال: حساسیت به فنوباربیتال و آنتی کولی نرژیکها، انسداد روده.

بسته بندی: قطره اطفال × ۱۵ میلی لیتر.

بها: ۱۳۵ ریال.

P

PIPTAL Tab.

لیک‌ساید ـ آمریکا

ترکیب: برمورپی بنزولات ۵ میلی گرم.

موارد استعمال: آنتی کلینرژیک برای از بین بردن درد و اسپاسم و کم کردن ترشحات در زخم، کاهش حرکات دودی شکل.

مقدار مصرف و طرز استعمال: ناراحتیهای معده و اثنی عشر روزی ۳ بار، هربار ۱ قرص قبل از هر وعده غذا و یک قرص شب موقع خواب.

موارد منع استعمال: گلو کوم و هیپرتروفی پروستات.
بسته بندی: قرص × ۲۵.
بها: ۱۰۸ ریال.

PIRITON
آلن هانبوریز
انگلستان ـ
داروپخش ایران

ترکیب: مالئات کلرفنیرامین.
موارد استعمال: کنترل علامتی اکزمای کودکان، خارشها، آلرژیهای غذائی، برونشیت آلرژیک، رینیت وازوموتور، گزش حشرات.
مقدار مصرف و طرز استعمال: خردسالان، روزی ۳ ـ ۴ بار، هربار ۰/۵ قرص. بزرگسالان روزی ۳ ـ ۴ بار، هربار ۱ قرص. قرص دوجداره: روزی ۱ عدد. آمپول: روزی ۱۰ ـ ۲۰ میلی‌گرم بطریق زیر جلدی یا داخل عضلانی.
بسته بندی: قرص ۴ میلی‌گرم × ۲۵ و ۵۰۰. آمپول ۱۰ میلی‌گرم = ۱ میلی‌لیتر × ۵.
بها: قرص ۲۵ عددی ۵۹ ریال، ۵۰۰ عددی ۱۰۵۰ ریال. آمپول ۵۹ ریال.

PIRITON EXPECTORANT
آلن هانبوریز
انگلستان ـ
داروپخش ایران

ترکیب: در هر قاشق مرباخوری: پیریتون = مالئات کلرفنیرامین ۲ میلی‌گرم + کلرورآمونیوم ۱۰۰ میلی‌گرم + سیترات سدیم ۴۴ میلی‌گرم.
موارد استعمال: احتقان مجاری تنفسی فوقانی بخصوص در مواردی که همراه با برونشیت و سرماخوردگی باشد.
مقدار مصرف و طرز استعمال: خردسالان: روزی ۳ ـ ۴ بار، هربار حداکثر ۱ قاشق مرباخوری. بزرگسالان: روزی ۳ ـ ۴ بار، هربار ۱ ـ ۲ قاشق مرباخوری.
بسته بندی: شربت ۱۱۴ میلی‌لیتر.
بها: ۵۳ ریال.

PLAQUINOL
وینتروپ آمریکا ـ ایران

ترکیب: در هر قرص: ۷ ـ کلر ـ ۴ ـ [۴ ـ (اتیل ـ ß ـ ئیدروکسی اتیلامین) ـ امتیل بوتیلامین] سولفات

P

کینولین ـ سولفات ئیدروکسی کلروکین ۲۰۰ میلی‌گرم.

موارد استعمال: آرتریت مزمن و سایر بیماریهای کولاژن مانند لوپوس ـ اریتماتوز.

مقدار مصرف و طرز استعمال: شروع درمان: روزی ۱ ـ ۲ بار، هربار ۱ قرص. ادامه درمان: ۲ قرص هر روز یا یک روز درمیان.

موارد منع استعمال: بیماران معدی.

عوارض جانبی: تجمع در کبد.

بسته بندی: قرص × ۳۰.

بها: ۲۱۱ ریال.

PLASIL

لپتی ایتالیا ـ ایران

ترکیب: متوکلوپرامید.

موارد استعمال: گاستریت، آنتروکولیت، سوء هضم، ناراحتی‌های توأم در زخم معده و دوازدهه، اسپاسم پیلور. جراحی و بیهوشی: حالات تهوع و استفراغ بعد از اعمال جراحی و بیهوشی. رادیولوژی: تظاهرات معدی و استفراغ در نتیجه اشعه‌ایکس یا درمان باکوبالت، تهوع و استفراغ با هر منشاء.

مقدار مصرف و طرز استعمال: از راه خوراکی: بزرگسالان: ۱ قرص نیم‌ساعت قبل از هر غذا. خردسالان: ۰/۵ ـ ۱ میلی‌گرم به ازاء هر کیلوگرم از وزن بدن در روز در ۳ ـ ۲ نوبت از راه تزریقی: بزرگسالان: ۱ آمپول عضلانی یا وریدی که در صورت لزوم هر ۸ ساعت تکرار میگردد. خردسالان: ۰/۵-۱ میلی‌گرم به‌ازاء هر کیلوگرم از وزن بدن از طریق تزریق عضلانی.

بسته بندی: قرص ۱۰ میلی‌گرم × ۲۴. قطره ۰/۲ میلی‌گرم در هر میلی‌لیتر ـ ۱۵ میلی لیتر. آمپول ۱۰ میلی‌گرم ـ ۲ میلی‌لیتر × ۵. شربت ۵ میلی‌گرم در هر پیمانه × ۱۲۰ میلی‌لیتر.

بها: قرص ۱۵۵ ریال. آمپول ۷۰ ریال. قطره ۷۰ ریال. شربت ۱۱۷ ریال.

P

PLEGICIL
کلن بیلا فرانسه ــ
فارما شیمی ایران

ترکیب: مالئات اسید دواتیلون ــ ۳ ــ (دی‌متیل ــ آمینو ــ ۳ ــ پروپیل ــ ۱۲ ــ فنوتیازین) = آسه‌پرومازین.
موارد استعمال: قی، تشنج، نوروزها، بیخوابیها، قولنجها، خارش‌ها، بیماریهای روانی.
مقدار مصرف و طرز استعمال: بزرگسالان: روزی ۳۰ ــ ۵۰ میلی‌گرم، در بیماریهای عصبی ۵۰ ــ ۱۰۰ میلی‌گرم. خردسالان ۰/۵ میلی‌گرم برای هر کیلووزن بدن.
بسته‌بندی: قطره خوراکی ۱ میلی‌گرم = ۱۰ قطره × ۳۰ میلی‌لیتر.
بها: ۵۳ ریال.

PLEXAFER
بنکارد ــ انگلستان

ترکیب: سولفات‌فرو ۴۲۵ میلی‌گرم حاوی ۱۳۰ میلی‌گرم آهن.
موارد استعمال: کم‌خونیهای ناشی از فقر آهن.
مقدار مصرف و طرز استعمال: روزی یک قرص صبح ناشتا.
عوارض جانبی: گاهی یبوست، تهوع و استفراغ.
بسته‌بندی: دراژه × ۳۰.
بها: ۱۴۰ ریال.

PLIMASINE
سیبا ــ سویس

ترکیب: در هر دراژه: پیری‌بنزامین ۲۵ میلی‌گرم + ریتالین ۵ میلی‌گرم.
موارد استعمال: تب یونجه، آلرژی غذائی، کهیر، بیماریهای آلرژیک پوست.
مقدار مصرف و طرز استعمال: بطور متوسط روزی ۲ ــ ۳ بار هربار یک قرص.
بسته‌بندی: دراژه × ۲۰.
بها: ۴۴ ریال.

PLURYLE K
PLURYLE K+R
لئو ــ دانمارك

ترکیب: در هر قرص: بند روفلومتیازید = پلوریل ۲/۵ میلی‌گرم + کلرور پتاسیم ۵۷۳ میلی‌گرم. KR: پلوریل K ۲/۵ میلی‌گرم + کلرورپتاسم ۵۷۳ میلی‌گرم + رزرپین ۰/۱ میلی‌گرم.

مکانیسم: جذب مجدد آب و الکترولیت‌ها را کاهش داده و در نتیجه موجب دفع آنها میشود.

موارد استعمال: فشارخون، ورم‌هائی که احتیاج به‌مداوای طولانی دارند.

مقدار مصرف و طرز استعمال: روزی ۱ ـ ۴ قرص.

بسته بندی: قرص × ۶۰، پلوریل KR × ۲۵.

بها: پلوریل K ۱۶۰ ریال، KR ۷۰ ریال.

POLARAMIN

شرینگ آمریکا ـ ایران

ترکیب: دکستروکلرفنیرامین مالئات:

مکانیسم: با رقابت با هیستامین روی گیرنده‌های هیستامینی قرارگرفته مانع از اثر آن میگردد.

موارد استعمال: پولنوزیس، کهیر، میگرن آلرژیک، خارشهای بامنشاء غیرمشخص و رینیت وازوموتور، اکزمای آلرژیک، آنژیوادما وراکسیونهای ناشی ازسرم و دارو، گزش حشرات، درموگرافیسم، آلرژی غذائی، آلرژی فیزیکی، نورودرماتیت، راکسیون‌های انتقال خون و بثورات جلدی مثل سرخک و آبله مرغان.

مقدار مصرف و طرز استعمال: بزرگسالان و اطفال بالاتر از ۱۲ سال: روزی ۳-۴بار، هربار۱ قرص معمولی. قرص رپتاب: هر ۸ یا ۱۲ساعت یکبار. شربت: روزی ۳ ـ ۴بار، هربار ۱ تا ۲ قاشق مرباخوری. خردسالان ۶ تا ۱۲ سال: روزی ۳ ـ ۴بار، هربار نصف قرص یا نصف قاشق مرباخوری شربت. خردسالان کوچکتر از ۶ سال: روزی ۳ ـ ۴بار، هربار ربع قرص یا ربع قاشق مرباخوری شربت.

احتیاط: هنگام مصرف دارو ازکار با ابزارهای مکانیکی خودداری شود.

بسته بندی: قرص ۲ میلی‌گرم × ۱۰۰. قرص رپتاب ۶ میلی‌گرم × ۲۰ و ۱۰۰. شربت پلارامین ۲ میلی‌گرم = ۵ میلی‌لیتر × ۱۲۰.

بها: قرص ۲ میلی ۲۳۴ ریال، رپتاب ۲۰ عددی ۹۶ ریال، ۱۰۰ عددی ۴۱۰ ریال. شربت ۷۶ ریال.

POLARAMIN Expectorant
شرینگ آمریکا ـ ایران

ترکیب: در هر قاشق مرباخوری: دکسترو- کلرفنیرامین مالئات ۲ میلی‌گرم + d ـ ایزوافدرین سولفات ۲۰ میلی‌گرم + گلیسریل گایاکولات ـ گوایفنزین ۱۰۰ میلی‌گرم.

موارد استعمال: ضدآلرژی، سرفه، احتقان.

مقدار مصرف و طرز استعمال: بزرگسالان: روزی ۳ ـ ۴بار، هربار ۱ ـ ۳ قاشق مرباخوری. خردسالان: روزی ۳ ـ ۴بار هربار یک قاشق مرباخوری. اطفال ۲ ـ ۶ ساله: روزی ۳ ـ ۴بار، هربار ربع تا نصف قاشق مرباخوری.

بسته‌بندی: شربت ۱۲۰ میلی‌لیتر.

بها: ۸۲ ریال.

POLIOMYELITIS Vaccine
برنا ـ سویس

ترکیب: سه‌تیپ اصلی ویروس بیماری فلج اطفال.

موارد استعمال: ایجاد مصونیت فعال در مقابل بیماری فلج.

مقدار مصرف و طرز استعمال: ۳ تزریق زیر جلدی و یا داخل عضلانی بفاصله یک‌ماه.

بسته‌بندی: ویال ۱ میلی‌لیتر.

بها: ۳۷ ریال.

POLYBION
مرک ـ آلمان

ترکیب: در هر آمپول: ویتامین B_1 ۱۰ میلی‌گرم + ویتامین B_2 ۴ میلی‌گرم + ویتامین PP ۴۰ میلی‌گرم + پانتنول ۶ میلی‌گرم + ویتامین B_6 ۴ میلی‌گرم + ویتامین B_{12} ۸ میکروگرم + بیوتین ۰/۵ میلی‌گرم. در هر میلی‌لیتر قطره: ویتامین B_1 ۲/۵ میلی‌گرم + ویتامین B_2 ۱ میلی‌گرم + ویتامین PP ۱۰ میلی‌گرم + پانتنول ۱/۵ میلی‌گرم + ویتامین B_6 ۱ میلی‌گرم + ویتامین B_{12} ۲ میکروگرم + بیوتین ۰/۲۵ میلی‌گرم. در هر دراژه: ویتامین B_1 ۱۵ میلی‌گرم + ویتامین B_2 ۱۵ میلی‌گرم + نیکوتینامید ۵۰ میلی‌گرم + پانتوتنات کلسیم ۲۵ میلی‌گرم + ویتامین B_6 ۱۰ میلی‌گرم + ویتامین B_{12} ۱۰ میکروگرم + بیوتین ۰/۱۵ میلی‌گرم.

P

موارد استعمال: التهاب مخاط دستگاه گوارش، آبستنی و استفراغ های دوران آبستنی، سوء تغذیه کودکان، کلیه موارد کمبود ویتامین های فوق.

مقدار مصرف و طرز استعمال: روزی یک آمپول عضلانی. روزی ۱۰ـ ۲۰ قطره برحسب سن. روزی ۱ ـ۳ دراژه برحسب سن.

بسته بندی: آمپول ۲ میلی‌لیتر × ۵ و ۱۰۰. قطره خوراکی ۲۰ میلی‌لیتر. دراژه × ۱۰۰.

بها: آمپول ۵ عددی ۵۹ ریال، ۱۰۰ عددی ۹۶۰ ریال. قطره ۴۷ ریال. دراژه. ۲۳۴ ریال.

POLYSILANE GEL

میدی فرانسه ـ آترا ایران

ترکیب: در هر ۱۰۰ گرم: متیل پلی‌سیلوکسان ۱۵ گرم + پاراهیدروکسی بنزوات پروپیل سدیم ۰/۰۵ گرم + اسید سوربیک ۰/۱ گرم.

موارد استعمال: سوزش و درد معده، سنگ صفراوی، نفخ و پری معده، آئروفاژی.

مقدار مصرف و طرز استعمال: بزرگسالان: روزی ۳ ـ ۴ بار، هربار یک قاشق غذاخوری، خردسالان: روزی ۱ ـ۳ بار، هربار یک قاشق مرباخوری.

بسته بندی: لوله خمیر ۱۷۰ گرم.

بها: ۱۱۷ ریال.

P

POLYSILANE REGLISSE

میدی فرانسه ـ آترا ایران

ترکیب: در هر قرص: متیل پلی سیلوکسان ۱۰۰ میلی‌گرم + عصاره رگلیس ۱۲۵ میلی‌گرم + گلیسینات آلومینیوم ۴۰۰ میلی‌گرم + هیدروکسید آلومینیوم ۳۵۰ میلی‌گرم + تری‌سیلیکات منیزیم ۱۵۰ میلی‌گرم + کربنات کلسیم ۱۰۰ میلی‌گرم.

موارد استعمال: درد و سوزش معده، سوءهاضمه، آئروفاژی، سنگینی معده، نفخ.

مقدار مصرف و طرز استعمال: در موقع ناراحتی ۱ ـ۲ قرص حداکثر تا ۶ قرص در روز.

بسته بندی: قرص × ۴۰.
بها: ۱۱۷ ریال.

POLYSPECTRIN S.O.P.
آلرگان ـ آمریکا

ترکیب: در هرگرم: پلی‌میکسین ۵ هزار واحد + باسی‌تراسین ۴۰۰ واحد + سولفات نئومایسین ۵ میلی‌گرم
موارد استعمال: درمان کوتاه‌مدت عفونتهای سطحی چشم.
مقدار مصرف و طرز استعمال: روزی چند بار در چشم بمالند.
موارد منع استعمال: حساسیت به‌دارو.
بسته بندی: پماد چشمی ۳/۵ گرم.
بها: ۱۳۴ ریال.

POLYVITAMIN "Bayer" 733
بایر آلمان ـ ایران

ترکیب: در هر میلی‌لیتر: عصاره‌لوور ۷۳۳ میلی‌گرم + ویتامین B_1 ۳/۵ میلی‌گرم + ویتامین B_2 ۰/۰۸۴ میلی‌گرم + ویتامین B_6 ۰/۰۲۸ میلی‌گرم + نیکوتینامید ۰/۵۶ میلی‌گرم + پانتوتنات کلسیم ۰/۷ میلی‌گرم.
موارد استعمال: درمان نقاهت بیماریهای عفونی، جراحی و زایمان، خونریزی و صدمات، نقصان ویتامینهای B در بدن بخصوص نزد زنان، خستگی، عدم تعادل دستگاه اعصاب نباتی، بی‌اشتهائی.
مقدار مصرف و طرز استعمال: بزرگسالان: روزی ۳ بار، هربار ۲۵ قطره
خردسالان: روزی ۳ بار، هربار ۱۰ قطره.
بسته بندی: قطره خوراکی ۲۵ میلی‌لیتر.
بها: ۴۷ ریال.

P

PONDERAL
سرویر ـ فرانسه

ترکیب: در هر قرص کلریدرات ۱ ـ (۳ ـ تری فلوئورومتیل فنیل) ـ ۲ ـ اتیل آمینو پروپان = فن فلورامین ۲۰ میلی‌گرم.
موارد استعمال: درمان کلیه موارد چاقی:
مقدار مصرف و طرز استعمال: روزی ۳ ـ ۶ قرص.
موارد منع استعمال: دوران بارداری.
بسته بندی: قرص × ۴۰.

بها: ۱۷۰ ریال.

PONSTAN
پارک دیویس آمریکا ـ ایران

ترکیب: اسید مفنامیک در هر کپسول: ۲۵۰ میلی‌گرم. در هر ۵ میلی‌لیتر شربت: ۵۰ میلی‌گرم.
موارد استعمال: دردهای رماتیسمی، دردهای عضلانی، دردهای مفصلی، کمردرد، دردهای ناشی از ضربه، دردهای قاعدگی، سردرد بعلل مختلف، دنداندرد، گوش‌درد، دردهای بعد از اعمال جراحی و زایمان، پائین آوردن تب ناشی از سرماخوردگی.
مقدار مصرف و طرز استعمال: بزرگسالان: روزی ۳ بار، هربار ۱-۲ کپسول. خردسالان از شش ماه به‌بالا: ۶/۵ میلی‌گرم برای هر کیلوگرم از وزن بدن بفواصل ۶ـ۸ ساعت.
موارد منع استعمال: مثل سایر داروهای ضدالتهاب در مبتلایان به‌قرحه و زخمهای دستگاه گوارش.
احتیاط: در صورت ایجاد حساسیت، مصرف دارو باید قطع گردد. مصرف بیش از یک هفته خطرناک است.
بسته‌بندی: کپسول × ۱۰. سوسپانسیون ۱۲۰ میلی‌لیتر.
بها: کپسول ۴۱ ریال، سوسپانسیون ۸۲ ریال.

P

POSITOS
ماکسون آمریکا ـ تولیدارو ایران

ترکیب: سوسالیسیلات بیسموت + کلریدرات فنیل افرین ۲/۵ میلی‌گرم + بنزوکائین ۵۰ میلی‌گرم + مانتول + اکسیدروی و اکسیپیان تا مقدار کافی.
موارد استعمال: بواسیر، فیسورآنورکتال، تحریکات آنورکتال.
مقدار مصرف و طرز استعمال: روزی چند بار از شیاف استعمال شود.
بسته‌بندی: شیاف × ۶.
بها: ۴۹ ریال.

POTASSIUM CHLORIDE
باکستر ـ ایران

ترکیب: کلروپتاسیم ۳ گرم + آب‌مقطر به‌مقدار کافی تا ۲۰ میلی‌لیتر (غلظت پتاسیم ۴۰ میلی‌اکی‌والان).

مقدار مصرف و طرز استعمال: بعد از رقیق کردن با دکستروز یا سالین - نرمال پرفوزیون وریدی انجام میشود.
موارد منع استعمال: اولیگوری، آنوری، نارسائی کلیوی، بیماری آدیسون، بلوک قلبی.
احتیاط: محلول را قبل از تزریق باید رقیق کرد
بسته بندی: ویال ۲۰ میلی‌لیتر.
بها: ۱۳ ریال.

POTASSIUM Logiais
لژه-فرانسه

ترکیب: در هر قرص : کلرور پتاسیم ۱ گرم.
موارد استعمال: کمی پتاسیم بدن، کلیه مواردی که پتاسیم بدن دفع گردیده، عدم توازن یون سدیم و پتاسیم، اسهال و استفراغ شدید، پیدایش استن در ادرار، اختلال نظم قلب، مسمومیت ناشی از دیژیتالین، تشنج بانوان باردار، هنگام تجویز داروهای مدر.
مقدار مصرف و طرز استعمال: روزی ۱ ـ ۸ قرص.
موارد منع استعمال: بیماری آدیسون، کوما، کاهش ادرار، احتباس ادرار، بیماری قند درمان نشده.
احتیاط: از شکستن قرص و جویدن آن خودداری شود.
بسته بندی: قرص × ۴۰.
بها: ۵۰ ریال.

P

PRAXILENE
اویروال-فرانسه

ترکیب: در هر قرص: (نفتیل ـ ۱) ـ ۳ تتراهیدروفورفوریل ـ ۲ پروپیونات دی اتیل آمینو ـ ۲ اتیل اکسالات اسید = نفتی د روفوریل.
موارد استعمال: آرتریوپاتی، بیماریهای عروق مغزی، افزایش فشارخون، آترواسکلروز.
مقدار مصرف و طرز استعمال: روزی ۲ بار، هربار یک قرص.
بسته بندی: قرص ۵۰ میلی‌گرم × ۲۵.
بها: ۳۰۰ ریال.

PREDASMAL
ارگانون هلند ـ ایران

ترکیب: پردنیزون ۱ میلی‌گرم + دیپروفیلین ۱۰۰ میلی‌گرم + کلریدرات افدرین ۲۰ میلی‌گرم + متیل فنوباربیتون ۰/۵ میلی‌گرم + متاندریول ۵ میلی‌گرم.

موارد استعمال: آسم ریوی و برونشیت اسماتیک، آمفیزم ریوی، متاستازهای ریوی، سیلیکوز.

مقدار مصرف و طرز استعمال: شروع درمان: ۶ قرص سپس به‌تدریج ۱ ـ ۳ قرص. خردسالان یک چهارم مقدار بالغین.

موارد منع استعمال: زنان باردار، سرطان پروستات.

احتیاط: هنگام درمان مراقبت و معاینه مرتب بیماران لازم است.

بسته‌بندی: قرص × ۲۰.

بها: ۷۰ ریال.

PREDNACYL
ارگانون هلند ـ ایران

ترکیب: پردنیزون ۰/۵ میلی‌گرم + اسیداستیل‌سالیسیلیک ۳۰۰ میلی‌گرم + هیدروکسید آلومینیوم ۳۰ میلی‌گرم + تری‌سیلیکات ـ منیزیم ۵۰ میلی‌گرم + رگونال ۳۰ میلی‌گرم + اگراین ۱۰ میلی‌ـ گرم.

موارد استعمال: اشکال خفیف و حالات شبیه رماتیسم.

مقدار مصرف و طرز استعمال: شروع درمان: روزی ۸ ـ ۱۲ قرص که بتدریج کم میشود. ادامه درمان: روزی ۳ قرص.

موارد منع استعمال: اولسر معده.

بسته‌بندی: قرص × ۳۰.

بها: ۸۲ ریال.

PREDNIFLEX
سیلاگ شمی ـ سویس

ترکیب: کلرزوکسازون ۲۵۰ میلی‌گرم + استامینوفن ۳۰۰ میلی‌گرم + پردنیزولون ۱/۵ میلی‌گرم.

موارد استعمال: آرتریت روماتوئید، استئوآرتریت، اسپاسم عضلانی.

مقدار مصرف و طرز استعمال: شروع درمان: روزی ۳ بار، هربار ۲ قرص ادامه درمان: روزی ۳ بار، هربار ۱ قرص.

بسته‌بندی: قرص × ۲۰.

P

بها: ۱۲۵ ریال.

PREDNIMOVIRNE N
یوسی‌بی ـ بلژیک

ترکیب: پردنیزون ۲/۵ میلی‌گرم + موویرن ۳۲۰ میلی‌گرم.

موارد استعمال: پلی‌آرتریت مزمن، روماتیسم غیرمفصلی، آرتروز، آرتریت عفونی، تب روماتیسمی، لمباگو.

مقدار مصرف و طرز استعمال: روزی ۴ـ۶ قرص.

بسته‌بندی: قرص × ۲۰.

بها: ۱۰۹ ریال.

PREFRIN - A
آلرگان ـ آمریکا

ترکیب: پیریلامین مالئات ۰/۱ درصد + کلریدرات فنیل افرین ۰/۱۲ درصد.

موارد استعمال: تسکین فوری عوارض آلرژیک چشمی.

مقدار مصرف و طرز استعمال: هر ۳ـ۴ ساعت یک قطره در چشم می‌چکانند.

موارد منع استعمال: گلوکوم با زاویه بسته.

احتیاط: درصورت بروز حساسیت درمان باید قطع شود.

بسته‌بندی: قطره چشمی ۱۵ میلی‌لیتر.

بها: ۱۶۰ ریال.

PREGNYL
ارگانون ـ هلند

ترکیب: گونادوتروپین خالص تهیه شده از ادرار زن حامله.

موارد استعمال: در زن باعث پاره شدن فولیکول دوگراف رسیده و ایجاد جسم زرد میشود. در مرد باعث تحریک سلولهای بینابینی گشته و آندروژنهای بیضه را بوجود میآورد، کریپتورکیدیسم.

مقدار مصرف و طرز استعمال: درکریپتورکیدیسم هفته‌ای ۳ تزریق ۵۰۰ واحدی بمدت ۷ هفته که درصورت احتیاج تکرار میشود.

احتیاط: معاینه مرتب بیمار. در صورت رشد زودرس جنسی، درد زیرشکم یا بزرگ شدن تخمدانها درمان باید قطع شود.

عوارض جانبی: خیز، آسیت، آبستنی چندقلو.

P

بسته بندی: آمپول ۵۰۰ و ۱۵۰۰ و ۵۰۰۰ واحدی بصورت لیوفیلیزه ۳×.

بها: ۵۰۰ واحدی ۱۶۸ ریال، ۱۵۰۰ واحدی ۲۶۰ ریال، ۵۰۰۰ واحدی ۵۳۰ ریال.

PREMARIN
آیرست ـ کانادا

ترکیب: استروژن کونژوگه.

موارد استعمال: ناراحتی‌های دوران یائسگی، خونریزی ـ دیسفونکسیونل، هیپوژنیتالیسم، سرطان پروستات، آکنه.

مقدار مصرف و طرز استعمال: روزی ۱ قرص از روز پنجم قاعدگی تا ۲۱ روز بعد. آمپول: ۲۵ میلی‌گرم در هربار تزریق.

بسته بندی: قرص ۱/۲۵ و ۲/۵ میلی‌گرم × ۲۰، قرص ۰/۶۲۵ × ۱۰۰. آمپول ۲۰ میلی‌گرم + حلال ۵ میلی‌لیتر × ۱. کرم مهبلی ۱/۵ اونسی.

بها: ۱/۲۵ میلی ۵۰۰ ریال، ۲/۵ میلی ۹۰۰ ریال. ۰/۶۲۵ میلی ۳۰۰ ریال. آمپول ۲۵۲ ریال. کرم مهبلی ۲۷۰ ریال.

PREMARIN (P.M.B)
آیرست ـ کانادا

ترکیب: استروژن ۰/۴۵ + مپروبامات ۲۰۰ میلی‌گرم.

موارد استعمال: دوران یائسگی همراه با اضطراب، دلهره، پریشانی.

مقدار مصرف و طرز استعمال: برحسب نوع و شدت بیماری متفاوت است.

بسته بندی: قرص × ۱۰۰.

بها: ۹۰۰ ریال.

PREMARIN (P.M.T.)
آیرست ـ کانادا

ترکیب: استروژن ۰/۶۲۵ میلی‌گرم + متیل ـ تستوسترون ۵ میلی‌گرم.

موارد استعمال: خشک کردن شیر قبل و بعد از زایمان، استئوپورز سنین پیری، دیسمنوره.

مقدار مصرف و طرز استعمال: روزی ۲ قرص.

موارد منع استعمال: کارسینوم پروستات.

P

بسته بندی: قرص × ۲۰ .
بها: ۱۳۵ ریال.

PRENATAL Cap.
لدرلی آمریکا ـ ایران

ترکیب: در هر کپسول: ویتامین A ۲ هزار واحد + ویتامین D ۴۰۰ واحد + تیامین منونیترات ۲ میلی‌گرم + ریبوفلاوین ۲ میلی‌گرم + اسید اسکوربیک ۳۵ میلی‌گرم + نیاسینامید ۷ میلی‌گرم + ویتامین B_{12} ۱ میکروگرم + اسید فولیک ۱ میلی‌گرم + کلسیم ۲۵۰ میلی‌گرم + فسفر ۱۹۰ میلی‌گرم + آهن ۶ میلی‌گرم + سولفات فرو خشک شده ۲۰ میلی‌گرم + منگنز ۰/۱۲ میلی‌گرم.
موارد استعمال: بعنوان مکمل رژیم غذایی در هنگام آبستنی و شیردهی.
مقدار مصرف و طرز استعمال: روزی ۱ ـ ۳ کپسول.
بسته بندی: کپسول × ۱۰۰ .
بها: ۲۳۴ ریال.

PRESSYL
لاتمات و بوانو ـ فرانسه

ترکیب: قطره: کامفوتامید ۰/۲۵ گرم + سولفات آمینو فنیل اتیل کاربینول ۰/۰۵ گرم.
موارد استعمال: نقرس، بعنوان آنتی‌شوک، آنتی آنافیلاکتیک و محرک دستگاه تنفسی.
مقدار مصرف و طرز استعمال: خردسالان: روزی ۱۵ ـ ۵۰ قطره.
بزرگسالان: روزی ۳۰ ـ ۸۰ قطره.
بسته بندی: قطره ۱۴ میلی‌لیتر.
بها: ۵۰ ریال.

PRIADEL
دلالاند ـ فرانسه

ترکیب: در هر قرص: کربنات لیتیوم ۴۰۰ میلی‌گرم.
موارد استعمال: حالات مانیک، حالات افسردگی.
مقدار مصرف و طرز استعمال: روزی ۳ ـ ۴ قرص.
موارد منع استعمال: نارسائی قلبی و کلیوی، بیماری آدیسون، اختلال تعادل سدیم.

بسته بندی: قرص ۴۰۰ میلی‌گرم × ۱۰۰ .
بها: ۳۲۰ ریال.

PRIMOBOLAN Depot
شرینگ آلمان ـ ایران

ترکیب: در هر میلی‌لیتر: انانتات متنولون ۱۰۰ میلی‌گرم.
موارد استعمال: نقاهت، ضعف عمومی (بی‌اشتهائی، لاغری، خستگی) بیماریهای لاغرکننده، حالات کاشکسی، هنگام درمان با اشعه، درمانهای سیتواستاتیک، کمک به‌درمان در سرطان پیشرفته پستان و دستگاه تناسلی زنان، اوستئوپوروز، بیماریهای مزمن کبد و کلیه، هیپرتیروئیدی، دیستروفی عضلانی در کودکان کم رشد، اختلالات رشد و نمو.
مقدار مصرف و طرز استعمال: برحسب نوع و شدت بیماری متفاوت است.
موارد منع استعمال: آبستنی و سرطان پروستات.
احتیاط و عوارض جانبی: در دختران جوان ندرتاً ممکنست باعث بروز آکنه، رویش موی صورت و پاها، خفگی صدا و خشونت و کلفت شدن آن شود. در ابتدا این عوارض معمولاً با قطع درمان بر طرف میشوند ولی چنانچه درمان با وجود شروع تغییرات صدا ادامه یابد ممکن است منجر به کلفتی صدا گردد که قابل برگشت به‌حال طبیعی نباشد.
بسته بندی: آمپول ۱ میلی‌لیتر × ۱ .
بها: ۱۱۷ ریال.

PRIMODIAN Depot
شرینگ آلمان ـ ایران

ترکیب: در هر میلی‌لیتر: انانتات تستوسترون ۶۵ میلی‌گرم + والرات استرادیول ۴ میلی‌گرم.
موارد استعمال: در زن: یائسگی، علائم کمبود هورمون بعد از برداشتن تخمدان‌ها، بی‌اختیار شدن ادرار در سن یائسگی (مثانه حساس) و برای خشک کردن شیر. در زن و مرد: اوستئوپوروز، اختلالات گردش خون محیطی، علائم آنژینی،

نارسائی قلب (قلب پیری).
مقدار مصرف و طرز استعمال: هر ۳ ـ ۱۰ هفته یک آمپول نسبت به اشخاص و برحسب احتیاج درمان.
عوارض جانبی: درمان با مقادیر زیاد و طولانی گاهی سبب عوارض ویریلیزاسیون از قبیل موی زیاد، خشونت و کلفتی صدا و ازدیاد میل جنسی میگردد که با قطع دارو بر طرف میگردد (در مورد استئوپوروز شاید لازم باشد این عوارض را پذیرفت).
بسته بندی: آمپول ۱ میلی‌لیتر × ۱.
بها: ۸۲ ریال.

PRIMOGERON
شرینگ ـ آلمان

ترکیب: هورمون و ویتامین با عصاره جگر برای پیران.
موارد استعمال: کم شدن قوه تمرکز هنگام کار، کم شدن حافظه، حالات افسردگی، عصبانیت، کم شدن قوای جسمی و فکری قبل از موقع، اختلالات بعد از یائسگی، دیابت پیران، بیماریهای آرتریو اسکلروتیک و عوارض آن مانند سرگیجه، صدای گوش، اختلالات گردش خون محیطی، طولانی شدن دوران نقاهت پس از اعمال جراحی و بیماریهای ناتوان کننده در دوران پیری.
مقدار مصرف و طرز استعمال: شروع درمان: روزی ۳ بار، هربار ۱ کپسول برای مدت ۳ ـ ۴ هفته. جهت تکرار درمان: یک کپسول در روز بین یا بعد از غذا.
بسته بندی: کپسول × ۳۰.
بها: ۹۰ ریال.

PRIMOGONYL
شرینگ ـ آلمان

ترکیب: گونادوتروپین کوریونیک.
موارد استعمال: در زنان: آمنوره، نازائی. در مردان: هیپوژنیتالیسم، پائین نیامدن بیضه‌ها. در هر دوجنس: دیستروفی آدیپوزو ـ ژنیتال، کوتاه بودن قد.
مقدار مصرف و طرز استعمال: برحسب نوع و شدت بیماری متفاوت است.

بسته بندی: آمپول ۳۰۰ واحد × ۳ + حلال ۲ میلی‌لیتر. آمپول ۱۰۰۰ واحد × ۳ + حلال ۲ میلی‌لیتر. آمپول ۵۰۰۰ واحد × ۳ + حلال ۲ میلی‌لیتر.

بها: آمپول ۳۰۰ واحدی ۱۲۰ ریال، ۱۰۰۰ واحدی ۲۴۰ ریال، ۵۰۰۰ واحدی ۶۰۰ ریال.

PRIMOLUT NOR

شرینگ آلمان ـ ایران

ترکیب: نوراتی‌سترون‌استات ۵ میلی‌گرم.

موارد استعمال: آمنوره اولیه و ثانویه بلندمدت، عقب انداختن قاعدگی، جلوگیری از عود خونریزی‌های دیسفونکسیونل، نازائی بعلت نارسائی جسم زرد، سندرم قبل از قاعدگی، ورم پستان، درد پستان، آندومتریوز، هیپوپلازی زهدان، سرطان پیشرونده پستان.

مقدار مصرف و طرز استعمال: آمنوره: روز اول معالجه ۲۰ میلی‌گرم و روز ۱۴ معالجه ۱۰ میلی‌گرم داخل عضله تزریق میشود، سپس از روز ۱۹ تا ۲۶ روزی دوقرص میخورند.

موارد منع استعمال: اختلالات شدید کبدی.

بسته بندی: قرص ۵ میلی‌گرم × ۲۰. قرص ۱۰ میلی‌گرم × ۳۰.

بها: قرص ۵ میلی ۱۲۹ ریال، ۱۰ میلی ۲۶۰ ریال.

P

PRIMOSISTON

شرینگ آلمان ـ ایران

ترکیب: در هر میلی‌لیتر: هیدروکسی پروژسترون کاپروآت ۲۵۰ میلی‌گرم + بنزوات استرادیول ۱۰ میلی‌گرم.

موارد استعمال: جلوگیری از عود خونریزی فونکسیونل، پولی‌منوره، عقب و جلو انداختن قاعدگی.

مقدار مصرف و طرز استعمال: برحسب نوع و شدت بیماری متفاوت است.

بسته بندی: آمپول ۱ میلی‌لیتر × ۱.

بها: ۱۷۵ ریال.

PRIMPRAN
دلاگرانژ ـ فرانسه

ترکیب: قرص: متوکلوپرامید ۱۰ میلی‌گرم هر قطره: ۰/۱ میلی‌گرم. هر میلی‌لیتر آمپول: ۵ میلی‌گرم.
مکانیسم: با رقابت با استیل کولین مانع اثر آن بر روی اعضاء میشود.
موارد استعمال: تهوع و استفراغ آبستنی، نفخ، سکسکه، عدم تحمل داروئی، دیس کینزی صفراوی، قاعدگی، کوله‌سیستکتومی، گاستر کتومی، سیروز، آنترو کولیت، اسپاسم پیلور.
مقدار مصرف و طرز استعمال: قرص: روزی ۳ بار، هربار ۰/۵ ـ ۱ قرص قبل از غذا. آمپول: در موارد حاد یک آمپول عضلانی یا وریدی که در صورت لزوم میتوان تکرار کرد. قطره: روزی ۵ تا ۱۰ قطره برای هر کیلو وزن بدن.
بسته بندی: قرص × ۴۰، قطره ۶۰ میلی‌لیتر، آمپول ۲ میلی‌لیتر × ۱۲.
بها: قرص ۲۸۰ ریال. قطره ۱۲۰ ریال. آمپول ۱۵۰ ریال.

PRINCI B
لاباز ـ فرانسه

ترکیب: ویتامین B_1 ۱۲۵ میلی‌گرم + ویتامین B_6 ۱۲۵ میلی‌گرم + ویتامین B_{12} ۱۲۵ میکروگرم.
موارد استعمال: دردهای بامنشاء عصبی عضلانی، دردهای روماتیسمی
مقدار مصرف و طرز استعمال: روزی ۲ ـ ۴ قرص قبل یا هنگام غذا، در موقع درد ۶ تا ۸ قرص.
بسته بندی: قرص × ۳۶.
بها: ۱۷۵ ریال.

PRISCOL
سیبا ـ سویس

ترکیب: در هر میلی‌لیتر: کلریدرات بنزیل ـ ۲ ـ ایمیدازولین = کلریدرات تولازولین ۱۰ میلی‌گرم.
موارد استعمال: آکروسیانوز، اختلالات جریان خون ناشی از آرتریواسکلروز، تغییرات نسجی مانند سرماخوردگی، سوختگی با مواد شیمیائی یا علل فیزیکی.
مقدار مصرف و طرز استعمال: روزی ۱۰ ـ ۲۵ میلی‌گرم زیرپوست یا داخل عضله، داخل ورید یا شریان تزریق میشود.
بسته بندی: آمپول + حلال ۱ میلی‌لیتر × ۵.

P

بها: ۱۰۵ ریال.

PRISCOPHENE
سیبا ـ سویس

ترکیب: در هر دراژه: کلریدرات تولازولین ۲/۵ میلی‌گرم + کلریدرات فنیل سیکلو هگزیل استیل دی اتیل آمینو تـرازنتین ۱۰ میلی‌گرم + اسید فنیل اتیل باربیتوریک ۲۰ میلی‌گرم.

موارد استعمال: دیستونی دستگاه نباتی، اختلالات عصبی دوران یائسگی، اختلالات عملی قلبی ـ عروقی و معدی ـ روده‌ای که علل عصبی دارند.

مقدار مصرف و طرز استعمال: روزی ۳ بار، هربار ۱ قرص.

بسته بندی: دراژه × ۳۰.

بها: ۴۷ ریال.

PRIVINE
سیبا ـ سویس

ترکیب: قطره: نیترات (نفتیل ـ ۱ ـ متیل) ـ ۲ ایمیدازولین (۱ در هزار).

موارد استعمال: سرماخوردگی، سینوزیت، فارنژیت، لارنـژیت، ورم ملتحمه، بعنوان بندآورنده خون.

مقدار مصرف و طرز استعمال: زکام و سرماخوردگی: ۲ـ۴ قطره. چشم: روزی ۲ ـ ۴ بار، هر بار ۱ ـ ۲ قطره.

بسته بندی: قطره ۱۰ میلی‌لیتر.

بها: ۴۸ ریال.

PRO - ACTIDIL
بوروزولکام ـ انگلستان

ترکیب: در هر قرص: کلریدرات تریپرولیدین ۱۰ میلی‌گرم.

موارد استعمال: درماتوزهای آلرژیک، کهیر، اکزماسبوروئیک، ادم ـ آنژیونوروتیک، خارش.

مقدار مصرف و طرز استعمال: خردسالان بالاتر از ۱۰ سال و بزرگسالان: ۱ قرص هنگام عصر. در موارد شدید: بزرگسالان تا روزی ۲ قرص.

بسته بندی: قرص × ۱۰.

بها: ۸۲ ریال.

PRO - BANTHINE

سرل انگلستان ـ پارس ایران

ترکیب: پروبانتلین بروماید ۱۵ میلی‌گرم.

موارد استعمال: زخم معده، گاستریت، اسپاسم پیلور، کولون اسپاستیک، دیورتیکولیت، اسهال فونکسیونل، اسپاسم مثانه، کولیک‌های کلیوی و حالب، شب ادراری، هیپرهیدروز.

مقدار مصرف و طرز استعمال: یک قرص قبل از هر غذا و ۲ قرص هنگام خواب.

موارد منع استعمال: گلوکوم.

احتیاط: در بیماران مبتلی به‌بزرگی پروستات و استنوزپیلور بایستی با احتیاط بکار برده شود.

بسته‌بندی: قرص × ۴۰.

بها: ۱۲۷ ریال.

PRO - BANTHINE Dartalan

سرل انگلستان ـ پارس ایران

ترکیب: پروبانتین ۱۵ میلی‌گرم + دارتالان ۳ میلی‌گرم.

موارد استعمال: زخم معده و دیس پپسی فونکسیونل، اسهال فونکسیونل و کولون اسپاستیک، حالات هیجانی و روانی همراه با عوارض معدی ـ روده‌ای.

مقدار مصرف و طرز استعمال: روزی ۳ ـ ۵ قرص.

موارد منع استعمال: گلوکوم.

احتیاط و عوارض جانبی: مانند پروبانتین.

بسته‌بندی: قرص × ۳۰.

بها: ۱۳۷ ریال.

PROBERON

آلن هانبوریز انگلستان ـ داروپخش ایران

ترکیب: در هر قرص: ویتامین B_1 ۵ میلی‌گرم + ویتامین B_2 ۲ میلی‌گرم + نیکوتینامید ۲۰ میلی‌گرم + ویتامین B_6 ۲ میلی‌گرم.
در هر میلی‌لیتر از آمپول: ویتامین B_1 ۲۰ میلی‌گرم + ویتامین B_2 ۳ میلی‌گرم + نیکوتینامید ۵۰ میلی‌گرم + ویتامین B_6 ۲ میلی‌گرم + پانتوتنات سدیم ۳ میلی‌گرم + کولین ۱۵ میلی‌گرم.

موارد استعمال: تمام موارد کمبود ویتامین‌های فوق، همراه با آنتی-

بیوتیکها، بی‌اشتهائی، آلرژی غذائی، اختلالات عصبی.
مقدار مصرف و طرز استعمال: معمولا ۳ قرص در روز یا ۱ آمپول در هفته. در موارد شدید روزی ۱ میلی‌لیتر از آمپول بشکل تزریق داخل عضلانی.
بسته‌بندی: آمپول ۲ میلی‌لیتر × ۵. قرص × ۲۵.
بها: آمپول ۵۹ ریال. قرص ۵۳ ریال.

PROCAINE + ADRENALINE
پ اواس فرانسه ـ دوپار ایران

ترکیب: در هر ۱۰۰ میلی‌لیتر: کلریدرات پروکائین ۲ گرم + آدرنالین ۰/۱ درصد ۱۰ میلی‌لیتر.
موارد استعمال: تسکین موقتی درد در بیماریها و ضربه‌ها بخصوص ضایعات قرنیه، آزمایش چشم، جراحی‌های کوچک، بیرون آوردن اجسام خارجی از چشم.
مقدار مصرف و طرز استعمال: چند قطره تا بدست آوردن نتیجه مطلوب در چشم می‌چکانند.
عوارض جانبی: حساسیت، اکزمای موضعی.
بسته‌بندی: قطره چشمی ۱۰ میلی‌لیتر.
بها: ۵۳ ریال.

PRODERMIDE
لالون ـ انگلستان

ترکیب: تری اتانولامین آمونیوم لوریل سولفات ۱۸ درصد + گلیسین ۱ درصد + اسیدلاکتیک در محلول تامپون مقدار کافی تا pH ۳/۵.
موارد استعمال: خارش موضعی، سبوره، عفونتهای قارچی.
بسته‌بندی: محلول ۲۰۰ میلی‌لیتر.
بها: ۱۹۸ ریال.

PRODISAN 300
زیگفرید ـ سویس

ترکیب: آزاپروپازون ۳۰۰ میلی‌گرم.
موارد استعمال: آرتریت روماتوئید، اسپوندولیت، دردهای مفاصل و عضلات.
مقدار مصرف و طرز استعمال: روزی ۳ بار، هربار ۱ ـ ۲ کپسول.

موارد منع استعمال: اولسر حاد معده و اثنی‌عشر.
احتیاط: همراه با داروهای ضدانعقادی باید با احتیاط تجویز شود.
بسته‌بندی: کپسول × ۲۰.
بها: ۳۸۰ ریال.

PRODOXOL
وارنرلامبرت ـ انگلستان

ترکیب: اسید اکسولی‌نیک.
موارد استعمال: عفونتهای حاد، مزمن و عودکننده دستگاه ادراری.
مقدار مصرف و طرز استعمال: هر ۱۲ ساعت یک قرص.
بسته‌بندی: قرص ۷۵۰ میلی‌گرم × ۲۸.
بها: ۱۱۷۶ ریال.

PROFASI
سرونو ـ ایتالیا

ترکیب: گونادوتروفین کوریونیک.
موارد استعمال: کریپتوئیدیسم، کوچکی تخمدانها، الیگومنوره، منوراژی، متروپاتی، سقط‌های عادتی و تهدیدی.
مقدار مصرف و طرز استعمال: برحسب نوع و شدت بیماری متفاوت است.
بسته‌بندی: آمپول لیوفیلیزه ۵۰۰، ۱۰۰۰ و ۵۰۰۰ واحدی × ۳ + حلال × ۳.
بها: ۵۰۰ واحدی ۱۷۰ ریال. ۱۰۰۰ واحدی ۲۴۰ ریال، ۵۰۰۰ واحدی ۶۴۰ ریال.

PROGESTIN
ارگانون هلند ـ ایران

ترکیب: پروژسترون.
موارد استعمال: آمنوره، دیسمنوره، سقط‌های عادتی، تهدید به‌سقط، هیپوپلازی رحمی.
مقدار مصرف و طرز استعمال: روزی ۵ تا ۲۵ میلی‌گرم از راه عضلانی.
بسته‌بندی: آمپول ۵ و ۱۰ و ۲۵ میلی‌گرم × ۶، ۵۰ میلی × ۳.
بها: ۵ میلی ۴۷ ریال. ۱۰ میلی ۵۹ ریال، ۲۵ میلی ۷۰ ریال، ۵۰ میلی ۴۵ ریال.

P

PROGYNON C
PROGYNON B Oleosum
PROGYNON Depot
شرینگ آلمان ـ ایران

ترکیب: قرص: اتی‌نیل استرادیول ۰/۰۲ میلی‌گرم. دپو: استرادیول والرات ۱۰ میلی‌گرم. الئوزوم: استرادیول بنزوات ۵ میلی‌گرم.

موارد استعمال: در زنان: آمنوره، دیسمنوره، هیپومنوره، پولی‌منوره، نازائی، هیپوژنیتالیسم، هیپوپلازی زهدان، آندومتریت بعد از زایمان یا بعد از سقط، خشکانیدن شیر، سرطان پستان (بعد از یائسگی) آکنه. در مردان: سرطان پروستات، هیپرتروفی پروستات، زخم معده و اثنی عشر.

مقدار مصرف و طرز استعمال: برحسب نوع و شدت بیماری متفاوت است.

بسته بندی: قرص × ۳۰. الئوزوم: آمپول ۱ میلی‌لیتر × ۱. دپو: آمپول ۱ میلی‌لیتر × ۱.

بها: قرص C ‏۳۵ ریال. دپو ۵۹ ریال، روغنی ۵۹ ریال.

PROGYNOVA
شرینگ آلمان ـ ایران

ترکیب: والرات استرادیول.

موارد استعمال: عوارض بعد از یائسگی.

مقدار مصرف و طرز استعمال: روزی یک قرص بعد از غذا. بعد از هر دوره ۲۰ روزه باید اقلا ۸ روز فاصله داد. در بسیاری از موارد میتوان مقدار دارو را کم کرد بدین ترتیب: که یکروز در میان یک قرص تجویز میشود در اینصورت دیگر فاصله بین دوره‌های معالجه کاملا ضروری نیست.

موارد منع استعمال: در بیماران مبتلا به‌سرطان پستان، رحم و آندومتر نباید تجویز شود.

بسته بندی: قرص ۱ و ۲ میلی‌گرم × ۲۰.

بها: قرص ۱ میلی ۷۶ ریال. ۲ میلی ۱۰۵ ریال.

PROLUTON
PROLUTON Depot
شرینگ آلمان ـ ایران

ترکیب: پرولوتون: پروژسترون. دپو: ئیدروکسی پروژسترون ـ کاپروآت.

موارد استعمال: سقط، خونریزی دیسفونکسیونل، آمنوره، دیسمنوره،

P

هیپرمنوره، اولیگومنوره، هیپوژنیتالیسم هیپوپلازی زهدان، جراحیهای ژینکولوژیک، نازائی، خارش.

مقدار مصرف و طرز استعمال: برحسب نوع و شدت بیماری متفاوت است.

بسته بندی: آمپول ۱۰ میلی‌گرم × ۳، دپو: آمپول ۲۵۰ میلی‌گرم × ۱.

بها: آمپول ۱۰ میلی ۴۰ ریال، دپو ۱۶۰ ریال.

PROMETHAZINE

دوپار-ایران

ترکیب: ۱۰ - (۲ - دی متیل آمینو پروپیل) - فنوتیازین.

مکانیسم: با عمل رقابتی با هیستامین روی گیرنده‌های هیستامینی قرار گرفته مانع اثر آن میگردد.

اثرمتقابل: همراه با الکل، باربیتوراتها، نارکوتیکها و آنالژزیکها نباید مصرف شود.

موارد استعمال: انواع خارش و اکزماهای خارش‌دار، کهیر، آنژیوادم، رینیت آلرژیک و وازوموتور، کونژونکتیویت آلرژیک، درموگرافیسم، واکنشهای آنافیلاکتیک و آلرژیک.

مقدار مصرف و طرز استعمال: بزرگسالان: روزی ۵-۱۰ قاشق مرباخوری. خردسالان ۱ - ۵ قاشق مرباخوری.

موارد منع استعمال: حساسیت بدارو.

عوارض جانبی: خواب‌آلودگی، خشکی دهان، تاری دید، گیجی، فتوفوبی.

احتیاط: کسانی که رانندگی میکنند باید کاملا احتیاط را رعایت کنند.

بسته بندی: شربت ۵ میلی‌گرم = ۵ میلی‌لیتر × ۱۲۰ میلی‌لیتر.

بها: ۵۹ ریال.

P

PRONESTYL

اسکوئیب-آمریکا

ترکیب: کلریدرات پروکائین آمید.

موارد استعمال: اکستراسیستول، تاکی کاردی، فیبریلاسیون آرتریال.

مقدار مصرف و طرز استعمال: معمولا روزی ۳ بار، هربار ۲۵۰ میلی‌گرم.

موارد منع استعمال: میاستنی گراو، بلوک AV.

بسته بندی: کپسول ۲۵۰ میلی‌گرم × ۱۰۰.

بها: ۱۷۶ ریال.

PROPACINE
لوگانو ـ سویس

ترکیب: آمپی‌سیلین تری هیدرات ۳/۵ گرم + پروبنسید ۱ گرم.
موارد استعمال: سوزاک.
مقدار مصرف و طرز استعمال: محتوی شیشه را با ۳۰ میلی لیتر آب جوشیده مخلوط کرده یکجا میل می کنند.
موارد منع استعمال: دیسکرازی خونی، سنگ کلیه.
عوارض جانبی: مانند پنی‌سیلین گاهی خارش، کهیر، تهوع و استفراغ.
بسته بندی: گرد برای تهیه شربت ۳۰ میلی‌لیتر.
بها: ۲۱۰ ریال.

PROPAMIDINE Cream
می‌اند بیکر ـ انگلستان

ترکیب: ایزوتیونات پروپامیدین.
موارد استعمال: سوختگی، بریدگی، ترکهای پستان، جلوگیری از آفتابزدگی بدن.
مقدار مصرف و طرز استعمال: پس از تمیزکردن موضع بر روی آن میمالند.
بسته بندی: کرم ۲۵ گرم.
بها: ۲۵ ریال.

PROSTAPHILIN
PROSTAPHILIN - A
بریستول ـ آمریکا

P

ترکیب: در هر آمپول: اگزاسیلین سدیم ۲۵۰ میلی‌گرم. کپسول: کلوگزاسیلین ۲۵۰ میلی‌گرم.
موارد استعمال: عفونتهای ناشی از انواع استافیلوکوک طلائی، دیپلوکوکوس پنومونیا، استرپتوکوکوس پیوژن، عفونتهای دستگاه تنفسی ـ ادراری و جلدی.
مقدار مصرف و طرز استعمال: خردسالان: ۴۵ میلی‌گرم برای هر کیلو وزن بدن ۴ نوبت در روز. بزرگسالان: هر ۴-۶ ساعت ۲۵۰ میلی‌گرم از راه تزریق عضلانی یا تجویز وریدی بصورت پرفوزیون.
احتیاط: ممکنست در افراد حساس ایجاد آلرژی نماید.
بسته بندی: آمپول ۲ میلی‌لیتر × ۱. کپسول × ۱۰۰. در هر ۵ میلی‌لیتر شربت ۱۲/۵ میلی‌گرم × ۶۰ میلی‌لیتر. آمپول A : ۲۵۰ میلی‌گرم

وریدی و عضلانی.
بها: آمپول ۵۷ ریال، کپسول ۱۷۶۶ ریال، شربت ۱۲۶ ریال.

PROSTATIDAUSSE
دوس ـ فرانسه

ترکیب: عصاره هیدروگلیسرینه اورشی‌تیک ۱/۵ میلی‌لیتر + سرم روتارد ۲/۵ میلی‌لیتر.
موارد استعمال: هیپرتروفی پروستات آندروپوز.
مقدار مصرف و طرز استعمال: روزی ۱ ـ ۳ آمپول خوراکی میل می‌شود.
بسته بندی: آمپول ۵ میلی‌لیتر × ۲۴.
بها: ۲۰۰ ریال.

PROSTIGMIN
روش ـ سویس

ترکیب: استردی متیل کاربامیک (۳ ـ ئیدروکسی فنیل) ـ تری آمونیوم = متیل سولفات نئوستیگمین.
موارد استعمال: اتونی روده، یبوست آتونیک، نفخ شکم، آنوری، تأخیر در قاعدگی، فلج و اسپاسم، پولیومیلیت، حالات بعد از ضربه، تاکیکاردی پاروکسیسمال.
مقدار مصرف و طرز استعمال: برحسب نوع و شدت بیماری متفاوت است.
موارد منع استعمال: ضایعات استخوانی، عفونت‌های ادراری، حساسیت به‌دارو.
احتیاط: حرکات دودی شکل را میتوان با آتروپین بحال طبیعی درآورد.
بسته بندی: قرص ۱۵ میلی‌گرم × ۲۰ آمپول ۰/۵ میلی‌گرم = ۱ میلی‌لیتر × ۶.
بها: قرص ۹۵ ریال، آمپول ۹۲ ریال.

PROTHIADEN
بوتس ـ انگلستان

ترکیب: کلریدرات ۱۱ ـ (۳ ـ دی‌متیل آمینو پروپیلیدین) ـ ۶ ـ ۱۱ ـ دی هیدرودی‌بنز (b و c) تی‌پین = کلریدرات تی‌پین.
موارد استعمال: دپرسیون و هیجانات همراه با بیماریهای افسردگی.
مقدار مصرف و طرز استعمال: خفیف: روزی ۳ بار، هربار ۱ کپسول یا

P

۳ کپسول در شب. متوسط تا شدید: روزی ۳ بار، هربار ۲ یا ۱ کپسول + ۳ کپسول در شب.

موارد منع استعمال: گلوکوم، احتباس ادراری، اپی‌لپسی، همراه با داروهای منوآمینواکسیداز.

عوارض جانبی: خشکی دهان، یبوست اختلال در تطابق، سستی، گیجی، هیپوتانسیون، طپش قلب، خواب‌آلودگی، لرزش، سردرد

بسته‌بندی: کپسول ۲۵ میلی‌گرم × ۲۵ و ۱۰۰.

بها: ۲۵ عددی ۱۲۵ ریال، ۱۰۰ عددی ۵۰۰ ریال.

PROVERA

آبجان-آمریکا

ترکیب: استات مدروکسی پروژسترون ۵ میلی‌گرم.

موارد استعمال: آمنوره ثانوی، خونروی فونکسیونل، سقط‌های عادتی و اتفاقی، آزمون آبستنی.

مقدار مصرف و طرز استعمال: روزی ۱۰ ــ ۲۰ میلی‌گرم.

موارد منع استعمال: بیمارانی که خون‌ریزی غیرطبیعی رحم دارند.

عوارض جانبی: سردرد، عصبانیت، سرگیجه.

بسته‌بندی: قرص ۵ میلی‌گرم × ۲۴.

بها: ۲۶۱ ریال.

P

PROVIRON

شرینگ آلمان-ایران

ترکیب: هر قرص: ۱۷ بتا ـ هیدروکسی ـ آلفا ـ متیل ـ ۵ ـ آلفا ـ آندروستان ـ ۳ ـ اون = مسترولون.

موارد استعمال: کم شدن فعالیت جسمی و فکری در سنین متوسط و هنگام پیری، اختلال در توانائی جنسی، عقیمی، هیپوگونادیسم، ناراحتی‌های قلبی و جریان خون.

مقدار مصرف و طرز استعمال: شروع درمان: روزی ۶۰ ــ ۷۵ میلی‌گرم در ۳ بار. ادامه درمان: روزی ۳۰ ــ ۵۰ میلی‌گرم.

موارد منع استعمال: سرطان پروستات.

بسته‌بندی: قرص ۱۰ میلی‌گرم × ۳۰، قرص ۲۵ میلی‌گرم × ۲۰.

بها: ۱۰ میلی ۱۳۵ ریال، ۲۵ میلی ۲۰۵ ریال.

PRUVIDERM . H
دسی تین آلمان ـ تولیدارو ایران

ترکیب: استات هیدروکورتیزون ۰/۴ درصد + چربیهای سنگین سولفوره ۲/۶۵ درصد + اکسید روی ۳ درصد + تزیت ۱ درصد.

موارد استعمال: اکزماهای مزمن و لیخنی شده، نورودرماتیت و اکزمای گوش.

مقدار مصرف و طرز استعمال: پماد را باید روزی چندبار در موضع مالید و بعد از بهتر شدن علائم استعمال دارو باید روزی ۱ ـ ۲ بار برای مدتی ادامه داده شود.

بسته بندی: پماد ۲۵ گرم.

بها: ۷۶ ریال.

PULGITE - N
تولیدارو ـ ایران

ترکیب: در هر ۱۰۰ میلی‌لیتر: آتاپولژیت فعال ۱۰ گرم + سولفات نئومایسین ۱/۷ گرم.

موارد استعمال: اسهالهای حساس به نئومایسین.

مقدار مصرف و طرز استعمال: خردسالان: روزی ۶ بار، هربار ۰/۵ ـ ۱ قاشق مرباخوری، بزرگسالان: روزی ۶ بار، هربار ۱ ـ ۲ قاشق مرباخوری.

بسته بندی: شربت ۱۲۰ میلی‌لیتر.

بها: ۷۲ ریال.

PULMO- BEBE
فاریا ـ ایران

ترکیب: برمور کلسیم + بنزوات سدیم + آنتی پیرین + عصاره مایع دزسارتز وتلو + استات آمونیوم.

موارد استعمال: سیاه‌سرفه، برونشیت حاد و مزمن، تراکئیت، تراکئو-برونشیت، برنکو پنومونی و سایر عوارض مجاری تنفسی.

مقدار مصرف و طرز استعمال: اطفال کوچکتر از یکسال: روزی ۳ بار، هربار نصف قاشق مرباخوری. اطفال یک ساله: ۱ قاشق مرباخوری ۳ بار در روز. اطفال ۳ تا ۶ ساله: روزی ۵ قاشق مرباخوری.

بسته بندی: شربت ۹۰ میلی‌لیتر.

P

بها: ۴۱ ریال.

PULMOREGAL
پارك ـ ایران

ترکیب: تنطور بلادون + تنطور ریشه آکونیت + کدئین + تیوکل + بنزوات سدیم + شربت دزسارتز + شربت تلو.
موارد استعمال: ذات‌الریه، برنشیت، لارنژیت، سرفه و ناراحتی‌های ریوی.
مقدار مصرف و طرز استعمال: بزرگسالان: روزی ۴ قاشق سوپخوری.
بسته‌بندی: شربت ۱۲۰ میلی‌لیتر.
بها: ۴۱ ریال.

PULMOVIT Enfants
ویرا ـ ایران

ترکیب: در هر ۱۰۰ میلی‌لیتر: بنزوات سدیم ۱/۵ گرم + فنوباربیتون ۱۰۰ میلی‌گرم + آنالژزین ۱/۵ گرم + تنطور والریان ۳ گرم + آب لوریه سریز ۵ گرم + شربت بم دو تلو ۲۰ گرم + شربت دزسارتز ۱۰ گرم + شربت کاپیلر ۱۵ گرم + اتانول ۳ میلی‌لیتر.
موارد استعمال: سرفه و سیاسرفه، تب اطفال و نوزادان.
مقدار مصرف و طرز استعمال: روزی ۱ ـ ۳ قاشق غذاخوری.
بسته‌بندی: شربت ۹۰ میلی‌لیتر.
بها: ۴۱ ریال.

P

PURI-NETHOL
ولکام ـ انگلستان

ترکیب: در هر قرص: مرکاپتوپورین ۵۰ میلی‌گرم.
موارد استعمال: درمان تسکینی لوسمی حاد.
مقدار مصرف و طرز استعمال: برحسب شدت بیماری متفاوت است.
احتیاط: هفته‌ای یکبار باید آزمایشهای خونی انجام شود. هنگام مصرف همزمان با اللوپورنیول مقدار این دارو باید به‌مقدار ۲۵ درصد دوز معمولی برسد.
زیاده روی در مصرف: شستشوی معده. انتقال خون.
بسته‌بندی: قرص × ۲۵.
بها: ۵۲۰ ریال.

PYOPEN
بیچام ـ انگلستان

ترکیب: سدیم آلفا کربوکسی بنزیل پنی‌سیلین ـ کاربنی‌سیلین.
موارد استعمال: درمان سریع عفونتهای گرم منفی مانند باسیل پیوسیانیک، پروتئوس ها و کلی باسیل.
مقدار مصرف و طرز استعمال: بزرگسالان: در عفونتهای مجاری ادراری روزی ۴-۸ گرم. درسایر عفونتها روزی ۸ ـ ۳۰ گرم. خردسالان: روزی ۱۰۰ ـ ۵۰۰ میلی‌گرم برای هر کیلو وزن در مقادیر منقسم.
موارد منع استعمال: حساسیت به پنی‌سیلین.
بسته‌بندی: ویال ۱ گرم تزریقی در عضله، ورید و بصورت پرفوزیون.
بها: ۱۸۰ ریال.

PYRADINE EXPECTORANT
عبیدی ـ ایران

ترکیب: d ـ کلرفنیرامین مالئات ۲ میلی‌گرم + کلریدرات فنیل پروپانولامین ۱۲/۵ میلی‌گرم + عصاره مایع ایپکا ۰/۰۲ میلی‌گرم + گلیسریل گایاکولات ۷۵ میلی‌گرم.
موارد استعمال: مسکن سرفه، خلط‌آور، ضد احتقان.
مقدار مصرف و طرز استعمال: بزرگسالان: روزی ۳ ـ ۴بار، هربار ۱ ـ ۲ قاشق مرباخوری، خردسالان: ۰/۵ قاشق.
بسته‌بندی: شربت ۱۲۰ میلی‌لیتر.
بها: ۹۴ ریال.

PYRALVEX
برنا ـ سویس

ترکیب: گلوکوزیدهای آنتراکینونیک ۵ درصد + اسید سالیسیلیک ۱ درصد + الکل.
موارد استعمال: التهابات حاد و مزمن مخاط لثه و دهان و گلو و حنجره، استوماتیت آفتوز، پیوره آلوئولر، فارنژیت.
مقدار مصرف و طرز استعمال: روزی چندبار بوسیله قلم‌موی مخصوص، روی محل ضایعه مالیده می‌شود.
احتیاط: پس از مصرف نبایستی تا چند دقیقه محل را شست.
بسته‌بندی: محلول ۱۰ میلی‌لیتر همراه برس.
بها: ۹۰ ریال.

PYRIPAN

تانابی ژاپن – فارماشیمی ایران

ترکیب: پیرابیتال ۱۰۰ میلی‌گرم + فناستین ۱۰۰ میلی‌گرم + ایزوپروپیل آنتی پیرین ۵۰ میلی‌گرم + کافئین ۳۵ میلی‌گرم.

موارد استعمال: میگرن، نورالژی، لمباگو، دردهای مفصلی و عضلانی و روماتیسمی.

مقدار مصرف و طرز استعمال: روزی ۲ قرص.

بسته‌بندی: قرص × ۳۰.

بها: ۲۱۵ ریال.

QUIBRON
میدجانسون ـ آمریکا

ترکیب: در هر کپسول: تئوفیلین ۱۵۰ میلی‌گرم + گلیسریل گایاکولات ۹۰ میلی‌گرم.
موارد استعمال: برونشیت آسماتیک، برونشیت مزمن، آمفیزم ریوی، سرفه.
مقدار مصرف و طرز استعمال: کپسول: روزی ۱ــ۲ عدد. شربت: روزی ۲ــ۳ بار، هربار ۱ــ۲ قاشق غذاخوری.
عوارض جانبی و احتیاط: تحریک مخاط معدی، ناراحتی شکم، استفراغ و قی، تحریک سیستم عصبی مرکزی.
بسته بندی: کپسول × ۱۰۰. الگزیر ۸ اونسی.
بها: کپسول ۴۶۸ ریال. شربت ۱۸۷ ریال.

QUILLA CODEINE
QUILLA SIMPLEX
فروسان سوند ـ فارمکس ایران

ترکیب: در هر ۱۰۰ میلی‌لیتر: فسفات کدئین ۰/۲۵ گرم + عصاره کیلا ۰/۵ گرم. در هر ۱۲۰ گرم شربت سیمپلکس: عصاره کیلا ۰/۵ گرم + کلرورآمونیوم ۳ گرم.
موارد استعمال: برونشیت تراکئوبرونشیت حاد و مزمن بیماریهای ریوی.
مقدار مصرف و طرز استعمال: روزی ۳ بار، هربار ۱ قاشق غذاخوری.
بسته بندی: شربت ۱۰۰ گرم، شربت سیمپلکس ۱۲۰ گرم.
بها: ساده ۱۰۰ ریال، سیمپلکس ۸۲ ریال.

QUINICARDINE
ناتیول ـ فرانسه

ترکیب: سولفات کینیدین.
موارد استعمال: فیبریلاسیون دهلیزی، تاکی کاردی، اکستراسیستول، تندی ضربان قلب.

مقدار مصرف و طرز استعمال: با روزی ۲ قرص شروع شده و به ۶ قرص ختم میشود. یکدوره درمان ۱۰ روز است.

موارد منع استعمال: نارسائی غیرقابل اصلاح قلبی ـ دهلیزی و بطنی، شوک، حملات احتقانی، ترومبوز قلبی، انفارکتوس.

احتیاط: بیمار را باید قبلا دیژیتالیزه نمود، در طول درمان باید بیمار را مرتب الکتروکاردیوگرام کرد.

بسته بندی: قرص ۰/۲ گرم × ۲۰.

بها: ۲۰۰ ریال.

Q

RABRO
رابرو هلند ـ آی دی آی ایران

ترکیب: در هر قرص: عصاره رگلیس ۳۰۰ میلی‌گرم + سونیترات بیسموت ۳۵۰ میلی‌گرم + کربنات منیزیم ۴۰۰ میلی‌گرم + پوست فرانگول ۲۵ میلی‌گرم + بیکربنات سدیم ۲۰۰ میلی‌گرم + ریـزوم کالاموس ۲۵ میلی‌گرم + نشاسته ۹۰ میلی‌گرم + تالک ۹۰ میلی‌گرم + منیزیم ۲۰ میلی‌گرم.

موارد استعمال: زخم معده و اثنی‌عشر، گاستریتهای حاد و مزمن، دل دردهای با منشاء عصبی، افزایش اسیدیته معدی در دوران بارداری.

مقدار مصرف و طرز استعمال: روزی ۳ بار، هربار ۱ ـ ۲ قرص بعد از غذا.

بسته‌بندی: قرص × ۱۰۰.

بها: ۲۹۳ ریال.

RAMINOL
رامین ـ ایران

ترکیب: در هر ۱۰۰ گرم: سالیسیلات متیل ۵ گرم + کامفر ۱/۲۵ گرم + کلرفرم ۵ گرم + تربانتین ۲۰ گرم.

موارد استعمال: دردهای موضعی، رماتیسم مفصلی و عضلانی کودکان و بزرگسالان انواع دردهای مفصلی، کمردرد و پادرد، درد شانه و گردن و زانو، دردهای استخوانی و عضلانی ناشی از سرماخوردگی.

مقدار مصرف و طرز استعمال: روزی ۳ ـ ۴ بار، هربار مقدار کمی از روغن را در محل درد مالش می‌دهند.

بسته‌بندی: روغن مالیدنی ۵۰ میلی‌لیتر.

بها: ۳۵ ریال.

RAMOSUCCIN
رامین ـ ایران

ترکیب: سوکسینیل سولفاتیازول ۱۰ گرم + الگزیر پارگوریک ۱۰ میلی‌لیتر + سیترات سدیم ۰/۸۴ گرم + کائولن ۱۶/۷ گرم + پکتین ۱/۶ گرم.

موارد استعمال: اسهال‌های تابستانی، اسهالهای باسیلی و آمیبی.

مقدار مصرف و طرز استعمال: بزرگسالان: روزی ۵ بار، هربار ۱ ـ ۲ قاشق مرباخوری. خردسالان: برحسب سن هر ۴ ساعت نصف تا ۲ قاشق مرباخوری.

موارد منع استعمال: خردسالان کمتر از ۳ سال.

بسته‌بندی: شربت ۹۰ میلی‌لیتر.

بها: ۵۳ ریال.

RARICAL
ارتو ـ انگلستان

ترکیب: در هر قرص سیترات مضاعف آهن و کلسیم ۵۰۰ میلی‌گرم (آهن ۲۵ میلی‌گرم کلسیم ۸۵ میلی‌گرم.)

موارد استعمال: کمبود آهن و کلسیم در زنان آبستن، شیرخواران، خردسالان، افراد مسن، کم‌خونی.

مقدار مصرف و طرز استعمال: روزی ۳ ـ ۶ قرص.

بسته‌بندی: قرص × ۵۰ و ۱۰۰۰.

بها: ۵۰ عددی ۴۵ ریال، ۱۰۰۰ عددی ۶۰۰ ریال.

RASTINON
هوخست آلمان ـ ایران

ترکیب: در هر قرص N ـ (۵ متیل ـ بنزول سولفونیل) ـ N ـ بوتیل اوره = تولبوتامید ۰/۵ گرم.

مکانیسم: با تحریک سلولهای بتا جزایرلانگرهانس سبب افزایش ترشح انسولین میشود.

موارد استعمال: درمان خوراکی دیابت.

مقدار مصرف و طرز استعمال: شروع درمان: روزی ۲ گرم. دوز نگهدارنده: روزی ۱ گرم.

موارد منع استعمال: اسیدوز، اغماء دیابتی، اختلالات شدید کلیه، دوران آبستنی، دیابت جوانان.

بسته‌بندی: قرص × ۲۰ و ۲۰۰.

R

بها: قرص ۲۰ عددی ۸۰ ریال، ۲۰۰ عددی ۷۰۲ ریال.

RAUTRAX Improved
اسکوئیب آمریکا
– ایران

ترکیب: ریشه کامل روولفیا ۵۰ میلی‌گرم + هیدرو- فلومتیازید ۲۵ میلی‌گرم + کلرور پتاسیم ۶۲۵ میلی‌گرم. در هر قرص ۵۰ میلی بترتیب: ۵۰ میلی‌گرم + ۵۰ میلی‌گرم + ۶۲۵ میلی‌گرم.

موارد استعمال: فشارخون اولیه، فشارخون توأم با خیز.

مقدار مصرف و طرز استعمال: شروع درمان: روزی ۱ – ۳ قرص ۲۵ یا ۵۰ میلی. ادامه درمان: روزی یک قرص ۲۵ میلی.

موارد منع استعمال: نارسائی شدید کلیه.

احتیاط و عوارض جانبی: گاهی سرگیجه.

بسته‌بندی: قرص ۲۵ و ۵۰ میلی‌گرم × ۱۰۰

بها: قرص ۲۵ میلی هر عدد ۵ ریال. قرص ۵۰ میلی هر عدد ۶/۵ ریال.

REACTIVAN
مرك – آلمان

ترکیب: کلریدرات – اتیل آمینو – فنیل نور کامفول = فن کامفامین ۱۰ میلی‌گرم + ویتامین B_1 ۱۰ میلی‌گرم + ویتامین B_6 ۲۰ میلی‌گرم + ویتامین B_{12} ۱۰ میلی‌گرم + ویتامین C ۱۰۰ میلی‌گرم.

موارد استعمال: ایجاد میل به‌فعالیت، درمان حالات دپرسیو، پسیکو- آستنی، خستگی جسمی و روانی، کاهش قدرت کار و توجه.

مقدار مصرف و طرز استعمال: شروع درمان: روزی ۱ – ۲ دراژه. ادامه درمان: روزی ۱ دراژه.

بسته‌بندی: دراژه × ۲۰.

بها: ۶۰ ریال.

RECTER
رکتر – هلند

ترکیب: سونیترات بیسموت ۳۷۳/۲ میلی‌گرم + سوکربنات منیزیم ۴۸۲/۲ میلی‌گرم + پوست فرانگولا ۱۷/۱ میلی‌گرم + ریزوم – کالامی ۲۶/۶ میلی‌گرم + بیکربنات سدیم ۲۱۳/۶ میلی‌گرم.

موارد استعمال: زخم معده و اثنی عشر، هیپر کلریدری.

مقدار مصرف و طرز استعمال: روزی ۳ قرص بعد از غذا.
بسته بندی: قرص × ۴۰.
بها: ۸۵ ریال.

RECTOIDAL
کوربیر فرانسه ـ فارماشیمی ایران

ترکیب: هیدروکورتیزون ۲/۵ میلی‌گرم + بنزوات دوسینیوم ۱ میلی‌گرم + آزولن ۰/۱ میلی‌گرم.
موارد استعمال: بواسیرها، شقاق و خارش مقعد، آلرژی و اکزمای مقعد و رکتوم، آماده کردن بیمار برای عمل جراحی.
مقدار مصرف و طرز استعمال: روزی ۲ بار، هربار ۱ شیاف بمدت ۱۰ الی ۱۵ روز استعمال می‌شود.
بسته بندی: شیاف × ۱۲.
بها: ۷۰ ریال.

RECTOLAX
ویرا ـ ایران

ترکیب: بیساکودیل: بزرگسالان ۱۰ میلی‌گرم. خردسالان ۵ میلی‌گرم.
مکانیسم: سبب تحریک روده‌ها و افزایش حرکات دودی آنها میشود.
موارد استعمال: انواع یبوستها.
مقدار مصرف و طرز استعمال: یک شیاف در مواقع لزوم.
بسته بندی: شیاف × ۵.
بها: شیاف بزرگسالان ۳۰ ریال، شیاف خردسالان ۲۹ ریال.

RECTOSEPTOL BeBe
برتیه درول ـ فرانسه

ترکیب: در هر شیاف: اوکالیپتول ۸۰ میلی‌گرم + کامفر ۱۰ میلی‌گرم + سولفات مضاعف ارتوکسی کینولئین و پتاسیم ۵ میلی‌گرم + افدرین ۱ میلی‌گرم.
موارد استعمال: اختلالات برنشی ریه‌ها، گریپ و عوارض ریوی ناشی آن، سرخک و سیاه‌سرفه.
مقدار مصرف و طرز استعمال: روزی ۱ ـ ۳ شیاف استعمال شود.
بسته بندی: شیاف اطفال × ۸.
بها: ۴۱ ریال.

REDOXON
روش ـ سویس

ترکیب: ملح سدیم اسید L ـ آسکوربیک ـ ویتامین C .

موارد استعمال: در موارد کمبود ویتامین C ازدیاد مقاومت بدن در مقابل عفونت‌ها .

مقدار مصرف و طرز استعمال: روزی ۱ ـ ۲ آمپول ۵۰۰ میلی‌گرم یا یک آمپول ۱ گرم داخل عضلانی یا وریدی .

بسته بندی: آمپول ۵۰۰ میلی‌گرم = ۵ میلی‌لیتر × ۵، آمپول ۱ گرم = ۵ میلی‌لیتر × ۵ .

بها: آمپول ۵۰۰ میلی ۹۰ ریال، ۱ گرمی ۱۲۷ ریال .

REDURIC
دوبار ـ ایران

ترکیب: آللوپورینول .

اثر متقابل: مصرف توأم آن با آنتی دیابتیکهای سولفونیل اوره ممکنست سبب اختلالات کبدی کلیوی شود. نباید توأم با پنی‌سیلین مصرف شود .

مکانیسم: با مهار آنزیم گزانتین اکسیداز از اکسیداسیون ترکیبات گزانتین جلوگیری کرده در نتیجه تولید اسیداوریک متوقف میشود .

موارد استعمال: هیپراورمی، نفروپاتی اسید اوریک، پیشگیری و درمان نفروپاتی .

مقدار مصرف و طرز استعمال: در موارد خفیف: روزی ۲ ـ ۴ قرص . در موارد شدید روزی ۳ بار هربار ۲ قرص .

موارد منع استعمال: خردسالان، مادران شیرده .

عوارض جانبی: گاهی دردهای شکمی، اسهال، بثورات جلدی، تب خفیف .

مصرف در آبستنی: ممنوع است .

بسته بندی: قرص ۱۰۰ میلی‌گرم × ۳۰ .

بها: ۱۹۷ ریال .

REFAGAN
بایر آلمان ـ ایران

ترکیب: سالیسیلامید ۲۰ سانتی‌گرم + فناستین ۲۰ سانتی‌گرم + کافئین ۵ سانتی‌گرم + اینسیدال ۱۵ میلی‌گرم .

R

موارد استعمال: پیش‌گیری و درمان سرماخوردگی، آنفلوانزا و نزله قسمت فوقانی جهاز تنفس.
مقدار مصرف و طرز استعمال: بزرگسالان: روزی ۳ بار، هربار ۲ قرص. خردسالان روزی ۳ بار، هربار ۱ قرص. شیرخواران: روزی ۳ بار، هربار نصف قرص.
بسته بندی: قرص × ۱۰۰.
بها: ۲۳۴ ریال.

REGAFLORINE
پارک ـ ایران

ترکیب: عصاره مایع پاسیفلور + مایع والریان + فنوباربیتال + برمورسدیم.
موارد استعمال: حالات عصبی، نورآستنی، هیستری.
مقدار مصرف و طرز استعمال: روزی ۳ بار، هربار یک قاشق مرباخوری قبل از غذا.
بسته بندی: شربت ۹۰ میلی‌لیتر.
بها: ۶۲ ریال.

REGENON RETARD
تملرورك ـ آلمان

ترکیب: در هر قرص: کلریدرات ۱ ـ فنیل ـ ۲ ـ دی اتیل آمینوپروپان ـ ۱ ـ اون ـ = کلریدرات دی اتیل پروپیون ۷۵ میلی‌گرم.
موارد استعمال: جهت کاهش وزن از راه کنترل اشتها.
مقدار مصرف و طرز استعمال: بالاتر از ۱۲ سال یک قرص دوساعت قبل ناهار. پائین‌تر از ۱۲ سال نصف قرص.
موارد منع استعمال: ناراحتیهای قلبی و بیخوابی.
عوارض جانبی: در اثر مصرف مداوم، عوارض آمفتامینی بدون عوارض قلبی حاصل میشود.
بسته بندی: قرص × ۳۰.
بها: ۳۵۰ ریال.

R

REINOCHOLINE
میسین ـ ایران

ترکیب: در هر ۱۰۰ گرم: پپتون ۵ گرم + سولفات منیزیم ۳۵ گرم + سینارین ۱/۵ گرم + عصاره بولدو ۱/۵ گرم + بوکو ۱ گرم.

موارد استعمال: بیماریهای کبدی و صفراوی، یرقان، سنگ‌صفرا، آماس کیسه صفرا، عوارض آنافیلاکسی، اختلالات گوارشی، یبوست، الیگوری.

مقدار مصرف و طرز استعمال: روزی ۰/۵ ـ ۱ قاشق سوپخوری در یک گیلاس آب نیم گرم حل کرده صبح ناشتا میل شود.

احتیاط: تخم‌مرغ، غذای چرب، سبزیهای تخمیر شدنی و مشروبات الکلی باید از رژیم غذائی حذف شود.

بسته بندی: گرد ۱۰۰ گرم.

بها: ۵۹ ریال.

RENNIE
نیکلاس انگلستان ـ دوپار ایران

ترکیب: کربنات منیزیم ۸۰ میلی‌گرم + کربنات کلسیم ۶۸۰ میلی‌گرم.

موارد استعمال: اختلالات گوارشی، زخم‌معده و اثنی‌عشر، نفخ شکم، سوزش و درد معده، سوءهاضمه.

مقدار مصرف و طرز استعمال: ۲ قرص بدنبال هم مکیده شود.

احتیاط: حداکثر تا ۱۶ قرص در روز.

بسته بندی: قرص × ۲۵.

بها: ۲۵ ریال.

R

REPARIL
مادوس ـ آلمان

ترکیب: اسین (سدیم آسینات)

موارد استعمال: التهابات و ورم‌های موضعی بنا بعلل مختلف، درد ستون فقرات، ورم ناشی از ضربه التهاب تاندونها، سندرم پست ترمبوتیک.

مقدار مصرف و طرز استعمال: قرص: ابتدا روزی ۳ بار هربار ۲ قرص بعداً هربار ۱ قرص. آمپول: روزی ۱ ـ ۲ تزریق وریدی.

موارد منع استعمال: ناسازگاری ارهاش خون.

بسته بندی: قرص ۲۰ میلی‌گرم × ۴۰، آمپول ۵ میلی‌گرم لیوفیلیزه +

حلال ۵ میلی‌لیتر × ۵.
بها: قرص ۲۸۰ ریال، آمپول ۴۴۰ ریال.

RESOCHIN
بایر آلمان ـ ایران

ترکیب: در هر قرص: کلروکین فسفات ۲۵۰ میلی‌گرم معادل ۱۵۰ میلی‌گرم باز.
موارد استعمال: درمان و پیشگیری مالاریا، آمیبیاز خارج روده‌ای، ژیاردیاز، آرتریت روماتوئید و اسپوندیلیت، لوپوس اریتماتو، دیسکوئید مزمن، آکنه روزاسه، آبسه آمیبی کبد، لیکن پلان، تنیانانا.
مقدار مصرف و طرز استعمال: درمان بزرگسالان: روز اول ۲ نوبت ۲ـ۴ قرص، روز دوم و سوم ۲ قرص. خردسالان ۸ـ۱۰ ساله: روز اول ۲ نوبت ۲ + یک و سه‌چهارم قرص. روز دوم و سوم هر روز یک و سه چهارم قرص. خردسالان ۴ـ۵ ساله: روز اول ۲ نوبت ۱ + یک و سه چهارم قرص. روز دوم ۱ قرص. روز سوم سه چهارم قرص.
بسته‌بندی: قرص × ۱۰۰.
بها: ۱۷۶ ریال.

RESTENIL
کابی ـ سویس

ترکیب: مپروبامات.
مکانیسم: مانند سایر مپروباماتها سبب دپرسیون هیپوتالاموس و بصل‌النخاع میشود.
موارد استعمال: بیقراری، ناراحتی عصبی، بیخوابی.
مقدار مصرف و طرز استعمال: روزی ۱ ـ ۴ قرص.
بسته‌بندی: قرص ۰/۴ گرم × ۲۰۰.
بها: ۳۵۱ ریال.

R

RESYL
سیبا ـ سویس

ترکیب: اتر گلیکولیک گایاکول ۲ درصد.
موارد استعمال: سرفه، اختلالات حاد و مزمن مجاری تنفسی مانند لارنژیت، تراکئیت، برونشیت.

مقدار مصرف و طرز استعمال: خردسالان: روزی ۱ ـ ۲ قاشق مرباخوری
بزرگسالان: روزی ۲ ـ ۳ قاشق سوپخوری.
بسته بندی: شربت ۲۰۰ گرم.
بها: ۶۸ ریال.

RETIN - A
سیلاگ شمی ـ سویس

ترکیب: تره‌تینونین ـ ویتامینA اسید.
موارد استعمال: آکنه و لگاریس.
مقدار مصرف و طرز استعمال: شروع درمان: روزی یکبار، ادامه درمان:
۲ ـ ۳ بار در هفته.
احتیاط: بعد از مصرف کرم نباید در برابر نور شدید قرارگرفت. از شستشوی بیش از حد یا استعمال مواد محرک پرهیز شود.
عوارض جانبی: گاهی قرمزی در اوایل هفته اول تا پنجم درمان.
بسته بندی: کرم ۰/۵ درصد ۳۰ گرم.
بها: ۲۸۶ ریال.

REVERIN
هوخست ـ آلمان

ترکیب: پیرولیدینومتیل تتراسیکلین.
موارد استعمال: کلیه عفونتهای حساس به بنی‌سیلین.
مقدار مصرف و طرز استعمال: خردسالان: روزی ۱۰ میلی‌گرم برای هر کیلو وزن بدن. بزرگسالان: روزی ۳۵۰ میلی‌گرم از راه عضلانی یا ۲۷۵ میلی‌گرم وریدی.
موارد منع استعمال: در کودکان کمتر از یکسال آمپول عضلانی نباید بکار برده شود.
احتیاط: در بیمارانیکه با دیژیتال توأم با استروفانتین مداوا میگردند بهتر است مدت تزریق طولانی و از تزریق مشترک دارو خودداری شود.
بسته بندی: آمپول‌های ۳۵۰ و ۱۵۰ میلی‌گرم عضلانی همراه با ۲ میلی‌لیتر آب مقطر. آمپول ۲۷۵ میلی‌گرم وریدی همراه با ۱۰ میلی‌لیتر آب مقطر.
بها: آمپول ۱۵۰ میلی‌گرم ۷۳ ریال، ۳۵۰ میلی ۱۰۰ ریال، ۲۷۵

R

میلی ۱۱۰ ریال.

REVONAL
مرك آلمان ـ ایران

ترکیب: در هر قرص: ۲ ـ متیل ـ ۳ ارتوتولیل ـ ۴ (۳H) کینازولینون ـ متاکوالون ۰/۲ گرم.
موارد استعمال: درمان انواع بیخوابیها.
مقدار مصرف و طرز استعمال: نصف قرص قبل از خواب همراه با کمی آب میل شود. در بیخوابیهای شدید ۱/۵ ـ ۱ قرص.
بسته بندی: قرص × ۱۰۰.
بها: ۲۳۴ ریال.

RHESUMAN Berna
برنا ـ سویس

ترکیب: سروم مصون کننده آنتی D ۲۰۰ میکروگرم.
موارد استعمال: پیش گیری از بیماریهای خونی نوزادان Rh مثبت که از مادران Rh منفی متولد میشوند.
مقدار مصرف و طرز استعمال: ۲ میلی لیتر داخل عضلانی بلافاصله پس از وضع حمل تا ۷۲ ساعت بعد از زایمان.
بسته بندی: ویال ۲ میلی لیتر.
بها: ۲۷۰۰ ریال.

RHINO - FAZ
فاز ـ ایران

ترکیب: در هر ۱۰ میلی لیتر: کلریدرات فنیل افرین ۵۰ میلی گرم + کلروبوتول ۵۰ میلی گرم + کلورسدیم ۹۰ میلی گرم.
مکانیسم: بواسطه خاصیت سمپاتومی متیک سبب انقباض عروق و مجاری بینی میشود.
موارد استعمال: احتقان مجاری بینی، زکام معمولی و آلرژیک، گرفتگی بینی.
مقدار مصرف و طرز استعمال: روزی ۲ ـ ۴ بار، هربار ۲ ـ ۴ قطره در بینی می چکانند.
بسته بندی: قطره بینی ۱۰ میلی لیتر.
بها: ۴۱ ریال.

R

RHINO - GOUTTES
فاریا ـ ایران

ترکیب: فنیل افرین (۵۰ میلی‌گرم) + کلرور سدیم + متابی سولفیت سدیم.
موارد استعمال: گرفتگی بینی، سرماخوردگی، گریپ، رینیت، سینوزیت، التهاب حنجره و حلق، تنگی نفس و سیاه‌سرفه.
مقدار مصرف و طرز استعمال: روزی ۳ بار، هربار ۲ ـ ۳ قطره در هر بینی می‌چکانند.
بسته بندی: قطره بینی ۱۰ میلی‌لیتر.
بها: ۲۹ ریال.

RHINOMARINE
مارین ـ ایران

ترکیب: کلریدرات فنیل افرین + نیترات نافازولین + کلربوتول.
موارد استعمال: برای ضدعفونی بینی و مجاری تنفسی.
مقدار مصرف و طرز استعمال: هر ۶ ساعت ۲ قطره در هر سوراخ بینی می‌چکانند.
بسته بندی: قطره بینی ۱۵ میلی‌لیتر.
بها: ۲۹ ریال.

RHINOPHENE
پارک ـ ایران

ترکیب: کلریدرات فنیل افرین.
موارد استعمال: رفع احتقان بینی.
مقدار مصرف و طرز استعمال: روزی ۳ بار، هربار ۲ قطره در هر بینی می‌چکانند.
بسته بندی: قطره ۱۵ میلی‌لیتر.
بها: ۳۵ ریال.

R

RHONAL
اسپسیا ـ فرانسه

ترکیب: در هر قرص: اسیداستیل سالیسیلیک با پوشش اتیل سلولز.
موارد استعمال: انواع روماتیسم، سیاتیک، آرترالژیها، کمردرد حاد، میگرن، تب، درد ناشی از عادت ماهانه، نورالژی، میالژی، و انواع گریپ.
مقدار مصرف و طرز استعمال: روزی ۲ بار، هربار ۱ ـ ۳ قرص.
بسته بندی: قرص ۰/۵ گرم × ۲۰.

بها: ۵۹ ریال.

RHUMACALMINE
فاریا ـ ایران

ترکیب: نیکوتینات متیل + کامفر + مانتول + اسانس تیم + اسانس اکالیپتوس + اسانس تربانتین.
موارد استعمال: انواع دردها بخصوص دردهای روماتیسمی.
مقدار مصرف و طرز استعمال: مقداری از پماد را روی پنبه مالیده بر روی محل درد میمالند سپس ماساژ می‌دهند.
موارد منع استعمال: از استعمال دارو روی زخمها، جراحات و بریدگیها و مخاط باید خودداری شود.
بسته‌بندی: پماد ۱۵ گرم.
بها: ۳۵ ریال.

RHUMACIDE
مارین ـ ایران

ترکیب: در هر ۱۰۰ گرم سالیسیلات متیل ۴ گرم + اسانس اوکالیپتوس ۳ گرم + کامفر ۲ گرم + مانتول ۱ گرم + تنطور کاپسیکوم ۲ گرم + تربانتین ۵ گرم.
موارد استعمال: دردهای ناشی از سرماخوردگی، ضرب‌دیدگی، روماتیسم.
مقدار مصرف و طرز استعمال: محل درد را باید با پماد مالش داده و با یک پنبه روی آنرا بپوشانند.
بسته‌بندی: پماد ۲۰ گرم.
بها: ۲۹ ریال.

R

RIFADIN
لپتی ایتالیا ـ ایران

ترکیب: ریفامپیسین.
موارد استعمال: سل ریوی و انواع دیگر سل، مننژیت سلی، سوزاک حاد و مزمن، عفونتهای حاد دستگاه تنفسی، عفونت‌های مجاری ادرار.
مقدار مصرف و طرز استعمال: بزرگسالان: سل ریوی و انواع دیگر سل: ۶۰۰ میلی‌گرم در روز در یک دوز واحد. سوزاک حاد: ۹۰۰ ـ ۱۲۰۰ میلی‌گرم دریک‌دوز واحد. در سوزاک مزمن

این مقدار باید ۳ــ۲ روز ادامه یابد. خردسالان: ۲۰ میلی‌گرم در ازاء هر کیلوگرم از وزن بدن در روز در ۱ یا ۲ نوبت. نوزادان: ۱۰ میلی‌گرم در ازاء هر کیلوگرم از وزن بدن در روز در یک دوز واحد.

موارد منع استعمال: سه ماهه اول آبستنی، یرقان.

بسته‌بندی: کپسول: ۱۵۰ و ۳۰۰ میلی‌گرم × ۸. قطره خوراکی اطفال: هر قطره = ۵ میلی‌گرم ریفامپیسین × ۶/۶ میلی‌لیتر.

بها: کپسول ۱۵۰ میلی‌گرم ۳۷۵ ریال ۳۰۰ میلی‌گرم ۶۰۸ ریال قطره ۳۲۰ ریال.

RIFOCIN
لپتی ایتالیا ــ ایران

ترکیب: ریفامایسین SV .

موارد استعمال: عفونت‌های ناشی از میکروارگانیسمهای گرم مثبت، عفونت‌های پوست و نسوج نرم، استئومیلیت ماستیت، عفونت‌ــ های بعد از سقط و زایمان، عفونت‌های برونکوپولمونر، آمپیم، کله‌سیستیت، هپاتوکولانژیت. بیماری‌های چشم: کونژونکتیویت، بلفاریت، داکریوسیستیت، کراتیت، اسکلریت، اپی اسکلریت، ایریدوسیکلیت و سیکلیت، عفونت‌های بعد از ضربه و بعد از اعمال جراحی چشم.

مقدار مصرف و طرز استعمال: تزریق عضلانی: بزرگسالان و خردسالان بیش از ۶ سال و بیش از ۲۵ کیلوگرم: روزی ۲ آمپول ۲۵۰ میلی‌گرم. خردسالان: ۱۰ ـ ۳۰ میلی‌گرم به‌ازاء هر کیلوگرم از وزن بدن در روز. قطره چشمی: ۳ ـ۲ قطره در هرچشم ۴ـ۳ بار در روز.

بسته‌بندی: آمپول ۱۲۵ و ۲۵۰ میلی‌گرم × ۱. قطره چشم ۵ میلی‌لیتر.

بها: آمپول ۱۲۵ میلی ۶۳ ریال، ۲۵۰ میلی ۱۰۰ ریال، قطره ۶۴ ریال.

RIFODERM
لپتی ایتالیا ــ ایران

ترکیب: در هر ۲۰۰ گرم: ریفامایسین SV ۰/۲۵ گرم + استات ــ پردنیزولون ۱ گرم.

موارد استعمال: درماتیت‌ها، عفونت‌های پوستی، اکزما، فولیکولیت، سوختگیها.

مقدار مصرف و طرز استعمال: روزی ۱ ـ ۳ بار بشکل ورقه نازکی بر روی سوضع مالیده شود.

بسته بندی: پماد جلدی ۵ و ۱۰ گرم.

بها: ۵ گرمی ۳۵ ریال، ۱۰ گرمی ۶۵ ریال.

RIMACTANE
سیبا ـ سویس

ترکیب: (متیل ـ ۴ ـ پیپرازینیل ـ ۱ ایمینو متیل) ـ ۳ ریفامیسین SV = ریفامپیسین.

موارد استعمال: کلیه اشکال سل.

مقدار مصرف و طرز استعمال: بزرگسالان: روزی ۴۰۰ ـ ۶۰۰ میلی‌گرم در یک‌مرتبه. خردسالان: ۱۰ ـ ۱۵ میلی‌گرم برای هر کیلو وزن بدن.

موارد منع استعمال: یرقان، سه ماهه اول آبستنی.

عوارض جانبی: گاهی اسهال، بی‌اشتهائی، حساسیت.

بسته بندی: کپسول ۱۵۰ میلی‌گرم × ۱۶، ۳۰۰ میلی‌گرم × ۸

بها: کپسول ۱۵۰ میلی ۶۴۰ ریال، ۳۰۰ میلی ۵۶۰ ریال.

RINGER'S SOLUTION
باکستر ـ ایران

ترکیب: کلرور سدیم ۰/۰۸۶ گرم + کلرور پتاسیم ۰/۰۳۰ گرم + کلرور کلسیم ۰/۰۳۳ گرم + آب مقطر مقدار کافی تا ۱۰۰ میلی‌لیتر (غلظت سدیم ۱۴۷، پتاسیم ۴، کلسیم ۴، کلرور ۱۵۵ میلی اکی والان).

موارد استعمال: اسهال، استفراغ، زهکشی فیستولها.

مقدار مصرف و طرز استعمال: برحسب نوع مصرف متفاوت است.

بسته بندی: محلول ۵۰۰ و ۱۰۰۰ میلی‌لیتر.

بها: ۵۰۰ میلی ۹۲ ریال، یک لیتری ۱۰۰ ریال.

RIOPAN
آلن هانبوریز
انگلستان ـ
داروپخش ایران

ترکیب: در هر قرص: مانولیوم هیدرات (آلومینات هیدراته منیزیوم) ۴۰۰ میلی‌گرم.
موارد استعمال: زخم‌معده و اثنی‌عشر، انواع هیپرسکرسیون و هیپرکلریدری معده.
مقدار مصرف و طرز استعمال: ۱ـ۲ قرص کامل با اندکی آب بلعیده می‌شود.
بسته بندی: قرص × ۲۰.
بها: ۴۱ ریال.

RITALIN
سیبا ـ سویس

ترکیب: در هر قرص: کلریدرات استرمتیلیک اسید آلفا فنیل ـ آلفا ـ پی‌پریدیل ـ ۲ـ استیک ۱۰ میلی‌گرم = کلریدرات متیل فنیدات.
موارد استعمال: خستگی شدید و غیرعادی، کمی حافظه، حالات دپرسیون، مسمومیت با داروهای خواب‌آور.
مقدار مصرف و طرز استعمال: روزی ۲ بار، هربار ۱ ـ ۲ قرص.
احتیاط: برای پیشگیری از بیخوابی نباید دارو عصر یا شب خورده شود.
عوارض جانبی: سردرد، بیخوابی، خشکی دهان، تهوع.
بسته بندی: قرص × ۳۰.
بها: ۵۰ ریال.

R-M
سینا ـ ایران

ترکیب: روغن رزماری + روغن تیم‌آنول + عصاره خردل + استربنزوئیک + اسید نیکوتینیک + کامفر + استربوروگلیسریک + اسید سالیسیلیک.
موارد استعمال: کوفتگی عضلات، دردهای مفاصل، رماتیسم، سیاتیک
مقدار مصرف و طرز استعمال: روزی ۳ ـ ۴ بار مقدارکمی از امولسیون را روی پوست گذاشته ماساژ میدهند.
موارد منع استعمال: زخمهای باز.
بسته بندی: محلول برای استعمال خارجی ۳۰ میلی‌لیتر.
بها: ۴۱ ریال.

ROBAXIN
روبنس ـ آمریکا

ترکیب: متوکاربامول.
موارد استعمال: کشیدگی عضلانی، تورتیکولی، شکستگی استخوان، دررفتگی مفاصل، ضایعات ضربه‌ای نخاع شوکی، آرتریت، میوزیت، فیبروزیت، بورسیت، سینوویت، سیاتیک، لمباگو، کرامپ عضلانی پارکینسونیسم، کزاز.
مقدار مصرف و طرز استعمال: روزی ۳ ـ ۴ بار، هربار ۲ ـ ۴ قرص.
عوارض جانبی: سرگیجه، خواب‌آلودگی، دل بهم‌خوردگی.
بسته بندی: قرص ۵۰۰ میلی‌گرم × ۲۵. آمپول ۱۰ گرم = ۱۰ میلی‌لیتر × ۱.
بها: قرص ۲۰۰ ریال. آمپول ۱۰۰ ریال.

ROBAXISAL
روبنس ـ آمریکا

ترکیب: روباکسین ۴۰۰ میلی‌گرم + آسپیرین ۳۲۵ میلی‌گرم.
موارد استعمال: رگ‌برگ شدن عضلات کمر و پشت، ضایعات ضربه‌ای، میوزیت، ضربه‌های مفصلی، سردردهای عصبی.
مقدار مصرف و طرز استعمال: خردسالان: روزی ۶۰ـ۷۴ میلی‌گرم
بزرگسالان: روزی ۴ بار، هربار ۲ قرص.
عوارض جانبی: تهوع، سرگیجه.
بسته بندی: قرص × ۳۰.
بها: ۱۷۵ ریال.

R

ROBINUL
ROBINUL PH
روبنس ـ آمریکا

ترکیب: در هر قرص: گلیکوپیرولات ۱ میلی‌گرم هر قرص PH: گلیکوپیرولات ۱ میلی‌گرم + فنوباربیتال ۱۶/۲ میلی‌گرم.
موارد استعمال: زخم و اسپاسم پیلور و دوازدهه، زخم معده، گاستریت، هیپوکلریدری، ترش کردن، آئروفاژی سوء هضم، گاستروآنتریت، پانکراتیت، کولون اسپاستیک و تحریک‌پذیر، آنتریت حاد.
مقدار مصرف و طرز استعمال: روزی ۳ بار، هربار ۱ قرص.
موارد منع استعمال: گلوکوم حاد، تنگی مثانه و دوازدهه، اسپاسم‌ـ کاردیا.
عوارض جانبی: خشکی دهان، تاری چشم، اختلالات ادراری، یبوست.

بسته بندی: قرص × ۳۰.

بها: قرص ساده ۱۴۰ ریال. قرص PH ۱۶۰ ریال.

RODANEX
برنا ـ سویس

ترکیب: در هرشیاف. اسید سالیسیلیک ۰/۰۲ گرم + عصاره ریوند ۰/۱۴ گرم + عصاره تیول ۰/۰۲ گرم + عصاره کاموميل ۰/۰۲ گرم + عصاره پنیرک ۰/۰۲ گرم.

موارد استعمال: بواسیر، شقاق مقعد و پروکتیت ها.

مقدار مصرف و طرز استعمال: روزی ۲ بار، هربار یک شیاف استعمال میشود.

بسته بندی: شیاف × ۵.

بها: ۵۰ ریال.

ROERIBEG
فایزر آمریکا ـ ایران

ترکیب: در هر قرص: ویتامین C ۵۰۰ میلی گرم + ویتامین B_1 ۱۰ میلی گرم + ویتامین B_2 ۱۰ میلی گرم + ویتامین B_6 ۱۰ میلی گرم + نیاسینامید ۱۰۰ میلی گرم + کلسیم پانتوتنات ۲۰ میلی گرم + ویتامین B_{12} ۴ میکرو گرم.

موارد استعمال: دوره نقاهت، شیردهی، آبستنی، عوارض ناشی از کمبود ویتامینهای فوق.

مقدار مصرف و طرز استعمال: روزی یک عدد میل شود.

بسته بندی: قرص × ۳۰.

بها: ۱۵۸ ریال.

R

RONICOL
RONICOL Retard
روش ـ سویس

ترکیب: بتاپیریدیل کاربینول = الکل اسید نیکوتینیک.

موارد استعمال: تأمین و پایداری انبساط رگها، پائین آوردن کلسترول خون، بهبود اعمال مغز، سرما زدگی، آرتریواسکلروز.

مقدار مصرف و طرز استعمال: قرص ساده: روزی چند بار، هربار ۰/۵ ـ ۲ قرص، روتارد: روزی ۲ بار، هربار ۱ ـ ۲ قرص. آمپول: روزی ۱ ـ ۲ تزریق عضلانی، وریدی یا شریانی.

بسته بندی: قرص ساده ۲۵ میلی گرم × ۵۰. قرص روتارد ۱۵۰ میلی گرم × ۲۰. آمپول ۱۰۰ میلی گرم = ۲ میلی لیتر × ۶.

بها: قرص ساده ۱۰۰ ریال، رونارد ۲۰۰ ریال. آمپول ۱۲۰ ریال

ROTER
روتر ـ هلند

ترکیب: سونیترات بیسموت ۳۰۰ میلی‌گرم + سوکربنات منیزیم ۴۰۰ میلی‌گرم + بیکربنات سدیم ۲۰۰ میلی‌گرم + کورتکس ۳۵ میلی‌گرم + ریزوم کالامی ۲۵ میلی‌گرم.

موارد استعمال: ناراحتی معده و اثنی‌عشر، ازدیاد اسیدیته، سوء هاضمه عصبی، گاستریت، اسپاسم و سوزش معده.

مقدار مصرف و طرز استعمال: روزی ۳ بار، هربار ۲ قرص بعد از غذا بمدت ۲ ـ ۳ ماه.

احتیاط: در ابتدای درمان از خوردن مشروبات الکلی، غذاهای سرخ کرده و چرب و حاوی کلم، قهوه و دخانیات پرهیز شود.

بسته‌بندی: قرص × ۴۰ و ۱۰۰۰.

بها: ۴۰ عددی ۱۴۰ ریال، ۱۰۰۰ عددی ۲۸۹۹ ریال.

ROVAMYCINE
اسپسیا ـ فرانسه

ترکیب: اسپیرامایسین.

موارد استعمال: عفونتهای حلقی ـ دهانی و تنفسی، سوزاک، توکسوپلاسموز، تب، سرخجه، پیشگیری آنفلوآنزا و سرخک، پولیومیلیت، ماستیت، لنفانژیت، گالاکتوفوریت، آنتروکولیت، عفونتهای مجاری صفراوی، آمیبیاز، پیودرماتوز، فولیکولیت غیرگونوکوکسی، آندوکاردیت باکتریال، عفونتهای روماتیسمی و رینوفارنژیت.

مقدار مصرف و طرز استعمال: هر ۳ ساعت ۱ قرص.

بسته‌بندی: قرص ۲۵۰ میلی‌گرم × ۲۰، قرص ۵۰۰ میلی‌گرم × ۱۶.

بها: ۲۵۰ میلی ۲۵۰ ریال، قرص ۵۰۰ میلی ۴۰۹ ریال.

ROVAMYCINE Pommade
اسپسیا ـ فرانسه

ترکیب: اسپیرامایسین.

موارد استعمال: اکتیما، سیکوزیس، فولیکولیت، پیودرماتوز، زخمهای عفونی مختلف، اسکار، بلفاریت، آبسه، کراتیت عفونی.

مقدار مصرف و طرز استعمال: جلدی: بعد از تمیز کردن موضع مقدار

R

کمی پماد را روی گاز گذاشته در محل قرار می‌دهند. چشمی: روزی ۱ـ۲ بار، هربار مقدار کمی از پماد در چشم استعمال می‌شود.

بسته‌بندی: پماد جلدی ۱ درصد ۱۵ گرم، پماد چشمی ۱ درصد ۵ گرم.

بها: جلدی ۲۹ ریال. چشمی ۱۶ ریال.

ROVIGON
روش ـ سویس

ترکیب: در هر دراژه: ویتامین A ۳۰ هزار واحد + ویتامین E ۷۰ میلی‌گرم.

موارد استعمال: اختلالات فونکسیونل نزد پیران، ضایعات عروقی پوست، مخاط، گوش میانی و چشم، آتروماتوز، تصلب شرائین، ضعف، پیری، اختلالات بعد از یائسگی.

مقدار مصرف و طرز استعمال: روزی ۳ـ۴ بار، هربار ۱ دراژه جویده شود.

بسته‌بندی: دراژه جویدنی × ۳۰.

بها: ۱۵۵ ریال.

RUBRATON - B
اسکوئیب آمریکا ـ ایران

ترکیب: در هر ۵ میلی‌لیتر: آهن ۳۸ میلی‌گرم + ویتامین B_{12} ۴ میکروگرم + ویتامین B_1 ۱ میلی‌گرم + ویتامین B_2 ۱ میلی‌گرم + نیاسینامید ۵ میلی‌گرم + پانتنول ۱/۵ میلی‌گرم + ویتامین B_6 ۰/۵ میلی‌گرم + الکل ۱۲ درصد.

موارد استعمال: کم‌خونی بعلت فقر آهن، کم‌خونی هیپوکروم تغذیه‌ای مزمن، کم‌خونی ناشی از کم‌غذائی و بی‌غذائی، کم‌خونی مگالو بلاستیک تغذیه‌ای، زنان باردار، اطفال در حال رشد، پس از گاسترکتومی.

مقدار مصرف و طرز استعمال: روزی ۳ قاشق مرباخوری بعد از هر غذا.

موارد منع استعمال: یبوست‌های شدید.

عوارض جانبی: مصرف بیش از حد آن ممکن است سبب اختلالات هاضمه و سفتی لثه‌ها و سیاه شدن دندانها گردد.

بسته‌بندی: الگزیر ۱۲۰ میلی‌لیتر.

بها: ۸۲ ریال.

RUBROHEPAR B Complex Fort
ریختر ـ ایتالیا

ترکیب: ویتامین B_1 ۲۰ میلی‌گرم + ویتامین B_2 ۲ میلی‌گرم + ویتامین B_6 ۶ میلی‌گرم + ویتامین PP ۶۰ میلی‌گرم + ویتامین B_{12} ۵۰ میکروگرم + پانتوتنات کلسیم ۱۵ میلی‌گرم + اسید پارا آمینو بنزوئیک ۱۵ میلی‌گرم.

موارد استعمال: کم‌خونی، ضعف و بیحالی، ناراحتیهای کبدی، نقاهت بعد از بیماری‌های عفونی، دوران شیردهی و بارداری.

مقدار مصرف و طرز استعمال: هر روز یا ۱ روز در میان ۱ آمپول داخل عضلانی.

بسته‌بندی: آمپول لیوفیلیزه ۲ میلی‌لیتر × ۵.

بها: ۱۲۰ ریال.

RUTASCOL
تراپلیکس ـ فرانسه

ترکیب: روتین ۰/۰۲ گرم + اسید آسکوربیک ۰/۲ گرم.

موارد استعمال: شکنندگی مویرگها، درمان خونریزیهای ناشی از فشارخون شریانی، اترواسکلروز.

مقدار مصرف و طرز استعمال: روزی ۳ ــ ۵ قرص برای مدت ۲۰ روز در ماه (مدت درمان چند ماه است).

بسته‌بندی: قرص × ۳۰.

بها: ۴۰ ریال.

RUTINOL
ویرا ـ ایران

ترکیب: روتین ۲۰ میلی‌گرم + کلریدرات پروکائین ۱۰ میلی‌گرم + بوتوفرم ۵۰ میلی‌گرم + عصاره مارون‌دند ۲۰ میلی‌گرم + عصاره هاماملیس ۲۰ میلی‌گرم.

موارد استعمال: درمان بواسیر.

مقدار مصرف و طرز استعمال: روزی ۱ ــ ۳ شیاف.

بسته‌بندی: شیاف × ۵.

بها: ۳۷ ریال.

SALAZOPYRIN - سالازوپیرین
فارماسیا ـ سوئد

ترکیب: در هر قرص: سالیسیل آزاسولفا پیریدین ۰/۵ گرم.
موارد استعمال: کولیت اولسروز.
مقدار مصرف و طرز استعمال: بزرگسالان: روزی ۴ بار هربار ۲ تا ۴ قرص. خردسالان: روزی ۴۰ تا ۶۰ میلی‌گرم بازاء هر کیلو وزن در ۳ـ۶ بار.
موارد منع استعمال: حساسیت به‌سولفونامیدها یا سالیسیلات‌ها. کودکان کوچکتر از ۲ سال، افراد مبتلا به‌پورفیری.
بسته بندی: قرص × ۵۰۰.
بها: ۲۰۰۳ ریال.

SALICO
عبیدی ـ ایران

ترکیب: در هر دراژه: سالیسیلات سدیم ۵۰۰ میلی‌گرم + ویتامین B_1 ۵ میلی‌گرم + ویتامین K ۰/۵ میلی‌گرم.
موارد استعمال: رماتیسم حاد، آرتریتهای روماتیسمی و عضلانی، درد اعصاب، دردهای شدید عضلات.
مقدار مصرف و طرز استعمال: بزرگسالان: روزی ۴ بار، هربار ۲ـ۳ دراژه. دوران معالجه را باید تا ۱۵ روز ادامه داد.
بسته بندی: دراژه × ۴۰.
بها: ۷۰ ریال.

SALIMARINE
مارین ـ ایران

ترکیب: سالیسیلات سدیم + ویتامین B_1 + ویتامین K .
موارد استعمال: انواع روماتیسم‌های حاد و مزمن.
مقدار مصرف و طرز استعمال: روزی ۲ بار، هربار ۱ قرص.

S

بسته بندی: قرص × ۱۰۰۰.
بها: ۲۹۰ ریال.

SALIRAMIN
رامین ـ ایران

ترکیب: در هر ۱۰۰ گرم: بیکربنات سدیم ۳۷/۵ گرم + سولفات منیزیم ۳۵/۵ گرم + اسید سیتریک ۲۵ گرم.
موارد استعمال: دفع اوره، انواع یبوستها، ناتوانی کبد، ترشی معده.
مقدار مصرف و طرز استعمال: روزی یک قاشق غذاخوری.
بسته بندی: بسته ۱۰۰ گرم.
بها: ۴۷ ریال.

SALMINSULINE NPH BERNA
برنا ـ سویس

ترکیب: یک واحد انسولین + ۵ گاما پروتئین + ۰/۴ گاما زنک.
مکانیسم: موجب عبور گلوکز از دیواره سلولها، مهار لیپاز و در نتیجه کاهش اسید چرب آزاد و بالا رفتن سنتز پروتئین میگردد.
موارد استعمال: درمان طولانی دیابت ملیتوس.
مقدار مصرف و طرز استعمال: بستگی بشدت و درجه بیماری دارد.
احتیاط: مصرف زیاد دارو سبب شوک هیپوگلیسمی میشود، قبل از مصرف دارو شیشه را باید بخوبی تکان داد.
بسته بندی: ویال ۱۰ میلی لیتر.
بها: ۱۸۵ ریال.

SALPIX
ارتو ـ انگلستان

ترکیب: پلی وینیل پیرولیدون ۲۳ درصد + سدیم استریزوات ۵۳ درصد که دارای ۶۵/۸ درصد ید در ملکول است.
موارد استعمال: هیستروسالپنکوگرافی بدون درد، درمان مکانیکی تنگیهای لوله رحم، تشخیص بدشکلی های رحم و لوله های آن.
مقدار مصرف و طرز استعمال: برخلاف ترکیبات روغنی یده که مستلزم ۲۴ ساعت فاصله بین تزریق دارو در رادیوگرافی میباشد میتوان رادیوگرافی را بلافاصله ۳ دقیقه پس از تزریق و عکس کنترل را ۲۰ دقیقه بعد برداشت.

موارد منع استعمال: عفونت‌های شدید عمومی و عفونت‌های واژن، عفونت‌های جدید و یا قدیمی لگن، آبستنی.
بسته بندی: ویال ۱۰ میلی‌لیتر× ۱۰.
بها: ۱۴۰ ریال.

SALVEATA
آپوتکاری ـ آمریکا

ترکیب: در هر ۱۰۰ گرم: کربنات لیتیم ۰/۱۵ گرم + سیترات کافئین ۰/۸ گرم + بنزوات سدیم ۱/۶ گرم + لاکتوفسفات ـ کلسیم ۰/۱۵ گرم + سیتروتارترات پتاسیم و سدیم ۵۹/۳ گرم + سولفات منیزیم ۸ گرم + سولفات سدیم ۳۰ گرم.
موارد استعمال: نارسائی کبد، یرقان، یبوست، نقرس، روماتیسم، سوء هاضمه و تحریکات معدی، ورم کلیه و مثانه، اکزما.
مقدار مصرف و طرز استعمال: روزی ۳ ـ ۴ بار، هربار ۱ ـ ۴ قاشق مرباخوری.
بسته بندی: گرانول ۱۰۰ گرم.
بها: ۳۶ ریال.

SALYROSINE
دوپار ـ ایران

ترکیب: در هر ۱۰۰ میلی‌لیتر: اسید سالیسیلیک ۰/۱ گرم + کلرورسدیم ۰/۲۵ گرم + فسفات دی سدیک ۰/۹ گرم + فسفات منوسدیک ۰/۱ گرم + نیترات فنیل مرکوریک ۰/۰۰۲ گرم + آب مقطر روزه ۱۰ میلی‌لیتر.
موارد استعمال: ضد عفونی کننده چشم.
مقدار مصرف و طرز استعمال: روزی ۳ قطره در هر چشم می‌چکانند.
بسته بندی: قطره ۵ میلی‌لیتر.
بها: ۵۳ ریال.

S

SANDOVENE - F
ساندوز ـ سویس

ترکیب: در هر قرص: دی هیدروارگو کریستین ۱ میلی‌گرم + روتین ۶۰ میلی‌گرم + اسکولین ۳ میلی‌گرم.
موارد استعمال: سندرمهای واریس و واریسهای اساسی (سنگینی و درد در ساق پاها ـ اسپاسمهای شبانه و خیز). نارسائی مزمن

سیاهرگی، سندرم بعد از ورم ورید (فلبیت) درمان تکمیلی قرحه، اولسرزانو، ترمبوفلبیت و اختلالات گردش خونی که بعد از ضربه و بی‌حرکتی بعلت گچ گرفتن اندام خلفی بوجود میآید.

مقدار مصرف و طرز استعمال: شروع درمان: روزی ۳ قرص بمدت یک هفته. ادامهٔ درمان: روزی ۱ تا ۲ قرص بمدت چندین هفته.

بسته بندی: قرص × ۳۰.

بها: ۲۴۰ ریال.

SARGENOR
سارژه ـ فرانسه

ترکیب: در هر ۱۰۰ میلی‌لیتر: آسپارات آرژی‌نین ۱۰ گرم + پاراهیدروکسی بنزوات متیل ۰/۰۸ گرم + پاراهیدروکسی بنزوات پروپیل ۰/۰۲ گرم.

موارد استعمال: ضدسم، انرژی‌زا، کم‌خوابی و کمی‌حافظه، خستگی بزرگسالان و خردسالان.

مقدار مصرف و طرز استعمال: بزرگسالان: روزی یک آمپول خوراکی، خردسالان: روزی نصف آمپول.

بسته بندی: آمپول خوراکی ۱۰ میلی‌لیتر × ۲۰.

بها: ۳۱۸ ریال.

SAROTEN
SAROTEN RETARD
لوندبک ـ دانمارک

ترکیب: کلریدرات آمی‌تری‌پتی‌لین.

اثر متقابل: خطر مصرف توأم آمی‌تری‌پتی‌لین و الکل باید به‌بیماران تذکر داده شود.

موارد استعمال: افسردگی‌های زمان پیری و یائسگی، درمان بیماری اسکیزوفرنی، افسردگی‌های ناشی از حوادث، افسردگی‌های روانی.

مقدار مصرف و طرز استعمال: شروع درمان: روزی ۳ بار، هربار ۲۵ میلی‌گرم و سپس تا حداکثر ۱۵۰ الی ۲۲۵ میلی‌گرم در روز افزایش میابد. روتارد: بدفعات کمتری در روز مصرف میشود.

موارد منع استعمال: بعلت خاصیت آنتی کولینرژیک در بیماریهای گلوکوم، هیپرتروفی پروستات و بیماران قلبی.

عوارض جانبی: ممکن است هنگام استفاده از آمپول یا مقادیر زیاد دارو خشکی دهان، سرگیجه، یبوست، خواب‌آلودگی در بعضی از بیماران مشاهده شود.
بسته بندی: قرص ۱۰ و ۲۵ میلی‌گرم × ۱۰۰، قرص روتارد ۲۵ و ۵۰ میلی‌گرم × ۳۰، آمپول ۱ درصد ۱۰ میلی‌لیتر × ۱۰.
بها: قرص ۱۰ میلی ۱۳۰ ریال، ۲۵ میلی ۲۱۰ ریال. آمپول ۸۰ ریال. قرص روتارد ۲۵ میلی ۱۹۲ ریال، ۵۰ میلی ۳۹۰ ریال.

SAVLON
آی‌سی‌آی انگلستان
ـ داروپخش ایران

ترکیب: مخلوط گلوکونات کلروهگزیدین ۱/۵ درصد وزن به‌حجم + ستریمید ۱۵ درصد وزن به‌حجم.
موارد استعمال: آنتی‌سپتیک عمومی.
مقدار مصرف و طرز استعمال: مصارف عمومی: محلول ۱ در ۲۰۰ قسمت آب برای ضدعفونی کردن بخشها و شیرخوارگاه‌ها شستشوی زخمها و کارهای مامائی: یک در ۱۰۰ قسمت آب. برای ضدعفونی کردن پوست قبل از عمل جراحی: محلول یک در ۳۰ قسمت الکل ۷۰ درجه. ضدعفونی ابزار و وسائل جراحی: محلول یک در ۲۰۰ که وسائل جراحی باید مدت ۳۰ دقیقه در مجاورت آن قرار بگیرند. ضدعفونی کردن ابزار جراحی: در عرض ۱ــ۲ دقیقه محلول یک در ۳۰ قسمت الکل ۷۰ درجه.
بسته بندی: گالنهای مخصوص بیمارستان و شیشه‌های ۴، ۶، ۸ اونسی رقیق شده.
بها: هر گالن ۱۸۵۰ ریال، ۴ اونسی ۵۵ ریال، ۶ اونسی ۸۰ ریال، ۸ اونسی ۹۵ ریال.

SCHERICUR
شرینگ آلمان ـ ایران

ترکیب: هیدروکورتیزون ۰/۲۵ درصد + کلمیزول ۲/۵ درصد + هگزاکلروفن.
موارد استعمال: اکزمای معمولی و شغلی، اکزمای مزمن مقعد، اکزمای آندروژن (نورودرماتیت)، اکزمای اطفال. درماتیت (سوختگی با آفتاب و سوختگی درجه یک).

مقدار مصرف و طرز استعمال: مقدار کمی از پماد را روزی ۲ ـ ۳ مرتبه در محل عارضه گذاشته باهستگی مالش می‌دهند پس از تخفیف علائم شدت بیماری، روزانه یک‌مرتبه و یا هر ۲ ـ ۳ روز یکبار دارو را استعمال می‌کنند.

بسته بندی: پماد ۲۰ گرم.

بها: ۵۹ ریال.

SCHERIPROCT
شرینگ آلمان ـ ایران

ترکیب: پماد: پردنیزولون کاپروآت ۰/۱۹ درصد (معادل ۰/۵ درصد پردنیزولون) + کلرور سینکو کائینیوم ۰/۵ درصد + هگزا کلروفن ۰/۵ درصد + کلمیزول اندوسیلات ۱ درصد. شیاف: پردنیزولون کاپروات ۱/۳ میلی‌گرم + کلرورسینکو کائینیوم ۱ میلی‌گرم + هگزا کلروفن ۲/۵ میلی‌گرم + کلمیزول اندسیلات ۵ میلی‌گرم.

موارد استعمال: پماد: بواسیر داخلی و خارجی، شقاق مقعد، پروکتیت، خارش مقعد. شیاف: بواسیر داخلی، شقاق مقعد، ورم مقعد.

مقدار مصرف و طرز استعمال: پماد: در بیشتر موارد عموماً روزی دوبار لایه نازکی از پماد را روی موضع می‌مالند. شیاف: روزی یک شیاف ولی درموارد شدید روز اول ۲ ـ ۳ شیاف استعمال می‌شود.

موارد منع استعمال: سل و سیفلیس موضعی.

بسته بندی: پماد ۱۰ گرم. شیاف × ۱۰.

بها: پماد ۴۷ ریال. شیاف ۵۹ ریال.

S

SCHERISOLON
شرینگ ـ آلمان

ترکیب: در هر آمپول: ۱ ـ دهیدرو ـ ۱۷ ـ هیدروکسی - کورتیکوسترون استات ۱۰ میلی‌گرم.

موارد استعمال: اپی کوندیلیت، استیلوئیدیت، بورسیت، پری‌ارتریت مفصل شانه، کیستهای تاندون، کوکسی دینی، درد بازو، سیاتیک، لمباگو، انقباض دوپوئیترن، دردهای عصبی در مورد قطع عضو. تزریق داخل مفصلی: آرتریت روماتیسمی، اوستئو- آرتریت مفاصل بزرگ، آرتروزها، آرتریت روماتوئید.

مقدار مصرف و طرز استعمال: مقدار استعمال داخلی مفصلی بطور متوسط ۱۰ میلی‌گرم در یکدفعه میباشد. در مفصل ران باید تا مقدار ۲۰ میلی‌گرم تزریق شود. در مفاصل کوچک ۵ میلی‌گرم در هر دفعه کافی است. تزریق دومی فقط در موقعی انجام میگیرد که اثر تزریق قبلی شروع به‌برطرف شدن نماید، تزریق باید تحت شرایط گندزدائی انجام پذیرد.

موارد منع استعمال: هیچگونه داروی تنگ‌کننده عروق نباید به محلولی که برای بیحسی موضعی بکار میرود اضافه شود. تزریق داخل مفصلی نباید در مورد آرتریت سیفلیسی و یا داخل دیسکهای مهره انجام شود.

بسته بندی: آمپول ۱ میلی‌لیتر × ۱.

بها: ۵۶ ریال.

SCHEROSON Eear Drop

شرینگ آلمان- ایران

ترکیب: هیدروکورتیزون + کلرامفنیکل.

موارد استعمال: اوتیت خارجی، اوتیت مزمن گوش، پولیپ گوش وسطی (جلوگیری از عود پس از برداشتن آن) جلوگیری از نمونسج در مواردیکه اعمال جراحی رادیکال انجام گرفته است.

مقدار مصرف و طرز استعمال: ابتدا هر نیم‌ساعت ۱ـ۴ قطره دارو را مستقیماً درگوش بریزند و بعداً این عمل را هر ۱ـ۴ ساعت تکرار کنند.

موارد منع استعمال: سل و سیفلیس موضعی.

بسته بندی: قطره گوشی ۸ میلی‌لیتر.

بها: ۴۷ ریال.

SCHEROSON F Oph.

شرینگ آلمان- ایران

ترکیب: در هرگرم: هیدروکورتیزون کاپروآت ۰/۵ درصد + کلرامفنیکل کاپروآت ۲ میلی‌گرم.

موارد استعمال: درماتیت پلک‌ها، پمفیگوس ملتحمه، کراتوکونژونکتیویت تاولی، کراتیت انترستی سیل و کراتیت پارانشیماتوز عمقی، کراتیت روزاسه، کراتیت سطحی، کراتیت

S

نقطه‌ای، کراتـو کـونژونکتیویت خشک، کـراتیت اسکلروزان اسکلرو کـراتیت، اسکلریت، اپـی اسکلریت، ایـریتیـس، ایریدوسیکلیت، ایـریتیس گلوکوماتو، اووئیت، اووئیت قدامی، اووئیت با گلوکوم ثانوی، اووئیت پس از عمل جراحی، گلوکوم (جهت درمان بعد از عمل جراحی)، برای جلوگیری از چسبندگی‌ها در قسمت قدامی چشم پس از ضربه، پیش‌گیری و درمان کدورت قرنیه بعد از عمل پیوند قرنیه.

مقدار مصرف و طرز استعمال: در بیماریهای حاد: مدت ۱ـ۲ روز هر ساعت یک‌قطره روزهای بعد فاصله چکانیدن قطره را زیاد میکنند. در بیماریهای تحت حاد: هر ۲ـ۶ ساعت یکقطره مدت درمان بسته بوضعیت بیماری است.

موارد منع استعمال: صدمه‌های تازه چشم، سوختگی‌ها، کراتـو-کونژونکتیویت چرکی، آبسه قرنیه، تبخالهای تازه، عفونتهای ویروسی، کراتیت توأم با آزارهای اپی‌تلیال، زخمهای اپی‌تلیالیزه نشده، عفونتهای قارچی، عفونتهای داخل چشمی پس از پارگی و گسترش خونریزی، توبرکولز چشمی حاد.

بسته‌بندی: پماد چشمی ۲ گرم.

بها: ۴۷ ریال.

SCLEROBION
مرك آلمان ـ ایران

ترکیب: در هر دراژه: ویتامین A ۳۰ هزار واحد + ویتامین B_6 ۴۰ میلی‌گرم + ویتامین E ۷۰ میلی‌گرم.

موارد استعمال: تصلب شرائین، اختلالات عروق سطحی، بیماریهای عصبی، ناراحتی‌های پوستی، اختلالات دوران یائسگی، خارش، کوریورتینوپاتی، شب کوری، اتواسکلروز، رینیت آتروفیک.

مقدار مصرف و طرز استعمال: پیشگیری: روزی ۱ دراژه. درمان: روزی ۲ـ۳ دراژه هنگام غذا یا پس از آن.

بسته‌بندی: دراژه × ۱۰۰.

بها: ۴۴۵ ریال.

S

SCOLINE
آلن هانبوریز
انگلستان ـ
داروپخش ایران

ترکیب: در هر میلی‌لیتر: کلریدرات سوکسینیل کولین معادل ۳۶/۵ میلی‌گرم کاتیون فعال.
موارد استعمال: برای شل کردن عضلات بطور عمیق ولی برای مدتی کوتاه.
مقدار مصرف و طرز استعمال: داخل وریدی با دوز واحد از ۰/۴ تا ۲ میلی‌لیتر برحسب مدت و میزان شلی مورد نیاز عضلات است.
بسته بندی: آمپول ۲ میلی‌لیتر × ۵.
بها: ۵۹ ریال.

SECERGAN
آسترا ـ سوئد

ترکیب: در هر قرص: الفا ـ الفادی متیل آمینو پروپیونیل فنوتیازین متوبرماید ۱۵۰ میلی‌گرم.
موارد استعمال: اولسر پپتیک، گاستریت، ازدیاد ترشح معدی، سندروم ـ دمپینگ، کلیت اسپاستیک.
مقدار مصرف و طرز استعمال: روزی ۳ ـ ۴ بار، هربار ۱ ـ ۲ قرص در بین غذا.
بسته بندی: قرص × ۵۰.
بها: ۱۲۰ ریال.

SECLOPEN
کلاگسو انگلستان
ـ داروپخش ایران

ترکیب: در هر ویال: پروکائین پنی‌سیلین G ۳۰۰ هزار واحد + سدیم پنی‌سیلین G ۱۰۰ هزار واحد.
موارد استعمال: تمام موارد پنی‌سیلین درمانی.
مقدار مصرف و طرز استعمال: روزی ۱ تزریق داخل عضلانی.
موارد منع استعمال: در افراد حساس به‌پنی‌سیلین یا پروکائین.
بسته بندی: ویال × ۵۰.
بها: هر عدد ۵ ریال.

SECRODYL
بی دی اچ انگلستان
ـ داروپخش ایران

ترکیب: در هر قرص: دی‌متی‌سترون ۱۰ میلی‌گرم + اتی‌نیل ـ استرادیول ۰/۰۵ میلی‌گرم.
موارد استعمال: تشخیص زودرس آبستنی، درمان آمنوره ثانوی کوتاه

مدت، آندومتریوز.

مقدار مصرف و طرز استعمال: تشخیص آبستنی: ۱ قرص شب، ۱ قرص صبح به‌مدت ۲ روز. اگر در عرض ۲ ـ ۶ روز خونریزی مشاهده نشد میتوان فرض کرد که فرد آبستن است. بروز خونریزی نشان میدهد که آمنوره ثانوی وجود داشته است. آمنوره ثانوی و آندومتریوز: ۱ قرص صبح ۱ قرص شب به‌مدت ۲ روز.

بسته‌بندی: قرص × ۴.

بها: ۶۵ ریال.

SECROSTERON
بی‌دی‌اچ انگلستان
ـ داروپخش ایران

ترکیب: دی متیسترون ۵ میلی‌گرم.

موارد استعمال: سقط‌های عادتی و اتفاقی.

مقدار مصرف و طرز استعمال: سقط عادتی: از زمان آبستنی تا هفته ۳۲ روزانه یک تا ۲ قرص. سقط اتفاقی: روزانه ۳ قرص تا ۲ روز بعد از رفع درد و خونریزی.

موارد منع استعمال: زنان مبتلا به‌بیماریهای پیشرفته لگن و بیماریهای خونی.

عوارض جانبی: ندرتاً شبیه تجویز مقدار زیاد پروژسترون.

بسته‌بندی: قرص × ۳۰.

بها: ۳۰۰ ریال.

SEDACO
پارک ـ ایران

ترکیب: عصاره بلادون + عصاره هاماملیس + عصاره ژوسکیام + برموردو کامفر + آنتی‌پیرین.

موارد استعمال: درمان بواسیر دردناک توأم با خونریزی.

مقدار مصرف و طرز استعمال: برحسب دستور پزشک روزی یک الی دوشیاف استعمال میشود.

بسته‌بندی: شیاف ۴ گرم × ۵.

بها: ۲۹ ریال.

SEDA - ILDAAMEN
همبورگ ـ آلمان

ترکیب: ایلدامن ۸ میلی‌گرم + پاسادن ۳ میلی‌گرم.

موارد استعمال: آنژین صدری، نارسائی کرونر، انفارکتوس میوکارد، ایسکمی قلب.

مقدار مصرف و طرز استعمال: شروع درمان: روزی ۳ بار، هربار ۲ قرص. ادامه درمان: روزی ۳ بار، هربار ۱ قرص.

موارد منع استعمال: مسمومیت شدید الکلی و باربیتوریکی.

عوارض جانبی: اختلالات حس چشائی.

بسته بندی: قرص × ۳۰.

بها: ۱۹۵ ریال.

SEDALMERCK
مرک آلمان ـ ایران

ترکیب: در هر قرص: دیونین ۵ میلی‌گرم + افتونین ۵ میلی‌گرم + کافئین ۵۰ میلی‌گرم + فناستین ۱۰۰ میلی‌گرم + دی ـ متیل آمینوفنیل دی‌متیل پیرازولون ۱۵۰ میلی‌گرم.

موارد استعمال: دردهای بامنشاء عصبی و روماتیسمی، سردرد، دیسمنوره، سرماخوردگی، آنفلوانزا.

مقدار مصرف و طرز استعمال: خردسالان: روزی ۳ بار، هربار ربع تا یک قرص. بزرگسالان: روزی ۳ بار، هربار ۱ قرص.

بسته بندی: قرص × ۲۰۰.

بها: ۵۳۶ ریال.

SEDAPERSANTIN
بهرینگر اینگلهایم آلمان ـ تولیدارو ایران

ترکیب: ۲، ۶ـ بیس (دی اتیل آمینو) ـ ۴،۸ ـ دی ـ پیپریدینو پیریمیدو (۵، ۴ ـ d) پیریمیدین = دی پیرید امول ۲۵ میلی‌گرم + فنیل اتیل باربیتوریک اسید ۲۰ میلی‌گرم.

موارد استعمال: بیماران مبتلا به نارسائی کرونر ناشی از هیجان‌پذیری و تحریک‌پذیری عصبی بیش از حد.

مقدار مصرف و طرز استعمال: روزی ۳ بار، هربار ۱ قرص و در صورت لزوم ممکن است مقدار دارو را افزود ولی در هر حال بایستی توجه داشت که افزایش مقدار ترکیب باربیتورات در بیماران سرپائی بایستی طوری تنظیم گردد که ایجاد اختلالاتی در اعمال

S

روزمرهٔ آنها نکند.

عوارض جانبی: سردرد، سرگیجه.

بسته بندی: دراژه × ۲۰.

بها: ۸۲ ریال.

SEDAPHEN ELIXIR
تولیدارو ـ ایران

ترکیب: در هر قاشق مرباخوری: ۴ ـ هیدروکسی - استانیلید = استامینوفن ۱۲۰ میلی‌گرم.

موارد استعمال: کلیه بیماریهائیکه با تب و درد همراه هستند.

مقدار مصرف و طرز استعمال: کودکان کمتر از یکسال: روزی ۴ ـ ۶ بار هربار یک قاشق چایخوری. بزرگتر از یکسال یک قاشق مرباخوری.

احتیاط: مقدار خوراک دارو نباید از دوز تعیین شده و بیش از مدت ده روز تجاوز نماید.

موارد منع استعمال: بیماران کلیوی و کبدی.

بسته بندی: شربت ۶۰ میلی‌لیتر.

بها: ۴۹ ریال.

SEDARIN
تولیدارو ـ ایران

ترکیب: استامینوفن ۴۰۰ میلی‌گرم + کلرفنیرامین مالئات ۲/۵ میلی‌گرم + کلریدرات فنیل افرین ۱۲/۵ میلی‌گرم + کافئین ۳۰ میلی‌گرم.

موارد استعمال: سرماخوردگی، زکام، گریپ و سینوزیت مخصوصاً در کسانی که نمیتوانند داروهای آسپیرین‌دار مصرف کنند.

مقدار مصرف و طرز استعمال: بزرگسالان: ابتداء ۱ ـ ۲ قرص و سپس هر ۴ ـ ۶ ساعت یک قرص. حداکثر ۶ قرص در ۲۴ ساعت.
خردسالان: ۶ ـ ۱۲ ساله ربع تا نصف مقدار فوق

احتیاط و عوارض جانبی: ممکن است با مصرف زیاد خواب‌آلودگی ایجاد کند.

بسته بندی: قرص های دولایه × ۶.

بها: ۱۷/۵ ریال.

SEDORMA
عبیدی ـ ایران

ترکیب: در هر قاشق چایخوری: فنوباربیتال ۸/۱ میلی‌گرم + سدیم فنوباربیتال ۴ میلی‌گرم + برمورمتیل هوماتروپین ۰/۱۳۵ میلی‌گرم + جوهر نعناع ۲ میلی‌گرم.

موارد استعمال: اسپاسم‌های معدی، روده‌ای، کولونی و اختلالات گوارشی، استفراغ های ناشی از اسپاسم و حالات بیخوابی.

مقدار مصرف و طرز استعمال: خردسالان کمتر از ۱ سال: روزی ۳ بار، هربار ۰/۵ قاشق مرباخوری. ۱ ـ ۱۲ سال: روزی ۲ بار، هربار ۲ قاشق مرباخوری.

بسته بندی: شربت ۹۰ میلی‌لیتر.

بها: ۵۶ ریال.

SEDO - RYTHMODAN
روسل ـ فرانسه

ترکیب: دیزوپیرامید ۷۵ میلی‌گرم + آموباربیتال ۲۰ میلی‌گرم.

موارد استعمال: اکستراسیستول، تاکی کاردی های متناوب، طپش قلب، درد جلو قفسه‌سینه.

مقدار مصرف و طرز استعمال: روزی ۱ ـ ۴ قرص برحسب شدت درد.

موارد منع استعمال: بلوکهای کامل دهلیزی ـ بطنی.

عوارض جانبی: با مقادیر زیاد خواب‌آلودگی ایجاد میکند.

بسته بندی: کپسول × ۳۰.

بها: ۲۳۴ ریال.

SEDOVIT
بیوشیمی ـ ایران

ترکیب: برمور کلسیم ۲ گرم + برمورسدیم ۱ گرم + برمورآمونیم ۱ گرم + فنوباربیتال سدیم ۰/۲ گرم + ویتامین B_1 ۰/۰۱ گرم + شربت معطر تا ۱۰۰ میلی‌لیتر.

موارد استعمال: درد و ناراحتی، بیخوابی، عصبانیت، سرفه و سیاه‌سرفه، تنگی نفس.

مقدار مصرف و طرز استعمال: خردسالان تا یکسال: روزی ۲ ـ ۳ قاشق مرباخوری. ۱ ـ ۵ سال: روزی ۲ ـ ۴ قاشق غذاخوری.

بسته بندی: شربت ۱۰۰ میلی‌لیتر.

S

بها: ۴۱ ریال.

SEGONTIN
هوخست آلمان ـ ایران

ترکیب: لاکتات ـ N ـ ۳ ـ فنیل ـ پروپیل (۲) ـ ۱ و ۱ ـ دی‌فنیل پروپیل (۳) آمین = لاکتات پرنیل‌آمین ۶۰ میلی‌گرم.

موارد استعمال: آنـژین دوپـواتـرین همراه با انفارکتوس میوکارد، اسکلروز عروق اکلیلی، علائم نورووژتاتیف‌فونکسیونر کرونرها، اشکال دیگر نارسائی کرونرها.

مقدار مصرف و طرز استعمال: دوز درمانی: روزی ۳ بار، هربار یک دراژه. دوز نگهدارنده: روزی یک دراژه.

موارد منع استعمال: در اختلالاتی مانند هدایت دهلیزی بطنی و داخل بطنی قلب.

عوارض جانبی: گاهی عدم تحمل دستگاه گوارشی و خستگی.

بسته‌بندی: قرص ۶۰ میلی‌گرم × ۱۵.

بها: قرص ۱۰۵ ریال.

SELENOL
لوندبک ـ دانمارک

ترکیب: دی‌سولفیت سلنیوم ۲/۵ درصد.

موارد استعمال: پتی‌ریازیس، ازدیاد چربی پوست، شوره‌سر، ریزش موی سر بعلت سستی پیاز مو.

مقدار مصرف و طرز استعمال: در دو هفته اول دومرتبه شستشو در هفته انجام میشود در چهار هفته بعد یک مرتبه و از آن ببعد هر دو هفته یک مرتبه کافی است.

عوارض جانبی: جذب دی‌سولفیت‌سلنیم از راه‌پوست بمقدار ناچیز امکان پذیر است.

بسته‌بندی: شامپو ۱۰۰ گرم.

بها: ۹۹ ریال.

S

SELSUN
ابوت ـ آمریکا

ترکیب: دی‌سولفیت سلنیوم ۲/۵ درصد.

موارد استعمال: درمان شوره سر، درماتیت‌سبوروئیک، درماتوزهای غیر اختصاصی.

مقدار مصرف و طرز استعمال: ابتدا بمدت ۲ هفته و هر هفته ۲ بار، بعد هر هفته یا هر ۲ هفته یکبار موها را میشویند. بدین ترتیب که بعد از شستن موها با شامپو یا صابون یک قاشق چایخوری از محلول دارو را روی سر ریخته و چنگ میزنند. (از آب گرم استفاده میشود). کف حاصله باید ۳ـ۵ دقیقه روی سر بماند بعد موها را آب کشیده و با صابون یا شامپو دوباره میشویند.

احتیاط: بعد از شستن سر، دستها را باید کاملا شست. دارو نباید با چشم‌ها تماس پیدا کند.

بسته بندی: سوسپانسیون ۶۰ و ۲۵۰ میلی‌لیتر.

بها: ۶۰ میلی ۶۷ ریال، ۲۵۰ میلی ۱۲۶ ریال.

SELUKOS
کابی ـ سوئد

ترکیب: در هر ۱۰۰ گرم شامپو: سولفورسلنیوم ۲/۵ گرم + هگزا-کلروفان ۱ گرم.

موارد استعمال: شوره‌سر، ترشحات زیاد سبوم، چرب بودن پوست سر، پوسته ریزی.

مقدار مصرف و طرز استعمال: هفته‌ای ۲ بار سر را شستشو میدهند.

بسته بندی: شامپو ۷۰ گرم.

بها: ۱۳۰ ریال.

SENODIN
اسکوئیب آمریکا ـ ایران

ترکیب: در هر قاشق مرباخوری: سولفات کدئین ۷ میلی‌گرم + عصاره مایع ایپکا ۰/۰۱۳ میلی‌لیتر + عصاره مایع سیل ۰/۰۱۵ میلی‌لیتر + عصاره مایع سنگا ۰/۰۲۵ میلی‌لیتر + عصاره مایع سانگینا ریا ۰/۰۱۳ میلی‌لیتر + گلیسرین ۰/۲۵ میلی‌لیتر + مانتول ۰/۳ میلی‌گرم + الکل ۸/۵ درصد.

موارد استعمال: سرفه، تقویت عضلات قلب و برونش، ضدعفونی مجاری تنفسی.

مقدار مصرف و طرز استعمال: بزرگسالان: هر ۲ـ۴ ساعت یک قاشق مرباخوری. خردسالان: هر ۲ـ۴ ساعت نصف قاشق مرباخوری.

بسته بندی: ۱۲۰ میلی‌لیتر.

بها: ۷۶ ریال.

SENOPHILE
برونوفرانسه ـ فارما
شیمی ایران

ترکیب: در هر ۱۰۰ گرم: نیترات بازیک بیسموت ۵ گرم + بنزوات کلسترول ۱ گرم.

موارد استعمال: شقاق پستان، قرمزی پوست نوزادان، پوسته پوسته شدن جلد، انترتریگو اکزمای کودکان، ترک دست، کهیر، زونا.

مقدار مصرف و طرز استعمال: روزی ۲ ـ ۳ بار زخم را تمیز نموده روغن را میمالند.

بسته بندی: پماد ۵۰ گرم.

بها: ۵۶ ریال.

SEPTRIN
ولکام ـ انگلستان

ترکیب: در هر قرص: تریمتوپریم ۸۰ میلی‌گرم + سولفات متوکسازول ۴۰۰ میلی‌گرم. در هر ۵ میلی‌لیتر شربت بترتیب: ۴۰ میلی‌گرم + ۲۰۰ میلی‌گرم.

موارد استعمال: عفونتهای مجاری تنفسی، فوقانی و تحتانی، عفونتهای مجاری ادراری و دستگاه تناسلی، عفونتهای دستگاه گوارش، سپتی سمی، عفونتهای پوست.

مقدار مصرف و طرز استعمال: بزرگسالان و کودکان بالاتر از ۱۲ سال دو قرص با هم دوبار در روز. شربت: کودکان ۶ هفته تا ۶ ماهه ۲/۵ میلی‌لیتر دوبار در روز، ۶ ماهه تا ۶ ساله ۵ میلی‌لیتر دوبار در روز، ۶ ساله تا ۱۲ ساله ۱۰ میلی‌لیتر دوبار در روز.

موارد منع استعمال: دیسکرازی خونی، نارسائی شدید کلیه‌ها.

عوارض جانبی: بثورات جلدی و تغییر فرمول گلبولهای خونی.

بسته بندی: قرص × ۲۰ شربت ۱۰۰ میلی‌لیتر.

بها: قرص ۳۲۰ ریال شربت ۲۲۰ ریال.

SERENACE
سرل ـ انگلستان

ترکیب: ۴ ـ (۴ ـ (۴ ـ کلروفنیل) ـ ۴ ـ ئیدروکسی ـ پیپریدینو ـ] ـ ۱) ـ ۴ ـ فلوئورو ـ [بوتیرفنون = هالوپریدول.

موارد استعمال: تظاهرات روانی، هیجان، توهم، اسکیزوفرنی بخصوص در فرمهای کاتاتونیک و پارانوئیدمانی و هیپومانی.

مقدار مصرف و طرز استعمال: شروع درمان: با ۱/۵ میلی‌گرم در روز شروع میشود و این مقدار را می‌توان هر ۴ روز ۲ برابر نمود. ادامه درمان: روزی ۱/۵ ـ ۶ میلی‌گرم. تزریقی: ۱ ـ ۲ آمپول داخل عضله یا ورید هر ۶ ساعت تا وقتیکه بیماری تحت کنترول درآید. سپس می‌توان درمان خوراکی را جانشین درمان تزریقی نمود. خردسالان: دوز نگهدارنده: ۰/۰۵ میلی‌گرم برای هر کیلو وزن در روز.

عوارض جانبی: عوارض اکستراپیرامیدال که با مصرف داروهای خواب‌آور و ضد پارکینسون تحت کنترل درمی‌آید و یا با مصرف آنها همراه با دارو از ابتدای درمان، جلوگیری میگردد.

احتیاط: در بیماران مبتلا به‌ضایعات گانگلیونی بازال باید با احتیاط مصرف کرد. درمانهای ضد تشنجی در بیماران اپی‌لپسی بایستی ادامه یابند.

بسته‌بندی: قرص ۱/۵ میلی‌گرم × ۵۰. آمپول ۵ میلی‌گرم × ۶. قطره ۲ میلی‌گرم = ۱ میلی‌لیتر × ۱۵ میلی‌لیتر. کپسول ۰/۵ میلی‌گرم × ۲۰.

بها: قرص ۲۵۰ ریال. آمپول ۲۰۸ ریال. قطره ۱۳۵ ریال. کپسول ۶۴ ریال.

SEREPAX
وایت ـ آمریکا

ترکیب: ۷ ـ کلرو ـ ۱، ۳ دی‌ئیدرو ـ ۳ ـ ئیدروکسی ـ ۵ ـ فنیل ـ H2 ـ ۱، ۴ ـ بنزودیازپین ـ ۲ ـ اون = اکسازپام.

موارد استعمال: هیجان، عصبانیت، فشار روحی، تحریک‌پذیری، سردرد عصبی.

مقدار مصرف و طرز استعمال: برحسب شدت بیماری از ۱۰ ـ ۳۰ میلی‌گرم در روز متفاوت است.

موارد منع استعمال: کودکان کمتر از ۶ سال، بیماران کلیوی و کبدی، دوران آبستنی.

عوارض جانبی: سرگیجه، آتاکسی، اسهال و یبوست.

S

بسته بندی: کپسول ۱۵ میلی‌گرم × ۲۰.

بها: ۷۶ ریال.

SERPASIL
سیبا ـ سویس

ترکیب: ۳، ۴، ۵ ـ تری‌متوکسی بنزوئیل متیل رزرپات = رزرپین.

موارد استعمال: کلیه اشکال ازدیاد فشارخون، اختلالات عملی قلب، تاکیکاردی، پسیکونوروز، درمان مسمومیتها.

مقدار مصرف و طرز استعمال: فشارخون شریانی: بطور متوسط روزی ۰/۳-۰/۵ میلی‌گرم. دوز نگهدارنده: روزی ۰/۲-۰/۳ میلی‌گرم. هیپرتانسیون پاروکسیستیک واکلامپسی: ۱ ـ ۳ میلی‌گرم داخل ورید یا داخل عضله.

احتیاط: توصیه میشود که گاهگاه درمان قطع شود.

بسته بندی: قرص ۰/۱ میلی‌گرم × ۵۰. قرص ۰/۲۵ میلی‌گرم × ۴۰. آمپول ۱ میلی‌گرم و ۲/۵ میلی‌گرم × ۵.

بها: قرص ۰/۱ میلی ۴۰ ریال، ۰/۲۵ میلی ۵۵ ریال. آمپول ۱ میلی ۵۴ ریال، ۲/۵ میلی ۱۰۴ ریال.

SERPASIL - ESIDREX
سیبا ـ سویس

ترکیب: در هر قرص: سرپازیل ۰/۱۵ میلی‌گرم + ازیدرکس ۱۰ میلی‌گرم.

موارد استعمال: همه اشکال ازدیاد فشارخون بخصوص آنها که با ادم قلبی یا کلیوی خفیف همراهند، بیماریهای قلبی همراه با اختلالات آنژینی، حالات بعد از انفارکتوس میوکارد.

مقدار مصرف و طرز استعمال: روزی ۲ ـ ۳ بار، هربار ۱ ـ ۲ قرص.

بسته بندی: قرص × ۳۰.

بها: ۱۳۸ ریال.

S

SERUM ANTITETANIQUE
برنا ـ سویس

ترکیب: سرم حاصله از خون حیوان ایمن شده برعلیه کزاز.

موارد استعمال: درمان بیماری کزاز.

مقدار مصرف و طرز استعمال: روزی ۱ تا چند تزریق.

موارد منع استعمال: حساسیت به‌سروم.
بسته‌بندی: آمپول ۱۵۰۰ واحد ۱/۵ میلی‌لیتر×۱. آمپول ۲۵۰۰ واحد ۲/۵ میلی‌لیتر×۱.
بها: ۱۵۰۰ واحدی ۴۰ ریال، ۲۵۰۰ واحدی ۹۶ ریال.

SERVICILLIN
سرویفارم–سویس

ترکیب: آمپی‌سیلین.
موارد استعمال: تمام عفونتهای حساس به‌آمپی‌سیلین.
مقدار مصرف و طرز استعمال: کپسول: هر ۶ ساعت ۱ ـ ۲ عدد پیش از غذا. شربت: هر ۶ ساعت ۱ ـ ۲ قاشق مرباخوری. قطره: ۵۰ میلی‌گرم برای هر کیلو وزن.
بسته‌بندی: کپسول ۲۵۰ میلی‌گرم × ۱۰۰۰، ۵۰۰ میلی‌گرم × ۵۰۰ شربت ۲۵۰ میلی‌گرم × ۶۰ میلی لیتر. ویال ۵۰۰ میلی‌گرم × ۱.
بها: کپسول ۲۵۰ میلی هر عدد ۱۲ ریال، ۵۰۰ میلی هر عدد ۲۰ ریال. شربت ۱۸۷ ریال، ویال ۷۱ ریال.

SEVAL
هور–ایران

ترکیب: در هر شیشه شربت: برمورسدیم ۵ گرم + عصاره والریان ۶ گرم + عصاره پاسیفلور ۶ گرم + تنطور کراتا کوس ۶ میلی‌لیتر + فنوباربیتال ۰/۵ گرم.
موارد استعمال: بیخوابی، تشنج بعلل مختلف، اختلالات عصبی، اضطراب، وحشت.
مقدار مصرف و طرز استعمال: بزرگسالان: روزی ۱ ـ ۳ قاشق مرباخوری خردسالان: ۱ ـ ۳ قاشق چای‌خوری.
احتیاط: از مصرف مداوم خودداری شود.
بسته‌بندی: شربت ۱۲۰ میلی‌لیتر.
بها: ۷۰ ریال.

SEVEN SEAS
هول‌اندگریمسبی انگلستان

ترکیب: در هر ۳۰ گرم: ویتامین A ۲۰ هزار واحد + ویتامین D ۲۳۰۰ واحد + ویتامین E ۳ واحد.

S

موارد استعمال: کلیه موارد کمبود ویتامینهای فوق.

مقدار مصرف و طرز استعمال: بزرگسالان: روزی ۳ بار، هربار ۱ ـ ۲ قاشق چایخوری. خردسالان: روزی ۳ بار، هربار ۱۰ ـ ۲۰ قطره.

بسته بندی: شربت ۱۲۵ میلی‌لیتر. قرص × ۱۰۰.

بها: شربت ۹۰ ریال. قرص ۱۴۰ ریال.

SEVINOL
شرینگ آمریکا ـ ایران

ترکیب: دی کلریدرات فلوفنازین.

موارد استعمال: اضطراب و پسیکوز، ترس، تحریک پذیری، گیجی و آشفتگی ادراک، عدم تعادل و بیخوابی، خستگی روانی، کم شدن قدرت ابتکار، آسم، کشش عصبی قبل از قاعدگی، آرتریت، هیپرتانسیون و سردردهای عصبی.

مقدار مصرف و طرز استعمال: روزی یک بار، هربار یک قرص.

موارد منع استعمال: افسردگیهای شدید ناشی از دپرسیون دهنده‌های دستگاه عصبی مرکزی، لکوپنی و سایر علائم دپرسیون مغز و استخوان.

عوارض جانبی: عصبانیت، تحریک پذیری، عدم آرامش، خواب‌آلودگی، خشکی دهان، تیرگی دید، یبوست، فشارهای معدی و حالت تهوع.

بسته بندی: قرص ۱ میلی‌گرمی × ۲۰ و ۱۰۰.

بها: ۲۰ عددی ۱۰۵ ریال، ۱۰۰ عددی ۴۶۸ ریال.

S

SIGMAGEN
شرینگ آمریکا ـ ایران

ترکیب: پردنیزون ۰/۷۵ میلی‌گرم + اسید استیل سالیسیلیک ۲۳۵ میلی‌گرم + اسید اسکوربیک ۲۰ میلی‌گرم + ئیدروکسید آلومینیوم ۷۵ میلی‌گرم.

موارد استعمال: موارد خفیف آرتریت روماتوئید و اسپوندیلیت، نقرس حاد و یا تحت حاد، بورسیت، میوزیت، فیبروزیت و نوریت.

مقدار مصرف و طرز استعمال: ۱ ـ ۳ قرص یک روز درمیان تا ۴ بار در روز.

موارد منع استعمال: سل، زخم معده، ناراحتی روانی، تبخال چشمی.
احتیاط: در نارسائی قلب، هیپرتانسیون شدید، دیابت ملیتوس، نارسائی کلیه، استئوپورز باید با احتیاط مصرف شود.
بسته بندی: قرص × ۱۰۰.
بها: ۲۳۴ ریال.

SILOMAT
بهرینگر اینگلهایم
آلمان ـ تولیدارو
ایران

ترکیب: کلریدرات ۱ ـ پارا ـ کلروفنیل ۲، ۳ ـ دی‌متیل ـ ۴ دی‌متیل آمینو ـ ۲ ـ بوتانول.
موارد استعمال: سرفه‌های ناشی از عفونتها و التهاب مجاری تنفسی فوقانی، آنفلوآنزا، سرفه‌های تحریکی معتادین به‌سیگار، سرفه‌های متعاقب برونکوسکپی و برونکوگرافی، سرفه‌های تحریکی که در تعقیب بیحسی‌های آندوتراکئال و بیهوشی با اتر ایجاد میشوند.
مقدار مصرف و طرز استعمال: بزرگسالان: روزی ۳ بار، هربار یک قرص یا ۲۰ قطره (درکمی آب یا چای) بچه‌های تا ۳ سال: روزی ۳ بار، هربار ۵ الی ۱۰ قطره، بچه‌های بالاتر از ۳ سال: روزی ۳ بار هربار ۲۰ قطره. در موارد سرفه‌های مقاوم و خیلی شدید یک آمپول ۳ مرتبه در روز بطور داخل وریدی، داخل عضلانی و یا زیرجلدی تزریق میشود.
بسته بندی: قرص ۴۰ میلی‌گرم × ۲۰. قطره (هر ۲۰ قطره = ۴۰ میلی‌گرم) ۱۵ میلی‌لیتر. آمپول ۲ میلی‌لیتر = ۲۰ میلی‌گرم × ۵.
بها: قرص ۵۹ ریال. قطره ۵۳ ریال. آمپول ۷۰ ریال.

S

SILOMAT Compositum
بهرینگر اینگلهایم
آلمان ـ تولیدارو
ایران

ترکیب: در هر ۱۰ میلی‌لیتر: سیلومات ۴۰ میلی‌گرم + ۱ ـ (۳، ۵ ـ دی هیدروکسی فنیل) ـ ۲ ـ ایزوپروپیل آمینواتانول سولفات = متاپروترنول = آلوپنت ۱۰ میلی‌گرم.
موارد استعمال: سرفه در برونشیت‌های توام با برونکواسپاسم، برونشیت‌های آمفیزماتوی همراه با اسپاسم، برونشیت‌هائیکه همراه با

پنوموکونیوز ایجاد میشوند، آمفیزم‌های حاصله از بیماریهای مزمن ریوی، برونشیت‌های همراه با اسپاسم دربچه‌ها.

مقدار مصرف و طرز استعمال: بزرگسالان: ۳ بار، هربار ۲ قاشق مرباخوری. خردسالان: روزی ۳ بار، هربار ۰/۵ـ۱ قاشق مرباخوری.

بسته بندی: شربت ۱۲۰ میلی‌لیتر.

بها: ۷۰ ریال.

SILUBIN Retard
گرونتال ـ آلمان

ترکیب: بوفرمین = ان‌بوتیل بی‌گوانید.

مکانیسم: با تحریک سلولهای بتا جزایر لانگرهانس سبب افزایش‌شمی ترشح انسولین میشود.

موارد استعمال: دیابت سالمندان، دیابت افراد چاق و جوانان همراه با انسولین.

مقدار مصرف و طرز استعمال: شروع درمان: روزی سه قرص (۲ عدد صبح و ۱ عدد شب). ادامه درمان: روزی ۱ ـ۲ قرص.

موارد منع استعمال: کمای دیابتیک، پرکما، نارسائیهای شدید کلیه، اعمال جراحی تصادفات، بیماریهای شدید عفونی، در همه بیماریهائی که با هیپوکسی همراه باشند.

احتیاط: در بیماریهائیکه با کمبود اکسیژن در بافتها همراه هستند بعلت بروز اسیدوزلاکتیک باید با احتیاط مصرف شود.

بسته بندی: دراژه ۱۰۰ میلی‌گرم × ۶۰.

بها: ۲۵۰ ریال.

S

SIMECO
وایت ـ آمریکا

ترکیب: در هر قرص: ئیدروکسید آلومینیم و کربنات‌منیزیم ۲۸۲ میلی‌گرم + ئیدروکسید منیزیم ۸۵ میلی‌گرم + متیل پلی ـ سیلوکسان سیمتیکون = دی‌متیکون ۲۵ میلی‌گرم در هر صد میلی‌لیتر سوسپانسیون: ژل ئیدروکسید آلومینیم ۴/۳ گرم + ئیدروکسید منیزیم ۱/۶ گرم + دی متیکون ۵۰۰ میلی‌گرم.

موارد استعمال: زخم‌معده و نفخ دستگاه گوارش، هیپراسیدیته.

مقدار مصرف و طرز استعمال: روزی ۳ بار، هربار ۲ قاشق مرباخوری سوسپانسیون هنگام یا بعد از غذا.

بسته بندی: قرص × ۶۰، سوسپانسیون ۱۷۰ میلی‌لیتر.

بها: سوسپانسیون ۱۱۰ ریال، قرص ۱۳۰ ریال.

SINADUR
عبیدی ـ ایران

ترکیب: یدوکلروکسی کینولئین ۳ درصد + اکسید روی ۱۰ درصد + ویتامین A ۱ هزار واحد + ویتامین D ۲۰ هزار واحد.

موارد استعمال: زخمهای پوستی عفونی، پیشگیری از ایجاد عفونتهای میکروبی، سوختگیهای عفونی شده، انترتریگو، پیودرمیت.

مقدار مصرف و طرز استعمال: لایه‌ای از پماد را روی موضع میمالند.

بسته بندی: پماد ۲۰ گرم.

بها: ۶۴ ریال.

SINEMET
مرك شارپ اند دوهم ـ آمریکا

ترکیب: کاربی‌دوپا ۲۵ میلی‌گرم + لوودوپا ۲۵۰ میلی‌گرم.

مکانیسم: با عمل رقابتی از تبدیل دوپامین به‌نور آدرنالین جلوگیری کرده و بجای آن متیل نورآدرنالین ترشح میشود.

موارد استعمال: درمان علایم پارکینسون ایدیوپاتیک، پارکینسونیسم پست انسفالیک، پارکینسونیسم علامتی در اثر آسیب به‌دستگاه اعصاب.

مقدار مصرف و طرز استعمال: روزی ۲ بار، هربار ۰/۵ - ۱ قرص.

موارد منع استعمال: بیماریهای فعال کبدی، فئوکروموسیتوم، حساسیت بدارو، دوران شیردهی، سیروز کبدی، درمان توأم با منوآمینو-اکسیدازها.

عوارض جانبی: گاهی سردرد، ضعف موقتی، خشکی دهان، بثورات جلدی، افزایش وزن، ادم.

احتیاط: در حرارت کمتر از ۲۵ درجه و در جای خشک دور از نور نگهداری شود. بیمارانیکه تحت درمان با لوودوپا هستند دست کم هشت ساعت پیش از آغاز استفاده از سی‌نمت باید مصرف لوودوپا را قطع کنند مقدار مصرف سی‌نمت باید دست کم باندازه

S

۲۵ درصد مقدار مصرفی لوودوپا باشد.
بسته بندی: قرص × ۱۰۰.
بها: ۳۲۲۰ ریال.

SINEQUAN
فایزرآمریکا ـ ایران

ترکیب: کلریدرات ۱۱ ـ دی متیل آمینو پروپیلیدن ـ ۶H ـ دی ـ بنزو (b و c) اکسپین = دوکسپین.
اثر متقابل: رجوع شود به NORPRAMIN
موارد استعمال: اختلالات روانی، دپرسیون همراه با اضطراب و آژیتاسیون، عصبانیت، بیخوابی، ترس، مالیخولیا، دردها و سوزشهای معدی.
مقدار مصرف و طرز استعمال: برحسب نوع و شدت بیماری متفاوت است و بین ۳۰ تا ۳۰۰ میلی‌گرم در روز در سه قسمت تجویز میشود.
موارد منع استعمال: گلوکوم، حبس البول.
عوارض جانبی: کلیه عوارض آنتی کولی نرژیک‌ها.
بسته بندی: کپسول ۱۰ و ۲۵ میلی‌گرم × ۳۰.
بها: کپسول ۱۰ میلی ۱۰۵ ریال، ۲۵ میلی ۱۷۶ ریال.

SINTROM
گایگی ـ سویس

ترکیب: در هر قرص: ۳ ـ (آلفا ـ پارا ـ نیتروفنیل ـ بتا ـ استیل ـ اتیل) ـ ۴ ـ ئیدروکسی کومارین = اسنوکومارول ۴ میلی‌گرم.
موارد استعمال: پیشگیری و درمان عوارض ترومبوآمبولی، پیشگیری در ترومبوزهای عود کننده و ترومبوز کرونر با تجویز طولانی.
مقدار مصرف و طرز استعمال: روز اول ۲ ـ ۳ قرص. روز دوم ۴ ـ ۶ قرص. از روز سوم به‌بعد برحسب قدرت انعقاد خون مقدار دارو تعیین میشود.
موارد منع استعمال: دیاتزهای هموراژیک، ضایعات شدید پارانشیم کبد و کلیه، قرحه معده و روده، فشارخون بالا، آنسفالوراژی، آبستنی.
پادزهر: ویتامین K_1 بشکل تزریقی یا خوراکی. در فوریت‌ها تزریق

S

خون.

بسته بندی: قرص × ۲۰.

بها: ۱۴۰ ریال.

SINUTAB
وارنر لامبرت آمریکا
- ایران

ترکیب: استامینوفن **۳۲۵** میلی‌گرم + فنیل پروپانولامین کلریدرات **۲۵** میلی‌گرم + فنیل تولوکسامین سیترات **۲۲** میلی‌گرم.

موارد استعمال: علائم سرماخوردگی، احتقان سینوسها، سردردهای ناشی از سرماخوردگی، آنفلوآنزا.

مقدار مصرف و طرز استعمال: بزرگسالان ابتدا ۲ قرص سپس هر ۴ ساعت یک قرص. خردسالان: نصف مقدار فوق.

موارد منع استعمال: کودکان کمتر از ۳ سال.

عوارض جانبی: خواب‌آلودگی.

احتیاط: نزد رانندگان و کسانیکه با کارهای ماشینی سروکار دارند با احتیاط باید مصرف شود.

بسته بندی: قرص × ۲۴.

بها: ۸۴ ریال.

SIOSTERAN
گایگی - سویس

ترکیب: ۵ و ۷ - دی کلر - ۲ - متیل - ۸ کینالدینول = کلر کینالدول.

موارد استعمال: آنتریت‌ها، آنتروکولیتها، گاستروآنتریت‌ها و اسهالهای تابستانی، لامبلیاز و آمیبیاز، کاندیدیاز.

مقدار مصرف و طرز استعمال: خردسالان: روزی ۳ بار، هر بار ۴ - ۸ میکروقرص. بزرگسالان: روزی ۳ بار، هربار ۱ - ۲ دراژه.

بسته بندی: دراژه × ۲۰، میکرو قرص × ۱۰۰.

بها: دراژه ۱۰۰ میلی ۴۲ ریال. میکروقرص ۱۰ میلی ۶۰ ریال.

SIPAT
عبیدی - ایران

ترکیب: اسید استیل سالیسیلیک ۱۰۰ میلی‌گرم + فنوباربیتال ۵ میلی‌گرم.

موارد استعمال: سرماخوردگی، گریپ، سردرد، دندان‌درد، مسکن،

تب بر.
مقدار مصرف و طرز استعمال: نوزادان: روزی ۱ ـ ۲ قرص. خردسالان: روزی ۳ ـ ۴ بار، هربار ۱ ـ ۲ قرص.
بسته بندی: قرص × ۱۰.
بها: ۳۵ ریال.

SIROLAX
مارین ـ ایران

ترکیب: در هر ۱۰۰ گرم: کربنات منیزیم ۱۸ گرم + اسید سیتریک ۳۲ گرم.
موارد استعمال: بدکارکردن دستگاه گوارش و ترشی زیاد معده.
مقدار مصرف و طرز استعمال: روزی ۱ ـ ۳ قاشق غذاخوری در آب حل کرده میل شود.
بسته بندی: گرد ۱۰۰ گرم.
بها: ۱۸ ریال.

SITUCIDINE
فرایس ـ فرانسه

ترکیب: لوته‌نورین (ترکیب آلکالوئید گیاهی).
موارد استعمال: انواع عفونتهای واژن لوکوره‌های اختصاصی و غیراختصاصی.
مقدار مصرف و طرز استعمال: روزی ۱ ـ ۲ قرص در عمق واژن استعمال شود. دوره درمان ۲۰ روز است.
بسته بندی: قرص واژینال ۳ میلی‌گرم × ۲۰.
بها: ۱۵۰ ریال.

SODIUM BICARBONATE
باکستر ـ ایران

ترکیب: بی‌کربنات سدیم ۱/۴ گرم + آب‌مقطر مقدارکافی تا ۱۰۰ میلی‌لیتر (غلظت سدیم ۱۶۷، بیکربنات ۱۶۷ میلی اکی‌والان).
موارد استعمال: اسیدوزمتابولیک، کوما دیابتیک، وبای آسیائی، امراض هپاتیک، واکنشهای همولیتیکی، مسمومیت با باربیتوریکها.
مقدار مصرف و طرز استعمال: برحسب نوع مصرف بین ۵ تا ۲۵

میلی‌لیتر بازاء هر کیلو.

موارد منع استعمال: آلکالوز تنفسی و متابولیک، نارسائی‌های احتقانی قلب، هیپوکالسمی.

احتیاط: در بیماران قلبی، کبدی و کلیوی باید با احتیاط مصرف شود.

بسته بندی: محلول ۱۰۰۰ میلی‌لیتر.

بها: ۲۰۵ ریال.

SODIUM BICARBONATE 7·4%

ابوت ـ آمریکا

ترکیب: در هر آمپول: بیکربنات سدیم ۷/۴ درصد.

موارد استعمال: اسیدوز ناشی از نارسائی کلیه، دیابت کنترل نشده، نارسائی دستگاه گردش خون بعلت شوک، دزئیدراتاسیون، اسیدوزلاکتیک، مسمومیتهائی که احتیاج به‌قلیائی کردن خون است.

مقدار مصرف و طرز استعمال: برحسب شدت بیماری و میزان اسیدوز متفاوت است.

موارد منع استعمال: افرادیکه در اثر استفراغ مقدار زیادی کلرور از دست داده‌اند، مصرف توام با دیورتیکهائی که سبب آلکالوز- هیپوکلرومی میشوند.

بسته بندی: آمپول ۵۰ میلی‌لیتر× ۱.

بها: ۱۱۰ ریال.

SODIUM CHLORIDE

باکستر ـ ایران

ترکیب: کلرورسدیم ۳/۵۰۸ گرم + آب مقطر مقدار کافی تا ۲۰ میلی‌لیتر (غلظت ۳ میلی اکی‌والان در هر میلی‌لیتر).

احتیاط: محلول را قبل از تزریق باید رقیق کرد.

بسته بندی: ویال ۲۰ میلی‌لیتر.

بها: ۷۰ ریال.

S

SODIUM CHLORIDE INJECTION
باکستر ـ ایران

ترکیب: کلرورسدیم ۰/۹ گرم + آب‌مقطر مقدار کافی تا ۱۰۰ میلی‌لیتر (غلظت کلرور ۱۵۴، سدیم ۱۵۴ میلی اکی‌والان در لیتر).

موارد استعمال: بعنوان حلال مواد داروئی مختلف.

بسته‌بندی: ویال ۲۰ میلی‌لیتر.

بها: ۶۸ ریال.

SOFRADEX
روسل ـ فرانسه

ترکیب: در هر ۱۰۰ میلی‌لیتر: دگزامتازون ۰/۱ گرم + سولفات ـ فرامیستین ۰/۵ گرم + گرامیسیدین ۰/۵ گرم + نیترات فنیل مرکوریک ۰/۱ گرم.

موارد استعمال: کونژونکتیویتهای عفونی و آلرژیک، بلفاریت، کراتیت، ایریتیس اسکلریت.

مقدار مصرف و طرز استعمال: بیماریهای حاد: هر ۲ ـ ۳ ساعت ۱ ـ ۲ قطره بمدت ۳ ـ ۵ روز. بیماریهای مزمن: هر ۴ ـ ۸ ساعت ۱ قطره.

موارد منع استعمال: بیماریهای ویرال، کراتیت هرپتیک و فونیژیک، گلوکوم فردی یا فامیلی.

بسته‌بندی: قطره چشمی ۵ میلی‌لیتر و ۸ میلی‌لیتر.

بها: ۵ میلی ۱۴۱ ریال، ۸ میلی ۱۸۶ ریال.

SOLCOSERYL
سولکو ـ سویس

ترکیب: عصاره پروتئینی حاصل از خون گوساله.

موارد استعمال: کورک، سوختگی، اولسر پوست و غشاءهای مخاطی، گاستریت مزمن.

مقدار مصرف و طرز استعمال: پماد: روزی ۲ ـ ۳ بار بر روی موضع می‌مالند. آمپول روزی ۲ ـ ۴ آمپول بمدت ۱۰ ـ ۳۰ روز و در صورت لزوم به‌مدت بیشتر.

بسته‌بندی: پماد ۵ درصد ۲۰ گرم، آمپول ۲ میلی‌لیتر × ۶.

بها: پماد ۱۳۰ ریال، آمپول ۸۰۰ ریال.

SOL PIPER
مینا ـ ایران

ترکیب: در هر ۱۰۰ میلی‌لیتر: سیترات پی‌پرازین ۱۲ گرم.
موارد استعمال: اکسیور و آسکاریس.
مقدار مصرف و طرز استعمال: آسکاریس: ۱۵۰ میلی‌گرم برای هر کیلو (حداکثر ۳/۷ گرم) در دو روز متوالی اکسیور: ۶۵ میلی‌گرم برای هر کیلوگرم (حداکثر ۲ گرم) در روز بمدت ۷ روز.
موارد منع استعمال: زخم معده.
عوارض جانبی: سرگیجه، استفراغ.
بسته بندی: شربت ۳۰ و ۶۰ میلی‌لیتر.
بها: ۳۰ میلی ۲۱ ریال، ۶۰ میلی ۲۹ ریال.

SOLUBACTER
شانترو ـ فرانسه

ترکیب: ۳، ۴، ۴َ تری کلرو کاربانیلید = تری کلو کاربن.
موارد استعمال: ضدعفونی دستگاه تناسلی و پوست.
مقدار مصرف و طرز استعمال: ۱ ـ ۲ قاشق سوپخوری در ۲۵۰ میلی‌لیتر آب.
بسته بندی: محلول ۱۵۰ میلی‌لیتر.
بها: محلول ۲۲۶ ریال.

SOLUCMPHRE Sirop
دلالاند ـ فرانسه

ترکیب: سولفو کامفر ۰/۴۲ گرم + عصاره مایع اپیکا ۰/۲۱ گرم + عصاره مایع سنا ۰/۸۴ گرم + تنطور آکونیت ۰/۴ گرم + تنطور بلادون ۱ گرم + کامفوسولفونات کدئین ۰/۰۴ گرم + کامفوسولفونات اتیل مرفین ۰/۰۴ گرم + کامفو-سولفونات افدرین ۰/۰۷۵ گرم + شربت معطر تا ۱۰۰ میلی‌لیتر.
موارد استعمال: تمام سرفه‌های تحریکی، لارنژیت، سیاه‌سرفه، آسم، ذات‌الریه، سل ریوی، برونشیت‌ها.
مقدار مصرف و طرز استعمال: بزرگسالان: روزی ۳ ـ ۵ قاشق غذاخوری خردسالان (از ۳ سال به‌بالا) روزی ۲ ـ ۴ قاشق مرباخوری.
موارد منع استعمال: کودکان کوچکتر از ۳ سال.
بسته بندی: شربت ۱۸۰ میلی‌لیتر.
بها: ۵۰ ریال.

S

SOLU - CORTEF
آپجان ـ آمریکا

ترکیب: ئیدروکورتیزون سدیم سوکسینات ۱۰۰ میلی‌گرم.

موارد استعمال: حساسیتها و عفونتهای شدید، لوپوس اریتماتوز، شوك، آسم.

مقدار مصرف و طرز استعمال: برحسب نوع و شدت بیماری متفاوت است.

بسته بندی: ویال ۱۰۰ میلی‌گرم + حلال ۲ میلی‌لیتر × ۱.

بها: ۱۷۵ ریال.

SOLU - DACORTIN
مرك ـ آلمان

ترکیب: پردنیزولون سوکسینات سدیم لیوفیلیزه.

موارد استعمال: شوك‌های شدید پس از عمل، عکس‌العمل های سخت آنافیلاکتیك، پلی‌آرتریت مزمن پیشرونده، روماتیسم حاد مفصلی، کریز بیماری آدیسن، تیرتوکسیکوزو کلیه مواردیکه به‌درمان با کورتیکوستروئیدها نیاز است.

مقدار مصرف و طرز استعمال: خردسالان: روزی ۱ یا چندبار، هربار ۱۰ ـ ۲۵ میلی‌گرم. بزرگسالان: روزی ۱ یا چندبار، هربار ۲۵ ـ ۵۰ میلی‌گرم داخل ورید. تزریق در مفصل زانو برای بزرگسالان ۲۵ ـ ۵۰ میلی‌گرم. برای استعمال بطور پرفوزیون باید اول آمپول خشك را در آب‌مقطر حل کرده سپس آنرا به محلول سرم گلوکزه ۵ درصد یا سروم فیزیولوژی اضافه کرد.

موارد منع استعمال: تمام موارد منع کورتیکوستروئیدها.

احتیاط: هیچگاه نباید قبل از بین رفتن اثر اولین تزریق داخل مفصلی و بازگشت درد، تزریقات بعدی را شروع کرد. نباید با داروهای دیگر مخلوط شده و تزریق گردد.

بسته بندی: آمپول ۱۰ میلی‌گرم × ۳، ۲۵ و ۵۰ و ۲۵۰ میلی‌گرم + حلال ۱ میلی‌لیتر × ۱.

بها: آمپول ۱۰ میلی ۱۸۰ ریال، ۲۵ میلی ۱۳۰ ریال، ۵۰ میلی ۱۶۰ ریال. ۲۵۰ میلی ۵۶۲ ریال.

S

SOLUGASTRIL
هوبن ـ آلمان

ترکیب: در هر ۱۰ گرم: ژل هیدروکسید آلومینیوم ۴/۳۵ گرم + کربنات کلسیم ۰/۶ گرم.
اثر متقابل: مانند تمام ترکیبات حاوی یون آلومینیم و کلسیم جذب تتراسیکلین ها را از روده بشدت کاهش میدهد.
موارد استعمال: هیپراسیدیته، گاستریت، زخم اثنی‌عشر، ازوفاژی.
مقدار مصرف و طرز استعمال: قبل از هر وعده غذا یک بسته را در یک لیوان آب یا شیر حل کرده میل میکنند.
بسته بندی: ساشه × ۲۰.
بها: ۱۴۵ ریال.

SOLU-MEDROL
آپجان ـ آمریکا

ترکیب: ۶ آلفا ـ متیل پردنیزولون سدیم سوکسینات.
موارد استعمال: نارسائی حاد غدّه فوق کلیوی، شوک شدید، لوپوس ـ اریتماتوز سیستمیک، آسم برونشیک حاد، عفونت‌های شدید همراه با سمیت.
مقدار مصرف و طرز استعمال: در شوک‌های شدید ۱۵ الی ۳۰ میلی‌گرم به‌ازاء هر کیلو وزن بدن در ۲۴ ساعت. در سایر موارد برحسب نوع و شدت بیماری متفاوت است.
بسته بندی: ویال ۴۰ میلی‌گرم = ۱ میلی‌لیتر × ۱.
بها: ۲۳۰ ریال.

SOLU - PARAXINE
بهرینگر مانهایم
آلمان ـ تهران شیمی
ایران

ترکیب: منوسوکسینات سدیم د (ـ) ـ ترئو ـ ۲ ـ دی کلرواستامیدو ـ ۱ ـ پارا ـ نیتروفنیل ـ ۱، ۳ ـ پروپاندیول.
موارد استعمال: برنشیت، برونکوپنومونی، سیاه‌سرفه، پیلونفریت، سیستیت، پروستاتیت، گاستروآنتریت، دیسانتری، تیفوئید پیودرمی، کورک، آدنکسیت، ماستیت، سقط جنین؛ اوتیت میانی و خارجی، مننژیت، باکتریمی.
مقدار مصرف و طرز استعمال: برحسب نوع و شدت بیماری متفاوت است.
موارد منع استعمال: ایکترهمولیتیک، پانمیلوپاتی.

بسته بندی: ویال ۱ گرم + ۵ میلی‌لیتر آب مقطر.
بها: ۸۴ ریال.

SOLURUTINE - Papaverine F. Retard
دوس ـ فرانسه

ترکیب: در هر قرص: مورفولینیل اتیل روتوزید ۰/۰۷۵ گرم + ویتامین C ۰/۰۷۵ گرم + کلریدرات پاپاورین ۰/۱ گرم.
موارد استعمال: اسپاسم عروقی و احشائی، ازدیاد مقاومت دستگاه گردش خون، افزایش فشارخون، نارسائی گردش خون.
مقدار مصرف و طرز استعمال: روزی ۲ بار، هربار ۲ ـ ۴ قرص. در موارد شدید تا ۶ قرص.
بسته بندی: قرص × ۳۰.
بها: ساده ۱۴۲ ریال. روتارد ۲۳۰ ریال.

SOLVIT
مینا ـ ایران

ترکیب: ویتامین A + ویتامین D + ویتامین C + ویتامین B_1 + ویتامین B_2 + ویتامین B_6 + نیاسینامید + اسید پانتوتنیک.
موارد استعمال: آویتامینوز، برای نوزادانی که منحصراً با شیرمادر تغذیه میشوند، بعد از بیماریهای عفونی، کمک به دندان درآوردن بچه ها.
مقدار مصرف و طرز استعمال: برحسب سن و مقدار احتیاج روزی ۱ ـ ۵ بار، هربار ۵ ـ ۲۴ قطره.
بسته بندی: قطره خوراکی ۱۵ میلی‌لیتر.
بها: ۴۷ ریال.

SOPALAMIN - 3 B
سوپار ـ بلژیک

ترکیب: در هر دراژه ویتامین B_{12} ۲۵۰ گاما + ویتامین B_1 ۲۵۰ میلی‌گرم + ویتامین B_6 ۱۲۵ میلی‌گرم. در هر آمپول خشک: ویتامین B_1 ۱۰۰ میلی‌گرم + ویتامین B_6 ۱۰۰ میلی‌گرم + ویتامین B_{12} ۱۰۰۰ گاما. حلال: سدیم استات ۲۴ میلی‌گرم + الکل ـ بنزیلیک ۴۰ میلی‌گرم + آب مقطر.
موارد استعمال: دردهای روماتیسمی، ناراحتیهای عصبی، دردهای

عضلانی، کم خونی، ضعف میوکارد.

مقدار مصرف و طرز استعمال: روزی ۴ـ۶ دراژه.

بسته بندی: دراژه × ۲۵، آمپول × ۳.

بها: دراژه ۱۲۰ ریال، آمپول ۱۶۰ ریال.

SOPAMYCETIN Succinate

سوپار ـ بلژیک

ترکیب: سدیم سوکسینات کلرامفنیکل.

موارد استعمال: تمام عفونتهای حساس به کلرامفنیکل.

مقدار مصرف و طرز استعمال: خردسالان: روزی ۵۰ـ۱۰۰ میلی گرم بازاء هر کیلو وزن بدن. بزرگسالان: روزی ۲ـ۳ گرم. تزریق داخل وریدی یا عضلانی.

عوارض جانبی: اختلالات خونی.

بسته بندی: ویال ۱ گرم.

بها: ۷۰ ریال.

SORBAX

آوبسن ـ ایران

ترکیب: سوربیتول.

مکانیسم: سبب تحریک کیسه صفرا و افزایش ترشحات کبدی میشود.

موارد استعمال: اختلالات عضوی کبد و نارسائی کار کیسه صفرا و مجاری صفراوی و اختلالات گوارشی.

مقدار مصرف و طرز استعمال: روزی ۱ـ۳ بار، هربار یک بسته در آب میل بشود.

بسته بندی: بسته ۵ گرم × ۲۰.

بها: ۸۳ ریال.

SORBEX EVA

اوا ـ ایران

ترکیب: سوربیتول.

مکانیسم: باعث تحریک کیسه صفرا و افزایش ترشحات کبدی میشود.

موارد استعمال: تقویت اعمال کبدی و صفراوی.

مقدار مصرف و طرز استعمال: روزی ۱ـ۳ بار، هربار یک بسته را در آب حل کرده میل میکنند.

بسته بندی: بسته ۵ گرم × ۲۰

بها: ۸۸ ریال.

SORBITOL
دلالاند ـ فرانسه

ترکیب: سوربیتول.
مکانیسم: سبب تحریک کیسه صفرا و افزایش ترشحات کبدی میشود.
موارد استعمال: اختلالات گوارشی، اختلالات گوارشی با مبدأ کبدی، یبوست‌های مزمن، اختلال عمل لوزالمعده، اختلالات گوارشی ناشی از مصرف انتی‌بیوتیک‌ها، ناسازگاری‌های داروئی و غذائی، رادیوگرافی کیسه صفرا.
مقدار مصرف و طرز استعمال: بزرگسالان: روزی ۱ ـ ۳ بسته.
خردسالان: نصف مقدار فوق.
بسته بندی: پاکت ۵ گرم × ۲۰.
بها: ۱۰۰ ریال.

SORBOSAN
مرک آلمان ـ ایران

ترکیب: سوربیتول ۵ گرم + اوپاورین ۰/۰۱۵ گرم.
موارد استعمال: هپاتوز حاد و مزمن، کله سیستیت، سوء هضم، یبوست، دیسکنزی صفراوی.
مقدار مصرف و طرز استعمال: روزی ۱ ـ ۳ بار محتوی بسته را در نصف لیوان آب حل کرده قبل از غذا میل میکنند.
بسته بندی: بسته × ۲۰.
بها: ۱۱۱ ریال.

SORDINOL
لوندبک ـ دانمارک

ترکیب: کول‌پن تیکسول.
موارد استعمال: اختلالات رفتاری و آژیتاسیون، بیقراری و هیجان.
مقدار مصرف و طرز استعمال: روزی ۱۰ میلی‌گرم در بعد ازظهر و در صورت لزوم ۵ میلی‌گرم در صبح. در موارد استثنائی تا ۲۵ میلی‌گرم در روز میتوان تجویز کرد.
عوارض جانبی: گاهی در شروع مصرف ایجاد خواب‌آلودگی میکند و ممکن است بطور نادر هیپوتانسیون و علائم اکسترا پیرامیدال ظاهر شود.

S

بسته بندی: دراژه ۵، ۱۰ و ۲۵ میلی‌گرم × ۱۰۰.
بها: ۵ میلی ۵۰ ریال، ۱۰ میلی ۲۰۰ ریال، ۲۵ میلی ۴۰۰ ریال.

SORIPAL
اسپسیا ـ فرانسه

ترکیب: ماده صناعی ضد التهابی غیراستروئیدی.
موارد استعمال: آرتریت و پلی‌آرتریت، روماتیسم تورمی مزمن، پلی‌-آرتریت روماتوئید، روماتیسم مفصلی و غیرمفصلی، نقرس، دردهای عصبی ـ ماهیچه‌ای، پری آرتریت مثانه، نورالژی، لمباگو.
مقدار مصرف و طرز استعمال: روزی ۴ ـ ۶ کپسول.
موارد منع استعمال: زخم‌معده.
عوارض جانبی: تغییر رنگ ادرار.
بسته بندی: کپسول ۲۵۰ میلی‌گرم × ۳۰.
بها: ۲۲۰ ریال.

SPARINE
وایت ـ آمریکا

ترکیب: کلریدرات ۱۰ ـ (گاما ـ دی متیل آمینو ـ ان ـ پروپیل) فنوتیازین = کلریدرات پرومازین.
اثر متقابل: ۱ ـ از مصرف توأم فنوتیازین ها و محرک‌های سمپاتوتیمیک از دسته آمفتاین بمنظورهای درمانی باید خودداری شود (اثر متضاد دارند). ۲ ـ اثرمتقابل بین باربیتورات ـ فنوتیازین میتواند منجر به‌سقوط فشارخون ایستاده شود ۳ ـ بعد از مصرف کلرپرومازین بدنبال پیپرازین گزارشی در مورد تشنج داده شده است. توصیه میشود بعد از مصرف پیپرازین از فنوتیازین ها استفاده نشود.
موارد استعمال: اختلالات روانی و هیجانی، استفراغ، برای تقویت اثر داروهای ضد درد.
مقدار مصرف و طرز استعمال: روزی ۴ ـ ۶ بار، هربار ۱۰۰ ـ ۲۰۰ میلی‌گرم.
موارد منع استعمال: اغمای ناشی از الکل، باربیتوریک‌ها، تصلب شرائین، ضایعات کرونر.

S

عوارض جانبی: خواب‌آلودگی، فشارخون.

بسته بندی: آمپول (۵۰ میلی‌گرم = ۱ میلی‌لیتر) × ۲ و ۱۰ میلی‌لیتر، قرص ۱۰ و ۲۵ میلی‌گرم × ۵۰.

بها: آمپول ۲ میلی ۴۹ ریال، ۱۰ میلی ۱۸۰ ریال. قرص ۱۰ میلی ۸۰ ریال، ۲۵ میلی ۱۰۸ ریال.

SPASLAR
زیگفرید ـ سویس

ترکیب: در هر آمپول: اتوپروما آلفا ـ آلفا ـ دی سیکلو ـ فنتیل استیک اسید ـ بتا ـ دی اتیل آمینو ـ اتیل استر = اونوسپاستون ۲۰ میلی‌گرم + فنیل ـ دی متیل پیرازولون متیل ـ آمینو متان منیزیم سولفونات = مگنوپیرول ۲۰۰ میلی‌گرم. در هر کپسول بترتیب ۱۵ میلی‌گرم + ۲۵۰ میلی‌گرم.

موارد استعمال: کولیک مجاری صفرا، کله سیستیت، حالات بعد از کله سیستکتومی، اسپاسمهای پاپیلر سیستیت، بلاکوری، پانکرآتیت.

مقدار مصرف و طرز استعمال: ۱ آمپول داخل وریدی یا عضلانی.

بسته بندی: آمپول ۵ میلی‌لیتر × ۵ و ۱۰۰. کپسول × ۴۰ و ۵۰۰.

بها: آمپول ۵ عددی ۱۸۵ ریال، ۱۰۰ عددی ۲۵۰۰ ریال. کپسول ۴۰ عددی ۲۰۰ ریال، ۵۰۰ عددی ۲۰۰۰ ریال.

SPASMO - CIBALGIN
سیبا ـ سویس

ترکیب: در هر قرص: آمینوفنازون ۰/۲۲ گرم + آللوباربیتون ۰/۰۳ گرم + کلریدرات فنیل سیکلوهگزیل استیل ـ دی اتیل آمینواتانول ۰/۰۲ گرم. در هر آمپول: به ترتیب ۰/۲۲ گرم + ۰/۰۳ گرم + ۰/۰۲۵ گرم. شیاف خردسالان به ترتیب ۰/۲۲ گرم + ۰/۰۳ گرم + ۰/۰۱ گرم. شیاف بزرگسالان به‌ترتیب ۰/۴۴ گرم + ۰/۰۶ گرم + ۰/۰۴ گرم.

موارد استعمال: دردهای گوارشی بعلت اسپاسم، اسپاسم و درد بعلت اختلال حرکات مجاری صفراوی، دیسمنوره، سرماخوردگی و زکام، نزله و آنفلوآنزا.

مقدار مصرف و طرز استعمال: خردسالان: برحسب سن روزی ۱ ـ ۳

S

بار، هربار ۰/۵ـ۱ شیاف مخصوص خردسالان. بزرگسالان: بطور متوسط روزی ۲ ـ ۳ بار، هربار ۱ قرص یا ۱ شیاف.

بسته بندی: دراژه × ۲۰۰. آمپول × ۵ و ۱۰۰. شیاف کودکان و بزرگسالان × ۵.

بها: دراژه ۲۰۰ عددی ۸۰۰ ریال. آمپول ۵ عددی ۱۰۰ ریال، ۱۰۰ عددی ۱۷۰۰ ریال. شیاف خردسالان ۴۴ ریال، بزرگسالان ۵۰ ریال.

SPASMO CIBALGINE Comp.
سیبا ـ سویس

ترکیب: در هر قرص: آمینوفنازون ۰/۲۲ گرم + آللوبا ربیتون ۰/۰۳ گرم + فنیل سیکلو هگزیل استیل دی اتیل آمینو ـ اتانول ۰/۰۲۵ گرم + کدئین فسفات ۰/۰۲ گرم.

موارد استعمال: اسپاسم و درد مجاری صفراوی و دستگاه گوارشی، درد دستگاه تناسلی، میگرن، سرماخوردگی، آنفلوانزا.

مقدار مصرف و طرز استعمال: روزی ۲ ـ ۳ بار، هربار ۱ قرص.

بسته بندی: قرص × ۲۰.

بها: ۱۴۰ ریال.

SPASMOCOR-R
رابید ـ اتریش

ترکیب: نیتروگلیسرین ۰/۴ میلی گرم + پنتااریتروتترانیترات ۱۰ میلی گرم + اسید نیکوتینیک ۲۰ میلی گرم + بنزیل فنیل گلیکولات ۴۰ میلی گرم + فنیل اتیل باربیتوریک اسید ۱۵ میلی گرم.

مکانیسم: نیتروگلیسیرین با شل کردن عضلات صاف سویرگها موجب گشادی آنها شده و در نتیجه خون بیشتری به‌عضو مربوطه میرساند.

موارد استعمال: ناراحتی عروق کرونر.

مقدار مصرف و طرز استعمال: هنگام حمله ۱ ـ ۲ قرص. درمان: روزی ۳ بار، هربار ۱ قرص.

بسته بندی: قرص × ۴۰.

بها: ۷۷ ریال.

S

SPASMO - DOLVIRAN
بایر ــ ایران

ترکیب: در هر قرص: اسید دی فنیل کاربامیک (۲ ــ دی اتیل آمینو ــ اتیل) تیواستر ۱۰ میلی‌گرم + سالیسیلامید ۲۰۰ میلی‌گرم + فناستین ۲۰۰ میلی‌گرم + کدئین فسفات ۱۰ میلی‌گرم + کافئین انیدر ۵۰ میلی‌گرم + لومینال ۲۵ میلی‌گرم.

موارد استعمال: درد با منشاء اسپاسم، اسپاسم عضلات صاف مجاری ادراری، قولنج مجاری صفرا، اسپاسم جهاز هاضمه، قاعدگی دردناک.

مقدار مصرف و طرز استعمال: روزی ۳ ـ ۵ بار، هربار یک قرص.

بسته بندی: قرص × ۲۰.

بها: ۷۰ ریال.

SPECILLINE G
اسپسیا ــ فرانسه

ترکیب: سدیم بنزیل پنیسیلین کریستالیزه.

موارد استعمال: کلیه عفونتهای ناشی از ارگانیسم‌های حساس به پنی‌سیلین.

مقدار مصرف و طرز استعمال: برحسب نوع و شدت بیماری متفاوت است.

موارد منع استعمال: حساسیت به پنی‌سیلین.

بسته بندی: ویال استریل حاوی ۲۰۰ هزار، ۱ و ۵ میلیون واحد.

بها: ۲۰۰ هزار ۹ ریال، ۱ میلیون ۱۲ ریال، ۵ میلیون ۳۴ ریال.

S - P - K
مینا ــ ایران

ترکیب: در هر قرص: سولفاسوکسیدین ۳۰۰ میلی‌گرم + پکتین ۲۵ میلی‌گرم + کائولن ۵۰ میلی‌گرم، در هر ۱۰۰ میلی‌لیتر: سولفاسوکسیدین ۱۰ گرم + اکسید پارگوریک ۱/۵ گرم + پکتین ۱ گرم + کائولن ۱۰ گرم.

موارد استعمال: اسهال‌های ویروسی و میکربی.

مقدار مصرف و طرز استعمال: روزی ۳ بار، هربار ۲ قاشق غذاخوری
قرص: هر ۴ ــ ۶ ساعت یکعدد.

موارد منع استعمال: ناراحتیهای پیشرفته کلیه.

احتیاط و عوارض جانبی: بعلت داشتن الکسیر پارگوریک مصرف آن

بایستی در کودکان با احتیاط همراه باشد.
بسته بندی: شربت ۶۰ میلی‌لیتر. قرص × ۲۰۰.
بها: شربت ۵۳ ریال. قرص ۳۵۱ ریال.

SPOROSTACIN CREAM
ارتو ـ انگلستان

ترکیب: ۵ ـ (۱ ـ اتیل پنتیل) ـ ۳ ـ (تری کلرو- متیل تیو) ـ هیدانتوئین = کلرودانتوئین ۱ درصد + بنزالکونیوم- کلراید ۰/۰۵ درصد.
موارد استعمال: درمان مونیلیا (کاندیدا آلبیکانس)، ترشحات خشک و برفی شکل واژن و التهاب لبهای خارجی (برفک واژن)، خارشهای قارچی در دوره بارداری، خارشهای قارچی در زنانی که قرص ضدآبستنی مصرف میکنند.
مقدار مصرف و طرز استعمال: روزی ۲ بار، هربار یک آپلیکاتور پر از کرم استفاده شود.
بسته بندی: کرم واژینال ۹۵ گرم همراه با آپلیکاتور.
بها: ۲۰۷ ریال.

STELABID
STELABID FORTE
اسکا اف ـ انگلستان

ترکیب: اسکازینا ۱ میلی‌گرم + ایزوپروپامید آیداید ۵ میلی‌گرم. فورت: به‌ترتیب: ۲ میلی‌گرم + ۷/۵ میلی‌گرم.
موارد استعمال: زخم معده، هیپرپریستالتیسم، تحریک پذیری پیلورودئودونال، کولون اسپاستیک یا تحریک پذیر، اسهالهای فونکسیونل، کولیت اولسراتیو.
مقدار مصرف و طرز استعمال: روزی ۲ ـ ۳ بار، هربار ۱ قرص. فورت: هر ۱۲ ساعت ۱ قرص.
موارد منع استعمال: گلوکوم، انسداد پیلور، هیپرتروفی پروستات، حساسیت به‌ید.
احتیاط: زنان آبستن.
عوارض جانبی: تاری دید، خشکی دهان، یبوست، احتباس ادرار.
بسته بندی: دراژه × ۳۰.
بها: ۲۱۶ ریال. فورت ۲۴۰ ریال.

STELLISEPT
فابریک ـ آلمان

ترکیب: ارتوفنیل فنل + مواد پاک کننده و محافظ.
موارد استعمال: ضدعفونی و شستشوی دستها و پوست، مخاطهای بیرون مانند دوش واژینال، شستشوی زخم و تاول.
مقدار مصرف و طرز استعمال: چند قطره با کمی آب مخلوط کرده شستشو دهند.
عوارض جانبی: گاهی حساسیت.
بسته بندی: محلول ۱۰۰۰ میلی لیتر.
بها: ۶۸۷ ریال.

STERANABOL
فارمیتالیا ـ ایتالیا

ترکیب: در هر آمپول ۲ میلی لیتر: ۴ ـ ئیدرُوکسی ـ ۱۹ ـ نورتستوسترون ـ ۱۷ سیکلوپنتیل پروپیونات در محلول روغنی.
موارد استعمال: ضعف، بدی تغذیه، بی‌اشتهایی، ترمیم زخمها و شکستگی ها.
مقدار مصرف و طرز استعمال: بزرگسالان: هر دوهفته ۱ آمپول عضلانی
موارد منع استعمال: سرطان پروستات.
عوارض جانبی: اثرات آندروژنیک.
بسته بندی: آمپول ۲۵ میلی‌گرم = ۲ میلی‌لیتر × ۲.
بها: ۲۰۰ ریال.

STERIFLEX
آلن هانبوریز
انگلستان ـ
داروپخش ایران

S

ترکیب: استریفلکس شماره ۱: سرم فیزیولوژی، شماره ۲: ۰/۳۳ درصد کلرورسدیم + ۳/۳۳ درصد دکستروز، شماره ۳: دکستروز ۵ درصد در محلول نمکی نرمال، شماره ۴: دکستروز ۱۰ درصد در محلول نمکی نرمال، شماره ۶: دکستروز ۵ درصد تزریقی، شماره ۷: دکستروز ۱۰ درصد، شماره ۹: محلول رینگر، شماره ۱۰: محلول دارو، شماره ۱۸: کلرور سدیم ۰/۱۸ درصد + دکستروز ۴/۳ درصد.
موارد استعمال: اسهال، استفراغ شدید، فیستول صفراوی یا لوزالمعده، ایلئوکتومی، آسپیراسیون مداوم معدی ـ روده‌ای، سوختگی شدید، هیپرناترمی، آنوری.

بسته‌بندی: کیسه‌های ۵۰۰ و ۱۰۰۰ میلی‌لیتر.
بها: ۵۰۰ میلی ۷۴ ریال، ۱۰۰۰ میلی ۸۵ ریال.

STERILLIUM
فابریک-آلمان

ترکیب: پروپیلول - ایزوپروپیلول + آمونیوم ۴ ظرفیتی.
موارد استعمال: ضدعفونی بمنظور اعمال جراحی و بهداشتی بدون آب و صابون.
مقدار مصرف و طرز استعمال: ۵ میلی‌لیتر بمدت ۵ دقیقه برای ضدعفونی دستها: ۲ میلی‌لیتر بمدت ۳۰ ثانیه.
عوارض جانبی: گاهی حساسیت.
بسته‌بندی: محلول ۵۰۰ میلی‌لیتر.
بها: ۴۱۹ ریال.

STEROSAN
گایگی-سویس

ترکیب: ۵ و ۷ - دی کلر - ۸ - ئیدروکسی کینالدین = ۵ و ۷ دی کلرو - ۲ - متیل - ۸ - کینالدینول = کلرکینالدول ۵ درصد.
موارد استعمال: آنتی سپتیک و ضد قارچ.
مقدار مصرف و طرز استعمال: روی زخم یک طبقه نازک از پماد و یا خمیر بمالند.
احتیاط: دارو نباید با چشمها تماس پیدا کند.
بسته‌بندی: پماد ۳۰ گرم. خمیر ۲۰ گرم.
بها: پماد ۵۸ ریال. خمیر ۳۷ ریال.

STEROSAN - HYDROCORTISONE
گایگی-سویس

ترکیب: کرم: ۵ و ۷ - دی کلر - ۸ - ئیدروکسی کینالدین = کلرکینالدول ۳ درصد + ئیدروکورتیزون ۱ درصد.
موارد استعمال: بیماریهای اکزمایی، درمو اپی درمیت، اکزمای حاد و فوق حاد، بیماریهای جلدی قارچی.
مقدار مصرف و طرز استعمال: روزی ۲ - ۳ بار روی موضع می‌مالند.
بسته‌بندی: کرم ۵ گرم.
بها: ۷۳ ریال.

STOVARSOL
اسپسیا ـ فرانسه

ترکیب: ۳ ـ استامید و ۴ ـ ئیدروکسی فنیل آرسونیک اسید = استارسول ۲۵۰ میلی‌گرم.
موارد استعمال: آمیباز حاد و مزمن، کولیت و آنتروکولیت، کولیتهای ناشی از دیسانتری، لامبلیاز، سیفلیس، پیوره آلوئودنتال، لیخن پلان.
مقدار مصرف و طرز استعمال: روزی ۰/۵ ـ ۱ گرم.
موارد منع استعمال: نارسائیهای کبدی و کلیوی.
بسته بندی: قرص × ۱۰۰.
بها: ۹۱ ریال.

STREPSILS
بوتس انگلستان ـ
پارس ایران

ترکیب: ۲ و ۴ ـ دی کلروبنزیل الکل = دای‌نبال ۱/۲ میلی‌گرم + امیل ـ متا ـ کرزول = آ ام ث ۰/۶ میلی‌گرم.
موارد استعمال: درمان و جلوگیری از عفونتهای گلو و دهان.
مقدار مصرف و طرز استعمال: هر ۴ ساعت یک قرص مکیده شود
بسته بندی: قرص × ۲۴.
بها: ۴۱ ریال.

STREPTOMAGMA
وایت ـ آمریکا

ترکیب: در هر ۲۰ میلی‌لیتر شربت: دی ئیدرواستر- پتومایسین ۳۰۰ میلی‌گرم + کائولن ۳ گرم + پکتین ۰/۲۷ گرم + ژل اکسیدآلومینیوم ۱۰/۸ گرم.
موارد استعمال: انواع اسهالهای غیر اختصاصی و میکربی.
مقدار مصرف و طرز استعمال: روزی ۳ ـ ۴ بار، هربار ۱ قرص.
عوارض جانبی: مصرف مقدار زیاد دارو باعث یبوست میشود.
بسته بندی: شربت ۹۰ میلی‌لیتر.
بها: ۱۳۵ ریال.

STREPTOMYCIN
اسکوئیب آمریکا ـ
ایران

ترکیب: سولفات استرپتومایسین.
موارد استعمال: عفونت‌های ناشی از باسیل کخ، باسیل سوبتیلیس، باسیل سیاه زخم، باسیل پیوسیانیک، کولی باسیل، باسیل دیفتری

باسیل جذام، هموفیلوس آنفلوآنزا، بروسلا آبورتوس، بروسلاتو-
لارنسیس، طاعون، تولارمی، گونوکک، مننگوکک، شیگلا.
مقدار مصرف و طرز استعمال: بزرگسالان: روزی یک آمپول. خردسالان:
روزی ۵۰ میلی‌گرم برای هر کیلوگرم وزن بدن.
موارد منع استعمال: حساسیت بدارو.
عوارض جانبی: در مصرف طولانی ممکن است ایجاد اختلال تعادل و
سرگیجه و اثر روی عصب شنوائی کند که با قطع دارو در
مراحل اول درمان از بین میرود.
بسته بندی: ویال ۱ گرم.
بها: هر عدد ۱۵ ریال.

STREPTOMYCIN SULPHATE

هوخست-آلمان

ترکیب: سولفات استرپتومایسین ۱ گرم.
موارد استعمال: درمان سل و کلیه عفونت‌های حاصل از ژرم‌های
حساس به‌استرپتومایسین.
مقدار مصرف و طرز استعمال: روزی ۱ـ۲ آمپول داخل عضله.
موارد منع استعمال: نارسائی حاد کلیه و آسیب های قبلی عصب شنوائی
بسته بندی: ویال ۱ گرم × ۱۰۰.
بها: هر عدد ۱۰ ریال.

STYPTANON

ارگانون-هلند

ترکیب: سوکسینات استریول ۲۰ میلی‌گرم.
موارد استعمال: پیشگیری و درمان خونریزی‌های منتشر مویرگی، در
کلیه اعمال جراحی، پروستاتکتومی، آمیگدالکتومی.
مقدار مصرف و طرز استعمال: روزی ۱ـ۲ آمپول وریدی یا عضلانی.
موارد منع استعمال: تومورهای تحت اثر استروژن.
احتیاط: نباید با مایعات تزریقی اسیدی مخلوط گردد.
بسته بندی: ویال ۲۰ میلی‌گرم + حلال ۲ میلی‌لیتر.
بها: ۱۶۰ ریال.

S

STYPTOBION
مرك آلمان ـ ایران

ترکیب: در هر قرص: ویتامین C ۱۰۰ میلی‌گرم + ویتامین P ۱۰۰ میلی‌گرم + ویتامین K_4 ۲۰ میلی‌گرم. در هر آمپول ۲ میلی‌لیتر: ویتامین C ۱۰۰ میلی‌گرم + ویتامین P ۲۰۰ میلی‌گرم + ویتامین K_4 ۲۰ میلی‌گرم.

موارد استعمال: پیشگیری و درمان خونریزی قبل و بعد از اعمال جراحی، درمان قبلی جراحی دندان، خونریزی پوست و غشاء-های مخاطی، خونریزی‌های ناشی از مسمومیت و عفونت، خونریزیهای بیماریهای زنان.

مقدار مصرف و طرز استعمال: خردسالان: روزی ۱ ـ ۳ قرص. بزرگسالان: روزی ۳ بار، هربار ۱ ـ ۲ قرص درکمی مایع حل کرده میل شود. آمپول: برحسب مورد بیماری روزی ۱ ـ ۳ عدد داخل وریدی یا عضلانی.

بسته‌بندی: قرص × ۱۰۰. آمپول × ۳.

بها: قرص ۳۳۴ ریال. آمپول ۶۰ ریال.

SUCARYL
ابوت ـ آمریکا

ترکیب: در هر قرص: ساخارین (بصورت ساخارین سدیم) ۱۲/۱ میلی‌گرم + گلوکونات سدیم + اسید تارتریک + بی کربنات سدیم + بنزوات سدیم + سیترات سدیم.

موارد استعمال: قند بدون کالری که در افراد دیابتی و افراد چاق استفاده میشود.

مقدار مصرف و طرز استعمال: هر قرص معادل یک قاشق چایخوری شکر.

بسته‌بندی: قرص × ۱۰۰.

بها: ۳۲ ریال.

SUCCINYL
آستا ـ آلمان

ترکیب: دی کلرور سوکسینیل کولین.

موارد استعمال: لوله‌گذاری، اندوسکوپی (مخصوصاً برونکوسکوپی)، آزمایشهای ژینکولوژی.

مقدار مصرف و طرز استعمال: برحسب نوع بیماری‌ها و وزن بدن بیمار

S

متفاوت است.

موارد منع استعمال: در مواردی که باعث کاهش کولین استراز میشود.

بسته‌بندی: آمپول ۱۰۰ میلی‌گرم × ۱، ۵۰۰ میلی‌گرم × ۱۰، ۱۰۰۰ میلی‌گرم × ۱.

بها: ۱۰۰ میلی ۱۴۵ ریال، ۵۰۰ میلی ۱۲۹۰ ریال، ۱۰۰۰ میلی ۲۵۵۰ ریال.

SULFA BLUE

پ او اس فرانسه ـ دوپار ایران

ترکیب: در هر ۱۰۰ میلی‌لیتر: سولفاستامید سدیم ۱۰ گرم + بلودومتیلن ۰/۰۱ گرم.

موارد استعمال: کونژونکتیویت، تراخم، کراتیت، اولسرهای قرنیه.

مقدار مصرف و طرز استعمال: روزی چند بار، هربار ۲ ـ ۳ قطره در چشم می‌چکانند.

بسته‌بندی: قطره ۱۰ میلی‌لیتر:

بها: ۴۷ ریال.

SULFACETAMIDE

پ او اس فرانسه ـ دوپار ایران

ترکیب: سولفاستامید سدیم.

موارد استعمال: قبل و بعد از عمل جراحی چشم، پیشگیری از عفونتهای چشمی، کونژو نکتیویت ها، اولسرهای قرنیه، بلفاریت، گل مژه، خراشهای قرنیه و ملتحمه.

مقدار مصرف و طرز استعمال: هر ۱ ـ ۲ ساعت ۲ ـ ۳ قطره در چشم می‌چکانند.

بسته‌بندی: قطره چشمی ۲۰ درصد و ۳۰ درصد ۱۰ میلی‌لیتر.

بها: ۲۰ درصد ۳۲ ریال، ۳۰ درصد ۳۵ ریال.

S

SULFACETAMIDE Chibret

شیبره ـ فرانسه

ترکیب: سولفاستامید سدیم.

موارد استعمال: کونژونکتیویت، بلفاریت، کراتیت، پیشگیری از عفونتهای چشمی.

مقدار مصرف و طرز استعمال: روزی ۳ ـ ۶ بار، هربار ۱ ـ ۲ قطره در هر چشم می‌چکانند.

بسته بندی: قطره ۲۵ درصد، ۱۰ میلی‌لیتر.
بها: ۳۵ ریال.

SULFADERM
میسین ـ ایران

ترکیب: در هرگرم پماد: سولفات نئومایسین ۵ میلی‌گرم + باسی‌تراسین ۱۰ میلی‌گرم.
موارد استعمال: انواع زخمها، سوختگی‌ها، عفونت‌های پوستی.
مقدار مصرف و طرز استعمال: روزی ۲ بار روی زخم میمالند.
بسته بندی: پماد ۲۰ گرم.
بها: ۴۴ ریال.

SULFAMYCINE Ointment
میسین ـ ایران

ترکیب: در هرگرم: نئومایسین باز ۳/۵ میلی‌گرم.
موارد استعمال: زخمهای عفونی، زرد زخم، سوختگیها، بریدگیها و سایر عفونت‌های جلدی واژینیت، ختنه، جراحی‌ها.
مقدار مصرف و طرز استعمال: روزی ۲ بار روی زخم می‌مالند.
بسته بندی: پماد ۲۰ گرم.
بها: ۴۰ ریال.

SULFAMYCINE Powder
میسین ـ ایران

ترکیب: نئومایسین سولفات ۵/۴۷ میلی‌گرم + باسی تراسین زنک ۴/۰۳ میلی‌گرم.
موارد استعمال: زخمهای عفونی، زرد زخم، سوختگی، بریدگی، عفونتهای جلدی، ختنه، جراحی.
مقدار مصرف و طرز استعمال: روزی ۲ بار روی زخم بمالند.
بسته بندی: پودر ۲۵ گرم.
بها: ۴۳ ریال.

S

SULFARILLA
تولیدارو ـ ایران

ترکیب: در هر ۱۵ میلی‌لیتر: سوکسینیل سولفاتیازول ۱/۵ گرم + کائولن ۱/۵ گرم + پکتین ۰/۱۵ گرم + ساکارین سدیم ۰/۰۱۵ گرم.

SULFASALAZINE
ساوافارم ـ ایران

ترکیب: در هر قرص: ۵ ـ [پارا ـ (۲ ـ پیریدیل ـ سولفاموئیل) فینل آزو] سالی سیلیک اسید ـ سالیسیل آزوسولفا ـ پیریدین ـ سولفاسالازین ۵۰۰ میلی‌گرم.

موارد استعمال: کولیت اولسروز، آنتریت رژیونال، کولیت‌های غیر ـ اختصاصی و اسهالهای مزمن.

مقدار مصرف و طرز استعمال: شروع درمان: خردسالان: روزی ۴۰ ـ ۶۰ میلی‌گرم بازاء هر کیلو وزن بدن منقسم به۶ دوز. بزرگسالان: روزی ۳ ـ ۴ گرم به‌مقادیر منقسم. ادامه درمان: خردسالان روزی ۳۰ میلی‌گرم بازاء هر کیلو وزن بدن منقسم به ۴ دوز. بزرگسالان روزی ۲ گرم.

موارد منع استعمال: حساسیت به‌سولفونامیدها یا آسپیرین، کودکان کوچکتر از ۲ سال، آبستنی و شیردهی، پورفیری.

عوارض جانبی: آنورکسی، تهوع، استفراغ، ناراحتیهای گوارشی

بسته‌بندی: جعبه ۱۰۰ عددی.

بها: ۵۷۵ ریال.

SULFATE DE PROTAMINE
شوئه ـ فرانسه

ترکیب: در هر میلی‌لیتر: سولفات روی ۱۰ میلی‌گرم.

موارد استعمال: بعنوان آنتی دوت هپارین.

مقدار مصرف و طرز استعمال: برای خنثی نمودن هر ۱۰۰۰ واحد هپارین که آخرین بار تجویز شده ۱ میلی‌لیتر داخل ورید تزریق می‌شود.

بسته‌بندی: فلاکن ۱۰ میلی‌لیتر × ۱.

بها: ۷۳ ریال.

SULFAT DE ZINC + PROCAINE
پ. او. اس فرانسه ـ دوپار ایران

ترکیب: در هر ۱۰۰ میلی‌لیتر: سولفات روی ۰/۵ گرم + کلریدرات پروکائین ۰/۲ گرم.

موارد استعمال: کونژونکتیویت‌ها، پتریژیون، ضایعات عفونی و هرپس قرنیه، اسکلریت‌ها، بلفاریت.

موارد استعمال: اسهال خونی، اسهال نوزادان و کودکان، اسهالهای کلی باسیلی، اسهالهای تابستانی، بیماری وبا.

مقدار مصرف و طرز استعمال: بزرگسالان: روزی ۴ بار، هربار ۱ـ۲ قاشق غذاخوری، خردسالان: روزی ۴ بار، هربار ۱ـ۲ قاشق غذاخوری.

احتیاط: سوسپانسیون را باید قبل از مصرف بخوبی تکان داد.

بسته بندی: سوسپانسیون ۱۲۰ میلی‌لیتر.

بها: ۶۴ ریال.

SULFARLEM
لاتماـفرانسه

ترکیب: در هر بسته تری تیوپارامتوکسی فنیل پروپن = آنه‌تول- تری تیون ۱۲/۵ میلی‌گرم معادل ۴ درصد گوگرد فعال.

موارد استعمال: هپاتیت، سندروم خشکی دهان، بیماریهای کیسه‌صفرا، هیپرکلسترولمی، نارسائی کلیوی.

مقدار مصرف و طرز استعمال: بزرگسالان: روزی ۴ـ۶ گرانول قبل از هر غذا. ۱۰ ـ ۱۵ سال: روزی ۲ ـ۳ گرانول قبل از هر غذا. ۵ـ ۱۰ سال: روزی ۱ گرانول صبح ناشتا.

بسته بندی: گرانول × ۶۰.

بها: ۶۰ ریال.

SULFARLEM CHOLINE
لاتماـفرانسه

ترکیب: در هر دراژه: آنه‌تول‌تری‌تیون ۵۰۰ گرم + بی‌تارترات کولین ۳۰۰ میلی‌گرم.

موارد استعمال: بیماریهای کبدی و صفراوی ـ هیپرکلسترولمی، آرتریو- اسکلروز، آلرژی داروئی و کبدی.

مقدار مصرف و طرز استعمال: بزرگسالان: روزی ۲ ـ ۴ دراژه قبل از غذا، ۱۰ ـ۱۵ سال: روزی ۲ ـ۶ دراژه قبل از غذا، ۵ـ ۱۰ سال: روزی ۱ ـ۳ دراژه قبل از غذا.

بسته بندی: دراژه × ۶۰.

بها: ۷۴ ریال.

مقدار مصرف و طرز استعمال: روزی ۲ ـ ۳ بار، هربار ۱ ـ ۲ قطره در چشم می‌چکانند.

بسته‌بندی: قطره چشمی ۱۰ میلی‌لیتر.

بها: ۴۱ ریال.

SULTRIN CREAM

ارتو ـ انگلستان

ترکیب: سولفاتیازول ۳/۴۲ درصد + سولفاستامید ۲/۸۶ درصد + ان ـ بنزوئیل سولفانیلامید ۳/۷۱ درصد + اوره ۰/۶۴۱ درصد.

موارد استعمال: واژینیتهای غیراختصاصی، واژینیتهای میکس و سرویسیت، واژینیت اولسراتیو، مواظبتهای بعد از زایمان، آماده کردن بیمار قبل ازگذاشتن آی. یو. دی یا قبل از هر عمل جراحی درواژن.

مقدار مصرف و طرز استعمال: روزی ۲ آپلیکاتور بمدت ۱۰ روز استعمال شود.

بسته‌بندی: کرم واژینال ۷۸ گرم همراه با آپلیکاتور.

بها: ۱۶۸ ریال.

SULTRIN TABLET

ارتو ـ انگلستان

ترکیب: سولفاتیازول ۱۷۱ میلی‌گرم + سولفاستامید ۱۴۳ میلی‌گرم + N_1 بنزوئیل‌سولفانیلامید ۱۸۵ میلی‌گرم + اوره ۱۳ میلی‌گرم.

موارد استعمال: واژینیتهای غیراختصاصی، واژینیتهای میکس وسرویسیت، واژینیت اولسراتیو.

مقدار مصرف و طرز استعمال: روزی ۲ قرص بمدت ۱۰ روز استعمال شود.

بسته‌بندی: قرص واژینال × ۲۰ همراه با آپلیکاتور.

بها: ۱۵۵ ریال.

SUMYCIN

اسکوئیب آمریکا ـ ایران

ترکیب: تتراسیکلین.

اثر متقابل: با داروهای حاوی املاح معدنی آلومینیم، منیزیم و

S

کلسیم نباید مصرف شود.
موارد استعمال: کوکسی های گرم مثبت و منفی، باسیل های گرم مثبت و منفی، عفونت‌های اسپیروکتی، عفونت‌های ریکتزیـائـی، ویروس های درشت، پروتوزوئرها، پاستورلا ها.
مقدار مصرف و طرز استعمال: بزرگسالان: روزی ۲ کپسول ۵۰۰ یا ۴ کپسول ۲۵۰ میلی. خردسالان: روزی ۲۰ ـ ۴۰ میلی‌گرم برای هر کیلو وزن بدن.
موارد منع استعمال: زنان آبستن، حساسیت به‌تتراسیکلین.
احتیاط و عوارض جانبی: سندرم فانکونی.
بسته‌بندی: کپسول ۲۵۰ میلی‌گرم × ۱۰۰. کپسول ۵۰۰ میلی‌گرم × ۵۰. قطره ۱۰ میلی‌لیتر. شربت ۶۰ میلی‌لیتر.
بها: کپسول ۵۰۰ میلی هر عدد ۱۲ ریال، ۲۵۰ میلی ۷ ریال. شربت ۸۸ ریال، قطره ۶۶ ریال.

SUPERLEVURE
گاری لرد ـ فرانسه

ترکیب: قرص گلوسید ۳۲/۷ درصد + پروتید ۴۴/۶ درصد + لیپید ۵/۲ درصد + ویتامین B_1 ۲ میلی‌گرم درصد + ویتامین B_2 ۲ میلی‌گرم درصد + ویتامین PP ۳۲ میلی‌گرم درصد. گرد: پروتئین ۴۸ گرم + گلوسید ۳۲ گرم + لیپید ۶ گرم + ویتامین B_1 ۳ میلی-گرم + ویتامین B_2 ۲ میلی‌گرم + ویتامین PP ۳۲ میلی‌گرم.
موارد استعمال: سستی، بیحالی، ضعف، دوران نقاهت، آکنه، غـرور جوانی.
مقدار مصرف و طرز استعمال: بزرگسالان: روزی ۸ ـ ۱۲ قرص. خردسالان: ۴ ـ ۶ قرص.
بسته‌بندی: قرص × ۲۰۰. گرد ۱۵۰ گرم.
بها: قرص ۱۲۸ ریال. گرد ۲۲۸ ریال.

SUPRADYN
روش ـ سویس

ترکیب: در هر کپسول: ویتامین A ۲۵ هزار واحد + ویتامین B_1 ۲۰ میلی‌گرم + ویتامین B_2 ۵ میلی‌گرم + نیکوتینامید ۵۰ میلی‌گرم + ویتامین B_6 ۱۰ میلی‌گرم + پانتنول ۱۰ میلی‌گرم + بیـوتیـن

(ویتامین H) ۰/۲۵ میلی‌گرم + ویتامین B_{12} ۵ گاما + ویتامین C ۱۵۰ میلی‌گرم + ویتامین D هزار واحد + ویتامین E ۱۰ میلی‌گرم + کلسیم ۴۳۵ میلی‌گرم + آهن ۱۰ میلی‌گرم + منیزیم ۳۶/۵ میلی‌گرم + منگنز ۲/۰۵ میلی‌گرم + فسفر ۷۷/۴ میلی‌گرم + مس ۳/۹ میلی‌گرم + روی ۳/۳ میلی‌گرم + مولیبدن ۰/۲۵ میلی‌گرم + کبالت ۰/۴۷ میلی‌گرم + بور ۰/۸۸ میلی‌گرم، در هر قرص جوشان: ویتامین A ۲۵ هزار واحد + ویتامین B_1 ۲۰ میلی‌گرم + ویتامین B_2 ۵ میلی‌گرم + نیکوتینامید ۵۰ میلی‌گرم + ویتامین B_6 ۱۰ میلی‌گرم + پانتوتنات کلسیم ۱۱/۶ میلی‌گرم + بیوتین ۰/۲۵ میلی‌گرم + ویتامین B_{12} ۵ گاما + ویتامین C ۱۵۰ میلی‌گرم + ویتامین D ۵۰۰ واحد + ویتامین E ۱۰ میلی‌گرم + کلسیم ۲۶۲ میلی‌گرم + آهن ۱۲/۵ میلی‌گرم + منیزیم ۴۰ میلی‌گرم + منگنز ۲/۰۵ میلی‌گرم + فسفر ۴۵ میلی‌گرم + مس ۰/۳۹ میلی‌گرم + روی ۲/۳ میلی‌گرم + مولیبدن ۰/۲۵ میلی‌گرم + کبالت ۰/۴۷ میلی‌گرم + بور ۰/۸۸ میلی‌گرم.

اثر متقابل: بدلیل داشتن یون‌های منیزیم و کلسیم همزمان با تتراسیکلین ها نباید مصرف شود.

موارد استعمال: کمبود ویتامین و املاح در بیماریهای حاد و مزمن، درمان استحفاظی بدن در دوران نقاهت، بارداری، شیردهی، یائسگی.

مقدار مصرف و طرز استعمال: روزی ۱ کپسول و یا ۱ قرص جوشان را در یک لیوان آب حل کرده میل میکنند.

بسته بندی: کپسول و قرص جوشان × ۱۰.

بها: کپسول ۱۴۰ ریال. قرص ۱۵۰ ریال.

S

SURIN
ماکسون آمریکا ـ
تولیدارو ایران

ترکیب: در ۱۰۰ گرم سالیسیلات متیل ۱۱/۴ گرم + مانتول ۲/۸۵ گرم + کامفر ۴/۷۵ گرم + کلرومتاکولین ۰/۲۵ گرم.

موارد استعمال: دردهای عضلانی ـ روماتیسمی درد و التهاب مفاصل.

مقدار مصرف و طرز استعمال: پس ازگرم نمودن موضع مقدارکمی پماد

روی پوست گذارده و مالش می‌دهند.
بسته بندی: پماد ۲۸/۵ گرم.
بها: ۳۵ ریال.

SURMONTIL
اسپسیا ـ فرانسه

ترکیب: ۵ ـ (۳ ـ دی متیل آمینو ۲ ـ متیل پروپیل) ایمینودی ـ بنزیل = تریمیپرایمین.
موارد استعمال: دپرسیون، دپرسیون آتی‌پیک و نوروتیک، دپرسیونهای غیرملانکولی، درمان علامتی، دردهای انعکاسی.
مقدار مصرف و طرز استعمال: شروع درمان: روزی ۷۵ ـ ۱۰۰ میلی‌گرم دوره درمان: ۱۵۰ ـ ۳۰۰ میلی‌گرم روزی ۲ ـ ۳ بار.
موارد منع استعمال: آرتریو اسکلروز، الکلیسم، گلوکوم.
احتیاط: در بیماران حساس و پیر باید مقدار کم مصرف شود.
بسته‌بندی: قرص ۲۵ میلی‌گرم × ۵۰. قرص ۱۰۰ میلی‌گرم × ۲۰. قطره ۴ درصد ۳۰ میلی‌لیتر. آمپول ۲۵ میلی‌گرم = ۲ میلی‌لیتر × ۱۰.
بها: قرص ۲۵ میلی ۲۱۰ ریال، ۱۰۰ میلی ۲۹۴ ریال. قطره ۲۲۲ ریال. آمپول ۱۲۷ ریال.

SUSTANON
ارگانون هلند ـ ایران

ترکیب: ۲۵۰ میلی: پروپیونات تستوسترون ۳۰ میلی‌گرم + فنیل پروپیونات تستوسترون ۶۰ میلی‌گرم + ایزو کاپروات تستوسترون ۶۰ میلی‌گرم + دکانوات تستوسترون ۱۰۰ میلی‌گرم ۱۰۰ میلی: به‌ترتیب ۲۰ میلی‌گرم + ۴۰ میلی‌گرم + ۴۰ میلی‌گرم.
موارد استعمال: خواجگی، نارسائی جنسی در اثر کار نکردن بیضه‌ها، عظم پروستات، مواقعیکه یک ضداستروژن قوی مورد نظر باشد.
مقدار مصرف و طرز استعمال: ۱۰۰ میلی: هر ۱۵ روز یک تزریق عضلانی ۲۵۰ میلی: هر ۳۰ روز یک تزریق عضلانی.
موارد منع استعمال: سرطان پرستات، زنان آبستن.
بسته‌بندی: آمپول ۱۰۰ و ۲۵۰ میلی‌گرم × ۱.

S

بها: ۱۰۰ میلی ۱۰۰ ریال، ۲۵۰ میلی ۱۸۷ ریال.

SWEETEX
بوتس ـ انگلستان

ترکیب: سدیم ـ ۲ ـ سولفو بنزوئیک ایمید ـ ساخارین سدیم ۱۳ میلی‌گرم.
موارد استعمال: ماده قندی جایگزینی قند بیماران دیابتی و اشخاصی که رژیم دارند.
مقدار مصرف و طرز استعمال: هر قرص برابر یک قاشق مرباخوری شکر است.
عوارض جانبی: مقدار زیاد حدود یک‌گرم در روز بمدت طولانی باعث بروز ناراحتی‌های گوارشی می‌شود.
بسته‌بندی: قرص × ۵۰۰.
بها: ۵۰ ریال.

SYBRON
پارك دیویس آمریکا ـ ایران

ترکیب: در هر ۱۰ میلی‌لیتر: ۵۵ میلی‌گرم آهن بصورت ملح سدیم ایرون ادتات ۵۵ میلی‌گرم.
موارد استعمال: کم‌خونی ناشی از کمبود آهن، برای نوزادان، کودکان، زنان باردار، زنان شیرده، سالمندان.
مقدار مصرف و طرز استعمال: اطفال و نوزادان نارس: روزی ۲ بار، هربار نصف قاشق مرباخوری. خردسالان: روزی ۲ بار، هربار نصف تا یک قاشق مرباخوری. بزرگسالان: روزی ۳ بار، هربار ۱ ـ ۲ قاشق مرباخوری.
بسته‌بندی: شربت ۱۲۰ میلی‌لیتر.
بها: ۸۲ ریال.

S

SYMMETREL
گایگی ـ سویس

ترکیب: در هر کپسول: کلریدرات ۱ ـ آدامانتانامین ـ آمانتادین ۱۰۰ میلی‌گرم.
موارد استعمال: پارکینسون، پیشگیری از بیماریهای عفونی، ویروسی.
مقدار مصرف و طرز استعمال: خردسالان: روزی ۱ کپسول، بزرگسالان: روزی ۲ کپسول.

موارد منع استعمال: حالات توهم، صرع، بهت روانی، بیماریهای کلیوی و کبدی پیشرفته.
بسته‌بندی: کپسول × ۶۰.
بها: ۷۵۰ ریال.

SYMPATHYL
شانترو-فرانسه

ترکیب: قطره: عصاره کراتاگوس ۰/۲۴ گرم + فنوباربیتال ۰/۴ گرم + عصاره بولدو ۰/۴ گرم + هگزامتیلن ترامین ۲/۴ گرم + پپتون ۰/۵ گرم + اکسیپیان ۲۵ گرم. در هر قرص: عصاره کراتاگوس ۰/۰۶ گرم + عصاره بولدو ۰/۰۱ گرم + هگزامتیلن - ترامین ۰/۶ گرم + فنوباربیتال ۰/۰۱ گرم + پپتون ۰/۰۲ گرم.
موارد استعمال: بیخوابی، تحریکات و حالات عصبی، استفراغ نوزادان، سیاه‌سرفه، اختلالات نورووژتاتیف.
مقدار مصرف و طرز استعمال: روزی ۳ بار، هربار ۱۰ ـ ۲۰ قطره، حداکثر ۱۰۰ قطره در روز. روزی ۳ ـ ۸ قرص.
بسته‌بندی: قطره خوراکی ۲۵ گرم، قرص × ۲۰.
بها: قطره ۵۵ ریال. قرص ۵۰ ریال.

SYMPATOCARD
بهرینگر اینگلهایم
آلمان - تولیدارو
ایران

ترکیب: ۱ - (۴ - هیدروکسی فنیل) - ۲ - متیل آمینو- اتانول تارترات = سینفرین تارتارات + کاردیازول.
موارد استعمال: نارسائی دستگاه گردش خون و خستگی‌های ناشی از اختلالات قلبی عروقی که در اثر آنفلوانزا، تیفوس، اعمال جراحی و زایمان بوجود آمده‌اند.
مقدار مصرف و طرز استعمال: بزرگسالان: روزی ۳ بار، هربار ۲۰ قطره نیمساعت قبل از غذا. خردسالان: روزی ۳ بار، هربار ۵ تا ۲۰ قطره به‌نسبت سن.
بسته‌بندی: قطره ۱۵ میلی‌لیتر.
بها: ۵۹ ریال.

S

SYMPTOL

بهرینگر اینگلهایم
آلمان ـ تولیدارو
ایران

ترکیب: ۱ ـ (۴ ـ هیدروکسی فنیل) ـ ۲ ـ متیل آمینو اتانول تارترات ـ سینفرین تارتارات.

موارد استعمال: کلیه موارد هیپوتانسیون، ضعف دستگاه گردش خون، متعاقب بیماری‌های عفونی، تقویت گردش خون در انفارکتوس حاد، زایمان، اعمال جراحی، بستری بودن طولانی، درمان نارسائی قلب توأم و یا در فواصل درمان با دیژیتال، آنژین دوپواترین و آریتمی‌های قلب، جلوگیری و معالجه کلاپس در اعمال جراحی.

مقدار مصرف و طرز استعمال: آمپول: بزرگسالان ۱ ـ ۲ آمپول زیر- جلدی، داخل عضلانی یا وریدی. خردسالان: برحسب سن از ۰/۱ آمپول به‌بالا. قطره: بزرگسالان روزی ۳ ـ ۵ بار، هربار ۲۰ تا ۳۰ قطره. خردسالان و شیرخواران: روزی ۳ ـ ۵ بار، هربار از ۳ قطره به‌بالا.

بسته‌بندی: قطره خوراکی ۱۰ درصد = ۱۰ میلی‌لیتر. آمپول ۶۰ میلی- گرم = ۱ میلی‌لیتر × ۶.

بها: قطره ۴۷ ریال. آمپول ۵۶ ریال.

SYNACHTEN Depot

سیبا ـ سویس

ترکیب: تتراکوزاکتید = کورتیکوتروپین.

موارد استعمال: بیماریهای کولاژن، آرتریت روماتوئید، سایر بیماریهای روماتیسمی، آتروپاتی پسوریازیک، درماتومیوزیت، بیماریهای آلرژیک، واکنشهای حساسیت، برای تحریک کورتکس غده فوق کلیوی.

موارد منع استعمال: پسیکوزهای حاد. عفونتها (مگر همراه با آنتی- بیوتیک‌ها) زخم‌معده یا اثنی‌عشر، سندرم کوشینگ، آبستنی ـ نارسائی‌های قلبی ـ مرض قند، هیپرتانسیون با شدت متوسط.

عوارض جانبی: احتباس آب و نمک، بالا رفتن فشارخون، کمی پتاسیم خون، زیاد شدن قندخون، افزایش پذیرش عفونتها، سندرم- کوشینگ، تغییرات روانی، زخم‌معده یا اثنی‌عشر، استئوپوروز، هیپرپیگمانتاسیون پوستی.

S

بسته‌بندی: آمپول یک میلی‌گرم × یک میلی‌لیتر.
بها: ۳۰۰ ریال.

SYNALAR - N
پروتوشمی آلمان – تهران شیمی ایران

ترکیب: فلوئوسینولون استونایدو ۰/۲۵ میلی‌گرم + سولفات نئومایسین ۴/۸۳ میلی‌گرم.
موارد استعمال: در همه ضایعات پوستی با منشاء التهاب و آلرژی، پسوریازیس.
مقدار مصرف و طرز استعمال: روزی ۲ ـ ۳ بار در محل می‌مالند.
بسته‌بندی: پماد و کرم ۵ و ۱۵ گرم.
بها: پماد و کرم ۵ گرمی ۵۹ ریال، ۱۵ گرمی ۱۳۵ ریال.

SYNAPAUSE
ارگانون – هلند

ترکیب: سوکسینات استریول.
موارد استعمال: کلیه عوارض ناشی از کمبود استروژن.
مقدار مصرف و طرز استعمال: روزی یک قرص.
موارد منع استعمال: تومورهای تحت استروژن، بیماران قلبی، کلیوی و صرع.
عوارض جانبی: احتباس آب و نمک، افزایش اندازه فیبروم رحم، اختلالات ترومبوز.
احتیاط: بیماران دیابتی باید تحت نظر باشند.
بسته‌بندی: قرص ۲ میلی‌گرم × ۳۰.
بها: ۲۲۰ ریال.

S

SYNCORTYL
روسل فرانسه – ایران

ترکیب: استات دزوکسی کورتیکوسترون.
موارد استعمال: بیماری آدیسون، شوک جراحی، شوک تروماتیک، دزئیدراتاسیون، آستنی.
مقدار مصرف و طرز استعمال: روزی یک تا چند تزریق عضلانی.
مصرف در آبستنی: بیمار باید از نظر فشارخون و الکترولیتها تحت مراقبت شدید باشد.
بسته‌بندی: آمپول ۱ میلی‌لیتر × ۴.

بها: ۱۲۳/۵ ریال.

SYNEPHRICOL
وینتروپ آمریکا ـ ایران

ترکیب: در هر قرص: N ـ استیل ـ پارا آمینوفنل ۱۵۰ میلی‌گرم + کلریدرات فنیل افرین ۵ میلی‌گرم + کلریدرات فنیل دیامین ۷/۵ میلی‌گرم + کافئین ۱۵ میلی‌گرم.
موارد استعمال: سرماخوردگیهای معمولی و رینیت، زکام یونجه‌ای، سینوزیت مزمن، آنفلوآنزا.
مقدار مصرف و طرز استعمال: بزرگسالان: روزی ۳ بار، هربار ۱ ـ ۲ قرص. خردسالان ۶ ـ ۱۲ ساله: روزی ۳ بار، هربار ۱ قرص.
بسته‌بندی: قرص × ۲۴.
بها: ۸۴ ریال.

SYNERGON
هپا ترول ـ فرانسه

ترکیب: در هر آمپول: پروژسترون ۱۰ میلی‌گرم + فولیکولین ۱ میلی‌گرم + روغن زیتون ۱ میلی‌لیتر.
موارد استعمال: ناراحتیهای دوران قاعدگی، دیسمنوره، الیگومنوره.
مقدار مصرف و طرز استعمال: برحسب نوع و شدت بیماری متفاوت است.
بسته‌بندی: آمپول ۱ میلی‌لیتر × ۲.
بها: ۵۸ ریال.

SYNERLAC
روژه بلون ـ فرانسه

ترکیب: در هر ۱۰۰ گرم فرمانهای لاکتیک لیوفیلیزه ۱۰ گرم + هیدرات آلومین کلوئیدال ۵۴ گرم + کائولن کلوئیدال ۱۸ گرم + لاکتوز ۱۸ گرم.
موارد استعمال: ضدعفونی روده‌ها، انواع اسهالها، آنتریت‌ها، کولیت، آنتروکولیت، عفونت‌ها و تخمیرهای روده‌ای، کلی باسیلوز، عوارض گوارشی ناشی از آنتی‌بیوتیکها.
مقدار مصرف و طرز استعمال: بزرگسالان: روزی ۱ ـ ۴ پیمانه. خردسالان: روزی ۱ ـ ۲ پیمانه. نوزادان: نصف پیمانه داخل شیر.

بسته‌بندی: پودر ۵۰ گرم.
بها ۹۰ ریال.

SYNKAVIT
روش ــ سویس

ترکیب: ۲ ــ متیل ــ ۱ ، ۴ ــ نفتوئیدرو کینون دی‌فسفات = مناندیول دی فسفات.
موارد استعمال: کمبود ویتامین K بواسطه اختلالات گوارشی، بیماریهای زنان و زایمان، گوش و حلق و بینی، چشم‌پزشکی و دندانپزشکی.
مقدار مصرف و طرز استعمال: روزی ۱ ــ ۳ آمپول داخل عضلانی یا وریدی.
موارد منع استعمال: درمان یا پیشگیری خونریزی ناشی از کمی پروترومبین.
بسته‌بندی: آمپول ۱۰ میلی‌گرم = ۱ میلی‌لیتر × ۳.
بها: ۵۷ ریال.

SYNOPENE
گایگی ــ سویس

ترکیب: در هر آمپول: کلریدرات اِن ــ دی متیل آمینو ــ اتیل ــ اِن ــ پارا کلروبنزیل ــ آلفا ــ آمینو پیریدین = کلریدرات کلروپیرامین ۲۰ میلی‌گرم. دراژه ۲۵ میلی‌گرم.
موارد استعمال: کونژونکتیویت آلرژیک، رینیت‌وازوموتور، زکام یونجه، گزیدگی حشرات، آفتاب‌زدگی.
مقدار مصرف و طرز استعمال: خردسالان: روزی ۱ ــ ۳ دراژه. بزرگسالان: روزی ۳ ــ ۶ دراژه.
موارد منع استعمال: پماد: درماتیت‌های چرکی و اکزوداتیو. آمپول: خردسالان و شیرخواران.
بسته‌بندی: آمپول ۲ میلی‌لیتر × ۵. دراژه × ۲۰.
بها: آمپول ۱۵۰ ریال. دراژه ۷۰ ریال.

SYNTHOMYCETINE
لبتی ایتالیا ــ ایران

ترکیب: کلرامفنیکل.
موارد استعمال: تیفوئید و پاراتیفوئید، سیاه‌سرفه، ریکتزیوز، عفونت‌های مجاری صفرا، عفونتهای کلیوی، آنتروکلیت، دیسانتری

باسیلر، مننژیت.

مقدار مصرف و طرز استعمال: نوزادان: حداکثر ۲۵ میلی‌گرم به‌ازاء هر کیلو. خردسالان و بزرگسالان: ۲۵ - ۵۰ میلی‌گرم به‌ازاء هر کیلو وزن بدن در ۴ دوز مساوی در روز.

بسته‌بندی: کپسول ۲۵۰ میلی‌گرم × ۵۰۰. شربت ۶۰ میلی‌لیتر (هر پیمانه = ۱۲۵ میلی‌گرم). قطره‌گوشی ۱۰ درصد ۱۵ میلی‌لیتر. پماد چشمی ۵ درصد ۵ گرم. پماد جلدی ۲ درصد ۱۵ گرم. اوول ۵۰۰ میلی‌گرم × ۶.

بها: کپسول ۵۰۰ عددی ۱۷۵۶ ریال. شربت ۷۰ ریال، قطره‌گوش ۵۳ ریال، پماد چشمی ۱۶ ریال. پماد جلدی ۲۳ ریال، اوول ۱۰۵ ریال.

SYNTOCINON

ساندوزسویس - پارس ایران

ترکیب: اوسی تـوسین - اکـی تـوسین - پیتوسین سنتتیـک فاقد وازوپرسین و پروتئین حیوانی.

موارد استعمال: تسریع زایمان، پـارگی قبل از موعد کیسه آب، اکلامپسی و پراکلامپسی، باقی ماندن جنین مرده در رحم، نـارسائی اولیه و ثـانـویه انقباضات رحم، عمل سزاریـن، خونریزیهای بعد از زایمان یا عدم رجعت کامل رحم بحالت اولیه، انسداد پستان، جلوگیری از تورم حاد پستان و عود آن.

مقدار مصرف و طرز استعمال: پرفوزیون وریدی و قطره‌قطره یک واحد در ۱۰۰ میلی‌لیتر از محلول ۵ درصد گلوکز ابتدا بمقدار ۵ تا ۸ و بعد ۸ تا ۴۰ قطره در دقیقه و در صورت لزوم بیشتر تزریق داخل عضلانی یا زیرجلدی ۰/۵ تا ۲ واحد که هر ۳۰ تا ۶۰ دقیقه یکبار میتوان تکرار کرد. در خونریزیهای بعد از زایمان: ۳ تا ۱۰ واحد بصورت تزریق داخل وریدی یا عضلانی.

موارد منع استعمال: دیستوسی بعلل مکانیکی.

بسته‌بندی: آمپول ۵ و ۱۰ واحدی = ۱ میلی‌لیتر × ۶.

بها: آمپول ۵ واحدی ۷۰ ریال ۱۰ واحدی ۷۴ ریال.

S

SYNTOPHTONE
لپتی ایتالیا ـ ایران

ترکیب: در هر ۱۰۰ میلی‌لیتر: کلرامفنیکل ۰/۲۴ گرم + استات پردنیزولون ۰/۵ گرم.

موارد استعمال: ورم ملتحمه، بلفاریت، کراتیت، ورم جسم مژگانی، کونژونکتیویت.

مقدار مصرف و طرز استعمال: روزی ۴ بار، هربار ۱ ـ ۲ قطره.

بسته بندی: قطره چشمی ۳ میلی‌لیتر.

بها: ۴۹ ریال.

S

TAB VACCINE
برنا ـ سویس

خاصیت درمانی: واکسن

ترکیب: در هر میلی‌لیتر: سالمونلاپاراتیفی A ۱ میلیارد + سالمونلاپاراتیفی B ۵۰۰ میلیون.

موارد استعمال: ایجاد مصونیت در مقابل تیفوئید و پاراتیفوئید.

مقدار مصرف و طرز استعمال: یک تزریق عضلانی.

موارد منع استعمال: بیماریهای تب دار شدید.

عوارض جانبی: ممکن است پس از واکسیناسیون سرخی، تورم و درد در محل تزریق و نیز تب و سردرد ایجاد گردد.

بسته بندی: آمپول ۰/۵ میلی‌لیتر × ۳.

بها: ۹۲ ریال.

TADENAN
دبا ـ فرانسه

ترکیب: عصاره پیژنوم آفریکانوم ۲۵ میلی‌گرم + سوربات پتاسیم ۰/۱۶ میلی‌گرم + اکسیپیان ۱۵۵ گرم.

موارد استعمال: اختلال دفع ادرار، آدنوم پروستات، بیماران غیرقابل عمل.

مقدار مصرف و طرز استعمال: روزی ۳ ـ ۴ بار، هربار ۱ کپسول بمدت ۶ ـ ۸ هفته.

بسته بندی: کپسول × ۱۵.

بها: ۳۹۰ ریال.

TAGAMET
اسکااف ـ انگلستان

ترکیب: سایمتیدین.

مکانیسم: با خاصیت آنتاگونیستی باگیرنده‌های هیستامینی هم ترشح بازال اسید معدی را متوقف میکند و هم ترشح پپسین را کاهش

میدهد.

موارد استعمال: زخم معده، التهاب مری، سایر بیماریهائی که اسیدیته معده باید کاهش یابد.

مقدار مصرف و طرز استعمال: روزی ۳ بار، هربار یک قرص همراه غذا، قبل از خواب ۲ عدد با هم.

عوارض جانبی: گاهی اسهال، درد عضلانی، بثورات جلدی، گاهی افزایش ترانس آمینازسرم و کرآتی نین پلاسما.

احتیاط: مبتلایان به نارسائی کلیوی نباید بیشتر از ۲ قرص در روز مصرف کنند.

بسته بندی: قرص ۲۰۰ میلی‌گرم × ۵۰، آمپول ۲۰۰ میلی‌گرم = ۲ میلی‌لیتر × ۱۰.

بها: قرص ۱۴۵۰ ریال، آمپول ۶۵۰ ریال.

TAKA - COMBEX

پارک دیویس آمریکا ـ ایران

ترکیب: تاکادیاستاز ۱۵۰ میلی‌گرم + ویتامین B_1 ۱۰ میلی‌گرم + ویتامین B_2 ۱۰ میلی‌گرم + ویتامین B_6 ۰/۵ میلی‌گرم + ویتامین B_{12} ۱ میکروگرم + ویتامین C ۳۰ میلی‌گرم + نیاسینامید ۱۰ میلی‌گرم + dl پانتنول ۶ میلی‌گرم + عصاره جگر ۳۴۰ میلی‌گرم.

موارد استعمال: کمبود ویتامینهای گروه B، بی‌اشتهائی، پولی نوریت تغذیه‌ای، دوران آبستنی و شیردهی، بیماریهای تب دار، دوران نقاهت، رژیم‌های محدود غذائی، هیپرتیروئیدیسم، بعد از آنتی‌بیوتراپی.

مقدار مصرف و طرز استعمال: روزی ۳ بار، هربار ۲ کپسول در بین غذا یا بلافاصله بعد از غذا. بعد از ۱۰ ـ ۱۵ روز، روزی ۳ بار، هربار ۱ کپسول.

بسته بندی: کپسول × ۵۰.

بها: ۱۷۶ ریال.

T

TAKA-DIASTASE Liquid
پارك دیویس آمریکا ـ ایران

ترکیب: در هر قاشق مرباخوری: تاکادیاستاز ۲۲۵ میلی‌گرم.
موارد استعمال: هضم ناقص مواد نشاسته‌ای، کمک به هضم پروتئین‌ها، ترشی معده، نفخ.
مقدار مصرف و طرز استعمال: بزرگسالان: ۲ قاشق مرباخوری در حین غذا یا بلافاصله بعد از هر غذا. شیرخواران و خردسالان: روزی ۳ بار، هربار ۱ قاشق چایخوری.
بسته‌بندی: شربت ۱۲۰ میلی‌لیتر.
بها: ۶۴ ریال.

TALSUTIN
اسکوئیب ـ آمریکا ـ ایران

ترکیب: تتراسیکلین ۱۰۰ میلی‌گرم + آمفوتریسین B ۵۰ میلی‌گرم.
موارد استعمال: عفونت‌های دستگاه تناسلی زنان، واژینیت مونیلیائی، واژینیت تریکومونائی، واژینیت باکتریال.
مقدار مصرف و طرز استعمال: بمدت دوهفته یک قرص صبح و شب در مهبل میگذارند.
بسته‌بندی: قرص واژینال همراه آپلیکاتور × ۱۵.
بها: ۱۹۹ ریال.

TALUSIN
کنول ـ آلمان

ترکیب: گلوکزید کریستالیزه قلبی = پروسیلارن.
موارد استعمال: نارسائی ثانویه قلب، ضایعات قلبی، نارسائی قلب همراه با برادیکاردی و بعلت فشارخون.
مقدار مصرف و طرز استعمال: برحسب شدت بیماری روزی ۱ ـ ۲/۵ میلی‌گرم.
عوارض جانبی: گاهی تهوع و اسهال و استفراغ.
بسته‌بندی: قرص ۰/۲۵ و ۰/۵ میلی‌گرم × ۲۰.
بها: ۰/۲۵ میلی ۱۶۵ ریال، ۰/۵ میلی ۲۶۷ ریال.

TALWIN
وینتروپ آمریکا ـ ایران

ترکیب: پنتازوسین.
موارد استعمال: دردهای جراحی، زایمان، کلیه دردهای مزمن و حاد،

دردهای بیماران سرطانی، دردهای قلبی، دردهای جهاز هاضمه و ادراری.

مقدار مصرف و طرز استعمال: روزی ۳۰ ـ ۶۰ میلی‌گرم عضلانی یا ۳۰ میلی‌گرم وریدی. خردسالان: ۰/۵ ـ ۱ میلی‌گرم بازاء هر کیلو وزن بدن.

موارد منع استعمال: ضایعات کبدی و کلیوی پیشرفته، آسم شدید، کودکان کمتر از ۱۲ سال، دوران آبستنی، ازدیاد فشار داخل جمجمه‌ای.

احتیاط: در بیماران سرپائی.

عوارض جانبی: استفراغ، تهوع، تاکیکاردی.

بسته بندی: ۵ میلی‌گرم = ۱ میلی‌لیتر × ۵.

بها: ۲۵۸ ریال.

TANDERIL
گایگی ـ سویس

ترکیب: در هر دراژه، منوئیدرات ۱ ـ فنیل ـ ۲ ـ (پارا ـ ئیدروکسی فنیل) ـ ۳ و ۵ ـ دی اکسو ۴ ـ ان ـ بوتیل پیرازولیدین = اکسی فن بوتازون ۱۰۰ میلی‌گرم.

موارد استعمال: اورام پس از تروماتیسم، ورم‌های غیر ضربه‌ای دستگاه‌لوکوموتور، ورم‌های ژنیکولوژی، التهاب و تورم چشم.

مقدار مصرف و طرز استعمال: شروع درمان: روزی ۲ ـ ۳ بار، هربار ۲ دراژه همراه با غذا بمدت ۲ تا ۳ روز. ادامه: روزی ۳ ـ ۴ بار، هربار ۱ دراژه همراه با غذا.

موارد منع استعمال: قرحه‌های معده و روده، حساسیت نسبت به پیرازول، لوکوپنی، دیاتزهموراژی.

عوارض جانبی: باعث احتباس آب و کم شدن دفع سدیم بخصوص نزد بیماران کلیوی و قلبی می‌گردد.

بسته بندی: دراژه × ۲۰.

بها: ۹۶ ریال.

TANTUM
ارگانون ـ هلند

ترکیب: کلریدرات بنزیدامین.
موارد استعمال: حالات دردناک و متورم پس از ضربه‌ها و جراحیها، التهابات حاد دستگاه تنفسی و تناسلی، فلبیت.
مقدار مصرف و طرز استعمال: روزی ۴ قرص بعد از غذا.
عوارض جانبی: گاهی ناراحتی خفیف معدی.
بسته بندی: قرص ۵۰ میلی‌گرم × ۳۰.
بها: ۲۲۰ ریال.

TAO
فایزر آمریکا ـ ایران

ترکیب: ترولئاندومایسین.
موارد استعمال: عفونتهای حاد دستگاه تنفسی، عفونتهای ناشی از استرپتوکوکوس پیوژنوس.
مقدار مصرف و طرز استعمال: هر ۶ ساعت یک کپسول یا یک قاشق مرباخوری شربت.
موارد منع استعمال: بیماریهای کبدی.
عوارض جانبی: گاهی تهوع و استفراغ.
بسته بندی: کپسول ۲۵۰ میلی‌گرم × ۱۰۰، شربت ۱۲۵ میلی‌گرم = ۵ میلی‌لیتر × ۶۰ میلی‌لیتر.
بها: کپسول ۱۵۸۱ ریال، شربت ۱۲۳ ریال.

TAPAZOLE
لی‌لی ـ آمریکا

ترکیب: در هر قرص متی مازول ۵ میلی‌گرم.
موارد استعمال: هیپرتیروئیدیسم، درمان کمکی قبل از تیروئید کتمی، درمان طبی در آن دسته از بیمارانی که برداشتن تیروئید در آنها ممنوع است.
مقدار مصرف و طرز استعمال: روزی ۱۵ میلی‌گرم. در هیپرتیروئیدی خفیف ۳۰ تا ۴۰ میلی‌گرم در هیپرتیروئیدی متوسط ۶۰ میلی‌گرم یا بیشتر برای موارد شدید. درمان نگاهدارنده: ۵ تا ۲۰ میلی گرم در ۲ تا ۳ قسمت.
موارد منع استعمال: ایدیوسنکرازی و حساسیت بدارو.
احتیاط و عوارض جانبی: بثورات جلدی، کهیر، احتمالا آگرانولوسیتوز،

T

آرترالژی و علائم مفصلی خفیف. بیمارانی که این دارو را مصرف می‌کنند باید از نزدیک تحت نظر قرارگرفته لزوم گزارش هر نوع علامتی بویژه گلودرد، بثورات جلدی، تب، سردرد و یا ضعف عمومی را به‌آنان خاطر نشان کرد.

بسته بندی: قرص × ۱۰۰.

بها: ۲۶۰ ریال.

TAVEGYL
ساندوز سویس ـ پارس ایران

ترکیب: کلماستین.

موارد استعمال: تب یونجه، رینیت مقاوم، کهیر حاد و مزمن، خارش.

مقدار مصرف و طرز استعمال: بزرگسالان در موارد خفیف: روزی ۲ بار هربار ۱ قرص. در موارد شدید: ۲ تا ۳ قرص صبح و عصر.
خردسالان: روزی ۲ بار، هربار نصف تا ۱ قرص.

عوارض جانبی: گاهی خواب‌آلودگی و خستگی.

بسته بندی: قرص ۱ میلی‌گرم × ۲۰. آمپول ۲ میلی‌گرم = ۲ میلی‌لیتر × ۵.

بها: قرص ۱۰۵ ریال. آمپول ۱۴۱ ریال.

TEEGEL
سیگما ـ سویس

ترکیب: سالیسیلات کولین ۸/۷ درصد + ستیل دی متیل بنزیل آمونیوم کلراید ۱۰ درصد.

موارد استعمال: درد مخاطی دهان، عفونت، آفت، برفک، عوارض بیرون آوردن دندان.

مقدار مصرف و طرز استعمال: هر ۳ـ۴ ساعت مقدار یک‌سانت از پماد را در محل (پای دندان) قرار دهند.

موارد منع استعمال: اطفال کمتر از ۲ سال.

بسته بندی: پماد ۷/۱ گرم.

بها: ۱۵۰ ریال.

TEGRETOL
گایگی ـ سویس

ترکیب: در هر قرص: ۵ ـ کارباموئیل ـ H ۵ ـ دی بنز [b و f] آزپین = کاربامازین ۲۰۰ میلی‌گرم.

T

موارد استعمال: صرع با تظاهرات حرکتی روانی، پسیکوموتور بالوب گیجگاهی، صرع بزرگ.
مقدار مصرف و طرز استعمال: ابتدا با ۱ ـ ۲ قرص شروع میشود تا درد بکلی از بین برود بعد کاهش میدهند تا حداقل لازم برای جلوگیری از درد بدست آید.
عوارض جانبی: بثورات آلـرژیـک، بندرت لوکوپنی، ترومبوپنی، آگرانولرسیتوز و آنمی آپلاستیک، هپاتیت.
بسته بندی: قرص × ۵۰.
بها: ۲۴۵ ریال.

TELEBRIX 38
آندره گربه ـ فرانسه

ترکیب: یـوکسی تـالامـات متیل گلوکـامین ۱۰/۲۶ گـرم + یوکسی تالامات سدیم ۵/۱۳ گرم + کلسی ادتات سدیم ۰/۰۰۲ گرم + فسفات منوسدیک دی هیدرات ۰/۰۰۳ گرم + سولفات سدیم ۰/۰۰۲ گرم (غلظت ید ۳۸ درصد + ملح ۷۷ درصد).
مقدار مصرف و طرز استعمال: برحسب نوع آزمایش ۵ تا ۸۰ میلی‌لیتر
موارد استعمال: اوروگرافی، آنژیوگرافی انتخابی و محیطی آئورتوگرافی، نفروگرافی، نفروتوموگرافی.
بسته بندی: آمپول ۲۰ میلی‌لیتر × ۱.
بها: ۳۸۴ ریال.

TELEPAQUE
وینتروپ آمریکا ـ ایران

ترکیب: ۳ ـ (۳ ـ آمینو ـ ۲′، ۴′، ۶′ تری یدوفنیل) ـ ۲ ـ اتیل ـ پروپان = اسید آیوپانوئیک.
موارد استعمال: نمایان ساختن کیسه‌صفرا و مجاری خارج کبدی.
مقدار مصرف و طرز استعمال: بزرگسالان ۶ قرص که بدون جویدن همراه با آب مصرف میگردد. در بیماران کمتر از ۶۰ کیلو فقط ۴ قرص کافی است. بیماران چاق تا ۱۲ قرص میتوانند مصرف کنند.
موارد منع استعمال: بیماران مبتلا به‌نفریت حاد، اورمی و در اشخاصی که عوارض روده‌ای ـ معده‌ای آنها باعث عدم جذب ماده حاجب میگردد.

T

عوارض جانبی: اسهال، کولیک، تهوع، استفراغ، سوزش بهنگام ادرار.
بسته‌بندی: قرص ۵۰۰ میلی‌گرم × ۶.
بها: ۷۰ ریال.

TELMEX
میسین ـ ایران

ترکیب: N ـ (۲ ـ کلـرو ـ ۴ٌ ـ نیتـروفنیـل) ـ ۵ ـ کلروسالیسیلامید = نیکلوزامید ۰/۵ گرم.
موارد استعمال: دفع کرم کدو.
مقدار مصرف و طرز استعمال: بزرگسالان: صبح ناشتا ۲ عدد قرص و پس از یکساعت ۲ عدد دیگر میل می‌شود. خردسالان: ۳ تا ۱۰ سال فقط دو قرص یکی صبح ناشتا و دیگری یک ساعت بعد میل میکنند. از ۳ سال کمتر یک قرص که نصف آنرا صبح ناشتا و نصف دیگر را یک‌ساعت بعد میل میکنند.
بسته‌بندی: قرص × ۴.
بها: ۳۶ ریال.

TEMPRA
مید جانسون ـ آمریکا

ترکیب: استامینوفن.
موارد استعمال: درد و تب.
مقدار مصرف و طرز استعمال: روزی ۱/۲ میلی‌لیتر ۳ ـ ۴ بار در روز.
احتیاط: بیشتر از ۱۰ روز مصرف نشود.
بسته‌بندی: قطره ۱۵ میلی‌لیتر.
بها: ۶۳ ریال.

T

TENIAX
ویرا ـ ایران

ترکیب: N ـ (۲ ـ کلرو ـ ۴ ـ نیترو ـ فنیل) ـ ۵ ـ کلرو ـ سالیسیلامید = نیکلوزامید ۵۰۰ میلی‌گرم.
موارد استعمال: دفع کرم کدو.
مقدار مصرف و طرز استعمال: ۲ قرص صبح ناشتا، یکساعت بعد ۳ قرص، ۳ ساعت بعد یک مسهل میل میشود.
بسته‌بندی: قرص × ۴.

بها: ۴۲ ریال.

TENICIDE
مینا ـ ایران

ترکیب: در هر قرص: N (۲ کلرو ـ ۴ ـ نیتروفنیل) ـ ۵ کلرو ـ سالیسیلامید) = نیکلوزامید ۰/۵ گرم.

موارد استعمال: تنیاساژیناتا، تنیاسولیوم هیمنولپسیس نانا.

مقدار مصرف و طرز استعمال: برحسب نوع و شدت بیماری متفاوت است.

بسته بندی: قرص × ۴.

بها: ۴۳ ریال.

TENORMIN
آی سی آی ـ انگلستان

ترکیب: آتنولول.

مکانیسم: گیرنده‌های بتا یک را در قلب بطور اختصاصی بلوکه کرده با مقادیر درمانی برگیرنده‌های بتا دو تنفسی و محیطی اثر ندارد.

موارد استعمال: هیپرتانسیون بخصوص با منشاء کلیوی، آنژین صدری.

مقدار مصرف و طرز استعمال: روزی یکعدد، در موارد شدید به ۱/۵ ـ ۲ قرص افزایش داده میشود.

عوارض جانبی: چنانچه نزد بعضی از بیماران آسماتیک مقاومتی در راههای تنفسی ایجاد شود میتوان با تجویز ایزوپرنالین یا سالبوتامول این مقاومت را از بین برد.

احتیاط: در نارسائی احتقانی قلب باید ابتدا نارسائی را برطرف کرد و سپس از این دارو استفاده کرد.

بسته بندی: قرص ۱۰۰ میلی‌گرم × ۲۸.

بها: ۱۳۰۰ ریال.

T

TERBOLAN
هوخست آلمان ـ ایران

ترکیب: لازیکس ۱۵ میلی‌گرم + رزرپین ۰/۱ میلی‌گرم.

موارد استعمال: کلیه اشکال هیپرتروفی، فشارخون اشخاص سالخورده، فشارخون کلیوی.

مقدار مصرف و طرز استعمال: شروع درمان: روزی ۲ ـ ۴ قرص. ادامه درمان: روزی ۱ ـ ۲ قرص.

عوارض جانبی: تهوع و استفراغ و سرگیجه.
بسته بندی: قرص × ۲۰.
بها: ۸۰ ریال.

TERRA - CORTRIL
فایزر آمریکا ـ ایران

ترکیب: در هر گرم پماد جلدی: ئیدروکورتیزون ۱۰ میلی‌گرم + کلریدرات ترامایسین ۳۰ میلی‌گرم.
موارد استعمال: عفونتهای جلدی، درماتیت آتوپیک و تماسی، خارش.
مقدار مصرف و طرز استعمال: روزی ۲ ـ ۴بار بر روی پوست مالیده می‌شود.
بسته بندی: پماد جلدی ۵ گرم.
بها: ۷۰ ریال.

TERRAMYCIN
فایزر آمریکا ـ ایران

ترکیب: شربت و قطره: کلسیم دی اکسی تتراسیکلین. کپسول و قرص: اکسی تتراسیکلین متبلور.
موارد استعمال: عفونتهای معدی ـ روده‌ای، عفونتهای مننژ، عفونتهای جراحی، عفونت‌های پوست و انساج نرم، عفونتهای ادراری ـ تناسلی، عفونتهای مامائی، عفونتهای گوش و حلق و بینی، عفونتهای دهان و دندان، عفونتهای اسپیروکتی، عفونتهای ریکتزیائی.
مقدار مصرف و طرز استعمال: خردسالان ـ شربت: ۲۰ ـ ۵۵ میلی‌گرم بازاء هر کیلووزن. بزرگسالان: روزی ۱ ـ۳ گرم. خردسالان ـ قطره: برحسب نوع عفونت از ۲ ـ ۱۲ قطره بازاء هر کیلووزن.
بسته بندی: شربت ۶۰ میلی‌لیتر، قطره خردسالان ۱۰ میلی‌لیتر. کپسول ۱۰۰ و ۲۵۰ میلی‌گرم × ۱۰۰،
بها: شربت ۱۰۰ ریال، قطره ۷۰ ریال، کپسول، ۱۰۰ میلی ۵ ریال، ۲۵۰ میلی ۱۲ ریال.

T

TERRAMYCIN Ear Drop
فایزر آمریکا ـ ایران

ترکیب: در هر ویال: کلریدرات اکسی ـ تتراسیکلین ۵ میلی‌گرم + سولفات پلی‌میکسین ۱ میلی‌گرم = ۱۰

هزار واحد + بنزوکائین ۵ درصد.

موارد استعمال: انواع عفونتهای گوش خارجی حساس به‌آنتی‌بیوتیکهای فوق.

مقدار مصرف و طرز استعمال: هر ۳ ساعت ۳ـ۵ قطره درگوش می‌چکانند.

احتیاط: بهتر است پیش از مصرف قطره را کمی گرم کرد.

بسته بندی: ویال × ۱ + ۵ میلی‌لیتر حلال حاوی ۹۰ درصد پروپیلن گلیکول.

بها: ۵۳ ریال.

TERRAMYCIN Intramuscular
فایزر آمریکا ـ ایران

ترکیب: در هر آمپول: اکسی‌تتراسیکلین ۵۰ میلی‌گرم + گزیلوکائین ۲ درصد + هگزائیدرات کلرور منیزیم ۲/۵ درصد + اتانولامین ۱/۷ درصد + سولوکسیلات فورمالوئید ۰/۵ درصد + پروپیلن گلیکول ۷۵/۲ درصد.

موارد استعمال: عفونتهای دستگاه تنفسی، عفونتهای دستگاه ادراری ـ تناسلی، عفونتهای جراحی، شکسته‌بندی و عفونتهای مختلف.

مقدار مصرف و طرز استعمال: روزی ۲ ـ۳ بار، هربار ۱۰۰ میلی‌گرم تزریق داخل عضلانی.

بسته بندی: آمپول ۲ میلی‌لیتر × ۱.

بها: ۳۰ ریال.

TERRAMYCIN Intravenous
فایزر آمریکا ـ ایران

ترکیب: کلریدرات اکسی‌تتراسیکلین + ویتامین C.

موارد استعمال: عفونتهای ناشی از عوامل حساس به‌ترامایسین.

مقدار مصرف و طرز استعمال: بزرگسالان: ۲۵۰ ـ ۵۰۰ میلی‌گرم هر ۱۲ ساعت. خردسالان: ۱۰ ـ ۲۰ میلی‌گرم بازاء هر کیلوگرم وزن بدن. بصورت تزریق مستقیم داخل وریدی یا تزریق قطره‌قطره داخل وریدی.

T

احتیاط: اختلال کار کلیوی بخصوص هنگام آبستنی.
بسته‌بندی: ویال ۲۵۰ و ۵۰۰ میلی‌گرم.
بها: ۲۵۰ میلی ۸۲ ریال، ۵۰۰ میلی ۱۴۱ ریال.

TERRAMYCIN Oph.
فایزر آمریکا ـ ایران

ترکیب: در هرگرم: کلریدرات اکسی تتراسیکلین ۵ میلی‌گرم + سولفات پلی‌میکسین ب ۱۰ هزار واحد = ۱ میلی‌گرم.
موارد استعمال: انواع عفونتهای چشمی.
مقدار مصرف و طرز استعمال: روزی ۴ ـ ۶ بار در چشم می‌مالند.
بسته‌بندی: پماد چشمی ۳/۵ گرم.
بها: ۱۶ ریال.

TERRAMYCIN Pom.
فایزر آمریکا ـ ایران

ترکیب: در هرگرم پماد جلدی: کلریدرات اکسی‌ـ تتراسیکلین ۳۰ میلی‌گرم + سولفات پلی میکسین ۱ میلی‌گرم.
موارد استعمال: انواع عفونتهای پوستی و حساس به‌آنتی‌بیوتیک‌های فوق.
مقدار مصرف و طرز استعمال: روزی ۲ ـ ۳ بار، هربار مقدار کمی از پماد را بعد از شستن موضع در محل قرار میدهند.
بسته‌بندی: پماد جلدی ۱۴/۲ گرم.
بها: پماد جلدی ۵۳ ریال.

TERRAMYCIN SF
فایزر آمریکا ـ ایران

ترکیب: اکسی تتراسیکلین ۲۵۰ میلی‌گرم + پیریدوکسین ۰/۵ میلی‌گرم + اسید فولیک ۰/۳۷۵ میلی‌گرم + ویتامین B_{12} ۴ میکروگرم + ویتامین C ۷۵ میلی‌گرم + تیامین ۲/۵ میلی‌گرم + ریبوفلاوین ۲/۵ میلی‌گرم + نیاسینامید ۲۵ میلی‌گرم.
موارد استعمال: پنومونی و سایر عفونتهای دستگاه تنفسی، سل، عفونتهای ادراری ـ تناسلی، عفونتهای چشمی، موارد جراحی، عفونتهای مننژ، عفونتهای اسپیروکتی، عفونتهای دهان و دندان، عفونتهای معدی روده‌ای، عفونتهای ریکتزیائی.
مقدار مصرف و طرز استعمال: خردسالان روزی ۱۰ ـ ۴۰ میلی‌گرم

T

بازاء هر کیلووزن. بزرگسالان: روزی ۱ گرم.
بسته بندی: کپسول × ۱۰۰.
بها: هر عدد ۱۳/۵ ریال.

TERRAMYCIN Vaginal Tab.
فایزر آمریکا ـ ایران

ترکیب: کلـریـدرات اکسی تتراسیکلیـن ۱۰۰ میلی‌گرم + سولفات پلی میکسین ۱۰ میلی‌گرم.
موارد استعمال: واژینیت حاد و مزمن، پروفیلاکسی قبل از جراحی، بعد از کوتریزاسیون کردن رحم، واژینیت تریکوموناتی.
مقدار مصرف و طرز استعمال: شبی ۱ ـ ۲ قرص در عمق مهبل قرار میدهند.
بسته بندی: قرص واژینال × ۱۰۰.
بها: ۱۰۵ ریال.

TERROPNEUMIN
مرل ترود فرانسه ـ دوپار ایران

ترکیب: در هر ۵ میلی‌لیتر شربت بزرگسالان: اکسی‌ـ تتراسیکلین ۱۲۵ میلی‌گرم + گایاکول گلیکولات سدیم ۱۷/۵ میلی‌گرم + کامفوسولفونات سدیم ۲۵ میلی‌گرم. شربت اطفال بترتیب: ۱۰۰ میلی‌گرم + ۱۲/۵ میلی‌گرم + ۱۵ میلی‌گرم. شربت نوزادان بترتیب: ۵۰ میلی‌گرم + ۵۰ میلی‌گرم + ۷/۵ میلی‌گرم.
موارد استعمال: ضدعفونی راههای تنفسی، برونشیت، عفونتهای حاد و مزمن مجاری تنفسی.
مقدار مصرف و طرز استعمال: شربت بزرگسالان: روزی ۴ ـ ۶ قاشق غذاخوری. اطفال روزی ۴ ـ ۶ قاشق مرباخوری. نوزادان نصف تا یک قاشق مرباخوری.
بسته بندی: شربت بزرگسالان ۱۶۰ میلی‌لیتر. اطفال و نوزادان ۱۲۰ میلی‌لیتر.
بها: شربت بزرگسالان ۲۷۳ ریال، اطفال ۱۹۳ ریال، نوزادان ۱۱۳ ریال.

TES-TAPE
لی‌لی ـ آمریکا

ترکیب: تست کولوری متری براساس واکنشهای آنزیمی.
موارد استعمال: تعیین مقدار قند ادرار براساس واکنش های آنزیماتیک
مقدار مصرف و طرز استعمال: نوار بریده شده آغشته به‌ادرار بمدت یک دقیقه در هوا نگاه داشته شده و تیره‌ترین محل نوار با نمونه‌های رنگ روی جعبه مقایسه شود.
بسته بندی: بصورت نوار ۱۰۰ سانتیمتری.
بها: ۷۳ ریال.

TESTOLUTON Forte
شرینگ آلمان ـ ایران

ترکیب: ساده: پروپیونات تستوسترون ۱۵ میلی‌گرم + پروژسترون ۱۰ میلی‌گرم. قوی: پروپیونات تستوسترون ۲۵ میلی‌گرم + پروژسترون ۱۰ میلی‌گرم.
موارد استعمال: اختلالات قبل از قاعدگی از قبیل (ورم و درد پستان دیسمنوره تغییرات روانی و میگرن) مثانه قابل تحریک، هیپر- منوره، فیبرومیوم.
مقدار مصرف و طرز استعمال: برای اختلالات قبل از قاعدگی ۲ ـ ۳ آمپول داخل عضله در طول ۱۰ روز قبل از قاعدگی، هر تزریق بفاصله سه روزو یا بمحض بروز علائم.
بسته بندی: آمپول عضلانی ۱ میلی‌لیتر × ۳.
بها: قوی: ۵۹ ریال.

TESTOSTERONE Vifor
ویفور ـ سویس

ترکیب: پروپیونات تستوسترون.
موارد استعمال: سرطان پستان، نارسائی غدد تناسلی، آندومتریت، استئوپوروز.
مقدار مصرف و طرز استعمال: برحسب نوع و شدت بیماری متفاوت است.
بسته بندی: آمپول ۲۵ میلی‌گرم × ۶. آمپول ۵۰ میلی‌گرم × ۳.
بها: ۲۵ میلی ۶۰ ریال، ۵۰ میلی ۵۴ ریال.

TESTOVIRON
TESTOVIRON Depot
شرینگ آلمان
ـ ایران

ترکیب: پروپیونات تستوسترون. دپو: پروپیونات + واناناتـات ـ تستوسترون.

موارد استعمال: در مرد: هیپوژنیتالیسم، عقیمی، ناتوانی جنسی، سن بحرانی مرد، نارسائی قلب، آنژین صدری، افسردگی، خارش پیری، ضعف عمومی در اثر کمبود پروتئین، کاشکسی، سیروز کبدی، اوستئوپوروز. در زن: سرطان پستان، سرطان دستگاه تناسلی، یائسگی، ورم فیبروکیستیک پستان، سردی جنسی.

مقدار مصرف و طرز استعمال: برحسب نوع و شدت بیماری متفاوت است.

موارد منع استعمال: سرطان پروستات.

بسته‌بندی: آمپول ۱ میلی‌لیتر (۱۰، ۲۵ و ۵۰ میلی‌گرم) × ۳. دپو: آمپول ۱ میلی لیتر، (۵۰، ۱۰۰ و ۲۵۰ میلی گرم) × ۱.

بها: ۱۰ میلی ۴۱ ریال، ۲۵ میلی ۶۵ ریال، ۵۰ میلی ۸۲ ریال، دپو: ۵۰ میلی ۸۲ ریال، ۱۰۰ میلی ۹۰ ریال، ۲۵۰ میلی ۱۸۷ ریال.

TETABULIN
ایمونو ـ اتریش

ترکیب: گاما گلوبین اختصاصی مشتق از خون انسان ۲۵۰ واحد.

موارد استعمال: پیشگیری و درمان کزاز.

مقدار مصرف و طرز استعمال: پیشگیری: ۱۵۰۰ ـ ۳۰۰۰ واحد بین المللی. درمان: بمجرد ظهور علائم کزاز حداقل ۳۰ هزار واحد بین المللی.

بسته بندی: ویال همراه با ۲ میلی‌لیتر حلال.

بها: ۳۰۰ ریال.

T

TETANUS Antitoxin
برنا ـ سویس

ترکیب: سرم اسب هائیکه بوسیله آناتوکسین مصون گردیده‌اند.

موارد استعمال: پیش گیری و درمان بیماری کزاز.

مقدار مصرف و طرز استعمال: پیش گیری: ۱۵۰۰ ـ ۳۰۰۰ واحد زیرجلدی یا داخل عضلانی. درمان: ۱۰ هزار تا ۲۰ هزار

واحد داخل عضلانی.
موارد منع استعمال: حساسیت به‌سرم.
بسته بندی: ۱۵۰۰ واحدی ۱/۵ میلی‌لیتر، ۲۵۰۰، ۵۰۰۰ واحدی ۲/۵ میلی‌لیتر.
بها: ۱۵۰۰ واحدی ۲۰ ریال، ۲۵۰۰ واحدی ۳۶ ریال، ۵۰۰۰ واحدی ۵۳ ریال.

TETRA-AMBEZIM
ریختر ایتالیا ـ ایران

ترکیب: تتراسیکلین ۲۵۰ میلی‌گرم + تریپسین و کیموتریپسین ۴۰۰ هزار واحد.
موارد استعمال: کلیه عفونتهای حساس به‌آنتی‌بیوتیک فوق که با التهاب توام باشند.
مقدار مصرف و طرز استعمال: هر ۶ ساعت یک کپسول بعد از غذا.
بسته بندی: کپسول × ۱۶.
بها: ۱۲۷ ریال.

TETRACAIN F
پ او اس فرانسه ـ دوپار ایران

ترکیب: در هر ۱۰۰ میلی‌لیتر کلریدرات تترا کائین ۲ گرم.
موارد استعمال: اندازه‌گیری فشار داخلی چشم، جراحات قرنیه، تزریقات و سوختگی چشم، تسکین درد و اعمال جراحی کوچک.
مقدار مصرف و طرز استعمال: ۲ ـ ۳ قطره به‌فواصل ۲-۳ دقیقه در چشم چکانده شود.
بسته بندی: قطره چشمی ۲ درصد ۱۰ میلی‌لیتر.
بها: ۴۵ ریال.

T

TETRACYCLINE
پ او اس فرانسه ـ دوپار ایران

ترکیب: در هر قاشق مرباخوری: کلریدرات تتراسیکلین ۱۲۵ میلی‌گرم، در هر قطره: ۵ میلی‌گرم.
موارد استعمال: تمام عفونت‌های حساس به‌تتراسیکلین ها.
مقدار مصرف و طرز استعمال: خردسالان: روزی ۲۰ ـ ۳۰ میلی‌گرم برای هر کیلو وزن بدن در ۴ نوبت. بزرگسالان: روزی ۱ گرم.
بسته بندی: سوسپانسیون ۶۰ میلی‌لیتر. قطره خوراکی ۱۰ میلی‌لیتر.

بها: شربت ۸۲ ریال، قطره ۴۷ ریال.

TETREX
بریستول ـ آمریکا

ترکیب: در هر ۵ میلی‌لیتر شربت: کلریدرات تتراسیکلین ۱۲۵ میلی‌گرم. قطره اطفال: مشابه شربت معادل کلریدرات تتراسیکلین ۱۰۰ میلی‌گرم در هر میلی‌لیتر.

موارد استعمال: عفونتهای مجاری تنفسی، ادراری و دستگاه گوارش، عفونتهای پوستی، عفونتهای ریکتزیائی و ویروسی.

مقدار مصرف و طرز استعمال: شربت: هر ۶ ساعت ۲ قاشق مرباخوری، قطره: نوزادان ۲۵ میلی‌گرم برای هر کیلو وزن بدن در ۲۴ ساعت. خردسالان: ۱۰۰ ـ ۵۰۰ میلی‌گرم چهار بار در روز.

موارد منع استعمال: افراد حساس به تتراسیکلین ها.

احتیاط: این دارو با شیر یا غذاهای واجد کلسیم نباید تجویز گردد.

بسته‌بندی: شربت ۱۲۵ میلی‌گرم = ۵ میلی‌لیتر × ۶۰ میلی‌لیتر، کپسول ۲۵۰ و ۵۰۰ × ۱۰۰، قطره ۱۰۰ میلی‌گرم = ۱ میلی‌لیتر × ۱۰.

بها: کپسول ۲۵۰ میلی هر عدد ۱۰ ریال، ۵۰۰ میلی هر عدد ۱۳ ریال، شربت ۱۰۵ ریال، قطره ۷۰ ریال.

THEO - LITE
عبیدی ـ ایران

ترکیب: هر قاشق چایخوری: مالئات کلرفنیرامین ۱ میلی‌گرم + فنوباربیتال ۴ میلی‌گرم + سولفات افدرین ۱۲ میلی‌گرم + تئوفیلین ۱۵ میلی‌گرم + گایاکولات گلیسریل ۵۰ میلی‌گرم.

موارد استعمال: پیشگیری و تخفیف آسم برونش، برونشیت مزمن همراه با آمفیزم، تب یونجه، رینیت آلرژیک و آلرژیهای غیرفصلی دستگاه تنفسی فوقانی.

مقدار مصرف و طرز استعمال: خردسالان ۳ ـ ۶ سال: هر ۳ ساعت یک چهارم تا نصف قاشق مرباخوری چهار بار در روز، خردسالان ۶ ـ ۱۲ سال: هر ۳ ساعت ۱ قاشق مرباخوری ۴ بار در روز، بزرگسالان: هر ۳ ساعت ۲ قاشق مرباخوری ۴ بار در روز.

بسته بندی: الگزیر ۱۲۰ میلی‌لیتر.

بها: ۷۶ ریال.

T

THEO - LITE Tab.
عبیدی ـ ایران

ترکیب: کلریدرات تنیل پیرامین ۱۰ میلی‌گرم + افدرین سولفات ۲۴ میلی‌گرم + گلیسریل گایاکولات ۱۰۰ میلی‌گرم + تئوفیلین ۱۰۰ میلی‌گرم + فنوباربیتال ۸ میلی‌گرم.

موارد استعمال: پیشگیری و درمان حمله‌های آسمی، برونشیت مزمن، برونکواسپاسم، آسم برونشیک، تب یونجه، رینیت آلرژیک، آلرژیهای غیرفصلی.

مقدار مصرف و طرز استعمال: روزی ۳ـ۴ قرص. خردسالان ۶ـ۱۲ سال: نصف مقدار فوق.

موارد منع استعمال: بیماریهای قلبی، دیابت قندی، هیپرتیروئیدیسم، هیپرتانسیون، پروستاتیسم.

عوارض جانبی: بیقراری، سرگیجه، طپش قلب، تعریق، خشکی دهان، بی‌اشتهائی.

بسته بندی: دراژه × ۲۴.

بها: ۴۸ ریال.

THERALENE
تراپلیکس ـ فرانسه

ترکیب: تارترات آلی تری‌میرازین.

موارد استعمال: درمان بیماریهای آلرژیک، کاردیولوژیک، درماتولوژی، درمان سرفه و سیاه‌سرفه، خارش.

مقدار مصرف و طرز استعمال: قرص: روزی ۱ تا ۸ عدد. قطره: یک قطره برای هرکیلو وزن بدن در روز، شربت: روزی ۱ تا ۶ قاشق مرباخوری.

احتیاط: بهتر است دوز بیشتر در شب تجویز شود.

بسته بندی: قرص ۵ میلی‌گرم × ۵۰ و ۵۰۰، قطره ۰/۴ میلی‌گرم = ۱۰ میلی‌لیتر × ۳۰ میلی‌لیتر، شربت ۵ میلی‌گرم = ۱۰ میلی‌لیتر × ۱۵۰ میلی‌لیتر.

بها: قرص ۵۰ عددی ۳۷ ریال، ۵۰۰ عددی ۱۴۳ ریال، قطره ۶۲ ریال، شربت ۴۵ ریال.

THIOBANZYME
بوشارا ـ فرانسه

ترکیب: در هر آمپول پودر: دی بنکوزید ۵ میلی‌گرم + منونیترات تیامین ۵۰ میلی‌گرم + پیریدوکسین ۱۰۰ میلی‌گرم + مرکوروتیولات سدیم ۰/۰۴ میلی‌گرم. در هر آمپول حلال: تیوسولفات سدیم ۲ میلی‌گرم + سولفیت سدیم ۵ میلی‌گرم + الکل بنزیلیک ۵۰ میلی‌گرم + پاراهیدروکسی بنزوات متیل ۴ میلی‌گرم + پاراهیدروکسی بنزوات پروپیل ۱ میلی‌گرم.

موارد استعمال: آرتروز و درد روماتیسمی، آرتروزهای ستون فقرات پشتی ـ گردنی و کمری، پری آرتریت کتفی، لمبالژی، درد کمر و سیاتیک، دردهای گردنی و بازوئی.

مقدار مصرف و طرز استعمال: روزی یک تزریق عضلانی بمدت ۱۵ تا ۲۰ روز.

بسته بندی: آمپول پودر + حلال ۵ میلی‌لیتر × ۴.

بها: ۴۰۰ ریال.

THIODERAZINE
میدی فرانسه ـ آترا ایران

ترکیب: تیوکاربامید + دی یدومتیلات متیل پیپرازین + پیپرازین + ویتامین B_1.

موارد استعمال: روماتیسم مزمن، روماتیسم مزمن عمومی و موضعی، نوراگزیتهای دردناک، تصلب عروقی.

مقدار مصرف و طرز استعمال: روزی ۲ ـ ۳ بار، هربار ۲۰ ـ ۳۰ قطره بعد از غذا.

بسته بندی: قطره خوراکی ۵۰ میلی‌لیتر.

بها: ۴۲ ریال.

THIOTEPA
لدرلی ـ آمریکا

ترکیب: در هر ویال تیوتپا = تری اتیلن تیوفسفرآمید ۱۵ میلی‌گرم.

موارد استعمال: سرطان پستان و تخمدان، کارسینوم، برونشها، لنفوم سارکوم، بیماری هوجکین.

مقدار مصرف و طرز استعمال: برحسب شدت بیماری در عضله یا ورید تزریق شود.

بسته بندی: ویال × ۱.

بها: ۱۳۵ ریال.

THYRANON
ارگانون هلند ـ ایران

ترکیب: در هر قرص: پودر غده تیروئید با نسبت دائمی ۳۰ درصد یدارگانیک ۱۰۰ میلی‌گرم.

موارد استعمال: کلیه مواردی که هورمون تیروئید لازم است.

مقدار مصرف و طرز استعمال: خردسالان: روزی ۱۲/۵ تا ۲۵ میلی‌گرم بزرگسالان: ۳۷/۵ تا ۷۵ میلی‌گرم در روزکه مقدار دارو بتدریج اضافه میشود.

بسته بندی: قرص × ۱۰۰.

بها: ۱۷۰ ریال.

THYROBOLINE
شوئه ـ فرانسه

ترکیب: هورمون طبیعی غده تیروئید ۵ سانتی‌گرم + مقداری ید اضافی.

موارد استعمال: هیپوتیروئیدی، هیپرتیروئیدی همراه با تیواوراسیل، آمنوره هیپرکلسترولمی، چاقی، سلولیت بزرگسالان، درماتوز، اکزما.

مقدار مصرف و طرز استعمال: روزی ۲ ـ ۳ بار، هربار ۱ ـ ۳ قرص.

عوارض جانبی: گاهی طپش قلب.

بسته بندی: قرص ۵ سانتی‌گرم × ۳۰، قرص ۱ سانتی‌گرم × ۴۰.

بها: قرص ۵ سانتی ۴۱ ریال، ۱ سانتی ۳۶ ریال.

TIAFA 300
لپتی ایتالیا ـ ایران

ترکیب: در هر قرص مونونیترات ویتامین B_1 ۳۰۰ میلی‌گرم.

موارد استعمال: دردهای عصبی، اختلالات روانی و حسی، اختلالات گوارشی، تأخیر رشد و نمو، درمان بیماریهای عفونی.

مقدار مصرف و طرز استعمال: بزرگسالان: روزی ۱ ـ ۳ قرص.

بسته بندی: قرص × ۲۰.

بها: ۷۰ ریال.

TIFOMYCIN
روسل ـ فرانسه

ترکیب: کلرامفنیکل.

موارد استعمال: عفونتهای گرم منفی، عفونتهای ویروسهای درشت و ریکتزیاها.

مقدار مصرف و طرز استعمال: قرص: هر ۶ ساعت ۲ ـ ۳ عدد. شربت: هر ۶ ساعت ۲ ـ ۳ قاشق مرباخوری. آمپول: شیرخواران، خردسالان، بزرگسالان بترتیب: نصف ـ یک یا دوآمپول ۲ ـ ۳ بار در روز.

احتیاط: درصورت مصرف طولانی شمارش گلبولی لازم است.

بسته بندی: قرص ۲۵۰ میلی‌گرم × ۱۲ شربت: پالمیتات کلرامفنیکل ۱۲۵ میلی‌گرم = ۵ میلی‌لیتر × ۶۰ میلی‌لیتر. آمپول ۵۰۰ میلی‌گرم = ۲ میلی‌لیتر × ۶، قطره ۱۰ میلی‌لیتر.

بها: قرص ۸۴ ریال، شربت ۱۰۵ ریال، آمپول ۱۷۶ ریال، قطره ۴۷ ریال.

TIKACILLIN 600,000
TIKACILLINE 1,000,000
آسترا ـ سوئد

ترکیب: فنوکسی متیل پنی‌سیلین.

موارد استعمال: درمان کلیه عفونتهائیکه به پنی‌سیلین حساسند.

مقدار مصرف و طرز استعمال: یک قرص ۳ بار در روز بمدت ۷ روز.

موارد منع استعمال: افرادیکه به‌پنی‌سیلین حساس هستند.

بسته بندی: قرص × ۲۱.

بها: ۶۰۰ هزار واحدی ۲۵۲ ریال، یک میلیون واحدی ۳۳۶ ریال.

TINADERM Solution
شرینگ آمریکا ـ ایران

ترکیب: محلول ۱ درصد ۲ ـ نفتیل متا، ان دی متیل تیوکاربانیلات = تولنافتات.

موارد استعمال: عفونتهای قارچی پوست مانند کچلی تنه، کچلی کشاله ران، کچلی ریش، کچلی پا و دست و کچلی ورسیکالر.

مقدار مصرف و طرز استعمال: روزی ۲ تا ۳ بار هردفعه یک تا دو قطره محلول را درسطح ضایعه مالش دهند.

بسته بندی: ۱۰ میلی‌لیتر.

بها: ۱۱۷ ریال.

TIOPHYLLIN
بیوکمیکال ـ آلمان

ترکیب: آمینوفیلین.

موارد استعمال: آسم برنشیال و قلبی، نارسائی قلبی، آنژین صدری، اسکلروز عروق اکلیلی، اسپاسم عروقی.

مقدار مصرف و طرز استعمال: روزی ۱۲۵ـ۵۰۰ میلی‌گرم تزریق وریدی با سرعت حداقل ۵ دقیقه برای هر تزریق.

عوارض جانبی: گاهی تهوع و استفراغ، سرگیجه، سردرد، کاهش سریع فشارخون.

بسته‌بندی: آمپول ۲۵۰ میلی‌گرم = ۱۰ میلی‌لیتر × ۱۰.

بها: ۱۶۶ ریال.

TOCOGESTIN
ترامکس ـ فرانسه

ترکیب: در هر ۲ میلی‌لیتر: ۱۷ آلفا هیدروکسی پروژسترون ۵۰ میلی‌گرم + دی‌ال ـ آلفا توکوفرول ۲۵۰ میلی‌گرم.

موارد استعمال: افزایش سطح هورمونی و ویتامینی بدن.

مقدار مصرف و طرز استعمال: روزی ۲ تزریق بمدت ۱ تا ۸ روز.

بسته‌بندی: آمپول × ۲.

بها: ۲۸۰ ریال.

TOFRANIL
گایگی ـ سویس

ترکیب: کلریدرات N ـ (گاما ـ دی‌متیل آمینو ـ پروپیل) ایمینودی بنزیل = کلریدرات ایمی پرامین.

موارد استعمال: دپرسیونهای اندوژن و اگزوژن، یائسگی، نوروتیک و نهانی.

مقدار مصرف و طرز استعمال: خردسالان: روزی ۱۰ ـ ۲۰ میلی‌گرم بزرگسالان: روزی ۵۰ میلی‌گرم.

احتیاط: در بیمارانی که نارسائی قلبی و عروقی دارند در مقدار مصرف دارو باید احتیاط بعمل آید.

بسته‌بندی: دراژه ۲۵ میلی‌گرم × ۵۰، دراژه ۱۰ میلی‌گرم × ۶۰، آمپول ۲۵ میلی‌گرم = ۲ میلی‌لیتر × ۱۰.

T

بها: دراژه ۲۵ میلی ۲۲۰ ریال، ۱۰ میلی ۱۶۰ ریال، آمپول ۳۶۰ ریال.

TOLINASE
آپجان ـ آمریکا

ترکیب: در هر قرص: ۱ ـ (هگزائیدرو ـ ۱ ـ آزپی نیل) ـ ۳ ـ پارا ـ تولیل ۳ سولفونیل اوره = تولازامید ۲۵۰ میلی‌گرم.
موارد استعمال: هیپرگلیسمی.
مقدار مصرف و طرز استعمال: برحسب شدت بیماری متفاوت است.
موارد منع استعمال: بیماریهای قندی همراه با عفونت، کتوزیس، اسیدوز، کوما، بیماران مبتلا به ناراحتیهای کلیوی.
بسته بندی: قرص × ۲۰.
بها: ۱۳۰ ریال.

TOLIVIT
تولیدارو ـ ایران

ترکیب: ویتامین A ۵۰۰۰ واحد + ویتامین D ۴۰۰ واحد + ویتامین C ۱۰۰ میلی‌گرم.
موارد استعمال: کمبود ویتامین های فوق.
مقدار مصرف و طرز استعمال: روزی یک آمپول خوراکی.
بسته بندی: آمپول خوراکی ۵ میلی‌لیتر × ۲۰.
بها: ۱۰۵ ریال.

TOMANOL
بیک گلدن ـ آلمان

ترکیب: در هر آمپول: ۴ ـ ان ـ بوتیل ـ ۱ و ۲ دی متیل ـ ۳ و ۵ دی اکسوپیرازولیدین = فبوزین ۰/۶ گرم + ۴ ـ متوایزو پروپیل ـ آمینو ـ ۱ ـ فنیل ۲ و ۳ دی متیل پیرازولون (۵) = ایزوپیرین ۱/۲ گرم. درهر قرص: فبوزین ۰/۱ گرم + ایزوپیرین ۰/۲ گرم. در هر شیاف: فبوزین ۰/۲ گرم + ایزوپیرین ۰/۴ گرم.
موارد استعمال: روماتیسم حاد، آرتریت روماتوئید، میالژی، لومباگو، نقرس، اسپوندیلوز.
مقدار مصرف و طرز استعمال: در موارد شدید: ابتدا روزی ۱ آمپول بعد با روزی ۳ بار، هربار ۲ قرص ادامه داده و بعد آنرا به روزی ۳ قرص میرسانند.

T

موارد منع استعمال: علایم اولسرپپتیک، نارسائی قلبی و کلیوی، دیابت، حساسیت به‌پیرازول‌ها، در مواقع معالجه با آنتی‌-کواگولانها.

بسته‌بندی: آمپول ۵ میلی‌لیتر × ۵. قرص × ۲۰ شیاف × ۲۰.

بها: آمپول ۱۹۰ ریال. قرص ۱۲۰ ریال، شیاف ۱۶۰ ریال.

TONATON
لوئیت پولد ـ آلمان

ترکیب: در هر ۴ دراژه یا یک دوز: عصاره یوهمبین ۱۲/۵ میلی‌گرم + عصاره باقلای سنت ایگناس ۱۲/۵ میلی‌گرم + نیترات متیل آتروپین ۰/۳ میلی‌گرم + کلریدرات افدرین ۳/۳ میلی‌گرم.

موارد استعمال: مقوی امیال جنسی، خستگی، دپرسیون.

مقدار مصرف و طرز استعمال: روزی ۳ بار، هربار ۴ دراژه یکجا بعد از هر غذا بمدت ۶ هفته.

احتیاط: درمان را باید حداقل بمدت دو هفته ادامه داد.

بسته‌بندی: دراژه × ۱۰۰.

بها: ۲۶۰ ریال.

TONICORINE
لومات و بوانوـ فرانسه

ترکیب: در هر میلی‌لیتر قطره: کامفتامید ۲۵ سانتی‌گرم.

موارد استعمال: بیماریها و ناراحتی‌های قلبی در مبتلایان به‌افزایش فشارخون، حالات سنکوپ قلبی و تنفسی، کولاپسوس، لیپوتیمی آسفیکسی.

مقدار مصرف و طرز استعمال: بزرگسالان: روزی ۳۰ ـ ۱۵۰ قطره، خردسالان: نصف یا ربع بزرگسالان.

بسته‌بندی: قطره ۱۴/۵ میلی‌لیتر.

بها: ۳۲ ریال.

T

TONOPAN
ساندوزـ سویس

ترکیب: در هر قرص: متان سولفات دی‌هیدروارگوتامین ۰/۵ میلی‌گرم + دی‌متیل آمینوفنازون ۱۲۵ میلی‌گرم + کافئین ۴۰ میلی‌گرم + بوتال بیتال (اسید ایزوبوتیل آللیل باربیتوریک) ۴۵ میلی‌گرم.

موارد استعمال: انواع سردردهای عروقی.

مقدار مصرف و طرز استعمال: ۲ قرص که در صورت لزوم میتوان هر نیم‌ساعت یکبار تکرار کرد.

بسته بندی: قرص × ۲۰.

بها: ۱۵۰ ریال.

TONOVAN

شرینگ آلمان ـ ایران

ترکیب: هر کپسول: ۱۷ ـ بتاهیدروکسی ۱ ـ آلفامتیل ۵ آلفا ـ اندوستان ۳ ان ـ مسترولون ۷/۵ میلی‌گرم + آلفاتوکوفرول استات ۱۱ میلی‌گرم + کلریدرات یوهمبین ۲ میلی‌گرم + استریکنین نیترات ۰/۱ میلی‌گرم + منیزیوم نیکوتینات ۱۰ میلی‌گرم.

موارد استعمال: اختلالات نیروی جنسی، اختلالات در قدرت مقاربت، کاهش میل جنسی، نعوظ ناکامل، اختلالات انزال و دفع منی، دپرسیون، کمی ظرفیت و قدرت جسمی، خستگی سریع، کاهش قدرت تمرکز، ترشروئی و بدخلقی، نقصان میل جنسی و قدرت جنسی که در میانسالی پیدا می‌شود. اختلالات باروری، فقدان قدرت باروری و توالدی در اثر ضعف قدرت و اختلالات متوسط اسپرماتوژنز.

مقدار مصرف و طرز استعمال: در مورد اختلالات قدرت جنسی میتوان درمان را با روزی ۳ بار، هربار ۲ کپسول آغاز کرد. توصیه میشود که دوره درمان را به‌مدت ۴ـ۸ هفته ادامه داده‌و در جریان این دوره درمان میتوان مقدار استعمال را به‌روزی ۲ یا یک کپسول کاهش داد. در موردیکه دوره درمان تکرار میشود بایستی حداقل ۲ هفته بین هر دوره درمان فاصله داد زیرا ترکیب یوهمبین و استریکنین را نمیتوان بطور دائم مصرف نمود.

موارد منع استعمال: سرطان پروستات.

احتیاط و عوارض جانبی: در مردانی که تحت درمان با دارو میباشند بایستی مرتباً آزمایش از راه مقعد برای کنترل پروستات بعمل

T

آید در موارد نادر در آغاز درمان کمی حالت عصبانیت، طپش قلب و احساس گرمی به‌بیمار دست میدهد که در جریان درمان از بین میرود.

بسته بندی: کپسول × ۳۰.

بها: ۱۷۶ ریال.

TOPIFRAM
روسل ـ فرانسه

ترکیب: در هر ۱۰۰ گرم: دگزامتازون ۲۵۰ میلی‌گرم + سولفات فرامیستین ۷۵۰ میلی‌گرم + گرامیسیدین ۲۵ میلی‌گرم + نیترات فنیل مرکوریک ۱ میلی‌گرم.

موارد استعمال: درماتوزهای خشک و مرطوب، انواع بیماریهای پوستی همراه با عفونت.

مقدار مصرف و طرز استعمال: بیماریهای ویروسی و سل پوستی.

بسته بندی: محلول ۱۵ گرم.

بها: ۱۸۷ ریال.

TORECAN
ساندوز سویس ـ پارس ایران

ترکیب: در هر قرص یا هر میلی‌لیتر آمپول: تی‌اتیل پرآزین ۶/۵ میلی‌گرم.

موارد استعمال: تهوع و استفراغ ناشی از اختلالات گوارشی و کبدی، آبستنی، اورمی، ناسازگاری بداروها، سرگیجه موجود در آرتریو اسکلروز، سندرم منیر، ضایعات وارده برگوش داخلی و عوارض ناشی ازصدمات وارده برسر.

مقدار مصرف و طرز استعمال: روزی ۱ ـ ۳ بار، هربار یک قرص.

موارد منع استعمال: ضعف مفرط و حالات اغما، خردسالان کمتر از ۱۵ سال.

عوارض جانبی: گاهی عوارض پارکینسون.

بسته بندی: قرص × ۲۰، آمپول ۱ میلی‌لیتر × ۶.

بها: قرص ۵۹ ریال، آمپول ۱۱۷ ریال.

TOSMILEN O. 25
لینز ـ اتریش

ترکیب: برموردمکاریوم ۰/۲۵ درصد.
موارد استعمال: گلوکوم اولیه و ثانویه، ایجاد میوزیس در چشم، محو اثرات آتروپین.
مقدار مصرف و طرز استعمال: معمولا روزی ۱ قطره.
موارد منع استعمال: آسم برونشیک، ناراحتیهای معدی ـ روده‌ای، برادی کاردی.
بسته بندی: قطره چشمی ۵ میلی‌لیتر.
بها: ۷۵ ریال.

TOSUMAN
برنا ـ سویس

ترکیب: گاماگلوبولین حاصل از خون اشخاص مصون به هموفیلوس پروتوسیس
موارد استعمال: پیش گیری و درمان بیماری سیاه سرفه.
مقدار مصرف و طرز استعمال: ۰/۲ میلی‌لیتر برای هر کیلوگرم وزن بدن بشکل زیرجلدی یا داخل عضلانی
بسته بندی: آمپول ۳۲۰ میلی‌گرم = ۲ میلی‌لیتر × ۱.
بها: ۱۱۰۰ ریال.

TOTAL
آلرگان ـ آمریکا

ترکیب: پلی وینیل الکل + ادتات دی سدیم + کلرو ربنز الکونیوم.
موارد استعمال: برای پاک کردن و خیس کردن و نگهداری لنزها قبل از قراردادن در چشم.
مقدار مصرف و طرز استعمال: لنزها را طبق دستور پزشک در محلول نگاهداری میکنند.
بسته بندی: محلول استریل ۶۰ میلی‌لیتر.
بها: ۱۰۴ ریال.

T

TRAL Gradumet
ابوت ـ آمریکا

ترکیب: هگزوسیکلیوم متیل سولفات.
مکانیسم: با رقابت با استیل کولین در قرارگرفتن روی گیرنده‌های موسکارینی اعصاب پاراسمپاتیک از اثر استیل کولین در اعضاء بدن جلوگیری میکند.

موارد استعمال: زخم معده و اثنی عشر.
مقدار مصرف و طرز استعمال: هر ۱۲ ساعت یک قرص پیش از غذا.
موارد منع استعمال: گلوکوم، هیپرتروفی پروستات، بیماریهای انسدادی دستگاه گوارشی، ناراحتیهای قلبی ـ عروقی.
عوارض جانبی: گاهی خواب‌آلودگی.
بسته بندی: قرص ۵۰ میلی‌گرم × ۳۰.
بها: ۱۶۲ ریال.

TRANQUINE
عبیدی ـ ایران

ترکیب: دیازپام.
مکانیسم: سبب دپرسیون هیپوتالاموس و بصل‌النخاع میشود.
موارد استعمال: اضطراب عدم تعادل دستگاه عصبی، انقباضات عضلات.
مقدار مصرف و طرز استعمال: روزی ۱ ـ ۳ بار، هربار یک قرص.
موارد منع استعمال: میاستنی گراو، گلوکوم حاد.
احتیاط: افراد مسن.
عوارض جانبی: خواب‌آلودگی، سردرد، خستگی، افسردگی، هیپوتانسیون.
بسته بندی: قرص ۵ میلی‌گرم × ۳۰.
بها: ۱۰۵ ریال.

TRANQUIPAM
دوپار ـ ایران

ترکیب: ۷ ـ کلرو ـ ۱ ـ متیل ـ فنیل ـ ۳ ـ ۱، ۴ بنزودیازپین ـ ۲ ـ (H ـ ۱) اون = دیازپام.
اثر متقابل: مصرف توأم آن با الکل سبب تشدید اثر آن میشود. نباید توأم با ضد انعقادهای خوراکی و لوودوپا مصرف شود.
موارد استعمال: تحریکات عصبی و روانی، عدم آرامش، تشویش و اضطراب، بیخوابی، ترس شدید.
مقدار مصرف و طرز استعمال: روزی ۳ بار، هربار ۱ قرص متناسب با شدت بیماری.
موارد منع استعمال: میاستنی گراو، گلوکوم حاد.
عوارض جانبی: در صورت مصرف بیش از حد سرگیجه، خستگی و

T

ضعف عضلانی ایجاد میشود.
بسته بندی: قرص ۲، ۵ و ۱۰ میلی‌گرم × ۲۰.
بها: ۲ میلی ۵۹ ریال، ۵ میلی ۹۵ ریال، ۱۰ میلی ۱۳۴ ریال.

TRANQUIRIT
انستیتو مدیکامنتا ـ ایتالیا
ترکیب: در هر کپسول: ۷ـ کلرو ـ ۱ ـ متیل ـ فنیل ـ H۳ ـ ۱، ۴ بنزودیازپین ـ ۲ ـ (H ۱) ـ اون ـ دیازپام ـ ۱۰ میلی‌گرم.
موارد استعمال: هیجان اولیه و ثانویه، فشار روحی، بیخوابی.
مقدار مصرف و طرز استعمال: روزی ۱ ـ ۲ کپسول.
بسته بندی: کپسول × ۲۰.
بها: ۱۴۰ ریال.

TRANQUO - ADAMON
آستا ـ آلمان
ترکیب: در هر قرص: برمورسیکلونیوم ـ آدامون ۱۰ میلی‌گرم + مپروبامات ۲۰۰ میلی‌گرم.
موارد استعمال: اسپاسمهای ناشی از گاستریت و زخم اثنی‌عشر، دیسمنوره، اسپاسم مجاری ادراری و صفراوی.
مقدار مصرف و طرز استعمال: روزی ۳ بار، هربار ۱ ـ ۲ قرص.
موارد منع استعمال: گلوکوم، کاهش تونوس مثانه.
بسته بندی: قرص × ۲۰.
بها: ۱۵۶ ریال.

TRANQUO - BUSCOPAN
بهرینگر اینگلهایم
آلمان ـ تولیدارو
ایران
ترکیب: در هر قرص: بوسکوپان ۱۰ میلی‌گرم + اکسازپام ۱۰ میلی‌گرم. در هر شیاف: به‌ترتیب ۱۰ میلی‌گرم + ۳۰ میلی‌گرم.
موارد استعمال: اختلالات عصبی معده در اثر دلهره، اضطراب، خستگی و استرس، اولسر پپتیک وگاسترو دوئودنیت، اسپاسم دردناک مجاری صفراوی در اثر حالات عصبی، اضطراب و خستگی‌های فکری، اسهال و یبوست‌های با منشأ عصبی، دیسمنوره، حالات عصبی قبل از قاعدگی، تظاهرات یائسگی همراه با دپرسیون.

مقدار مصرف و طرز استعمال: روزی ۳ ـ ۴ بار، هربار ۱ قرص.
احتیاط: مانند آرام بخش‌های دیگر با دوزهای بالا صلاحیت رانندگی بیمار را نقصان میدهد.
بسته بندی: دراژه × ۲۰. شیاف × ۵.
بها: قرص ۱۰۵ ریال، شیاف ۱۰۵ ریال.

TRANSAMIN
دائی‌چی‌سیکو ـ ژاپن

ترکیب: ترانس آمینو متیل سیکلوهگزان کربو کسیلیک اسید.
موارد استعمال: پورپورآ، آنمی آپلاستیک، سرطان خون، بیماریهای ریوی، بیماری‌های کلیوی، جراحی‌های عمومی، بیماری‌های پوست، گوش و حلق و بینی.
مقدار مصرف و طرز استعمال: روزی ۳ ـ ۴ بار، هربار ۱ ـ ۲ کپسول.
آمپول: ۲ تزریق صبح و عصر هنگام جراحی و بعد از آن ۲ الی ۱۰ آمپول مخلوط با محلول‌های غذائی گلوکز یا رینگر.
احتیاط: تزریق داخل وریدی باید خیلی آهسته انجام گیرد.
عوارض جانبی: با مقادیر زیاد تهوع.
بسته‌بندی: کپسول ۲۵۰ میلی‌گرم × ۱۰۰، آمپول ۲۵۰ میلی‌گرم = ۲/۵ میلی‌لیتر × ۱۰، آمپول ۲۵۰ میلی‌گرم = ۵ میلی‌لیتر × ۱۰.
بها: کپسول ۴۰۰ ریال. آمپول ۱۸۰ ریال.

TRANSFUSO - VAC
باکستر ـ ایران

ترکیب: سیترات سدیم ۱/۳۲ گرم + اسید سیتریک ۰/۴۴ گرم + دکستروز ۱/۴۷ گرم + آب‌مقطر مقدار کافی تا ۱۰۰ میلی‌لیتر.
بسته‌بندی: شیشه ۴۲۵ میلی‌لیتر با ۶۲/۵ میلی‌لیتر محلول ACD و گنجایش ۲۵۰ میلی‌لیتر خون، ۵۰۰ میلی‌لیتر با ۱۲۰ میلی‌لیتر و گنجایش ۴۸۰ میلی‌لیتر.
بها: ۲۵۰ میلی ۷۵ ریال، ۵۰۰ میلی ۸۳ ریال.

TRANXENE
کلن بیلا ـ فرانسه

ترکیب: پتاسیم کلرآزپات.
موارد استعمال: اضطراب ناشی از هر علل مختلف.

مقدار مصرف و طرز استعمال: موارد خفیف ۱۵ ـ ۳۵ میلی‌گرم. موارد شدید ۲۰ ، ۸۰ میلی‌گرم. خردسالان: ۵ میلی‌گرم برای هر ۱۰ کیلووزن.

بسته بندی: قرص ۵ و ۱۰ میلی‌گرم × ۳۰.

بها: قرص ۵ میلی ۱۰۵ ریال، ۱۰ میلی ۱۶۴ ریال.

TRASICOR 80
سیبا ـ سویس

ترکیب: در هر قرص: ۱ ـ (او ـ آلیل اکسی فنوکسی) ـ ۳ ـ ایزوپروپیل آمینو ـ ۲ ـ پروپانول کلریدرات = اُکس پرنولول ۸۰ میلی‌گرم.

موارد استعمال: فشارخون بالا.

مقدار مصرف و طرز استعمال: روزی ۲ بار، هربار یک قرص بمدت ۱ ـ ۲ هفته.

موارد منع استعمال: برادیکاردی، بیماریهای ریوی، اورمی.

عوارض جانبی: گاهی عوارض ریوی ـ قلبی و معدی ـ روده‌ای، سرگیجه.

بسته بندی: قرص × ۴۰.

بها: ۷۰۰ ریال.

TRASYLOL
بایر ـ آلمان

ترکیب: ماده بیولوژیک وقفه دهنده کالیکرئین.

موارد استعمال: درمان و پیشگیری شوک تروماتیک هموراژیک و آمبولی چربی، پانکراتیت حاد و شوک پانکراتوژنیک، پریتونیت پرفوراتیو، شوک ناشی از خونریزی و خونریزیهای هیپر-فیبرینولیتیک ، پیشگیری از نکروز پانکراس، آمبولی ریوی، خونریزیهای بعد از اعمال جراحی.

مقدار مصرف و طرز استعمال: درمان: ابتدا ۵۰۰ هزار واحد و سپس هر ۴ تا ۶ ساعت ۲۰۰ هزار واحد داخل ورید. پیشگیری: ابتدا ۲۰۰ هزار واحد و سپس هر ۶ ساعت ۱۰۰ هزار واحد داخل وریدی.

بسته بندی: آمپول ۱۰۰ هزار واحد ۵ میلی‌لیتر × ۵.

بها: ۳۶۰۰ ریال.

T

TRENTAL
هوخست ـ آلمان

ترکیب: ۳، ۷ دی‌متیل ـ ۱ ـ (۵ اکسو ـ هگزیل) ـ گزانتین = پنتوکسی فیلین.

موارد استعمال: درد عضلات پاها ناشی از اختلالات گردش خون، اسپاسم عضلانی، گانگرن.

مقدار مصرف و طرز استعمال: شروع درمان: روزی ۳ بار، هربار دو قرص. ادامه درمان: یک قرص.

موارد استعمال: نارسائی میوکارد، خونریزی، هیپوتانسیون.

عوارض جانبی: احساس فشار و پری معده، استفراغ، خارش.

بسته‌بندی: قرص ۱۰۰ میلی‌گرم × ۶۰.

بها: ۳۷۵ ریال.

TREVINTIX
تراپلیکس ـ فرانسه

ترکیب: پروتیونامید.

موارد استعمال: کلیه موارد سلهای ریوی و خارج ریوی.

مقدار مصرف و طرز استعمال: بزرگسالان: روزی ۱ تا ۴ قرص. خردسالان ۲۰ میلی‌گرم برای هر کیلو وزن بدن.

موارد منع استعمال: علائم عدم تحمل.

احتیاط: این دارو حتماً باید با سایر داروهای ضد سل تجویز شود.

بسته‌بندی: قرص ۱۲۵ و ۲۵۰ میلی‌گرم × ۴۰ و ۵۰۰

بها: قرص ۱۲۵ میلی ۴۰ عددی ۳۶۴ ریال، ۵۰۰ عددی ۳۶۴۰ ریال، قرص ۲۵۰ میلی ۴۰ عددی ۲۰۰ ریال، ۵۰۰ عددی ۲۰۰۰ ریال.

TRICLORYL
گلاکسو انگلستان ـ
داروپخش ایران

ترکیب: در هر قرص یا هر قاشق مرباخوری بزرگ شربت: ملح منوسدیک فسفات کلرواتیل تریکلوفوس ۰/۶ گرم.

موارد استعمال: انواع بیخوابیها در شب و برای آرامش در روز.

مقدار مصرف و طرز استعمال: بزرگسالان: ۲ قرص یا ۲ ـ ۴ قاشق مرباخوری شربت، قرصها یا شربت را باید در حدود نیم ساعت قبل از رفتن به رختخواب خورد.

بسته‌بندی: قرص × ۱۲، شربت ۵۰ میلی‌لیتر.

بها: قرص ۵۶ ریال، شربت ۷۰ ریال.

TRICOFURON Vaginal Powder
ایتون ـ آمریکا

ترکیب: فورازولیدون ۰/۱ درصد + نیفوروکسیم ۰/۵ درصد.
موارد استعمال: تریکوموناومونیلیای مهبل.
مقدار مصرف و طرز استعمال: پس از تمیز و خشک کردن مهبل یک یا دوبار در هفته پودر پاشیده می‌شود و درمان توأم با مصرف شیاف انجام می‌یابد.
موارد منع استعمال: حساسیت بدارو.
بسته‌بندی: پودر با اپلیکاتور ۱۵ گرم.
بها: ۵۷ ریال.

TRICOFURON Vaginal Suppositories
ایتون ـ آمریکا

ترکیب: فورازولیدون ۰/۲۵ درصد + نیفوروکسیم ۰/۳۷۵ درصد.
موارد استعمال: درمان تریکومونونا و مونیلیای مهبل.
مقدار مصرف و طرز استعمال: در هفته اول یک شیاف صبح و یکی شب موقع خواب و پس از هفته اول شبی یک شیاف.
موارد منع استعمال: حساسیت به‌دارو.
بسته‌بندی: شیاف × ۱۲.
بها: ۱۳۵ ریال.

TRIDOCELAN
روسل ـ فرانسه

ترکیب: ویتامین B_1 ۱۰۰ میلی‌گرم + ویتامین B_6 ۱۵۰ میلی‌گرم + ویتامین B_{12} ۱۰۰۰ میکروگرم + کلریدرات لینوکائین ۱۰ میلی‌گرم.
موارد استعمال: دردهای نورولوژیک، دردهای روماتیسمی، استئی، الکلیسم.
مقدار مصرف و طرز استعمال: هر روز یا یکروز در میان یک تزریق عضلانی بمدت ۱ ـ ۲ هفته.
موارد منع استعمال: تزریق وریدی و خردسالان.
بسته‌بندی: آمپول لیوفیلیزه + حلال ۵ میلی‌لیتر × ۶.

T

بها: ۲۳۴ ریال.

TRIDOCEMINE
روسل ـ فرانسه

ترکیب: ویتامین B_1 ۱۰۰ میلی‌گرم + ویتامین B_6 ۱۰۰ میلی‌گرم + ویتامین B_{12} ۱۰۰۰ میکروگرم.

موارد استعمال: پولی نوریت، نوریتهای توکسیک، نورالژی عصب سه قلو و انترکوستال، پارالیز فاسیال، زونا، میگرن، پری‌آرتریت، آرتروز، لومبوسیاتیک، استئوپوروز.

مقدار مصرف و طرز استعمال: یکروز در میان یک تزریق عضلانی بمدت ۱ـ۲ هفته.

موارد منع استعمال: تزریق وریدی و خردسالان.

بسته بندی: آمپول ۱ میلی‌لیتر × ۲.

بها: ۸۲ ریال.

TRI-HISTA
عبیدی ـ ایران

ترکیب: در هر قاشق چایخوری: مالئات کلرفنیرآمین ۱ میلی‌گرم + مالئات پیرپلامین ۱۰ میلی‌گرم + سیترات فنیل تولوکسامین ۳ میلی‌گرم + کلریدرات فنیل افرین ۵ میلی‌گرم + کلریدرات فنیل پروپانولامین ۱۰ میلی‌گرم.

موارد استعمال: احتقان بینی توأم باریزش آب، رینیت آلرژیک، آسم برونشیک و آلرژیک.

مقدار مصرف و طرز استعمال: کوچکتر از ۶ سال: هر ۴ ساعت نصف قاشق مرباخوری. ۶ـ۱۲ سال: هر ۴ ساعت ۱ قاشق مرباخوری. بزرگسالان: هر ۴ ساعت ۲ قاشق مرباخوری.

بسته بندی: شربت ۱۲۰ میلی‌لیتر.

بها: ۷۰ ریال.

T

TRILAFON
شرینگ آمریکا ـ ایران

ترکیب: ۱ ـ (۲ ـ هیدروکسی اتیل) ـ ۴ ـ [۳ ـ (۲ ـ کلرو ـ ۱۰ فنوتیازینیل) پروپیل] ـ پی‌پرازین = پرفنازین.

موارد استعمال: اضطراب، نگرانی، اختلالات روانی، سردرد، کهیر، درماتوز، کهولت و آرتریت، تهوع و استفراغ، گاستروآنتریت

و پسیکوز.

مقدار مصرف و طرز استعمال: روزی ۳ بار، هربار ۲ ـ ۴ میلی‌گرم حداکثر تا ۱۶ میلی‌گرم در درمان پسیکوز تا ۶۴ میلی‌گرم در روز مصرف می‌شود.

موارد منع استعمال: افسردگیهای روانی و افسردگیهای ناشی از داروهای دپرسیون دهنده دستگاه عصبی مرکزی. بیماران مبتلا به لکوپنی و سایر علائم دپرسیون مغز استخوان.

عوارض جانبی: علائم اکستراپیرامیدل، خشکی دهان و گاهی گیجی.

بسته بندی: قرص ۲، ۴، ۸ میلی‌گرم × ۳۰ و ۵۰۰. شربت ۲ میلی‌گرم = ۵ میلی‌لیتر × ۶۰ میلی‌لیتر. آمپول ۵ میلی‌گرم = ۱ میلی‌لیتر × ۵ و ۱۰۰.

بها: قرص ۲ میلی ۳۰ عددی ۶۵ ریال، ۵۰۰ عددی ۱۰۰۰ ریال، ۴ میلی ۳۰ عددی ۸۸ ریال، ۵۰۰ عددی ۱۴۱۰ ریال، ۸ میلی ۳۰ عددی ۷۶ ریال، ۵۰۰ عددی ۱۶۰۴ ریال، آمپول ۵ میلی ۵ عددی ۱۰۵ ریال، ۱۰۰ عددی ۱۷۶۰ ریال، شربت ۸۲ ریال.

TRINIDE
پاکستر ـ ایران

ترکیب: دکستروز ۵۰ گرم + نیکوتینامید ۱۰۰ میلی‌گرم + ریبوفلاوین ۲۰ میلی‌گرم + کلریدرات تیامین ۱۰ میلی‌گرم + آب‌مقطر مقدار کافی تا یک لیتر.

موارد استعمال: جراحی، عفونتها و اختلالات گوارشی، تب، آبستنی، هیپرتیروئیدیسم، بیماریهای اعصاب و بیماریهای روانی.

مقدار مصرف و طرز استعمال: برحسب نوع مصرف متفاوت است.

بسته بندی: محلول ۵۰۰ و ۱۰۰۰ میلی‌لیتر.

بها: ۵۰۰ میلی ۸۶ ریال، یک لیتری ۹۷ ریال.

TRINITRINE Retard
روژه بلون ـ فرانسه

ترکیب: تری‌نیترین ۲/۶ میلی‌گرم.

موارد استعمال: آنژین دوپواترین، نارسائی‌های سرخرگ‌های قلب، بقایای انفارکتوس.

مقدار مصرف و طرز استعمال: روزی ۲ ــ ۳ قرص بفواصل ۸ ــ ۱۲ ساعت
بسته بندی: قرص × ۲۰ .
بها: ۹۴ ریال.

TRINSICON
لی لی ـ آمریکا

ترکیب: عصاره کبد و معده کنسانتره محتوی فاکتور انترنسک ۲۴۰ میلی گرم + کبالامین ۷/۵ میکروگرم + عنصر آهن (بشکل فوما رات فرو) ۱۱۰ میلی گرم + ویتامین C ۷۵ میلی گرم.
موارد استعمال: آنمی پرنیسیوز، آنمی های مگالو بلاستیک و آنمی ناشی از فقر آهن.
مقدار مصرف و طرز استعمال: روزی ۲ بار، هربار یک کپسول همراه با غذا.
موارد منع استعمال: مانند سایر ترکیبات آهن دار در موارد همو کروماتوز و هیوسیتوز.
عوارض جانبی: بندرت واکنش های گوارشی از قبیل اسهال و یبوست.
بسته بندی: کپسول × ۳۰ .
بها: ۱۷۶ ریال.

TRIOLANDREN
سیبا ــ سویس

ترکیب: در هر آمپول: پروپیونات تستوسترون ۲۰ میلی گرم + ان ــ والریانات تستوسترون ۸۰ میلی گرم + آندسیلنات تستوسترون ۱۵۰ میلی گرم.
موارد استعمال: ضعف قوه باه، سرطان پستان، اختلال درگردش خون، درمیوکارد و در عروق محیطی.
مقدار مصرف و طرز استعمال: در هر ماه یک آمپول داخل عضلانی در سرطان پستان: یک آمپول در هفته.
بسته بندی: آمپول ۱ میلی لیتر × ۱ .
بها: ۲۲۰ ریال.

TRIPLOPEN
گلاکسو انگلستان ــ داروپخش ایران

ترکیب: در هر ویال: بنتامین پنی سیلین G ۵۰۰ هزار واحد + پروکائین پنی سیلین G ۲۵۰ هزار واحد + سدیم پنی سیلین G

۵۰۰ هزار واحد.

موارد استعمال: عفونتهای حاد موضعی مانند جوش، کورک، سلولیت، پیشگیری عفونت‌ها در سوانح و جراحی.

مقدار مصرف و طرز استعمال: یک تزریق که در صورت لزوم هر ۳ ـ ۴ روز یکبار تکرار میشود. در صورت لزوم بطور روزانه نیز قابل تزریق است.

احتیاط: فقط باید از راه داخل عضلانی مصرف شود.

بسته بندی: ویال × ۱.

بها: ۳۵ ریال.

TRI - S
عبیدی ـ ایران

ترکیب: در هر قرص: سولفادیازین ۱۶۷ میلی‌گرم + سولفاتیازول ۱۶۷ میلی‌گرم + سولفامرازین ۱۶۷ میلی‌گرم.

موارد استعمال: درمان عفونتهای حاد ناشی از پنوموکوک، مننگوکوک، استرپتوکوک، استافیلوکوک، دیسانتری شیگلا، تراخم کونژونکتیویت، عفونتهای پروتئوسی.

مقدار مصرف و طرز استعمال: پیشگیری: خردسالان: روزی ۱/۵ قرص بزرگسالان: روزی ۳ قرص. درمان: خردسالان: نصف بزرگسالان. بزرگسالان: در شروع درمان ۴ قرص و بعد از آن هر ۴ ساعت ۲ قرص.

عوارض جانبی و احتیاط: برای اینکه در ضمن درمان سولفامیدها حداقل عوارض بوجود آید بهتر است اولا دارو همراه با شیر و یا یک شربت قلیائی میل شود و هیچگاه با معده خالی مبادرت بمصرف آن نشود و باید درضمن مصرف مقدار زیادی آب نوشید.

بسته بندی: قرص × ۱۰۰.

بها: ۱۷۶ ریال.

T

TRISIBAM
دلالاند ـ فرانسه

ترکیب: تری سیلیکات بیسموت + آلومینیوم + منیزیم + سدیم.

موارد استعمال: بزرگسالان: زخمهای معده و اثنی‌عشر، گاستریت، اسهالهای کلیت، اسپاسمودیک. خردسالان: انواع اسهال با

هر منشأ (بعنوان بند آورنده).
مقدار مصرف و طرز استعمال: خردسالان: روزی یک گرم برای ۵ کیلو وزن. بزرگسالان: دو بسته قبل از دوغذای اصلی.
عوارض جانبی: با مقادیر زیاد سبب یبوست میشود.
موارد منع استعمال: تنگیهای عضوی روده، مصرف توام با تتراسیکلین - ها.
بسته بندی: بسته ۵ گرمی × ۲۰.
بها: ۱۶۰ ریال.

TRIZYMAL
بهرینگر مانهایم آلمان - تهران‌شیمی ایران

ترکیب: در هر دراژه: پانکراس ۱۵۰ میلی‌گرم + آنزیمهای قارچی ۱۰۰ میلی‌گرم + صفرای گاو ۲۵ میلی‌گرم.
موارد استعمال: اختلالات گوارشی ناشی از عدم فعالیت آنزیمهای معمولی معده و روده مانند نفخ و بی‌اشتهائی، کمبود آنزیم پس از جراحی.
مقدار مصرف و طرز استعمال: روزی ۳ بار، هربار ۱ ـ۲ دراژه همراه با غذا.
بسته بندی: دراژه × ۳۰.
بها: ۶۴ ریال.

TROBICIN
آپجان ـ آمریکا

ترکیب: در هر ویال اسپکتینومایسین دی هایدروکلراید پنتا - هیدرات معادل ۲ گرم اسپکتینومایسین.
موارد استعمال: اورتریت گونوکوکسیک، پروکتیت، گونوکوکسیک.
مقدار مصرف و طرز استعمال: در مردان یک دوز ۲ گرم داخل عضله. در زنان: یک دوز واحد ۴ گرم داخل عضله.
موارد منع استعمال: بیماران حساس به‌اسپکتینومایسین، نوزادان، سیفلیس.
بسته بندی: ویال ۲ گرم + حلال ۵ میلی‌لیتر.
بها: ۲۷۰ ریال.

TROFODERMIN
فارميتا ليا ـ ايتاليا

ترکیب: استرآنابول + نئومایسین.
موارد استعمال: اولسر پوستی، زونا، سوختگی، عفونتهای پیوژن، انترتریگو، هرپس زوستر.
مقدار مصرف و طرز استعمال: روزی ۱ ـ ۲ بار در محل میمالند و با گاز استریل می‌پوشانند.
بسته بندی: پماد ۳۰ گرم.
بها: ۷۰ ریال.

TROMEXAN
گایگی ـ سویس

ترکیب: در هر قرص: استراتیلیک اسید دی ۳ و ۳′ ـ (۴ ـ ئیدروکسی ـ کومارینیل) ـ استیک = اتیل بیسکوم استات ۳۰۰ میلی‌گرم.
موارد استعمال: ترومبوز و ترومبوفلبیت، سندرم‌های ترومبوآمبولی، آنفارکتوس میوکارد توأم با فیبریلاسیون دهلیزی.
مقدار مصرف و طرز استعمال: روز اول: ۳ ـ ۴ قرص. روز دوم: ۲ ـ ۳ قرص. روزهای بعد ۰/۵ ـ ۱/۵ قرص در ۲ ـ ۴ بار.
موارد منع استعمال: دیاتزهای هموراژی، ضایعات بدخیم پارانشیم کبد و کلیه، قرحه‌های معده و اثنی‌عشر، فشارخون‌های شدید، خونریزی مغزی، آبستنی.
احتیاط: اگر استعمال دارو باعث خونریزی شدید گردید از محلول ۲ درصد ویتامین K_1 بمقدار ۵ ـ ۲۰ قطره استفاده شود.
بسته بندی: قرص ۳۰۰ میلی‌گرم × ۱۰.
بها: ۱۷۰ ریال.

TROPHIRES
رولن ماری فرانسه ـ فارمکس ایران

T

ترکیب: در هر ۱۲۵ میلی‌لیتر شربت اطفال: فولکودین ۶۰ میلی‌گرم + تیوفن کربوکسیلات سدیم ۱۰۰۰ میلی‌گرم + تنطور اوکالیپتوس ۱۲ درصد ۲۵ میلی‌لیتر. در هر ۱۲۵ میلی‌لیتر شربت بزرگسالان: بترتیب ۱۳۳ میلی‌گرم + ۱۰۰۰ میلی‌گرم + تنطور اکالیپتوس ۱۲ درصد ۲۵ میلی‌لیتر.
موارد استعمال: سرفه‌های حاد و مزمن، آنژین، رینوفارنژیت، لارنژیت،

تراکئیت، برونشیت، زکام.
مقدار مصرف و طرز استعمال: نصف قاشق مرباخوری برای هر سال سن.
بسته‌بندی: شربت اطفال ۱۲۵ میلی‌لیتر. شربت بزرگسالان ۱۲۵ میلی‌لیتر
بها: شربت اطفال ۱۰۰ ریال، شربت بزرگسالان: ۱۴۰ ریال.

TROPHOBOLENE
اسپرت ـ فرانسه

ترکیب: ۳ ـ پروپیونیل ۱۷ ـ بتا ـ نیکوتیلولیل ۱، ۳، ۵ (۱۰) استراترین = نیکوتینات استرادیول ۱/۳ میلی‌گرم + ۱۷ بتا ـ اندسیلوئیل ۱۹ ـ نور ۴ اندروستن ۳ ـ اون = ناندرولون آندسیلات ۸۰ میلی‌گرم + ۱۷ آلفا ـ هپتی‌لوئیل ۴ ـ پرگنن ۳، ۲۰ دیون = انانتات پروژسترون ۸۰ میلی‌گرم.
موارد استعمال: تظاهرات و عوارض آترواسکلروز، عوارض عروقی و دژنراتیو، دیابت، اختلالات استخوانی، عوارض کهولت، پیوند ـ های نسجی و استخوانی.
مقدار مصرف و طرز استعمال: موارد شدید: هفته‌ای ۱ آمپول. موارد خفیف: ماهی یک تزریق عضلانی.
موارد منع استعمال: زنان آبستن، سرطان پروستات، اشخاص کمتر از ۱۵ سال.
عوارض جانبی: ایجاد علایم زنانه در مردان و علایم مردانه در زنان.
بسته‌بندی: آمپول ۱ میلی‌لیتر.
بها: ۲۵۰ ریال.

TRYPTIZOL
مرک شارپ انددوهم امریکا ـ ایران

ترکیب: کلریدرات آمی تریپ تیلین.
موارد استعمال: افسردگی، بیخوابی، بی‌علاقگی، بی‌اشتهائی.
مقدار مصرف و طرز استعمال: ۲۵ میلی‌گرم سه بار در روز و بندرت بیش از ۱۵۰ میلی‌گرم در ۲۴ ساعت ضرورت پیدا می‌کند.
موارد منع استعمال: گلوکوم، استعداد احتباس ادراری.
عوارض جانبی: اختلال در هوشیاری.
بسته‌بندی: قرص ۱۰ میلی‌گرم × ۱۰۰، قرص ۲۵ میلی‌گرم × ۳۰. آمپول ۱۰ میلی‌لیتر = ۱۰ میلی‌گرم × ۱.

T

بها: قرص ۱۰ میلی ۲۱۱ ریال، قرص ۲۵ میلی ۱۴۱ ریال. آمپول ۹۶ ریال.

TUBOCURARINE Chloride
ابوت ـ آمریکا

ترکیب: در هر میلی‌لیتر آمپول: کلرورتوبو- کورارین ۳۰ میلی‌گرم.

موارد استعمال: بعنوان عامل کمکی در بیحسی، جراحی، بیماریهای زنان و نیز کزاز و درمان شوکها.

مقدار مصرف و طرز استعمال: ابتدا ۱۰ ـ ۱۵ میلی‌گرم داخل وریدی که بعداً ۵ میلی‌گرم برای تکمیل اثر تزریق می‌شود.

بسته بندی: آمپول ۱۰ میلی‌لیتر.

بها: ۱۵۶ ریال.

TUSSICOF
عبیدی ـ ایران

ترکیب: در هر ۵ میلی‌لیتر: بنزوات سدیم ۶۰ میلی‌گرم + تری‌برمور ۷۵ میلی‌گرم + آنتی‌پیرین ۰/۳۵ میلی‌گرم + تنطور بلادون ۲۰ میلی‌گرم + عصاره تولو ۷۴ میلی‌گرم + کدئین ۱/۷ میلی‌گرم + کلروفرم ۱/۲۵ میلی‌گرم.

موارد استعمال: سیاه‌سرفه، گریپ، برونکوپنومونی، عوارض ریوی و بیخوابی خردسالان.

مقدار مصرف و طرز استعمال: خردسالان تا ۲ ساله: هر ۴ ساعت ۰/۵ ـ ۱ قاشق مرباخوری. خردسالان ۲ ـ ۵ ساله: هر ۴ ساعت ۱/۵ ـ ۲ قاشق مرباخوری. ۵ ـ ۱۰ ساله: هر ۴ ساعت ۱ قاشق غذاخوری.

بسته بندی: شربت ۹۰ میلی‌لیتر.

بها: ۵۶ ریال.

T

TUSSILAR Cough Sprup
آویسن ـ ایران

ترکیب: در هر صد میلی‌لیتر: هیدروبرمور- دکسترومتورفان ۳۰۰ میلی‌گرم.

موارد استعمال: سرفه های خشک و تحریکی.

مقدار مصرف و طرز استعمال: روزی ۳ ـ ۴ بار هربار: بزرگسالان ۱ ـ ۲

قاشق مرباخوری. خردسالان: ۱۰–۱۲ سال یک قاشق‌مرباخوری، ۵–۹ سال نصف قاشق مرباخوری، ۲–۴ سال $\frac{۱}{۴}$ قاشق مرباخوری.

بسته‌بندی: شربت ۱۰۰ میلی‌لیتر

بها: ۷۷ ریال.

TUSSIPECT Codeine
بایرسدروف آلمان – تولیدارو ایران

ترکیب: پریمولاساپونین ۰/۰۳ درصد + کلریدرات افدرین ۰/۱۲ درصد + محلول عصاره تیم ۵ درصد + کدئین ۰/۰۷۳۲ درصد + شکر ۵۲ درصد + آب مقطر ۴۲/۷۷۶۸ درصد.

موارد استعمال: سرفه های تحریکی، سرفه های خشک، سیاه‌سرفه.

مقدار مصرف و طرز استعمال: روزی ۳ بار، هربار ۱ قاشق غذاخوری.

بسته بندی: شربت ۱۵۰ میلی‌لیتر.

بها: ۶۳ ریال.

TYZINE
فایزر–ایران

ترکیب: کلریدرات ۲–(۱، ۲، ۳، ۴،–تترائیدرو–۱–نفتیل)–ایمیدازولین = کلریدرات تترائیدروزولین ۰/۱ درصد.

موارد استعمال: تسکین هیپرمی آماسی، خیز مخاطبینی، انسداد احتقانی درسرماخوردگی، رینیت وازوموتور فصلی.

مقدار مصرف و طرز استعمال: هر ۳–۴ ساعت ۲–۴ قطره در هر سوراخ بینی می‌چکانند.

احتیاط و عوارض جانبی: بیماران مبتلا به‌فشارخون و هیپرتیروئیدی.

بسته بندی: قطره بینی ۰/۱ درصد و ۰/۰۵ درصد × ۱۵ میلی‌لیتر.

بها: ۰/۱ درصد ۳۷ ریال ۰/۰۵ درصد ۳۳ ریال.

T

ULTRACARBONE
مرک ـ آلمان

ترکیب: در هر قرص: زغال طبی ۰/۲۵ گرم.

موارد استعمال: ضایعات عفونی روده‌ها، اسهال، وبا، اسهال خونی، حصبه، مسمومیت‌های غذائی، آئروفاژی و نفخ.

مقدار مصرف و طرز استعمال: روزی چند بار، هربار ۱ ـ ۲ قرص.

احتیاط: تجویز مسهل جهت دفع زغال ضروری است.

بسته بندی: قرص × ۵۰.

بها: ۶۰ ریال.

ULTRACORTENOL
سیبا ـ سویس

ترکیب: تری متیل استات پردنیزون ۵ درصد.

موارد استعمال: بیماریهای التهابی موضعی غیر میکربی دستگاه لوکوموتور، ضایعات مفصلی، بیماریهای پوستی، اگزمای تحریکی و تماسی، ورم‌های مختلف ملتحمه.

مقدار مصرف و طرز استعمال: روزی چند بار، هربار ۱ ـ ۲ قطره در کیسه ملتحمه چکانده شود.

بسته بندی: قطره چشمی ۵ میلی‌لیتر، پماد چشمی ۳ گرم.

بها: قطره ۸۳ ریال، پماد ۱۱۶ ریال.

ULTRALAN Cream
شرینگ آلمان ـ ایران

ترکیب: در هر گرم کرم: ۲/۵ میلی‌گرم (۰/۲۵ درصد) پی‌والات فلوئوکورتولون + ۲/۵ میلی‌گرم (۰/۲۵ درصد) هگزانوات فلوئوکورتولون.

موارد استعمال: شبیه پماد ولی بیشتر برای نقاط روباز و مرئی بدن و همچنین در اگزمای مرطوب.

مقدار مصرف و طرز استعمال: مقدار استعمال کاملا شبیه پماد است.

بسته بندی: ۱۰، ۳۰ و ۵۰ گرم.
بها: کرم ۱۰ گرمی ۸۲ ریال، ۳۰ گرمی ۱۹۳ ریال، ۵۰ گرمی ۲۹۳ ریال.

ULTRALAN Ointment
ULTRALAN FATTY OINTMENT
شرینگ آلمان ـ ایران

ترکیب: در هر گرم پماد: ۲/۵ میلی‌گرم (۰/۲۵ درصد) فلوئوکورتولون + ۲/۵ میلی‌گرم (۰/۲۵ درصد) هگزانوات فلوئوکورتولون.
موارد استعمال: درماتیت و اکزما در اثر تماس، اکزمای معمولی (حاد و مزمن)، اکزمای سوپرانفکته مرطوب، اکزمای میکربی، درموایی درماتیت، اکزمای واریسی، اکزمای احتقانی، اکزمای سبورئیک، اکزمای کودکان، نورودرماتیت، سوختگیها، آفتابزدگی، آکنه روزاسه، اریتماتوزهای مزمن. اولترالان چرب: پوستهای خشک، نورودرماتیت ـ اکزمای نومولار، اکزمای لیخنی شده، پسوریازیس.
مقدار مصرف و طرز استعمال: ابتدا روزی ۲ بار فقط ورقه نازکی از پماد را در محل میمالند همینکه علائم بیماری تخفیف یافت فقط روزی یک‌مرتبه یا هر ۲ ـ ۳ روز یک‌بار. فقط در موارد سخت باید پماد را روزی ۳ بار و در صورت لزوم با پانسمان بسته استعمال کرد.
بسته بندی: پماد و پماد چرب ۱۰، ۳۰ و ۵۰ گرم.
بها: ۱۰ گرمی ۸۲ ریال، ۳۰ گرمی ۱۹۳ ریال، ۵۰ گرمی ۲۶۹ ریال.

ULTRALAN Oral
شرینگ ـ آلمان

ترکیب: فلوئوکورتولون.
موارد استعمال: تب زوماتیسمی، آرتریت روماتوئید، آسم برونشیال، اکزما اتوپیک، درماتیت، پمفیگوس، واکنش در برابر داروها، هپاتیت حاد و مزمن، سیروز کبدی، سندرم نفروتیک، بیماریهای خونی مانند آگرانولوسیتوز، فرمهای مخصوص کم خونی، بیماریهای چشمی.
مقدار مصرف و طرز استعمال: معمولا درمان را با ۲۰ ـ ۶۰ میلی‌گرم در روز آغاز کرده پس از بهبود کلینیکی هر ۲ ـ ۴ روز یک مرتبه ۵

U

میلی‌گرم از مقدار استعمال روزانه را کاهش داده تا به ۵ ـ ۲۰ میلی‌گرم در روز برسد. خردسالان: (مقدار داخل پرانتز مقدار درمان نگهداری است) بطور عموم تا یک سالگی ۱۰ میلی‌گرم (۲/۵ ـ ۵ میلی‌گرم) در روز، آغاز درمان: ۱ ـ ۱۰ سال: ۱۰ ـ ۳۰ میلی‌گرم (۵ ـ ۱۰ میلی‌گرم) ۱۰ تا ۱۴ سال ۲۰ ـ ۴۰ میلی‌گرم (۵ ـ ۱۵ میلی‌گرم) در روز. تمام مقدار دارو بایستی یک‌مرتبه استعمال شود و بهتر است بین ساعت ۶ ـ ۸ صبح پس از صرف صبحانه میل گردد.

موارد منع استعمال: مانند سایر کورتونها در زخم‌معده و دوازدهه، استئوپوروز شدید، سابقه بیماریهای روانی، تبخال زونا، آبله‌مرغان، قبل و بلافاصله بعد از واکسیناسیون آمیبیاز، میکوزیس عمومی، پولیومیلیت به‌استثنای نوع بولبو، انسفالیتیک.

احتیاط و عوارض جانبی: مانند سایر کورتونها در بیماریهای عفونی بایستی مقدار کافی از داروی شیمیوتراپیک مخصوص بیماری بکار برده شود. در مورد فشارخون زیاد، آزار قرنیه، نارسائی مزمن کلیوی تمایل به‌ترومبوز و همچنین در سه ماهه اول آبستنی و بیماری دیابت باید بسیار دقت کرد.

بسته بندی: قرص ۵ میلی‌گرم × ۲۰ ، قرص ۲۰ میلی‌گرم × ۱۰ .

بها: قرص خوراکی ۵ میلی ۲۳۴ ریال، ۲۰ میلی ۳۲۸ ریال.

ULTRALEVURE

بیوکدکس فرانسه ـ فارماشیمی ایران

ترکیب: ساکاراموکازبولاردی یک میلیارد ژرم.

موارد استعمال: پیشگیری عوارض آنتی‌بیوتیکها، عفونتهای روده‌ای، آنتروکولیت‌ها.

مقدار مصرف و طرز استعمال: روزی ۲ ـ ۴ ژلول.

بسته بندی: ژلول × ۲۰ ..

بها: ۱۲۴ ریال.

ULTRAMOX

تولیدارو ـ ایران

ترکیب: آموکسی‌سیلین.

موارد استعمال: کلیه عفونتهای ناشی از میکربهای گرم مثبت و گرم

منفی.
مقدار مصرف و طرز استعمال: بزرگسالان: هر ۸ ساعت ۲۵۰ – ۵۰۰ میلی‌گرم. خردسالان: ۱۲۵ – ۲۵۰ میلی‌گرم.
موارد منع استعمال: حساسیت به پنی‌سیلین.
بسته‌بندی: کپسول ۲۵۰ میلی‌گرم × ۱۰۰. کپسول ۵۰۰ میلی‌گرم × ۴۸. شربت ۱۲۵ میلی‌گرم = ۵ میلی‌لیتر × ۶۰ میلی‌لیتر.
بها: کپسول ۲۵۰ میلی ۱۵۵۰ ریال، ۵۰۰ میلی ۱۲۴۸ ریال. شربت ۱۴۰ ریال.

ULTRAPROCT
شرینگ آلمان – ایران

ترکیب: در هر گرم پماد: ۹ آلفا – فلوئورو – ۱۶ آلفا – متیل ۱ – دهیدرو کورتیکوسترون تری‌متیل استات = فلوئو کورتولون پیوالات ۰/۹۲ میلی‌گرم + ۶ آلفا – فلوئورو – ۱۶ – آلفا – متیل – ۱ – دهیدرو کورتیکوسترون کاپروآت = فلوئو کورتولون هگزانوآت ۰/۹۵ میلی‌گرم + هگزا کلروفن ۵ میلی‌گرم + کلریدرات سنکوکائین ۵ میلی‌گرم + کله‌میزول اندسیلات ۱۰ میلی‌گرم. در هر شیاف بترتیب: ۰/۶۱ میلی‌گرم + ۰/۶۳ میلی‌گرم + ۲/۵ میلی‌گرم + ۱ میلی‌گرم + ۵ میلی‌گرم.
موارد استعمال: بواسیر، شقاق مقعد، پروکتیت، خارش مقعد.
مقدار مصرف و طرز استعمال: پماد: روزی ۲ بار، هربار ورقه نازکی از پماد مالیده میشود. شیاف: روزی یکعدد. در موارد سخت روزی ۲ بار.
موارد منع استعمال: سل و سیفلیس موضعی.
بسته‌بندی: پماد ۱۰ گرم، شیاف × ۱۰.
بها: ۵۹ ریال، شیاف ۷۰ ریال.

UNGUENTOLAN
زیگفرید – سویس

ترکیب: روغن کبد ماهی مورو.
موارد استعمال: زخمهای ناشی از تصادف، سوختگیها و ضایعات ناشی از آفتابزدگی یا سرما، ضایعات سطحی مزمن، اولسرهای ناشی از اشعه ایکس.

مقدار مصرف و طرز استعمال: لایه نسبتا ضخیمی از پماد را روی ضایعه می‌مالند.

احتیاط: پانسمان دیر بدیر تعویض شود. در دمای کمتر از ۴۵ درجه سانتیگراد نگهداری شود.

بسته بندی: پماد ۱۰۰ گرم.

بها: ۱۲۰ ریال.

UNICAP Cap.
آبجان ـ آمریکا

ترکیب: در هر کپسول: ویتامین A ۱/۵ میلی‌گرم + ویتامین D ۱۲/۵ میکروگرم + کلریدرات تیامین ۲/۵ میلی‌گرم + ریبوفلاوین ۲/۵ میلی‌گرم + اسید آسکوربیک ۵۰ میلی‌گرم + نیاسینامید ۲۰ میلی‌گرم + کلریدرات پیریدوکسین ۰/۵ میلی‌گرم + پانتوتنات‌ـ کلسیم ۵ میلی‌گرم + ویتامین B_{12} ۲ میکروگرم.

موارد استعمال: در موارد کمبود تمام ویتامین های فوق.

مقدار مصرف و طرز استعمال: روزی یک کپسول.

بسته بندی: کپسول × ۱۰۰.

بها: ۱۸۰ ریال.

UNICAP Therapeutic
آبجان ـ آمریکا

ترکیب: درهرقرص تراپوتیک: ویتامین A ۱/۵ میلی‌گرم + ویتامین D ۱۲/۵ میکروگرم + ویتامین B_1 ۱۰ میلی‌گرم + ویتامین B_2 ۱۰ میلی‌گرم + ویتامین C ۳۰۰ میلی‌گرم + نیاسینامید ۱۰۰ میلی‌گرم + ویتامین B_6 ۲ میلی‌گرم + پانتوتنات کلسیم ۲۰ میلی‌گرم + ویتامین B_{12} ۴ میکروگرم + آهن ۱۰ میلی‌گرم + ید ۰/۱۵ میلی‌گرم + کلسیم ۵۰ میلی‌گرم + مس ۱ میلی‌گرم + منگنز ۱ میلی‌گرم + منیزیم ۶ میلی‌گرم + پتاسیم ۵ میلی‌گرم.

موارد استعمال: کلیه مواردیکه به‌ویتامینهای فوق احتیاج باشد.

مقدار مصرف و طرز استعمال: روزی ۱ قرص جویده یا بلعیده شود.

بسته بندی: قرص تراپوتیک × ۳۰.

بها: ۱۵۰ ریال.

URBAMIN
کرمس اوربان ـ آمریکا

ترکیب: ال ـ لیزین ۳۰۰ میلی‌گرم + متیونین ۱۰۰ میلی‌گرم + ویتامین B_1 ۵ میلی‌گرم + ویتامین B_2 ۲ میلی‌گرم + ویتامین B_{12} ۲۵ مگا.

موارد استعمال: افزایش فعالیت عضلانی، افزایش وزن، افزایش ذخیره پروتئینی.

مقدار مصرف و طرز استعمال: روزی ۳ ـ ۶ کپسول.

بسته بندی: کپسول × ۴۵.

بها: ۱۷۵ ریال.

UROBIOTIC
فایرز آمریکا ـ ایران

ترکیب: در هر کپسول ۱۲۵ : تـرامـایسین ۱۲۵ میلی‌گرم + سولفامتیزول ۲۵۰ میلی‌گرم + کلریدرات فنازوپیریدین ۵۰ میلی‌گرم. در هر کپسول ۲۵۰ : بترتیب ۲۵۰ میلی‌گرم + ۲۵۰ میلی‌گرم + ۵۰ میلی‌گرم.

موارد استعمال: نفریت، پیلیت، سیستیت، پروستاتیت، اورتریت و کلیه بیماریهای عفونی مجاری ادراری.

مقدار مصرف و طرز استعمال: خردسالان: روزی ۴ بار، هربار ۱ کپسول ۱۲۵ میلی. بزرگسالان: روزی ۴ بار، هربار ۱ کپسول ۲۵۰ میلی.

موارد منع استعمال: هپاتیت، بی کفایتی کبد، اورمی، گلومرو نفریت مزمن.

بسته بندی: کپسول ۱۲۵ و ۲۵۰ × ۱۰۰.

بها: کپسول ۱۲۵ میلی ۹۳۷ ریال ۲۵۰ میلی ۱۷۵۷ ریال.

URODAN
مدا کسپورت ـ شوروی

U

ترکیب: پـی‌پرازین ۲/۵ قسمت + بنزوات لیتیوم ۲/۵ قسمت + بنزوات سدیم ۸ قسمت + فسفات سدیم ۱۰ قسمت + بیکربنات سدیم ۳۷/۵ قسمت + اسید تارتریک ۳۷/۵ قسمت.

موارد استعمال: نقرس، سنگ کلیه، سنگهای مجاری ادراری، اسپوندیلو-آرتریت، آرتریت‌های کرونیک.

مقدار مصرف و طرز استعمال: یک قاشق چای‌خوری در نصف لیوان

آب قبل از غذا بمدت ۴۰ – ۳۰ روز یا بیشتر.
بسته بندی: گرانول ۱۰۰ گرمی.
بها: ۴۰ ریال.

URODONAL
شاتلن – فرانسه

ترکیب: تارترات پیپرازین ۰/۵ گرم + کینات دوپیپرازین ۰/۵ گرم + بی تارترات متیل گلیوکسالیدین ۰/۵ گرم + هگزامتیلن – تترامین ۰/۵ گرم + تئوبرومین ۰/۱ گرم + بنزوات لیتیوم ۰/۵ گرم + بنزوات سدیم ۲/۵ گرم.
موارد استعمال: آرتریت، روماتیسم، آرتریواسکلروز، نارسائی کلیوی.
مقدار مصرف و طرز استعمال: روزی ۳ قاشق مرباخوری در آب حل کرده صبح ناشتا میل می کنند.
بسته بندی: گرانول ۱۷۰ گرم.
بها: ۱۶۰ ریال.

UROGRAFIN
شرینگ – آلمان

ترکیب: در هر میلی لیتر آمپول ۷۶ درصد: ملح سدیم دیاتریزوات ۰/۱ گرم + ملح متیل گلوکامین N و Ń – دی استیل – ۳، ۵ – دی آمینو ۲، ۴، ۶ – تری یدوبنزوئیک اسید ۰/۶۶ گرم در هر میلی لیتر آمپول ۶۰ درصد: ملح سدیم ۰/۰۸ گرم + ملح فوق ۰/۵۲ گرم.
موارد استعمال: اوروگرافی از راه وریدی، انواع آنژیوگرافی و سایر آزمایشهای مخصوص.
مقدار مصرف و طرز استعمال: برحسب نوع مصرف متفاوت است.
بسته بندی: آمپول ۷۶ درصد ۲۰ میلی لیتر× ۵ و ۲۰، آمپول ۶۰ درصد ۲۰ میلی لیتر× ۵ و ۲۰.
بها: ۷۶ درصد: ۵ عددی ۱۱۵۰ ریال، ۲۰ عددی ۴۴۰۰ ریال، ۶۰ درصد: ۵ عددی ۱۱۰۰ ریال، ۲۰ عددی ۴۲۰۰ ریال.

UROPOL
بریستول – آمریکا

ترکیب: تتراسیکلین ۱۲۵ میلی گرم + سولفامتیزول ۲۵۰ میلی گرم + فنازوپیریدین ۵۰ میلی گرم.

موارد استعمال: عفونتهای مجاری ادراری مانند سیستیت، اورتریت، پروستاتیت.
مقدار مصرف و طرز استعمال: هر ۶ ساعت یک عدد میل می‌شود.
بسته بندی: کپسول × ۱۰۰.
بها: هر عدد ۱۱ ریال.

UROSPASMON
هوبن ـ آلمان
ترکیب: در هر قرص: نیتروفورانتوئین ۵۰ میلی‌گرم + سولفادیازین ۱۵۰ میلی‌گرم + فنازوپیریدین ۵۰ میلی‌گرم.
موارد استعمال: عفونتهای حاد و مزمن مجاری ادراری.
مقدار مصرف و طرز استعمال: روزی ۳ بار، هربار یک قرص.
بسته بندی: قرص × ۲۰.
بها: ۱۳۲ ریال.

UROSTOP
زیما ـ سویس
ترکیب: عصاره بلادون ۵ درصد + عصاره برگ اوواورسی + عصاره پوست ریشه روس آروماتیکا (سماق).
موارد استعمال: عدم توانائی نگهداری ادرار، بعد از جراحی دستگاه ادراری، پولاکی اوری، پولی اوری، سیستیت مزمن.
مقدار مصرف و طرز استعمال: خردسالان: روزی ۳ بار، هربار ۱۰ قطره
بزرگسالان: روزی ۳ بار، هربار ۳۰ قطره.
بسته بندی: قطره خوراکی ۵۰ میلی‌لیتر.
بها: ۶۴ ریال.

USTIMON
لینز ـ اتریش
ترکیب: در هر قرص: N ، Ń ـ دی متیل ـ بیس ـ [۳ ـ (۳́ ۴ ۵́ ـ تری متوکسی ـ بنزوکسی) ـ پروپیل] ـ اتیلن دیامین دی‌ـ کلریدرات = هگزوبندین ۳۰ میلی‌گرم در هر آمپول: ۱۰ میلی‌ـ گرم.
موارد استعمال: درمان اختلالات کرونر، ناراحتیهای میوکارد، آنژین صدری، انفارکتوس قلبی.
مقدار مصرف و طرز استعمال: روزی ۳ بار، هربار ۲ قرص بمدت ۲ ـ ۳

U

هفته، آمپول: روزی ۱ ـ ۲ بار، هربار ۱ آمپول عضلانی بمدت ۲ ـ ۳ روز.

بسته بندی: قرص × ۳۰، آمپول ۲ میلی‌لیتر × ۵.

بها: قرص ۸۵ ریال، آمپول ۵۵ ریال.

USTIMON Compositum
لینز ـ اتریش

ترکیب: در هر قرص: هگزوبندین ۳۰ میلی‌گرم + تترانیترات پنتا اریترتول ۱۰ میلی‌گرم + اسید فنیل اتیل ـ باربی‌توریک ۵ میلی‌گرم.

موارد استعمال: درمان حملات حاد، پیشگیری از اختلالات کرونر، آنژین دوپواترین، نارسائیهای قلبی.

مقدار مصرف و طرز استعمال: روزی ۳ بار، هربار ۱ ـ ۳ قرص.

بسته بندی: قرص × ۳۰.

بها: ۹۰ ریال.

UVELINE
شیبره ـ فرانسه

ترکیب: در هر ۱۰ میلی‌لیتر: متیل سولفات N ـ متیل ـ ۸ ـ ئیدروکسی کینولئین ۰/۰۵ گرم.

موارد استعمال: درمان و پیشگیری فتوفتالمی حاصل از خستگی چشم، انعکاس اشعهٔ خورشید، اشعه ماوراء بنفش.

مقدار مصرف و طرز استعمال: روزی ۲ ـ ۶ قطره در هر چشم می‌چکانند. در مواقعیکه چشم در برابر اشعه ماوراء بنفش قرارگرفته است: هر ساعت ۱ قطره.

بسته بندی: قطره چشمی ۱۰ میلی‌لیتر.

بها: ۴۷ ریال.

UVILON
بایر آلمان ـ ایران

ترکیب: سیترات پیپرازین.

موارد استعمال: درمان اسکاریدوز و اکسیوروز.

مقدار مصرف و طرز استعمال: اسکاریدوز: بزرگسالان وکودکان بزرگتر از ۶ سال: یک قاشق سوپخوری. خردسالان ۳ تا ۵ ساله: ۲ قاشق مرباخوری. خردسالان ۱ تا ۲ ساله: یک قاشق

مرباخوری. اکسیوروز: بمدت ۴ روز بزرگسالان و کودکان بزرگتر از ۶ سال: روزی ۳ بار هربار، یک قاشق مرباخوری. خردسالان ۳ تا ۵ ساله: روزی ۲ بار، هرباو یک قاشق‌مرباخوری. خردسالان ۱ تا ۲ ساله: روزی ۲ بار هربار نصف قاشق مرباخوری، شیرخواران: متناسب با سن.

بسته بندی: شربت ۳۰ میلی‌لیتر.

بها: ۲۹ ریال.

VACOTRAN
باکستر ـ ایران

ترکیب: دکستران ۶ گرم + آب‌مقطر مقدار کافی تا ۱۰۰ میلی‌لیتر.
موارد استعمال: کاهش حجم پلاسما در اثر خونریزی‌های شدید.
مقدار مصرف و طرز استعمال: برحسب نوع مصرف بین ۵۰۰ تا یک لیتر در ۲۴ ساعت.
بسته‌بندی: محلول ۵۰۰ میلی‌لیتر.
بها: ۲۰۸ ریال.

VAGICOL OVULE
ویرا ـ ایران

ترکیب: کلرامفنیکل ۵۰۰ میلی‌گرم.
موارد استعمال: عفونتهای مزمن رحمی، لوکوره.
مقدار مصرف و طرز استعمال: شبی یک اوول قبل از خواب استعمال می‌شود.
بسته‌بندی: اوول × ۳.
بها: ۱۰۰ ریال.

VALADOL
اسکوئیب آمریکا ـ ایران

ترکیب: در هر ۵ میلی‌لیتر: استامینوفن ۱۲۰ میلی‌گرم.
موارد استعمال: درد، تب.
مقدار مصرف و طرز استعمال: بزرگسالان: روزی ۴ ـ ۳ بار، هربار ۱ ـ ۲ قاشق مرباخوری. خردسالان ۳ ـ ۶ سال: روزی ۳ ـ ۴ بار، هربار یک قاشق مرباخوری. خردسالان کمتر از سه‌سال و شیرخواران: روزی ۱۰ ـ ۲۰ میلی‌گرم برای هر کیلوگرم وزن بدن.
موارد منع استعمال: حساسیت به‌دارو، ناراحتی‌های کبدی.
بسته‌بندی: شربت ۶۰ میلی‌لیتر.
بها: ۴۹ ریال.

U

VALISONE – G
شرینگ ـ آمریکا

ترکیب: در هرگرم: بتامتازون ۱ میلی‌گرم + جنتامایسین ۱ میلی‌گرم.
موارد استعمال: ناراحتیهای پوستی همراه با عفونت.
مقدار مصرف و طرز استعمال: مقدار کمی از پماد را درمحل می‌مالند.
بسته بندی: کرم و پماد ۱۵ گرم.
بها: پماد و کرم ۱۶۰ ریال.

VALIUM
روش ـ سویس

ترکیب: ۷ ـ کلرو ـ ۱ ، ۳ ـ دی ئیدرو ـ ۱ ـ متیل ـ ۵ ـ فنیل ـ H ۲ ـ ۱ ، ۴ ـ بنزودیازپین ـ ۲ ـ اون = دیازپام.
موارد استعمال: هیجان، عصبانیت، نورآستنی، پسیکو نوروز، استرس، یائسگی، بیخوابی.
مقدار مصرف و طرز استعمال: هیجان: روزی ۳ بار، هربار ۱ قرص ۲ میلی‌گرمی. برای رفع بیخوابی: روزی ۵ یا ۱۰ میلی‌گرم.
بسته بندی: قرص ۲ میلی‌گرم × ۳۰. قرص ۵ و ۱۰ میلی‌گرم × ۲۵. آمپول ۱۰ میلی‌گرم = ۲ میلی لیتر × ۵.
بها: قرص ۲ میلی ۹۵ ریال، ۵ میلی ۱۴۵ ریال، ۱۰ میلی ۲۲۵ ریال، آمپول ۲۲۵ ریال.

VALLERGAN
می‌اندبیکر ـ انگلستان

ترکیب: تارترات تری میرازین.
موارد استعمال: خارش بهرعلت، اکزما و عوارض خارش دار پوستی.
مقدار مصرف و طرز استعمال: بزرگسالان: روزی ۳ ـ ۴ قرص. خردسالان روزی ۱ ـ ۲ قاشق مرباخوری شربت.
عوارض جانبی: اندکی خواب آلودگی.
بسته بندی: قرص × ۵۰. شربت ۱۲۵ میلی‌لیتر.
بها: قرص ۱۴۰ ریال، شربت ۱۰۰ ریال.

U

VALY POMMAD
توا ـ ایران

ترکیب: در هر ۱۰ گرم: سولفانیلامید ۳ گرم + کامفر ۱۴ گرم + موم سفید ۱۴ گرم + مغز استخوان گاو ۱ گرم + روغن پسته ۷ گرم + روغن بادام شیرین ۵۸ گرم.

موارد استعمال: سوختگی، بریدگی، آفتاب‌سوختگی، عرق‌سوز، ترک‌خوردگی.

مقدار مصرف و طرز استعمال: پماد را باید درسوختگیهای فوری بلافاصله استعمال کرد تا از تاول زدن جلوگیری کند. چنانچه تاول زده باشد باید تاول را برداشته و از پماد روی محل سوختگی مالید.

بسته بندی: پماد ۲۰ گرم.

بها: ۳۵ ریال.

VANPAR
پارک دیویس ـ انگلستان

ترکیب: در هر ۵ میلی‌لیتر: پیریوینیوم پاموآت ۲۵ میلی‌گرم + پیپرازین ۳۳۳ میلی‌گرم.

موارد استعمال: آلودگی توام با آسکاریس واکسیور.

مقدار مصرف و طرز استعمال: یک قاشق مرباخوری برای هر ۱۰ کیلوگرم وزن بدن در ۲ روز متوالی.

بسته بندی: سوسپانسیون ۵۰ میلی‌لیتر.

بها: ۱۱۳ ریال.

VANQUIN
پارک دیویس ـ انگلستان

ترکیب: در هر قرص یا هر ۵ میلی‌لیتر: پیریوینیوم پاموآت معادل با ۵۰ میلیگرم بازپیریوینیوم.

موارد استعمال: ریشه کنی اکسیوروز با دوز واحد.

مقدار مصرف و طرز استعمال: دوز واحد: بازاء هر ۱۰ کیلوگرم وزن بدن یک قرص یا یک قاشق مرباخوری از شربت. برای پیشگیری از انتقال و سرایت انگل بهتر است کلیه افراد خانواده در یک زمان درمان شوند.

بسته بندی: قرص × ۸. شربت ۳۰ میلی‌لیتر.

بها: قرص ۱۰۵ ریال. شربت ۷۰ ریال.

U

VARECORT
زیما سویس ـ ایران

ترکیب: در هر شیاف: پردنیزولون تری متیل استات ۲ میلی‌گرم + فاکتورپ ـ زیما = وارموئید ۶۰ میلی‌گرم + هگزاکلروفن ۲/۵ میلی‌گرم. در هر ۱۰۰ گرم پماد بترتیب: ۱۰۰ میلی‌گرم + ۲

گرم + ۵ گرم.
موارد استعمال: بواسیر، ترشح، خارش، خونریزی.
مقدار مصرف و طرز استعمال: شیاف: روزی ۴ عدد صبح و شب. پماد: روزی ۲ـ۳ بار بمالند.
بسته بندی: شیاف × ۶، پماد ۱۰۰ گرم.
بها: شیاف و پماد ۵۹ ریال.

VAREMOIDE
زیما سویس ـ ایران

ترکیب: ارتـو ـ (بتا ـ هیدروکسی اتیل) ـ روتوزید = تری ـ هیدروکسی اتیل ـ روتوزید.
موارد استعمال: درمان هموروئید از راه خوراکی.
مقدار مصرف و طرز استعمال: ۲ عدد همراه با هر وعده غذا میل می‌شود.
بسته بندی: قرص ۱۰۰ میلی‌گرم × ۴۰.
بها: ۱۶۴ ریال.

VASOBRIX 32
آندره گربه ـ فرانسه

ترکیب: یوکسی تالامات متیل گلوکامین ۴/۱۷ گرم + یوکسی تالامات منواتانول آمین ۸/۳۴ گرم (غلظت ید ۳۲ درصد + ملح ۶۲/۵ درصد).
موارد استعمال: آنژیوگرافی، آرتریوگرافی سربرال انتخابی و محیطی، فلبوگرافی، ارتروگرافی.
مقدار مصرف و طرز استعمال: برحسب نوع مصرف متفاوت است.
احتیاط: مانند تمام ترکیبات یددار در میلوم و نارسائی کبد با احتیاط مصرف شود.
بسته بندی: آمپول ۲۰ میلی‌لیتر × ۱.
بها: ۱۷۰ ریال.

VASOLEX
بیوهورم فرانسه ـ آی دی آی ایران

ترکیب: ۲، ۶ پیریدین دی متانول بیس ـ (ان ـ متیل کاربامات).
موارد استعمال: پیشگیری آتروم و درمان اختلالات جریان خون بعلت آترواسکلروز.
مقدار مصرف و طرز استعمال: روزی ۳ـ۴ بار، هربار یک کپسول.

U

درمان: هربار ۲ کپسول.
بسته‌بندی: کپسول ۲۵۰ میلی‌گرم × ۲۴.
بها: ۴۶۸ ریال.

VASTAREL – FORT
سرویه ـ فرانسه

ترکیب: ۱ و ۲ و ۳ (۴ ـ تری متوکسی بنزیل) ـ پی ـ پرازین دی هیدروکلراید = تری متازیدین دی هیدروکلراید.
موارد استعمال: آنژین های صدری و بیماری ایسکمیک قلب.
مقدار مصرف و طرز استعمال: روزی ۳ تا ۴ قرص بعد از غذا.
عوارض جانبی: با دوز زیاد ندرتا ممکن است ایجاد تهوع و بی‌اشتهائی کند.
بسته بندی: دراژه ۳ میلی‌گرم × ۳۰.
بها: ۲۱۰ ریال.

VASURIX POLYVIDON
آندره‌گربه ـ فرانسه

ترکیب: متیل گلوکامین اسید ۱۰ گرم + استریزوئیک پلی وی نیل پیرولیدون (غلظت ید ۲۵ درصد).
موارد استعمال: هیستروسالپنگوگرافی، اورتروگرافی.
مقدار مصرف و طرز استعمال: برحسب نوع مصرف متفاوت است.
بسته بندی: آمپول ۲۰ میلی‌لیتر × ۱.
بها: ۱۱۰ ریال.

V COLIYRE (Jell)
پ. او. اس. فرانسه ـ دوپاره ایران

ترکیب: در هر ۱۰۰ میلی‌لیتر: ۵ یدودزوکسی یوریدن ۰/۱ گرم.
موارد استعمال: کراتیت نقطه‌ای شکل سطحی، کراتیت دیسیفورم، کراتیت سطحی ویروسی، اولسر مارژینال تب خالی.
مقدار مصرف و طرز استعمال: شروع درمان: در روز هر ۱ ساعت ۱ قطره، در شب هر ۲ ساعت ۱ قطره. ادامه درمان: هر ۲ ساعت ۱ قطره در روز بمدت ۳ ـ ۴ روز.
بسته بندی: گرد خشک همراه با حلال ۵ میلی‌لیتر.
بها: ۲۱۱ ریال.

U

VEETIDS
اسکوئیب آمریکا ـ ایران

ترکیب: فنوکسی متیل پنی‌سیلین پتاسیم.
موارد استعمال: کلیه عفونت‌های حساس به پنی‌سیلین.
مقدار مصرف و طرز استعمال: بزرگسالان: هر ۶ ـ ۸ ساعت ۱ ـ ۲ قرص ۵۰۰ میلی‌گرمی. خردسالان: روزی ۵۰ میلی‌گرم برای هر کیلوگرم وزن بدن.
موارد منع استعمال: حساسیت به پنی‌سیلین.
بسته‌بندی: قرص ۲۵۰ میلی‌گرم × ۱۰۰. قرص ۵۰۰ میلی‌گرم × ۵۰.
بها: قرص ۲۵۰ میلی هر عدد ۶ ریال، قرص ۵۰۰ میلی هر عدد ۱۱ ریال.

VELBE
لی‌لی ـ آمریکا

ترکیب: وینبلاستین سولفات.
موارد استعمال: هوچکین ژنرالیزه، کوریوکارسینومای مقاوم به‌سایر داروهای موجود.
مقدار مصرف و طرز استعمال: مقدار دارو برحسب شدت لوکوپنی که بدنبال تجویز دارو حاصل می‌گردد از راه تزریق وریدی بافواصل هفتگی تعیین می‌گردد.
موارد منع استعمال: بیماران مبتلا به‌لوکوپنی و عفونت‌های باکتریال.
احتیاط و عوارض جانبی: وجود کاشکسی یا مناطق زخمی شده در سطح پوست بخصوص در افراد مسن ممکن است واکنش لوکوپنی را تشدید نماید. احتمال بروز اختلالات عصبی عضلانی وجود دارد. بکاربردن تمام داروهای انکولتیک در زمان بارداری باید با احتیاط انجام شود. دارو باید در یخچال نگاهداری شود.
بسته‌بندی: آمپول‌های ۱۰ میلی‌لیتر همراه با حلال.
بها: ۱۱۲۰ ریال.

VELOSEF
اسکوئیب ـ آمریکا

ترکیب: سفرادین.
موارد استعمال: عفونتهای دستگاه تنفسی، اوتیت میانی، عفونتهای جلدی و نسوج نرم ناشی از استافیلوکوک، عفونتهای ادراری.
مقدار مصرف و طرز استعمال: بزرگسالان: ۱ ـ ۴ گرم در ۴ دوز مساوی،

V

خردسالان: ۲۵ ـ ۵۰ میلی‌گرم برای هر کیلو وزن بدن.
موارد منع استعمال: حساسیت بدارو، نارسائی شدید کلیوی.
بسته‌بندی: کپسول ۲۵۰ میلی × ۱۰۰، ۵۰۰ میلی × ۵۰. شربت ۱۲۵ میلی‌گرم = ۵ میلی‌لیتر × ۶۰ میلی‌لیتر، شربت ۲۵۰ میلی‌گرم = ۵ میلی‌لیتر × ۶۰ میلی‌لیتر. ویال ۵۰۰ میلی‌گرم × ۱. ویال ۱ گرمی × ۱.
بها: کپسول ۲۵۰ میلی ۴۰۴۴ ریال، ۵۰۰ میلی ۳۶۰۸ ریال. شربت ۱۲۵، ۲۳۴ ریال، شربت ۲۵۰، ۴۲۰ ریال. ویال ۵۰۰ میلی، ۱۶۲ ریال، یک گرمی ۲۷۶ ریال.

VENDARCIN
مایکوفارم ـ هلند

ترکیب: کلریدرات اکسی تتراسیکلین.
موارد استعمال: کلیه عفونتهائی که به‌تتراسیکلین ها حساسند.
مقدار مصرف و طرز استعمال: مشابه سایر تتراسیکلین ها.
احتیاط: شیرخواران.
بسته‌بندی: کپسول ۲۵۰ میلی‌گرم × ۱۵. آمپول ۵ درصد = ۲ میلی‌لیتر × ۲.
بها: کپسول ۱۸۷ ریال. آمپول ۷۰ ریال.

VENEMA
فارمیتالیا ـ ایتالیا

ترکیب: در هر ۱۰۰ میلی‌لیتر شربت: عصاره جگر ۱/۰۴۱ گرم + ویتامین B_{12} ۱۰۴ میکروگرم + گلیسرو فسفات کلسیم ۱/۰۴۱ گرم + گلیسروفسفات‌سدیم ۲/۰۸۲ گرم + گلیسروفسفات منگنز ۰/۳۱۲ گرم + اسید نو کلئیک ۰/۵۲ گرم.
موارد استعمال: کم‌خونیهای ثانوی، ضعف جسمی و فکری، بعد از عمل جراحی، دوران نقاهت و بارداری.
مقدار مصرف و طرز استعمال: خردسالان: روزی ۳ بار، هربار یک قاشق چایخوری. بزرگسالان: روزی ۳ ـ ۴ بار، هربار یک قاشق مرباخوری قبل از غذا.
بسته‌بندی: شربت ۱۲۰ میلی‌لیتر.
بها: ۷۷ ریال.

VENORUTON %10
زیما ـ سویس

ترکیب: در ۱۰۰ میلی‌لیتر ارتو ـ (بتا ـ ئیدروکسی اتیل) ـ روتوزید ـ تری ـ ئیدروکسی اتیل روتوزید ۱۰ گرم.

موارد استعمال: سنگینی و درد پا، ورم قوزک پا، سوزن‌سوزن شدن عضلات در شب، واریس، ترومبوفلبیت، هموروئید.

مقدار مصرف و طرز استعمال: شروع درمان: روزی ۳ بار، هربار ۴۰ قطره. ادامه درمان: روزی ۳ بار، هربار ۲۰ قطره همراه با غذا.

بسته بندی: قطره خوراکی ۲۰ میلی‌لیتر. کپسول ۳۰۰ میلی‌گرم × ۲۰.

بها: قطره ۱۰۲ ریال. کپسول ۲۷۰ ریال.

VENTILAT
مدینوا ـ سویس

ترکیب: تئوفیلین انیدر ۱۲۰ میلی‌گرم + ۱ ـ متیل افدرین کلریدرات ۳۰ میلی‌گرم + فنوباربیتال ۸ میلی‌گرم.

موارد استعمال: آسم برونش ها، برونشیت‌های مزمن توأم با تنگی‌نفس، آمفیزم، فیبروز ریوی.

مقدار مصرف و طرز استعمال: بلافاصله پس از احساس شروع حملات آسم یک قرص و برای پیشگیری و یا در مورد حملات تکرار شونده هر ۴ ساعت یک قرص.

موارد منع استعمال: اختلالات شدید قلبی و عروقی، فشارخون، هیپرتیروئیدیسم.

عوارض جانبی: بعلت دارا بودن اثر تسکینی گاهی دقت رانندگان را کاهش میدهد بخصوص اگر الکل هم مصرف شده باشد.

بسته بندی: قرص × ۲۰.

بها: ۹۵ ریال.

VENTOLIN
آلن هانبوریز ـ انگلستان

U

ترکیب: در هر قرص و در هر ۵ میلی‌لیتر شربت. ۲ ـ تی ـ بوتیل ـ آمینو ـ ۱ ـ (۴ ـ هیدروکسی متیل) ـ فنیل اناتول = سالبوتامول ۲ میلی‌گرم در هر استنشاق آئروسل ۰/۱ میلی‌گرم.

موارد استعمال: انواع آسم برونش ها، برونشیت مزمن، آمفیزم.

مقدار مصرف و طرز استعمال: روزی ۴ بار، هربار یک قاشق مرباخوری یا ۱ ـ ۲ قرص. آئروسل: روزی ۴ بار استنشاق می‌شود.

موارد منع استعمال: هیپرتانسیون، نارسائی قلبی.
بسته‌بندی: شربت ۱۵۰ میلی‌لیتر، قرص × ۲۰، آئروسل استنشاقی.
بها: شربت ۱۰۵ ریال، قرص ۶۳ ریال. استنشاقی ۲۷۵ ریال.

VERSAPEN
میدجانسون ـ آمریکا

ترکیب: ملح پتاسیم ۶ـ (۲، ۲ دی متیل ـ ۴ ـ فنیل ـ ۵ ـ اکسو ـ ۱ ـ ایمیدازولیدینیل) پنی‌سیلیک اسید = هتاسیلین پتاسیم.
موارد استعمال: عفونتهای دستگاه تنفسی، عفونتهای قبل و بعد از عمل جراحی، عفونتهای دستگاه گوارشی، عفونتهای مجاری ادراری ـ تناسلی.
مقدار مصرف و طرز استعمال: برحسب نوع و شدت بیماری متفاوت است.
بسته‌بندی: کپسول ۲۵۰ و ۵۰۰ میلی‌گرم × ۱۰۰ پودر برای محلول ۱۲۵ میلی‌گرم = ۱ میلی‌لیتر × ۶۰ میلی‌لیتر. آمپول تزریقی ۲۵۰، ۵۰۰ و ۱۰۰۰ میلی‌گرم.
بها: کپسول ۲۵۰ میلی هر عدد ۱۲ ریال، ۵۰۰ میلی هر عدد ۲۰ ریال. شربت ۱۱۰ ریال. آمپول ۲۵۰ میلی ۵۰ ریال، ۵۰۰ میلی ۸۰ ریال، ۱ گرمی ۱۴۰ ریال.

VIBRAMYCIN
فایزر آمریکا ـ ایران

ترکیب: داکسی‌سایکلین.
موارد استعمال: عفونتهای دستگاه تنفسی، گوش و حلق و بینی، عفونتهای حاد و مزمن مجاری ادراری، عفونتهای پوست و انساج نرم، عفونتهای مامائی و زنان.
مقدار مصرف و طرز استعمال: خردسالان: ابتدا روزی ۳ میلی‌گرم بازاء هر کیلو و سپس ۲ میلی‌گرم. بزرگسالان: ابتدا روزی ۲۰۰ میلی‌گرم و سپس ۱۰۰ میلی‌گرم.
موارد منع استعمال: حساسیت به تتراسیکلین ها.
عوارض جانبی: گاهی تهوع، استفراغ، اسهال.
بسته‌بندی: کپسول ۱۰۰ میلی‌گرم × ۱۰۰. سوسپانسیون ۲۵ میلی‌گرم = ۵ میلی‌لیتر × ۶۰ میلی‌لیتر، آمپول وریدی ۱۰۰ میلی‌گرم × ۱.

بها: کپسول ۵۳۸۷ ریال، سوسپانسیون ۱۳۰ ریال. آمپول ۲۲۲ ریال.

VICILIN
ایران دراگ ـ ایران

ترکیب: در هر قرص: ملح پتاسیم پنی‌سیلین ۶۰۰ ۷ هزار واحد.
موارد استعمال: عفونتهای استرپتوکوکسی، عفونتهای پنوموکوکسی، پیشگیری تب رماتیسم و عفونتهای استرپتوکوکسی، بعد از اعمال جراحی دهان و دندان.
مقدار مصرف و طرز استعمال: خردسالان: نصف مقدار بزرگسالان
بزرگسالان: هر ۶ـ۸ ساعت ۱ قرص یا دوقاشق مرباخوری.
بسته بندی: قرص × ۱۲، شربت ۵ میلی‌لیتر= ۳۰۰ هزار واحد × ۶۰ میلی‌لیتر.
بها: قرص ۹۸ ریال، شربت ۸۲ ریال.

VICKS
ویک اینترنشنال
آمریکا ـ ایران

ترکیب: در هر قرص: ستیل پیریدینیوم ۰/۰۲ درصد + اسید آسکوربیک ۰/۲۲ درصد + مانتول ۰/۰۸۷ درصد + اسید سیتریک ۰/۰۸۷ درصد.
موارد استعمال: سرماخوردگی، گلودرد، آنفلوآنزا، برونشیت و اعتیاد به‌سیگار.
مقدار مصرف و طرز استعمال: قرص: هر ۳ ساعت ۱ عدد می‌مکند.
شربت: خردسالان ۴ تا ۶ سال: روزی نصف قاشق مرباخوری از ۶ـ۱۲ سال: روزی ۱ قاشق مرباخوری. بزرگتر از ۱۲ سال: هرسه ساعت ۱ قاشق مرباخوری.
احتیاط: بعد از مصرف شربت باید از رانندگی خودداری کرد.
بسته بندی: قرص × ۱۷، شربت ۵۷ میلی‌لیتر.
بها: قرص هر بسته ۱۰ ریال، شربت ۴۱ ریال.

VI — DAYLIN
ابوت ـ آمریکا

ترکیب: در هر ۰/۶ میلی‌لیتر قطره: ویتامین A ۵ هزار واحد + ویتامین D ۴۰۰ واحد + ویتامین B_1 ۱/۵ میلی‌گرم + ویتامین B_2 ۱/۲ میلی‌گرم + اسید آسکوربیک ۵۰ میلی‌گرم + نیاسینامید ۱۰ میلی‌گرم + ویتامین B_6 ۰/۵ میلی‌گرم. در هر قاشق مرباخوری

شربت: ویتامین A ۳ هزار واحد + ویتامین D ۴۰۰ واحد + ویتامین C ۵۰ میلی‌گرم + ویتامین B_1 ۱/۵ میلی‌گرم + ویتامین B_2 ۱/۳ میلی‌گرم + ویتامین B_6 ۱ میلی‌گرم + ویتامین B_{12} ۳ میکروگرم + نیاسینامید ۱۰ میلی‌گرم.

موارد استعمال: در کلیه موارد کمبود ویتامینهای فوق.

مقدار مصرف و طرز استعمال: خردسالان: روزی ۰/۲ ــ ۰/۶ میلی‌لیتر از قطره. روزی ۰/۵ ــ ۱ قاشق مرباخوری شربت.

بسته بندی: قطره ۱۵ میلی‌لیتر. شربت ۹۰ میلی‌لیتر.

بها: قطره ۷۲ ریال. شربت ۶۵ ریال.

VI-DAYLIN With Iron

ابوت ــ آمریکا

ترکیب: ترکیبات قطره ویدایلین ساده + سولفات ـ فرو.

موارد استعمال: کمبود ویتامین و بعنوان پیشگیری در آنمی.

مقدار مصرف و طرز استعمال: حداقل روزی ۱ میلی‌لیتر.

عوارض جانبی: گاهی سبب یبوست میشود.

بسته بندی: قطره ۵ میلی‌لیتر.

بها: ۱۲۰ ریال.

VIDELTA

لدرلی آمریکا ــ ایران

ترکیب: در هر قاشق مرباخوری: ویتامین A ۲۵ هزار واحد + ویتامین D ۳۷۵ واحد.

موارد استعمال: کلیه موارد کمبود ویتامینهای A و D.

مقدار مصرف و طرز استعمال: روزی ۱ ــ ۳ قاشق مرباخوری.

بسته بندی: شربت ۱۲۰ میلی‌لیتر.

بها: ۵۳ ریال.

VIFORT

اندو ــ آمریکا

ترکیب: در هر ۰/۶ میلی‌لیتر. ویتامین A ۳۰۰۰ واحد + ویتامین D ۴۰۰ واحد + ویتامین C ۵۰ میلی‌گرم + نیکوتینامید ۱۰ میلی‌گرم + ویتامین B_6 ۱ میلی‌گرم + ویتامین B_1 ۱/۱ میلی‌گرم + ویتامین B_2 ۱/۲ میلی‌گرم + پانتنول ۳ میلی‌گرم.

V

موارد استعمال: کمبود ویتامین های فوق، ضعف عمومی اطفال.
مقدار مصرف و طرز استعمال: شیرخواران: روزی ۳ بار، هربار ۵ قطره.
اطفال: ۱۵ قطره.
بسته بندی: قطره خوراکی ۱۵ میلی‌لیتر.
بها: ۱۰۵ ریال.

VIGANTOL Fort
مرک ـ آلمان

ترکیب: ویتامین D_3 = کله کالسیفرول ۱۵ میلی‌گرم معادل ۶۰۰ هزار واحد.
موارد استعمال: راشیتیسم، استئومالاسی، اسپاسموفیلی، تتانی، تأخیر در جوش خوردن استخوانها در شکستگی ها، آلرژی، پسوریازیس.
مقدار مصرف و طرز استعمال: برحسب شدت و نوع بیماری فقط بطور داخل عضلانی تزریق می‌شود.
موارد منع استعمال: بیماریهای کلیوی، عدم تحمل به ویتامین D.
بسته بندی: آمپول تزریقی ۱ میلی‌لیتر × ۵.
بها: ۲۷۵ ریال.

VI – NUPHOS
آلن هانبوریز انگلستان ـ داروپخش ایران

ترکیب: در هر ۱۰۰ میلی‌لیتر: ویتامین B_1 ۲۱/۳ میلی‌گرم + کافئین انیدر ۲۱۰ میلی‌گرم + گلیسروفسفات کلسیم ۶۳۰ میلی‌گرم + محلول ۵۰ درصد گلیسرو فسفات سدیم و پتاسیم بترتیب ۹۲۰ و ۸۳۰ میلی‌گرم + سولفات استریکنین ۸/۳ میلی‌گرم + سولفات منگنز ۵۷/۵ میلی‌گرم.
موارد استعمال: خستگی‌های فکری و جسمی، بی‌اشتهائی، دوران نقاهت.
مقدار مصرف و طرز استعمال: خردسالان: روزی ۳ بار، هربار ۰/۵ ـ ۱ قاشق مرباخوری. بزرگسالان: روزی ۳ بار، هربار ۱ ـ ۲ قاشق مرباخوری قبل از هر غذا.
بسته بندی: شربت ۱۰۰ و ۲۵۰ میلی‌لیتر.
بها: شربت ۱۰۰ میلی ۴۱ ریال، ۲۵۰ میلی ۸۸ ریال.

VIONEURIN – 6
کنتینانتال فارما ـ بلژیک

ترکیب: ویتامین B_1 ۲۵۰ میلی‌گرم + ویتامین B_6 ۱۰۰ میلی‌گرم + ویتامین B_{12} ۵۰۰ میکروگرم.

موارد استعمال: سندرمهای دردناک با منشأ عصبی-استخوانی، مفصلی و تاندونی، تقویت کننده عمومی.

مقدار مصرف و طرز استعمال: روزی ۲ ـ ۴ قرص.

بسته بندی: قرص × ۲۰.

بها: ۱۹۵ ریال.

VIONEURIN FORTE
کنتینانتال فارما ـ بلژیک

ترکیب: ویتامین B_{12} ۱۰۰۰ میکروگرم + ویتامین B_1 ۲۵۰ میلی‌گرم.

موارد استعمال: پلی نوریت‌های متابولیک، نورالژی عصب فاسیال نوریت، سیاتیک، زونا.

مقدار مصرف و طرز استعمال: یک تزریق عضلانی در روز و یا یکروز در میان.

موارد منع استعمال: بیماران حساس به‌ویتامین B_1.

بسته بندی: آمپول ۳ میلی‌لیتر × ۳.

بها: ۱۲۰ ریال.

VIPLEX
اسکوئیب آمریکا ـ ایران

ترکیب: در هر ۵ میلی‌لیتر: ویتامین A ۲۵ هزار واحد + ویتامین B_{12} ۵ میکروگرم + ویتامین C ۲۰۰ میلی‌گرم + ویتامین D ۴۰۰ واحد + ویتامین B_6 ۵ میلی‌گرم + پانتنول ۲۰ میلی‌گرم + ویتامین B_1 ۱۰ میلی‌گرم + ویتامین B_2 ۱۰ میلی‌گرم + نیاسینامید ۱۰۰ میلی‌گرم.

موارد استعمال: دیابت پانکراتیت، کولیت اولسروز، زخم‌های پپتیک، الکلیسم، بیماریهای مزمن کبدی، بیماریهای دژنراتیو استخوانها و مفاصل و عضلات، بیماریهای گوارشی، بیماریهای روانی، نورآستنی، یائسگی، هنگام رشد و بلوغ.

مقدار مصرف و طرز استعمال: روزی یک قاشق مرباخوری.

عوارض جانبی: اگر بیش از ۳ ماه بطور متوالی مصرف شود امکان دارد هیپرویتامینوز ویتامین A در شخص بوجود آید.

V

بسته بندی: ۱۲۰ میلی‌لیتر.

بها: ۹۴ ریال.

VITA 3
فور–فرانسه

ترکیب: در هر ۱۰۰ میلی‌لیتر: کلریدرات لینیوکائین ۰/۱ گرم + کلریدرات نئوسینفرین ۰/۱ گرم + سولفوروتین سدیم ۰/۱ گرم + مرکوروتیولات سدیم ۰/۱ گرم + اسید بوریک ۱/۵ گرم + برات سدیم ۰/۰۵ گرم.

موارد استعمال: خستگی چشم در اثر عینک، لنز، انجام کارهای دقیق و ظریف، کونژونکتیویتهای خوش خیم بهاره یا عفونی، حساسیت به‌نور، آبریزش و تحریک‌پذیری چشم، عفونت و التهاب چشم.

مقدار مصرف و طرز استعمال: روزی ۴ ــ ۸ بار هربار ۲ قطره در هر چشم می‌چکانند.

بسته بندی: قطره چشمی ۱۰ میلی‌لیتر.

بها: ۵۲ ریال.

VITABEX
تولیدارو–ایران

ترکیب: ویتامین B_1 ۵ میلی‌گرم + ویتامین B_2 ۲ میلی‌گرم + ویتامین B_6 ۱ میلی‌گرم + ویتامین B_{12} ۳ میکروگرم + نیکوتینامید ۲۰ میلی‌گرم + d ـ پانتنول ۵ میلی‌گرم + کولین ۳۰ میلی‌گرم + اینوزیتول ۱۰ میلی‌گرم.

موارد استعمال: پیشگیری و درمان عوارض ناشی از کمبود ویتامین های مواد فوق.

مقدار مصرف و طرز استعمال: بزرگسالان: روزی ۱ ــ ۲ قاشق مرباخوری خردسالان: نصف مقدار فوق.

بسته بندی: شربت ۱۲۰ میلی‌لیتر.

بها: ۸۲ ریال.

V

VITA . C. EVA FORTE
اوا–ایران

ترکیب: ویتامین C ۱۰۰۰ میلی‌گرم.

موارد استعمال: کمبود ویتامین C.

مقدار مصرف و طرز استعمال: روزی ۱ ــ ۲ بسته در آب میل شود.

موارد منع استعمال: هیپراسیدیته.
بسته‌بندی: گرد ۴ گرم × ۱۰.
بها: ۷۰ ریال.

VITADERM
تولیدارو ـ ایران

ترکیب: در هر ۱۰۰ گرم: روغن کبد ماهی ۵۰ گرم + اکسید روی ۳۰ گرم + بنزوکائین ۲ گرم + کلروربنزآلکونیوم ۰/۱ گرم.
موارد استعمال: ادرار سوختگی پای اطفال، سوختگیهای سطحی، ترک و زخم پوست، خشکی پوست، عوارض جلدی ناشی از آفتاب و سرما و پودرهای دترجنت.
مقدار مصرف و طرز استعمال: روزی ۳ بار در محل ضایعه می‌مالند.
بسته‌بندی: پماد ۲۵ گرم.
بها: ۳۷ ریال.

VITA-IODUROL
فور ـ فرانسه

ترکیب: در هر ۱۰۰ میلی‌لیتر: یدورپتاسیم ۱/۵ گرم + کلرورکلسیم ۰/۳ گرم + کلرور منیزیم ۰/۳ گرم + تریفوزادنین ۰/۰۰۲۷ گرم + سیستئین ۰/۰۳ گرم + گلوتاتیون ۰/۰۰۶ گرم + ویتامین B_1 ۰/۰۳ گرم + اسید نیکوتینیک ۰/۰۳ گرم.
موارد استعمال: جلوگیری و درمان تاری عدسی چشم.
مقدار مصرف و طرز استعمال: روزی ۲ بار، هربار ۱ ـ ۲ قطره در هر چشم می‌چکانند.
بسته‌بندی: قطره چشمی ۱۵ میلی‌لیتر.
بها: ۶۴ ریال.

VITAMARCIDERME
کلن بیلافرانسه ـ فارماشیمی ایران

ترکیب: آمیدنیکوتینیک ۲۵ میلی‌گرم + اسید ـ گلوتامیک ۱۰۰ میلی‌گرم + تریپتوفان ۲۰ میلی‌گرم + اسید ـ سیتریک مقدار کافی تا pH به ۷ برسد + اکسی بنزوات‌متیل ۱۰۰ میلی‌گرم.
موارد استعمال: حساسیت جلدی، سوختگی، آفتابزدگی، اکزما، خارش، سوختگی زیر بغل و کشاله ران، کهیر، سرمازدگی.

مقدار مصرف و طرز استعمال: با مالش مختصر پماد بر روی موضع استعمال می‌شود.

بسته‌بندی: پماد ۴۰ گرم.

بها: ۴۹ ریال

VITAMINE A Pom.
پ. او. اس. فرانسه ـ دوپار ایران

ترکیب: ویتامین A ۲۵ هزار واحد + اکسیپیان تا ۱۰۰ گرم.

موارد استعمال: خشکی قرنیه و ملتحمه و مخاط بینی.

مقدار مصرف و طرز استعمال: روزی ۲ ـ ۳ بار در چشم یا بینی استعمال می‌شود.

بسته‌بندی: پماد چشمی و بینی ۵ گرم.

بها: ۲۹ ریال.

VITAMINE A OINTMENT
ـ شیبره ـ فرانسه

ترکیب: در هر ۱۰۰ گرم: ویتامین A ۲۵۰۰۰ واحد.

موارد استعمال: گزروفتالمی، کونژونکتیویت خشک، کراتومالاسی، اولسرهای قرنیه، بلفاریت، در بینی: رینیتهای خشک و آتروفیک.

مقدار مصرف و طرز استعمال: روزی ۳ ـ ۴ بار پماد را در چشم یا بینی می‌مالند.

بسته‌بندی: پماد چشمی و بینی ۷ گرم.

بها: ۲۳ ریال.

VITASEL
مارین ـ ایران

ترکیب: کربنات‌لیتیوم ۰/۱۵ گرم + لاکتات‌استرونسیوم ۰/۳ گرم + سیترات کافئین ۰/۸ گرم + سولفات سدیم ۳۰ گرم + سولفات منیزیم ۸ گرم.

موارد استعمال: بدکارکردن کبد، کلیه و روده‌ها، کمک به‌دفع اوره و اسیداوریک.

مقدار مصرف و طرز استعمال: صبح ناشتا یک قاشق غذاخوری از

گرانول را در یک لیوان آب سرد حل کرده میل می کنند.
بسته بندی: گرانول ۶۰ گرم.
بها: ۳۵ ریال.

VITATEN
کولت نروژ ـ دارو پخش ایران

ترکیب: در هر بسته: ویتامین A ۲ هزار واحد + ویتامین D_3 ۳۰۰ واحد + ویتامین B_1 ۳ میلی گرم + ویتامین B_2 ۳ میلی گرم + ویتامین B_6 ۴ میلی گرم + ویتامین B_{12} ۲ میکروگرم + پانتوتنات کلسیم ۸ میلی گرم + نیکوتینامید ۲۰ میلی گرم + ویتامین C ۱۰۰ میلی گرم + ویتامین E ۴ میلی گرم.
موارد استعمال: در تمام موارد کمبود ویتامینهای فوق، ضعف، کمی رشد، دوران نقاهت.
مقدار مصرف و طرز استعمال: روزی ۱ ـ ۲ بسته را در نصف تا ۱ لیوان آب حل کرده مینوشند.
بسته بندی: گرانول ۵ گرم × ۵.
بها: ۸۲ ریال.

VITATHION (A. T. P)
سرویه ـ فرانسه

ترکیب: در هر بسته ۵ گرمی: اسید اسکوربیک ۵۰۰ میلی گرم + گلوتاتیون احیاء شده ۵۰۰ میکروگرم + آدنوزین تری فسفات ۵۰۰ میلی گرم + ویتامین B_1 ۲ میلی گرم + هگزا فسفات اینوزیتول کلسیم و منیزیم ۱۰۰ میلی گرم + هموگلوبین ۵ میلی گرم.
موارد استعمال: کار زیاد و خستگی، عفونت ها، دوران بارداری، دوران رشد، بی اشتهائی، ضعف.
مقدار مصرف و طرز استعمال: خردسالان: روزی ۱ بسته. بزرگسالان: روزی ۲ بسته را در کمی آب حل کرده میل کنند.
بسته بندی: بسته ۵ گرم × ۲۰.
بها: ۱۵۵ ریال.

V

VITERRA
فایزر آمریکا ـ ایران

ترکیب: ویتامین A ۵ هزار واحد + ویتامین D ۵۰۰ واحد + ویتامین B_1 ۳ میلی‌گرم + ویتامین B_2 ۳ میلی‌گرم + نیکوتینامید ۲۵ میلی‌گرم + ویتامین B_6 ۱ میلی‌گرم + پانتوتنات کلسیم ۵ میلی‌گرم + ویتامین B_{12} ۲ میکروگرم + ویتامین C ۵۰ میلی‌گرم + ویتامین E ۳/۷ واحد + کلسیم ۵۵ میلی‌گرم + فسفر ۴۲ میلی‌گرم + آهن ۱۰ میلی‌گرم + سدیم مولیبدات ۰/۵ میلی‌گرم + مس ۱ میلی‌گرم + ید ۰/۱۵ میلی‌گرم + منیزیم ۵ میلی‌گرم + منگنز ۱ میلی‌گرم + پتاسیم ۴۷ میکروگرم + روی ۱/۲ میلی‌گرم.

موارد استعمال: دوره نقاهت، شیردهی و آبستنی، خستگی فکری و جسمی.

مقدار مصرف و طرز استعمال: روزی ۱ کپسول بعد از غذا.

بسته‌بندی: کپسول × ۳۰.

بها: ۸۸ ریال.

V-m
سینا ـ ایران

ترکیب: در هر ۵ میلی‌لیتر شربت. تری فلوپرومازین ۱۰۰ میلی‌گرم.

موارد استعمال: استفراغ بعلل مختلف.

مقدار مصرف و طرز استعمال: خردسالان: روزی ۳ ـ ۴ بار، هربار یک قاشق چای‌خوری. بزرگتر از یکسال: ۰/۵ تا یک قاشق مرباخوری. بزرگسالان: روزی ۳ ـ ۶ بار هربار یک قاشق غذا- خوری.

احتیاط و عوارض جانبی: مصرف مداوم و زیاد آن عوارض فنوتیازینی (آگرانولوسیتوز، لکوپنی) ایجاد میکند.

بسته‌بندی: شربت ۵۰ میلی‌لیتر.

بها: ۳۵ ریال.

V

VOGALENE
تراپلیکس ـ فرانسه

ترکیب: متان ـ سولفونیل ـ ۳ (کارباموئیل ـ ۴ ـ پی‌پریدینو) ـ ۳ پروپیل ـ ۱۰ فنوتیازین = متوپیمازین.

مکانیسم: گیرنده‌های شیمیائی حساس به‌آپومرفین را بلوکه نموده و درنتیجه مانع از رسیدن آنها به‌مرکز تهوع میشود.

موارد استعمال: جلوگیری و درمان استفراغ و تهوع با هر منشائی که باشد.
مقدار مصرف و طرز استعمال: قرص: روزی ۲ تا حداکثر ۶ عدد. قطره: ۱۰ قطره برای هر کیلو وزن بدن منقسم بدفعات مساوی در روز.
آمپول: روزی ۱-۲ تزریق عضلانی یا وریدی.
احتیاط: تزریق باید بسیار آهسته انجام شود.
بسته بندی: قرص ۲/۵ میلی‌گرم × ۴۰. قطره ۳۰ میلی‌لیتر. آمپول ۱۰ میلی‌گرم = ۱ میلی‌لیتر × ۱۰.
بها: قرص ۱۲۴ ریال، قطره ۱۵۵ ریال، آمپول ۱۸۶ ریال.

VOMYCINE
میسین – ایران

ترکیب: در هر قرص: پرومتازین تئوکلات ۲۵ میلی‌گرم.
موارد استعمال: استفراغ، تهوع، دل‌درد التهاب و نفخ معده، درد معده، دل بهم‌خوردگی ناشی از مسافرت.
مقدار مصرف و طرز استعمال: بزرگسالان: یک‌ساعت قبل از مسافرت یک قرص. خردسالان: نصف قرص.
بسته بندی: قرص × ۲۰.
بها: ۳۹ ریال.

V

WHOOPING COUGH
بوتس انگلستان ـ ایران

ترکیب: در هر قاشق مرباخوری: کلریدرات افدرین ۳ میلی‌گرم + تنطوربلادون ۰/۱۲۵ میلی‌گرم + عصاره مایع اپیکا ۰/۰۰۶۲۵ میلی‌گرم + شربت تلو ۱/۱۲ میلی‌گرم + عسل ۳۵۰ میلی‌گرم + اسید سیتریک ۵۰ میلی‌گرم + بنزوات سدیم ۱۰ میلی‌گرم.

موارد استعمال: سیاه‌سرفه، سرماخوردگی، برونشیت مزمن.

مقدار مصرف و طرز استعمال: خردسالان کمتر از یکسال: نصف قاشق مرباخوری. خردسالان ۱ـ۴ سال: ۱ قاشق مرباخوری. خردسالان بیش از ۴ سال: ۲ قاشق مرباخوری، مقادیر فوق هر ۴ ساعت یکبار تکرار شود.

بسته بندی: شربت ۱۱۲ میلی‌لیتر.

بها: ۴۱ ریال.

WINSTROL
وینتروپ آمریکا ـ ایران

ترکیب: ۱۷ ـ بتاهیدروکسی ـ ۱۷ آلفا ـ متیل آندروستانو (۳، 2C) پیرازول ـ استانوزولول.

موارد استعمال: جلوگیری از تحلیل و کاتابولیسم بیماران سرطانی، پائین آوردن اوره خون، کمک به‌بیماران دیابتی برای کم کردن مقدار انسولین، بهبود حالت فیزیکی و جسمانی بیماران ضعیف.

مقدار مصرف و طرز استعمال: بزرگسالان: روزی ۲ـ۳ قرص. خردسالان ۶ـ۱۲ ساله: روزی ۲ بار، هربار یک قرص کمتر از ۶ سال: نصف قرص.

موارد منع استعمال: زنان آبستن و شیرده، سرطان پروستات.

احتیاط: در بیماران قلبی ـ کبدی باید با احتیاط مصرف شود.

W

عوارض جانبی: رویش مو، تغییر صدا، کوتاه شدن دوره قاعدگی.
بسته بندی: قرص ۲ میلی‌گرم × ۲۰.
بها: ۹۴ ریال.

WYAMINE
وایت-آمریکا

ترکیب: سولفات مفنترمین.
موارد استعمال: مقوی قلب، نگهداری تونوس عروق، محرک تنفس، رفع هیپوتانسیون بعلل مختلف و انفارکتوس حاد میوکارد، نوع خوراکی: افسردگی.
مقدار مصرف و طرز استعمال: ۱-۲ آمپول از راه وریدی و بعداً ۱ آمپول در عضله. خوراکی: ۲۵ میلی‌گرم دوبار در روز.
موارد منع استعمال: شوکهای بعد از خونریزی.
احتیاط: اشخاص مبتلا به‌فشارخون. افراد حساس به‌این دارو.
بسته بندی: آمپول ۱ میلی‌لیتر- ۱۵ میلی‌گرم × ۱، ۱۰ میلی‌لیتر × ۱.
بها: ۱ میلی ۳۶ ریال، ۱۰ میلی ۸۰ ریال.

X . PREP
سیگما ـ کانادا

ترکیب: در هر میلی لیتر سنوزید آ + ب، ۲ میلی‌گرم.

مکانیسم: پس از ورود در روده‌ها موجب تحریک و افزایش حرکات دودی آنها میشود.

موارد استعمال: مسهل قبل از رادیوگرافی.

مقدار مصرف و طرز استعمال: محتوی شیشه را یکجا میل کرده و بلافاصله یک لیوان آب سرد می‌نوشند.

عوارض جانبی: گاهی اوقات کرامپ عضلانی و کولیک.

بسته بندی: محلول ۷۰ میلی‌لیتر.

بها: ۱۶۵ ریال.

XYLOCAINE Heavy
آسترا ـ سوئد

ترکیب: لیدوکائین ۰/۰۵ گرم + گلوکز ۰/۰۷۵ گرم.

موارد استعمال: بیحسی نخاعی.

مقدار مصرف و طرز استعمال: برحسب نوع مصرف بیماری متفاوت است.

بسته بندی: هوی ۵ درصد ۲ میلی‌لیتر × ۲۵.

بها: ۱۱۸۰ ریال.

XYLOCAINE Injection
آسترا ـ سوئد

ترکیب: لیدوکائین.

موارد استعمال: بیحسی موضعی.

مقدار مصرف و طرز استعمال: طبق نظر پزشک تا حصول بیحسی مطلوب.

بسته بندی: محلول تزریقی ۱ درصد ساده و آدرنالینه، ۲ درصد ساده و آدرنالینه، در شیشه های ۵۰ میلی‌لیتر.

بها: ساده و آدرنالینه: ۱ درصد ۱۱۶ ریال، ۲ درصد ۱۳۳ ریال.

XYLOCAINE Jelly
آسترا ـ سوئد

ترکیب: لیدوکـائین + کـربـوکسی متیل سلولـز + متیل پاراهیدروکسی بنزوات.
موارد استعمال: سوندزدن مجرا، سیستوسکوپی، هموروئید.
مقدار مصرف و طرز استعمال: برحسب نوع مصرف متفاوت است.
بسته‌بندی: ژله ۲ درصد ۲۰ میلی‌لیتر.
بها: ۱۶۵ ریال.

XYLOCAINE Ointment
آسترا ـ سوئد

ترکیب: در هر ۱۰۰ گرم: لیدوکائین ۵ گرم + پروپیلن گلیکول ۲۵ گرم + پلی اتیلن گلیکول ۷۵ گرم.
موارد استعمال: رفع خارش پوست، سوختگی، کهیر، شقاق پستان، هموروئید.
مقدار مصرف و طرز استعمال: برحسب نوع و شدت بیماری متفاوت است.
بسته‌بندی: پماد ۵ درصد ۳۵ گرم.
بها: ۱۷۵ ریال.

XYLOCAINE Spray 10
آسترا ـ سوئد

ترکیب: در هر ۱۰۰ میلی‌لیتر محلول لیدوکائین ۱۰ گرم + ۱۰ میلی‌گرم ستیل پیریدینیوم کلراید.
موارد استعمال: مامائی، گوش و حلق و بینی، دندانپزشکی.
مقدار مصرف و طرز استعمال: دوبار اسپری برابر ۲۰ میلی‌گرم گزیلو-کائین.
بسته‌بندی: ۱۰ درصد ۸۰ میلی‌لیتر (برابر ۸۰۰ بار اسپری).
بها: ۷۰۰ ریال.

XYLOCAINE Solution
آسترا ـ سوئد

ترکیب: در هر ۱۰۰ میلی‌لیتر: لیدوکائین ۴ گرم + متیل پارائیدروکسی بنزوات ۰/۱ گرم.
موارد استعمال: مخصوص بیحسی مخاطی در تمام اعمال جراحی بینی و

دهـان و پـولـوریـزه کردن آن روی مخـاط حلق به‌منظور لارنگوسکوپی.

مقدار مصرف و طرز استعمال: طبق نظر پزشک تا حصول نتیجه مطلوب.

بسته بندی: محلول ۴ درصد ۱۰۰ میلی‌لیتر.

بها: ۳۵۰ ریال.

XYLOCAINE Viscous
آسترا ـ سوئد

ترکیب: در هر ۱۰۰ میلی‌لیتر: لیدوکائین ۲ گرم + لیگنوکائین ۲ گرم + متیل‌سلولز ۲/۵ گرم + متیل پارابن ۰/۰۷ گرم + پروپیل پارابن ۰/۰۳ گرم + ساکارین ۰/۰۷۵ گرم.

موارد استعمال: ضایعات غشاء مخاطی دهان وگلو مخصوصاً بعد از برداشتن لوزه و اونوئید، سندرم دمپینگ، دخول وسائل فلزی وکاتاتر در داخل معده، ازوفاگوسکپی، دردهای اولسر، سکسکه.

مقدار مصرف و طرز استعمال: روزی یک تا ۳ قاشق مرباخوری.

بسته بندی: ۱۲۵ میلی‌لیتر.

بها: ۲۷۰ ریال.

XYLOPROCT Ointment
آسترا ـ سوئد

ترکیب: در هرگرم پماد: لیدوکائین ۵۰ میلی‌گرم + استات آلومینیم ۳۵ میلی‌گرم + اکسید روی ۱۸۰ میلی‌گرم + هیدروکورتیزون ۲/۵ میلی‌گرم.

موارد استعمال: هموروئیدهای پرولاپس خارجی و سایر حالات دردناک انورکتال فیسور خارش.

مقدار مصرف و طرز استعمال: روزی چندبار برحسب شدت بیماری استعمال می‌شود.

بسته بندی: پماد ۲۰ گرم.

بها: ۱۸۰ ریال.

YOMESAN
بایر-آلمان

ترکیب: N - (۲ - کلرو - ۴ - نیتروفنیل) - ۵ کلروسالیسیلامید - نیکلوزامید.

موارد استعمال: تنیاساژیناتا، تنیاسولیوم، دیفیلوبوتریوم لاتوم، هیمنولپیس نانا.

مقدار مصرف و طرز استعمال: بزرگسالان: ۴ قرص. خردسالان ۲ - ۶ ساله: ۲ قرص. خردسالان کمتر از ۲ سال: ۱ قرص. مقدار خوراک مذکور یکجا جویده یا کوبیده و بعد از صبحانه میل میشود. برای دفع هی‌منولپیس نانا: روز اول بشرح مذکور و ۶ روز دیگر نصف دوزهای مذکور بعد از صبحانه میل می‌شود.

بسته بندی: قرص ۵۰۰ میلی‌گرم × ۴.

بها: ۹۴ ریال.

ZACTIRIN
وایت ـ آمریکا

ترکیب: سیترات اتوهپتازین ۷۵ میلی‌گرم + اسید استیل سالیسیلیک ۲۲۵ میلی‌گرم.

موارد استعمال: درد ناشی از آرتریت، ضربه، بورسیت، نوریت، درد- های قاعدگی، درد عضلانی.

مقدار مصرف و طرز استعمال: روزی ۳-۴ بار، هربار ۱-۲ قرص.

بسته بندی: قرص × ۱۰۰۰.

بها: ۳۱۰۵ ریال.

ZARONTIN
پارك دیویس آمریکا ـ ایران

ترکیب: در هر کپسول یا هر ۵ میلی‌لیتر شربت: اتوسوکسیمید ۲۵۰ میلی‌گرم.

موارد استعمال: کنترل صرع از نوع پتی‌مال.

مقدار مصرف و طرز استعمال: شروع درمان: بیماران کمتر از ۶ سال: ۲۵۰ میلی‌گرم. بیماران ۶ ساله و بزرگتر: ۵۰۰ میلی‌گرم. مقادیر مصرف بعدی بستگی به‌پاسخ درمانی بیماران دارد.

احتیاط و عوارض جانبی: در بعضی بیماران حالات خونسردی، بی- علاقگی، افسردگی، افوری، آتاکسی، سرگیجه، بی‌اشتهائی، اختلال معدی و در معدودی از بیماران بثورات جلدی مشاهده شده است.

بسته بندی: کپسول × ۵۰. شربت ۲۴۰ میلی‌لیتر.

بها: کپسول ۲۵۰ ریال. شربت ۱۸۷ ریال.

ZINCFRIN
آلکان آمریکا ـ
تولیدارو ایران

ترکیب: سولفات روی ۰/۲۵ درصد + فنیل افرین ۰/۱۲ درصد.

موارد استعمال: التهابات چشم ناشی ازگرد و خاک، باد، طوفان، نور

شدید، جوشکاری و خستگی چشم، آلرژی و عفونتهای ملایم چشم.

مقدار مصرف و طرز استعمال: روزی ۳-۴ بار، هربار ۲ قطره در هر چشم می‌چکانند.

بسته بندی: قطره چشمی ۱۵ میلی‌لیتر.

بها: ۴۱ ریال.

ZYLORIC

بوروزولکام ـ انگلستان

ترکیب: در هر قرص آللوپورینول ۱۰۰ میلی‌گرم.

موارد استعمال: دردهای استخوانی، نقرس اولیه و ثانویه، افزایش اسیداوریک خون.

مقدار مصرف و طرز استعمال: برحسب نوع و شدت بیماری از ۲ ـ ۶ قرص در روز متفاوت است.

عوارض جانبی: اسهال، دردهای شکمی. بثورات جلدی، گاهی تب.

بسته بندی: قرص × ۵۰.

بها: ۴۰۰ ریال.

ZYMET

پارك دیویس آمریکا ـ ایران

ترکیب: تاکادیاستاز ۱۲۵ میلی‌گرم + پپسین ۶۶ میلی‌گرم + پانکر آتین ۱۲۵ میلی‌گرم.

موارد استعمال: کمک به‌هضم و جذب مواد نشاسته‌ای و پروتئین، سوء هاضمه، نفخ.

مقدار مصرف و طرز استعمال: روزی ۱ ـ ۲ قرص در حین غذا یا بلافاصله بعد از غذا.

بسته بندی: قرص × ۲۵.

بها: ۸۲ ریال.

شیر خشک و غذای کودک

MILK POWDER & BABY FOOD

ALMA
ژاکوماری- فرانسه

ترکیب: قوطی آبی: چربی ۱۵/۲ درصد + لاکتوز ۲۳/۸ درصد + دکسترین ـ مالتوز ۱۵ درصد + ساکارز ۲۱ درصد + پروتئین ۱۷/۵ درصد + مواد معدنی ۴/۱ درصد. قوطی صورتی: چربی ۱۸/۲ درصد + لاکتوز ۲۲/۷ درصد + دکسترین ـ مالتوز ۱۴/۶ درصد + ساکارز ۲۲/۱ درصد + پروتئین ۱۶ درصد + املاح معدنی ۴ درصد + ۴۷۰ کالری در هر ۱۰۰ گرم

موارد استعمال: تغذیه نوزادان از بدو تولد تا پایان شیرخوارگی.
صورتی: از ۶ ماهگی به بعد.

مقدار مصرف: ۱ پیمانه در مقدار متناسب آب حل کرده به‌طفل میخورانند.

بسته بندی: پودر ۴۰۰ گرم.

بها: قوطی آبی و صورتی ۱۳۵ ریال.

APONTI AU MIEL
آپونتی- آلمان

ترکیب: کربوهیدرات ۸۵ درصد + پروتئین ۱۰/۸ درصد + چربی ۰/۱ درصد + آب ۳ درصد + مواد معدنی ۱ درصد + عسل + ۳۸۵ کالری در ۱۰۰ گرم.

موارد استعمال: تغذیه نوزادان و شیرخواران.

مقدار مصرف: ۲ ـ ۵ قاشق مرباخوری در ۱۷۰ ـ ۲۳۰ گرم آب جوشیده یا شیر حل شود.

بسته بندی: پودر ۲۰۰ گرم.

بها: ۷۵ ریال.

APONTI BANANAS
آپونتی-آلمان

ترکیب: کربوهیدرات ۸۸/۵ درصد + پروتئین ۷/۸ درصد + چربی ۰/۱ درصد + آب ۱ درصد + مواد معدنی ۰/۸۵ درصد + موز + ۳۸۶ کالری در ۱۰۰ گرم.

موارد استعمال: تغذیه نوزادان و شیرخواران.

مقدار مصرف: ۲ ـ ۵ قاشق مرباخوری در ۱۷۰ ـ ۲۳۰ گرم آب جوشیده یا شیر حل کرده به‌طفل میخورانند.

بسته‌بندی: پودر ۳۰۰ گرم.

بها: ۷۵ ریال.

APONTI CARROTS
آپونتی-آلمان

ترکیب: کربوهیدرات ۷۳/۵ درصد + پروتئین ۱۰ درصد + چربی ۰/۶۵ درصد + آب ۴ درصد + مواد معدنی ۵/۸ درصد + هویج، گندم، برنج + ۳۴۰ کالری در ۱۰۰ گرم پودر.

موارد استعمال: تغذیه نوزادان و شیرخواران.

مقدار مصرف: ۲ ـ ۸ قاشق مرباخوری در ۱۷۰ ـ ۲۳۰ گرم آب یا شیر حل کرده به‌طفل میخورانند.

بسته‌بندی: پودر ۳۰۰ گرم.

بها: ۷۵ ریال.

APONTI CHOCOLATE
آپونتی-آلمان

ترکیب: کربوهیدرات ۷۹ درصد + پروتئین ۱۰/۱ درصد + چربی ۲ درصد + آب ۴ درصد + مواد معدنی ۱/۳ درصد + کاکائو.

موارد استعمال: تغذیه نوزادان و شیرخواران.

مقدار مصرف: ۶ قاشق مرباخوری در ۲۰۰ گرم آب.

بسته‌بندی: پودر ۲۰۰ گرم.

بها: ۷۵ ریال.

APONTI 3 – CORN CEREAL
آپونتی-آلمان

ترکیب: کربوهیدرات ۸۰ درصد + پروتئین ۱۰/۵ درصد + چربی ۰/۸ درصد + آب ۵ درصد + مواد معدنی ۱/۶ درصد + گندم، برنج، بلوط + ۳۷۰ کالری در ۱۰۰ گرم

پودر.

موارد استعمال: تغذیه نوزادان و شیرخواران.

مقدار مصرف: ۳ـ۶ قاشق مرباخوری در ۱۳۰ ـ ۲۰۰ گرم آب یا شیر حل کرده به‌طفل میخورانند.

بسته بندی: پودر ۳۰۰ گرم.

بها: ۶۵ ریال.

APONTI FRUITS

آپونتی-آلمان

ترکیب: کربوهیدرات ۸۶ درصد + پروتئین ۸/۷ درصد + چربی ۰/۳ درصد + آب ۲ درصد + مواد معدنی ۱/۱ درصد + گلابی، موز، سیب، پرتقال، لیمو + ۳۸۰ کالری در ۱۰۰ گرم.

موارد استعمال: تغذیه نوزادان و شیرخواران.

مقدار مصرف: ۴ـ۶ قاشق مرباخوری در ۱۶۰ ـ ۲۰۰ گرم آب جوشیده یا شیر حل کرده به‌طفل میخورانند.

بسته بندی: پودر ۳۰۰ گرم.

بها: ۷۵ ریال.

APONTI RICE CEREAL

آپونتی-آلمان

ترکیب: کربوهیدرات ۷۹ درصد + پروتئین ۹/۳ درصد + چربی ۰/۸ درصد + آب ۵ درصد + مواد معدنی ۱/۳ درصد + برنج + ۳۷۰ کالری.

موارد استعمال: تغذیه نوزادان و شیرخواران با حالت عادی یا کمی لینت مزاج.

مقدار مصرف: ۳ ـ ۶ قاشق مرباخوری در ۱۳۰ ـ ۲۰۰ گرم آب جوشیده یا شیر حل کرده به‌طفل میخورانند.

بسته بندی: پودر ۳۰۰ گرم.

بها: ۱۲۴ ریال.

APTAMIL

میلوپا-آلمان

ترکیب: در هر ۱۰۰ گرم: چربی ۲۸/۳ گرم + پروتئین ۱۳/۶ گرم + لاکتوز ۵۵/۱ گرم + ویتامین A ۱۴۶۲ واحد + ویتامین D_3 ۳۱۴ واحد + ویتامین B_1 ۰/۲۵ میلی‌گرم + ویتامین B_2 ۰/۳۸ میلی‌گرم

+ نیکوتین آمید ۱/۸۵ میلی گرم + ویتامین B۶ ۰/۳۲ میلی- گرم + املاح معدنی ۱/۹ گرم + آب ۱/۱ گرم + ۵۳۰ کالری + اسید فولیک ۳۸/۵ میکروگرم + ویتامین B۱۲ ۱/۶۲ میکرو- گرم + ویتامین C ۵۷/۷ میلی گرم + ویتامین E ۶/۱۵ میلی گرم + پانتوتنات کلسیم ۱/۸۵ میلی گرم + آهن ۳/۸ میلی گرم.

بسته‌بندی: پودر ۴۰۰ گرم.

بها: ۱۸۸ ریال.

BAKER
بیکر- هلند

ترکیب: چربی (نارگیل و سویا و ذرت) ۲۵/۵ درصد + پروتئین ۱۶/۳ درصد + مواد قندی ۵۱/۸ درصد + مواد معدنی ۴/۱ درصد + کلسیم ۰/۶۲ درصد + فسفر ۰/۴۶ درصد + آهن ۰/۰۰۹۳ درصد + آب ۲/۳ درصد + ویتامین A ۲ هزار واحد + D ۴۰۰ واحد + E ۸ واحد + C ۵۲ میلی گرم + نیاسینامید ۶ میلی گرم + اسید پانتوتنیک ۳ میلی گرم + ویتامین B۱ ۰/۴ میلی- گرم + B۲ ۱ میلی گرم + B۶ ۰/۴ میلی گرم + ویتامین B۱۲ ۲ میکرو- گرم + اسید فولیک ۷۰ میکروگرم + (در هر ۹ گرم پودر شیر در ۲ اونس آب: کلسیم ۸۰۰ میلی گرم + فسفر ۵۹۵ میلی گرم + منیزیم ۶۰ میلی گرم + آهن ۱۲ میلی گرم + مس ۰/۴ میلی گرم + ید ۵۰ میکروگرم.) + ۴۴۴ کیلو کالری در ۱۰۰ گرم.

موارد استعمال: تغذیه شیرخواران از بدو تولد.

مقدار مصرف: یک پیمانه در ۶۰ میلی لیتر آب حل کرده برحسب سن طفل باو میخورانند.

بسته‌بندی: پودر ۴۵۴ گرم.

بها: ۱۶۵ ریال.

BEBELAC CREAM VANILA
لیمف- هلند

ترکیب: چربی ۱۳ درصد + پروتئین ۱۵/۳ درصد + لاکتوز ۱۹/۲ درصد + مواد معدنی ۳/۵ درصد + ساکارز ۱۸/۴ درصد + آرد برنج ۲۷ درصد + آب ۳/۶ درصد + ویتامین A ۷۵۰ واحد + ویتامین C ۲۰ میلی گرم + ویتامین D۳ ۳۵۰ واحد +

ویتامین E ۰/۲ میلی‌گرم + ویتامین B_1 ۰/۲ میلی‌گرم + ویتامین B_2 ۰/۷ میلی‌گرم + ویتامین B_6 ۰/۶ میلی‌گرم + ویتامین B_{12} ۱/۵ گاماگرم + نیاسینامید ۰/۴ میلی‌گرم + اسید پانتوتنیک ۱/۴ میکروگرم + کلسیم ۵۰۰ میلی‌گرم + فسفر ۳۵۰ میلی‌گرم + سدیم ۲۰۰ میلی‌گرم + پتاسیم ۶۰۰ میلی‌گرم + مس ۰/۰۳ میلی‌گرم + آهن ۰/۵ میلی‌گرم.

موارد استعمال: شیرخشک برای تغذیه کودکان از ۳ ماهگی به بعد.

بسته‌بندی: پودر ۴۵۴ گرم.

بها: ۱۸۷ ریال.

BEBELAC HUMANIZED
لیمف - هلند

ترکیب: چربی ۲۸ درصد + پروتئین (لاکتابومین ۷/۰۸ + کازئین ۴/۷۲) ۱۱/۸ درصد + لاکتوز ۵۶ درصد + مواد معدنی (کلسیم + فسفر + سدیم + پتاسیم + مس + آهن) ۱/۶ درصد + آب ۲/۵ درصد + آهن ۷/۵ میکروگرم + انواع مختلف ویتامینها (ویتامین A + ویتامین D_3 + ویتامین C + ویتامین E + ویتامین B_1 + ویتامین B_2 + ویتامین B_6 + ویتامین B_{12} + نیاسینامید + اسید پانتوتنیک) + ۵۲۵ کالری در هر ۱۰۰ گرم.

موارد استعمال: تغذیه کودکان از بدو تولد.

مقدار مصرف: هر پیمانه در ۳۰ میلی‌لیتر آب حل کرده و با توجه به سن طفل باو میخورانند.

بسته‌بندی: پودر ۴۰۰ گرم.

بها: ۱۶۷ ریال.

BLEDINE BANANA
دی اپال - فرانسه

ترکیب: گلوسید ۸۹ درصد + پروتید ۵/۶ درصد + لیپید ۲ درصد + موز ۳۵ درصد + ۳۹۶ کیلو کالری در ۱۰۰ گرم.

موارد استعمال: تغذیه نوزادان و شیرخواران.

مقدار مصرف: ۲ قاشق چایخوری برای هر ماه سن طفل.

بسته‌بندی: پودر ۲۵۰ گرم.

بها: ۹۹ ریال.

BLEDINE GROWTH
دی‌اپال ـ فرانسه

ترکیب: گلوسید ۹۰/۹ درصد + پروتئین ۴ درصد + چربی ۲/۱ درصد + غلات (جو، ذرت، چاودار، برنج، ارگ) + فسفات بی‌کلسیک + لسیتین + ۳۹۸ کالری در هر ۱۰۰ گرم.
مقدار مصرف: ۱/۵ ـ ۲ قاشق چایخوری برای هر ماه سن طفل.
بسته‌بندی: پودر ۲۵۰ گرم.
بها: ۹۹ ریال.

BLEDINE RICE
دی‌اپال ـ فرانسه

ترکیب: گلوسید ۹۴/۳ درصد + پروتئین ۲/۶ درصد + چربی ۱/۳ درصد گرم + شکر، برنج، تاپیوکا + فسفات بی‌کلسیک + ۳۹۹ کالری در هر ۱۰۰ گرم.
موارد استعمال: تغذیه نوزادان و شیرخواران، لینت‌مزاج.
مقدار مصرف: ۱/۵ ـ ۲ قاشق چایخوری برای هر ماه سن طفل.
بسته‌بندی: پودر ۲۵۰ گرم.
بها: ۹۹ ریال.

CERELAC
نستله ـ سویس

ترکیب: پروتئین ۱۱ درصد + چربی ۷/۸ درصد + کربوهیدرات ۷۷/۷ درصد + املاح معدنی ۲ درصد + آب ۱/۵ درصد + ۴۲۵ کالری در ۱۰۰ گرم: ویتامین A ۷۵۰ واحد + ویتامین D ۲۰۰ واحد + ویتامین E ۲/۵ میلی‌گرم + ویتامین B_1 ۰/۲ میلی‌گرم + ویتامین B_2 ۰/۳ میلی‌گرم + ویتامین B_6 ۰/۲ میلی‌گرم + ویتامین B_{12} ۰/۸ میکروگرم + ویتامین C ۲۰ میلی‌گرم + اسید فولیک ۱۰ میکرو‌گرم + ویتامین PP ۳/۸ میلی‌گرم + پانتوتنات کلسیم ۱/۸۵ میلی‌گرم.
بسته‌بندی: پودر ۴۰۰ گرم.
بها: ۱۸۰ ریال.

DIALAC 1
دیادال ـ بلژیک

ترکیب: چربی ۱۴/۵ درصد + پروتئین ۲۰/۸ درصد + لاکتوز ۲۸/۵ درصد + دکسترین مالتوز ۱۸/۴ درصد + ساکارز ۱۰ درصد + آب ۳/۵ درصد + آهن لاکتیک ۳۰ میلی‌گرم درصد + در هر

۱۰۰ گرم پودر ۴۴۰ کالری در ۱۰۰ گرم: ویتامین A ۲۲۵۰ واحد + B_1 ۰/۴۵ میلی‌گرم + B_2 ۰/۷ میلی‌گرم + PP ۳/۵ میلی‌گرم + B_6 ۰/۳ میلی‌گرم + پانتوتنات کلسیم ۳ میلی‌گرم + بیوتین ۳/۸ میلی‌گرم + C ۴۰ میلی‌گرم + D ۳۵۰ واحد

بسته‌بندی: پودر ۴۵۴ گرم

بها: ۲۲۵ ریال.

DIALAC 2
دیادال - بلژیک

ترکیب: چربی ۱۹/۱ درصد + پروتئین ۱۹/۹ درصد + لاکتوز ۲۸/۷ درصد + دکسترین مالتوز، ۱۵ درصد + ساکارز ۱۰ درصد + مواد معدنی ۴/۳ درصد + آب ۳ درصد + آهن لاکتیک ۴۵ میلی‌گرم درصد + ویتامین D ۳۵۰ واحد درصد گرم + در هر ۱۰۰ گرم پودر ۴۸۰ کالری.

بسته‌بندی: پودر ۴۵۴ گرمی.

بها: ۲۲۵ ریال.

ELDACID 1
لئودووینتر (مای‌بوی) ــ هلند

ترکیب: چربی ۱۰/۷ درصد + پروتئین ۱۸/۲ درصد + لاکتوز ۲۵/۶ درصد + دکسترین مالتوز ۱۲/۵ درصد + ساکارز ۱۵/۶ درصد + اسید لاکتیک ۲/۲ درصد + نشاسته ذرت ۷/۱ درصد + املاح معدنی ۵/۱ درصد + ویتامین ۱ درصد + آب ۳ درصد + ۴۰۷ کیلو کالری در هر ۱۰۰ گرم + آهن ۳ میلی‌گرم + کلسیم ۹۶۰ میلی‌گرم + سدیم ۲۷۳ میلی‌گرم + پتاسیم ۱۰۵۲ میلی‌گرم + فسفر ۷۳۳ میلی‌گرم + کلر ۱۰۲۰ میلی‌گرم + ویتامین A ۳۲۰۰ واحد + ویتامین D_3 ۵۰۰ واحد + ویتامین C ۳۱/۹ میلی‌گرم + ویتامین B_1 ۰/۴۲ میلی‌گرم + ویتامین B_2 ۱/۰۱ میلی‌گرم + ویتامین B_6 ۰/۲۶ میلی‌گرم + نیاسین ۳ میلی‌گرم + ۴۰۷ کالری در ۱۰۰ گرم.

موارد استعمال: تغذیه کودکان سالم و نارس تا چهارماهگی، پیشگیری و درمان اختلالات گوارشی.

مقدار مصرف: هفته اول تا سوم: ۲/۵ پیمانه در ۷۰ میلی‌لیتر آب ۷ بار

در شبانه‌روز، این مقدار بتدریج افزایش داده میشود تا در ماههای هفتم و هشتم به۶ پیمانه در ۱۶۰ میلی‌لیتر آب ۲ بار در شبانه‌روز میرسد.

بسته‌بندی: پودر ۴۵۴ گرم.

بها: ۲۳۴ ریال.

ELDACID 2
لئودوویتر
(مای‌بوی) ـ هلند

ترکیب: چربی ۱۸/۳ درصد + پروتئین ۱۶/۳ درصد + لاکتوز ۲۳ درصد + دکسترین مالتوز ۱۳ درصد + ساکارز ۱۳ درصد + اسید- لاکتیک ۱/۹۵ درصد + نشاسته ذرت ۷/۱۵ درصد + املاح- معدنی ۴/۳ درصد + ویتامین ۱ درصد + آب ۳ درصد + ۴۵۶ کیلو کالری در هر ۱۰۰ گرم + آهن ۷ میلی‌گرم + کلسیم ۶۵۰ میلی‌گرم + سدیم ۲۵۰ میلی‌گرم + پتاسیم ۸۰۰ میلی‌گرم + فسفر ۴۵۰ میلی‌گرم + کلر ۵۰۰ میلی‌گرم + ویتامین A ۲۸۷۵ واحد + ویتامین D_3 ۵۰۰ واحد + ویتامین C ۵۰ میلی‌گرم + ویتامین B_1 ۰/۴ میلی‌گرم + ویتامین B_2 ۰/۹ میلی‌گرم + ویتامین B_6 ۰/۲ میلی‌گرم + ویتامین B_{12} ۲ میکروگرم + نیاسین ۶ میلی‌گرم + اسید- پانتوتنیک ۲ میلی‌گرم + اسید فولیک ۶۵ میکروگرم + ویتامین E ۸ میلی‌گرم + ۴۵۶ کالری در ۱۰۰ گرم.

موارد استعمال: تغذیه نوزادان سالم از بدو تولد تا آخر شیرخوارگی، اختلالات گوارشی.

مقدار مصرف: مانند الداسید شماره ۱.

بسته‌بندی: پودر ۴۵۴ گرم.

بها: ۲۳۴ ریال.

ELEDON
نستله ـ سویس

ترکیب: چربی ۱۴ درصد + پروتئین ۳۰/۵ درصد + لاکتوز ۳۹/۳ درصد + اسید لاکتیک ۴/۲ درصد + املاح معدنی ۶/۸ درصد + آب ۴ درصد + ۴۲۰ کالری در هر ۱۰۰ گرم.

موارد استعمال: تغذیه اطفال نارس و ضعیف، اختلالات گوارشی شیرخواران، سوءهاضمه، اختلالات جلدی، اسپاسم پیلور،

توکسیکوز، اختلالات رشد، کمبودهای غذائی و بی‌اشتهائی،
گاستریت حاد.

مقدار مصرف: با غلظت ۱۲ درصد با آب جوشیده تهیه میشود و به‌مقدار ۱۶۰ تا ۱۸۰ میلی‌لیتر برای هرکیلو حداکثر تا ۱۰۰۰ میلی‌لیتر در روز به‌طفل میخورانند.

بسته بندی: پودر ۲۷۲ گرم.

بها: ۲۸۰ ریال.

ELDORIN
لئودووینتر
(مای‌بوی) ـ هلند

ترکیب: چربی ۲۸ درصد + پروتئین ۱۳ درصد + لاکتوز ۵۳/۲ درصد + املاح معدنی ۲/۸ درصد + آب ۳ درصد، در هر ۱۰۰ گرم ویتامین A ۴۰۰۰ واحد + ویتامین D_3 ۶۴۰ واحد + ویتامین B_1 ۰/۴ میلی‌گرم + ویتامین B_2 ۱/۳ میلی‌گرم + ویتامین B_6 ۰/۴ میلی‌گرم + ویتامین B_{12} ۱/۵ میکروگرم + نیاسین ۱/۷ میلی‌گرم + بیوتین ۰/۰۱۸ میلی‌گرم + اسید فولیک ۰/۰۳۷ میلی‌گرم + اینوزیتول ۳۱۲ میلی‌گرم + اسید پانتوتنیک ۳ میلی‌گرم + ویتامین C ۳۶ میلی‌گرم + ویتامین E ۸ میلی‌گرم + آهن + کلسیم + فسفر + سدیم + پتاسیم + منیزیم + کلر + سولفور + مس + ید + منگنز + ۵۱۷ کالری در ۱۰۰ گرم

مقدار مصرف: هفته اول: ۱ پیمانه در ۶۰ میلی‌لیتر آب ۷ بار در شبانه‌روز، ۷ـ۸ ماهگی: ۷ پیمانه در ۲۴۰ میلی‌لیتر آب ۴ بار در روز.

بسته بندی: پودر ۴۵۴ گرم.

بها: ۲۴۷ ریال.

FORMULA M
کواندگیت ـ
انگلستان

ترکیب: در هر ۱۰۰ گرم: چربی ۲۴ گرم + پروتئین ۱۴/۵ گرم + کربوهیدرات ۵۳/۱ گرم + آب ۲ گرم + ویتامین A ۲۱۰۰ واحد + ویتامین B_1 ۰/۷ میلی‌گرم + ویتامین B_2 ۰/۹ میلی‌گرم + ویتامین B_6 ۰/۴ میلی‌گرم + نیکوتی‌نیک اسید ۷ میلی‌گرم + پانتوتنات کلسیم ۳ میلی‌گرم + اسید فولیک ۵۰ میکروگرم +

ویتامین B_{12} ۲ میکروگرم + ویتامین C ۴۰ میلی‌گرم + ویتامین D ۳۵۰ واحد + ویتامین ۵ میلی‌گرم + آهن ۱/۰۵ میلی‌گرم + کلسیم ۷۰۰ میلی‌گرم.

موارد استعمال: تغذیه نوزادان از بدو تولد تا پایان دوره شیرخوارگی.

مقدار مصرف: برحسب سن طفل از ۲ ـ ۸ پیمانه (هر پیمانه در ۴۰ میلی‌لیتر آب حل شده) به‌طفل میخورانند.

بسته‌بندی: پودر ۴۵۴ گرم.

بها: ۱۳۲ ریال.

FRISINFLAG
سی‌سی‌اف ـ هلند

ترکیب: لاکتوز ۳۶/۹ درصد + چربی ۲۸ درصد + پروتئین ۲۶/۵ درصد + آب ۳ درصد + مواد معدنی ۵/۶ درصد + ویتامین D_3 ۱۰۰ واحد در هر اونس + ۵۲۲ کالری در ۱۰۰ گرم.

موارد استعمال: تغذیه کودکان از ۶ ماهگی به بعد.

مقدار مصرف: ۳۰ گرم پودر در ۲۰۰ میلی‌لیتر آب ۵ ـ ۶ بار در روز.

بسته‌بندی: پودر ۴۵۴ گرم.

بها: ۱۳۹ ریال.

FRISOCREM
سی‌سی‌اف ـ هلند

ترکیب: در هر ۱۰۰ گرم: ساکارز ۳۰ گرم + لاکتوز ۱۹/۵ گرم + چربی ۱۳/۲ گرم + پروتئین ۱۵/۸ گرم + آب ۴/۲ گرم + مواد معدنی ۳/۳ گرم + ویتامین ها.

موارد استعمال: تغذیه شیرخواران و کودکان از ۶ ماهگی به بعد. ناراحتیهای گوارشی.

مقدار مصرف: یک قاشق سوپخوری در ۱۲۰ میلی‌لیتر آب جوشیده هم بزنند تا محلول یکنواختی بدست آید.

بسته‌بندی: پودر ۴۵۴ گرم.

بها: ۱۴۵ ریال.

FRISOLAC
سی‌سی‌اف ـ هلند

ترکیب: پروتئین ۱۴/۵ درصد + چربی ۲۷ درصد + لاکتوز ۵۴ درصد + آب ۲/۵ درصد + مواد معدنی ۲ درصد + ویتامین A + ویتامین

D + ویتامین E + ویتامین B_1 + ویتامین B_2 + نیاسینامید + ویتامین B_6 + اسید پانتوتنیک + ویتامین B_{12} + کولین + ویتامین C + ۵۱۷ کالری در ۱۰۰ گرم.

موارد استعمال: تغذیه کودکان سالم و نارس تا ۶ ماهگی.

مقدار مصرف: هفته اول: ۱/۵ پیمانه در ۶۰ میلی‌لیتر آب ۶بار در روز که بتدریج تا ماه هشتم به‌۵ پیمانه در ۲۲۵ میلی‌لیتر آب ۵ مرتبه در روز میرسد.

بسته بندی: پودر ۴۵۴ گرم.

بها: ۱۵۸ ریال.

GITANA
بیه‌لن- هلند

ترکیب: چربی ۲۶ درصد + لاکتوز ۳۶ درصد + پروتئین ۲۸ درصد + مواد معدنی ۷ درصد + آب ۳ درصد + در هر ۱۰۰ گرم: ویتامین D ۳۵۳ واحد + ۵۰۰ کالری.

موارد استعمال: تغذیه نوزادان از بدو تولد تا پایان دوره شیرخوارگی.

مقدار مصرف: برحسب سن طفل از ۱ـ۹ پیمانه (هر پیمانه در ۳۰ میلی‌لیتر آب حل کرده) به‌طفل میخورانند.

بسته بندی: پودر ۴۵۴ گرم.

بها:

GUIGOZ 1
گی‌گز-سویس

ترکیب: در هر ۱۰۰ گرم: چربی ۲۲/۲ درصد + پروتئین ۱۴/۳ درصد + لاکتوز ۴۰/۲ درصد + ساکارز ۱۷/۳ درصد + مواد معدنی ۳ درصد + آب ۳ درصد + ویتامین A ۱۵۰۰ واحد + ویتامین D ۴۰۰ واحد + ویتامین C ۴۰ میلی‌گرم + ویتامین B_1 ۰/۲۵ میلی‌گرم + ویتامین B_2 ۰/۴ میلی‌گرم + ویتامین B_6 ۰/۲۵ میلی‌گرم + ویتامین B_{12} ۱ میکروگرم + ویتامین PP ۵ میلی‌گرم + پانتوتنات کلسیم ۵ میلی‌گرم + اسید فولیک ۵۰ میکروگرم + ویتامین E ۵ میلی‌گرم + آهن ۶ میلی‌گرم + ۴۸۷ کالری.

موارد استعمال: شیرخشک کم‌چرب از بدو تولد تا پایان دوره شیرخوارگی.

بسته‌بندی: پودر ۴۵۰ گرم.
بها: ۲۰۰ ریال.

GUIGOZ 2
گی‌گز-سویس

ترکیب: چربی ۱۸/۲ درصد + پروتئین ۱۸/۴ درصد + لاکتوز ۲۶/۹ درصد + ساکارز ۱۹/۵ درصد + نشاسته ۱۰ درصد + مواد معدنی ۴ درصد + آب ۳ درصد + ویتامین‌ها: مانند گی‌گز شماره ۱ + ۴۶۸ کالری در هر ۱۰۰ گرم.
موارد استعمال: شیرخشک پر چرب برای نوزادان بالاتر از ۶ ماه و خردسالان.
بسته‌بندی: پودر ۵۰۰ گرم.
بها: ۲۰۹ ریال.

ISOMIL
ابوت-آمریکا

ترکیب: کربوهیدرات ۵۱/۶۵ درصد + چربی ۲۷/۳۵ درصد + پروتئین ۱۵/۲۵ درصد + آب ۲ درصد + مواد معدنی ۳/۷۵ درصد + ویتامین‌های A + D + E + B_1 + B_2 + B_6 + نیاسینامید + ویتامین D + اسید فولیک + ویتامین B_{12} + اسید پانتوتنیک + بیوتین + ۲۰ کالری در هر ۳۰ میلی‌لیتر شیر آماده.
موارد استعمال: تمام موارد اسهال نوزادان، ناراحتی غیر اختصاصی دستگاه تنفسی، سندرم کولیک، آبریزش دهان و تحریک پذیری.
مقدار مصرف: هر پیمانه در ۶۰ میلی‌لیتر آب جوشیده حل کرده بعد از ۳۰ ثانیه تکان دادن مصرف شود.
بسته‌بندی: پودر ۴۰۰ گرم.
بها: ۳۴۶ ریال.

KANY 1
ایمکو-هند

ترکیب: چربی ۱۱/۱ درصد + پروتئین ۳۲ درصد + لاکتوز ۴۴ درصد + مواد معدنی ۸ درصد + ویتامین A + ویتامین B_1 + ویتامین B_2 + ویتامین D_3 ۴۰۰ واحد + ۴۶۵ کالری در ۱۰۰ گرم.
بسته‌بندی: پودر ۴۵۴ گرم.
بها: ۱۹۵ ریال.

KANY 2
ایمکو- هلند

ترکیب: پروتئین ۲۷ درصد + لاکتوز ۳۷ درصد + مواد معدنی ۶ درصد + آب ۳ درصد + مواد معدنی + ویتامین A + ویتامین B_1 + ویتامین B_2 + ویتامین D_3.
بسته‌بندی: پودر ۴۵۴ گرم.
بها: ۲۰۰ ریال.

LIDAGEN
لیدانو- دانمارک

ترکیب: چربی ۱ درصد + پروتئین ۵۳ درصد + لاکتوز ۳۶ درصد + مواد معدنی ۷ درصد + کلسیم ۰/۹ درصد + فسفر ۰/۷ درصد + سدیم ۰/۶ درصد + پتاسیم ۱/۲ درصد + آب ۳ درصد در هر ۱۰۰ گرم: کالری ۳۷۰ + ویتامین ۳A هزار واحد + ۳۰۰D واحد + ۲E واحد + ۷۰ C میلی‌گرم + ۲B_1 میلی‌گرم + ۲B_2 میلی‌گرم + ویتامین ۵B_3 میلی‌گرم + ۱B_6 میلی‌گرم + ۱B_{12} میکروگرم + نیاسین ۱۵ میلی‌گرم + آهن ۱۰ میلی‌گرم.
موارد استعمال: کودکان سالم و نارس، اطفال کم رشد، تقویت عمومی نوزادان، دوران نقاهت، زنان باردار پس از زایمان.
مقدار مصرف: یک قاشق غذاخوری پودر را با شکر و آب مخلوط کرده خمیر حاصل میل می‌شود.
بسته‌بندی: پودر ۴۰۰ گرم.
بها: ۱۴۲ ریال.

MEIJI MILK
می‌جی- ژاپن

ترکیب: شیر خالص ۶۵/۱ درصد + نیشکر ۱۰ درصد + چربی مخلوط با اسید لینولئیک ۱۰/۷ درصد + پلی‌ساکاریدهای محلول ۱۴/۲ درصد + چربی ۱۷/۸ درصد + کربوهیدرات ۶۳/۱ درصد + پروتئین ۱۳/۳ درصد + ساده خاکستری ۳/۳ درصد + آب ۲/۵ درصد + کالری در هر ۱۰۰ گرم ۴۶۶ واحد ویتامین‌های: ۲۰۰۰A واحد + ۰/۵۶B_1 میلی‌گرم + ۰/۹۱B_2 میلی‌گرم + ۰/۲B_6 میلی‌گرم + ۴B_{12} گاما + ۴۰C میلی‌گرم + ۵۰۰D واحد + ۶E واحد + اسید لینولئیک ۲/۳۶ گرم + نیکوتینامید ۴ میلی‌گرم + کلسیم ۵۰۰ میلی‌گرم + فسفر ۴۲۰

میلی‌گرم + آهن ۶/۷ میلی‌گرم + ۵۶۶ کالری در هر ۱۰۰ گرم.
بسته‌بندی: پودر ۴۵۴ گرم.
بها: ۲۳۵ ریال.

MILUPA (Milk cereal)
میلوپا ـ آلمان

ترکیب: کربوهیدرات ۶۴/۱ درصد + چربی ۸/۶ درصد + پروتئین ۲۰ درصد + آب ۳ درصد + مواد معدنی ۴/۶ درصد + آهن ۲ میلی‌گرم + ویتامین A + ویتامین D_3 + ویتامین B_1 + ویتامین B_2 + نیکوتینامید + ویتامین B_6 + اسید فولیک + ویتامین B_{12} + ویتامین C + ویتامین E + پانتوتنات کلسیم + ۴۱۴ کالری در هر ۱۰۰ گرم پودر.
موارد استعمال: غذای شیرخواران پس از ۳ ماهگی.
مقدار مصرف: ۵ـ۶ قاشق غذاخوری را در ۱۴۰ میلی‌لیتر آب حل کرده و با قاشق به کودک میخورانند
بسته‌بندی: پودر ۳۰۰ گرم.
بها: ۱۶۲ ریال.

MILUPA (Cereal with Milk and apple)
میلوپا ـ آلمان

ترکیب: کربوهیدرات ۷۲/۸ درصد + چربی ۸/۱ درصد + پروتئین ۱۳/۲ درصد + ویتامین های میلوویت + ۴۱۷ کالری در هر ۱۰۰ گرم پودر.
موارد استعمال، مقدار مصرف، بسته‌بندی مشابه MILUPA (Milk Cereal) است.
بها: ۱۵۶ ریال.

MILUPA (Cereal with Milk and Bananas)
میلوپا ـ آلمان

ترکیب: کربوهیدرات ۷۳ درصد + چربی ۸ درصد + پروتئین ۱۲/۵ درصد + ویتامین های میلوویت + ۴۱۴ کالری در هر ۱۰۰ گرم پودر.
موارد استعمال، مقدار مصرف، بسته‌بندی مشابه MILUPA (Milk Cereal) است.
بها: ۱۵۶ ریال.

MILUPA (Cereal with Milk and Mixed fruit)
میلوپا ـ آلمان

ترکیب: کربوهیدرات ۷۳ درصد + چربی ۹ درصد + پروتئین ۱۲/۶ درصد + ویتامین های میلوویت + ۴۲۳ کالری در هر ۱۰۰ گرم پودر.

موارد استعمال، مقدار مصرف، بسته‌بندی مشابه MILUPA (Milk Cereal) است.

بها: ۱۵۶ ریال.

MILUPA (Coreal With Milk and orange)
میلوپا ـ آلمان

ترکیب: کربوهیدرات ۷۲/۴ درصد + چربی ۹ درصد + پروتئین ۱۳/۵ درصد + ویتامین هـای میلوویت + ۴۲۵ کالری در هر ۱۰۰ گرم پودر.

موارد استعمال، مقدار مصرف، بسته‌بندی مشابه MILUPA (Milk Cereal) است.

بها: ۱۵۶ ریال.

MILUVIT (MIT)
میلوپا ـ آلمان

ترکیب: کربوهیدرات ۷۱ درصد + چربی ۹/۲ درصد + پروتئین ۱۳/۷ درصد + ۴۲۲ کالری در هر ۱۰۰ گرم.

موارد استعمال: غذای نوزادان از ۳ ماهگی به بعد.

مقدار مصرف: ۵ـ۶ قاشق غذاخوری در ۱۴۰ میلی‌لیتر آب جوشیده. حل و با قاشق به‌طفل میخورانند.

بسته‌بندی: پودر ۲۷۵ گرم.

بها: ۱۴۰ ریال.

MIOLAC
(کم چرب، اسیدبفیه) هلند ـ هلند

ترکیب: چربی ۱۸/۲ درصد + لاکتوز ۵۲/۵ درصد + پروتئین ۲۰/۳ درصد + آب ۲/۵ درصد + اسید لاکتیک ۱ درصد + ویتامین A ۱۵۰۰ واحد + ویتامین D ۱۷۵ واحد + ویتامین C ۳۰ میلی‌گرم + ویتامین B_1 ۰/۵ میلی‌گرم + ویتامین B_2 ۱ میلی‌گرم + ویتامین B_6 ۰/۵ میلی‌گرم + نیاسینامید ۴ میلی‌گرم.

موارد استعمال: شیر اسیدی مخصوص ناراحتی‌های گوارشی.

مقدار مصرف: ۱ پیمانه در ۳۵ میلی‌لیتر آب حل کرده برطبق سن طفل باو

میخورانند.
بسته‌بندی: پودر در قوطی بنفش ۴۵۴ گرم.
بها: ۱۷۲ ریال.

MIOLAC
(کم‌چرب)
هلند ـ هلند

ترکیب: چربی ۱۲ درصد + لاکتوز ۲۹ درصد + پروتئین ۲۱ درصد + ساکارز ۲۰ درصد + دکسترین مالتوز ۱۰ درصد + مواد معدنی ۵ درصد + آب ۳ درصد + ویتامین A ۱۲۵۰ واحد + ویتامین D ۴۰۰ واحد + ویتامین C ۳۵ میلی‌گرم.
موارد استعمال: شیر مخصوص نوزادان سالم از بدو تولد تا پایان دوره شیرخوارگی.
مقدار مصرف: با غلظت ۱۳ درصد تهیه و به‌طفل میخورانند.
بسته‌بندی: پودر کم چرب در قوطی سبز ۴۵۴ گرم.
بها: ۱۷۲ ریال.

MIOLAC
(پرچرب)
هلند ـ هلند

ترکیب: چربی ۲۷ درصد + لاکتوز ۵۴ درصد + آب ۲ درصد + پروتئین ۱۳/۵ درصد + کلسیم ۰/۵۵ درصد + فسفر ۰/۴۵ درصد + آهن ۰/۰۰۳ درصد + مس ۰/۰۰۲۵ درصد + ویتامین A ۱۱۵۰ واحد + D ۶۵۰ واحد + B_1 ۰/۵ میلی‌گرم + B_2 ۲ میلی‌گرم + C ۳۵ میلی‌گرم + نیکوتینامید ۱ میلی‌گرم + اسید پانتوتنیک ۴ میلی‌گرم + پیریدوکسین ۰/۵ میلی‌گرم + اینوزیتول ۱۴۰ میلی‌گرم.
موارد استعمال: شیر مخصوص نوزادان ۶ ماه به بالا.
مقدار مصرف: ۱ پیمانه در ۳۵ میلی‌لیتر آب حل و به‌طفل میخورانند.
بسته‌بندی: پودر پر چرب در قوطی آبی ۴۵۴ گرم.
بها: ۱۷۲ ریال.

MORINAGA
مورینا‌گا ـ ژاپن

ترکیب: چربی ۲۳ درصد + پروتئین ۱۳ درصد + کربوهیدرات ۵۹/۸ درصد + مواد معدنی ۲/۲ درصد + آب ۲ درصد + ویتامین A ۲۰۰۰ واحد + ویتامین B_1 ۰/۶ میلی‌گرم + ویتامین B_2 ۱ میلی‌گرم + ویتامین B_6 ۰/۲ میلی‌گرم + ویتامین B_{12} ۲ میکروگرم + ویتامین

C ۴۰ میلی‌گرم + ویتامین D ۵۰۰ واحد + ویتامین E ۶ میلی‌گرم + ویتامین F ۳/۳ گرم + نیکوتینامید ۶ میلی‌گرم + اسید فولیک ۰/۱ میلی‌گرم + پانتوتنات کلسیم ۳ میلی‌گرم + اینوزیتول ۱ میلی‌گرم + آهن ۵ میلی‌گرم + کلسیم ۳۰۰ میلی‌گرم + فسفر ۲۷۰ میلی‌گرم + سدیم ۱۸۰ میلی‌گرم + پتاسیم ۴۵۰ میلی‌گرم + منگنز ۲۷۰ میلی‌گرم + کلر ۳۰۰ میلی‌گرم + سیستین ۱۵۰ میلی‌گرم + لسیتین ۳۰۰ میلی‌گرم + موسین ۳۰ میلی‌گرم.

موارد استعمال: تغذیه نوزادان سالم، نارس و ضعیف از بدو تولد تا پایان دوره شیرخوارگی.

مقدار مصرف: بعد از تمیز کردن و جوشاندن شیشه و سر شیشه بمدت ۵ ـ ۱۰ دقیقه در آب‌جوش ۳ ـ ۱۱ پیمانه (هر پیمانه با ۲۰ میلی‌لیتر آب جوشیده سرد مخلوط شود) به‌طفل میخورانند.

بسته‌بندی: پودر ۴۵۰ گرم.

بها: ۱۷۵ ریال.

MY BOY FULL Cream
(قرمز)
لئودو وینتر ـ هلند

ترکیب: چربی ۱۷ درصد + پروتئین ۱۶/۵ درصد + لاکتوز ۲۴/۵ درصد + ساکارز ۲۶ درصد + دکسترین مالتوز ۹ درصد + مواد معدنی ۴ درصد + آب ۳ درصد، در هر ۱۰۰ گرم: ویتامین A ۲۲۰۰ واحد + ویتامین D_3 ۴۰۰ واحد + ویتامین B_1 ۰/۴ میلی‌گرم + ویتامین B_2 ۰/۹ میلی‌گرم + ویتامین B_6 ۰/۴ میلی‌گرم + ویتامین B_{12} ۲ میکروگرم + ویتامین C ۴۰ میلی‌گرم + ویتامین E ۸ میلی‌گرم + نیاسین ۶ میلی‌گرم + اسید پانتوتنیک ۳ میلی‌گرم + اسید فولیک ۵۰ میکروگرم + آهن ۷ میلی‌گرم + کلسیم ۶۵۰ میلی‌گرم + فسفر ۴۵۰ میلی‌گرم + سدیم ۲۵۰ میلی‌گرم + پتاسیم ۸۳۰ میلی‌گرم + کلر ۴۸۰ میلی‌گرم.

موارد استعمال: شیر پرچرب مخصوص ۶ ماهگی به بعد + ۴۵۷ کالری در ۱۰۰ گرم.

مقدار مصرف: با غلظت ۱۷ درصد تهیه و حداکثر تا ۱۰۰۰ میلی‌لیتر در روز به‌طفل میخورانند.

بسته‌بندی: پودر ۴۵۴ گرم.
بها: ۲۳۴ ریال.

MY BOY Half Cream
(سبز)
لئودووینتر ـ هلند

ترکیب: چربی ۱۰ درصد + پروتئین ۱۸ درصد + لاکتوز ۲۷ درصد + ساکارز ۲۹ درصد + دکسترین مالتوز ۹ درصد + مواد معدنی ۴ درصد + آب ۳ درصد + ویتامین A ۲۵۰۰ واحد + ویتامین D_3 ۴۰۰ واحد + ویتامین B_1 ۰/۴ میلی‌گرم + ویتامین B_2 ۰/۹۰ میلی‌گرم + ویتامین B_6 ۰/۴ میلی‌گرم + ویتامین B_{12} ۲ میکروگرم + ویتامین C ۴۰ میلی‌گرم + ویتامین E ۸ میلی‌گرم + نیاسین ۶ میلی‌گرم + اسیدپانتوتنیک ۳ میلی‌گرم + اسید‌فولیک ۵۰ میکروگرم + آهن ۷ میلی‌گرم + کلسیم ۶۷۰ میلی‌گرم + فسفر ۴۸۰ میلی‌گرم + سدیم ۲۷۰ میلی‌گرم + پتاسیم ۸۳۰ میلی‌گرم + کلرور ۵۰۰ میلی‌گرم.
موارد استعمال: شیر کم چرب تا ۶ ماهگی.
مقدار مصرف: با غلظت ۱۵ درصد با آب جوشیده تهیه و حداکثر تا ۱۰۰۰ میلی‌لیتر در روز به‌طفل میخورانند.
بسته‌بندی: پودر ۴۵۴ گرم.
بها: ۲۳۴ ریال.

NAN
نستله ـ سویس

ترکیب: چربی ۲۶ درصد + پروتئین ۱۲/۵ درصد (کازئین ۴/۸ درصد + لاکتالبومین ۷/۲ درصد + گلیسین ۰/۵ درصد) + لاکتوز ۵۶/۲ درصد + املاح معدنی ۲/۳ درصد + آب ۳ درصد + ویتامین A ۱۵۰۰ واحد + ویتامین D ۴۰۰ واحد + ویتامین C ۴۰ میلی‌گرم + ویتامین B_1 ۰/۲۵ میلی‌گرم + ویتامین B_2 ۰/۴ میلی‌گرم + ویتامین B_6 ۰/۲۵ میلی‌گرم + ویتامین B_{12} ۱ میکروگرم + ویتامین PP ۵ میلی‌گرم + پانتوتنات کلسیم ۵ میلی‌گرم + اسیدفولیک ۵۰ میکروگرم + ویتامین E ۵ میلی‌گرم + آهن ۶ میلی‌گرم + ۵۰۶ کالری در هر ۱۰۰ گرم.
موارد استعمال: تغذیه اطفال سالم، ضعیف و نارس، مکمل شیر مادر تا

پایان شیر خوارگی.

مقدار مصرف: با غلظت ۱۳ درصد با آب جوشیده تهیه میشود و بمقدار یک ششم کل وزن طفل حداکثر تا ۱۰۰۰ میلی‌لیتر در روز به طفل میخورانند.

بسته‌بندی: پودر ۴۵۴ گرم.

بها: ۲۰۹ ریال.

NEKTARMIL 1
مبلوبا ـ آلمان

ترکیب: کربوهیدرات ۶۶/۵ درصد + چربی ۱۳ درصد + پروتئین ۱۳ درصد + آب ۴/۵ درصد + مواد معدنی ۳ درصد + ویتامین A + ویتامین D_3 + ویتامین B_1 + ویتامین B_2 + نیکوتینامید + ویتامین B_6 + اسید فولیک + ویتامین B_{12} + ویتامین C + ویتامین E + کلسیم پانتوتنات + ۴۳۵ کالری در هر ۱۰۰ گرم.

مقدار مصرف: با غلظت ۱۷ درصد با آب جوشیده تهیه میشود.

بسته‌بندی: پودر ۴۰۰ گرم.

بها: ۲۰۹ ریال.

NEKTARMIL 2
میلوپا ـ آلمان

ترکیب: کربوهیدرات ۶۲ درصد + چربی ۱۵/۵ درصد + پروتئین ۱۵/۵ درصد + آب ۳ درصد + مواد معدنی ۴ درصد + ویتامین A + ویتامین D_3 + ویتامین B_1 + ویتامین B_2 + نیکوتینامید + ویتامین B_6 + اسید فولیک + ویتامین B_{12} + ویتامین C + ویتامین E + کلسیم پانتوتنات.

بسته‌بندی: پودر ۴۰۰ گرم.

بها: ۲۰۹ ریال.

NESTOGEN Full Cream
نستله ـ سویس

ترکیب: چربی ۲۱/۵ درصد + پروتئین ۱۹/۷ درصد + لاکتوز ۲۸/۱ درصد + دکسترین مالتوز ۸ درصد + سوکروز ۱۴/۵ درصد + املاح معدنی ۵/۲ درصد + آب ۳ درصد + ویتامین A ۱۵۰۰ واحد + ویتامین D ۴۰۰ واحد + ویتامین E ۵ میلی‌گرم + ویتامین B_1 ۰/۲۵ میلی‌گرم + ویتامین B_2

۰/۴ میلی‌گرم + ویتامین B_6 ۰/۲۵ میلی‌گرم + ویتامین B_{12} ۱ میکروگرم + ویتامین C ۴۰ میلی‌گرم + اسید فولیک ۵۰ میکروگرم + ویتامین PP ۵ میلی‌گرم + پانتوتنات کلسیم ۵ میلی‌گرم + آهن ۶ میلی‌گرم + آهن آلی ۴/۴ میلی‌گرم + ۴۷۵ کالری در هر ۱۰۰ گرم.

موارد استعمال: بعنوان شیر پرچرب از شش ماهگی به بعد، اطفال حساس به شیرهای اسیدی.

مقدار مصرف: با غلظت ۵ تا ۱۸ درصد تهیه میشود و حداکثر تا ۱۰۵۰ میلی‌لیتر در شبانه روز مصرف می‌گردد.

بسته بندی: پودر در قوطی سبز رنگ ۴۵۴ گرم.

بها: ۲۰۹ ریال.

NESTOGNEN Half Skimmed
نستله-سویس

ترکیب: چربی ۱۲ درصد + پروتئین ۲۰/۳ درصد + لاکتوز ۲۹ درصد + دکسترین مالتوز ۱۴/۹ درصد + سوکروز ۱۴/۹ درصد + املاح معدنی ۵/۴ درصد + آب ۳/۵ درصد + ویتامین A ۱۵۰۰ واحد + ویتامین D ۴۰۰ واحد + ویتامین E ۵ میلی‌گرم + ویتامین B_1 ۰/۲۵ میلی‌گرم + ویتامین B_2 ۰/۴ میلی‌گرم + ویتامین B_6 ۰/۲۵ میلی‌گرم + ویتامین B_{12} ۱ میکروگرم + ویتامین C ۴۰ میلی‌گرم + اسید فولیک ۵۰ میکروگرم + ویتامین PP ۵ میلی‌گرم + پانتوتنات کلسیم ۵ میلی‌گرم + آهن ۶ میلی‌گرم + آهن آلی ۴/۴ میلی‌گرم + ۴۲۴ کالری در هر ۱۰۰ گرم.

موارد استعمال: تغذیه اطفال سالم، نارس و ضعیف تا ۶ ماهگی، شیرخوارانی که سایر شیرها را تحمل نمیکنند.

مقدار مصرف: با غلظت ۱۳ تا ۱۵ درصد با آب جوشیده تهیه میشود و بمقدار حداکثر ۱۰۰۰ میلی‌لیتر در روز به کودک میخورانند.

بسته بندی: پودر در قوطی زرد رنگ ۴۵۴ گرم.

بها: ۲۰۰ ریال.

NUTRICIA
نوتریسیا - هلند

ترکیب: لاکتوز ۷/۱ درصد، دکسترین مالتوز ۲۷ درصد + سوکروز ۲۷ درصد + چربی گیاهی ۲۱/۵ درصد + اسید لینولئیک ۸/۸ گرم + پروتئین ۱۳/۴ درصد + آب ۲/۵ درصد + مواد معدنی ۱/۵ درصد + ویتامین های مختلف + ۴۰۰ کیلو کالری در هر ۱۰۰ گرم پودر.

بسته بندی: ۴۵۰ گرم.

بها: ۲۲۴ ریال.

PELARGON
نستله - سویس

ترکیب: چربی ۱۷ درصد + پروتئین ۱۶/۵ درصد + لاکتوز ۲۱/۸ درصد + دکسترین مالتوز ۱۲/۸ درصد + سوکروز ۱۲/۸ درصد + نشاسته ۹/۵ درصد + اسید لاکتیک ۱/۷ درصد + املاح معدنی ۴/۴ درصد + آب ۳/۵ درصد + ویتامین های A ۱۵۰۰ واحد + D ۴۰۰ واحد + E ۵ میلی گرم + B_1 ۰/۲۵ میلی گرم + B_2 ۰/۴ میلی گرم + B_6 ۰/۲۵ میلی گرم + B_{12} ۱ میکروگرم + C ۴۰ میلی-گرم + اسید فولیک ۵۰ میکروگرم + PP ۵ میلی گرم + پانتوتنات کلسیم ۵ میلی گرم + آهن ۶ میلی گرم + آهن آلی ۳/۹ میلی گرم + ۴۵۳ کالری در هر ۱۰۰ گرم.

موارد استعمال: تغذیه اطفال، اختلالات گوارشی اطفال معمولی و اطفال ضعیف.

مقدار مصرف: با غلظت ۱۵ درصد که بتدریج تا ۲۱ درصد افزایش مییابد با آب جوشیده تهیه میشود و حداکثر تا ۱۰۰۰ میلی لیتر در روز به کودک میخورانند.

بسته بندی: پودر ۴۵۴ گرم.

بها: ۱۹۷ ریال.

PRODIETON
نستله - سویس

ترکیب: چربی ۹/۵ درصد + پروتئین ۱۸ درصد + لاکتوز ۲۳/۲ درصد + سوکروز ۱۹ درصد + دکسترین مالتوز ۱۹ درصد + اسید-لاکتیک ۲/۵ درصد + املاح معدنی ۴/۸ درصد + آب ۴ درصد + ۱۱ نوع ویتامین مختلف + آهن آلی ۵/۱ میلی گرم + ۴۱۱

کالری در هر ۱۰۰ گرم.

موارد استعمال: شروع تغذیه نوزادان، مواردیکه احتیاج به‌شیر اسیدی نیم‌چرب باشد، کودکان نارس، مکمل شیرمادران.

مقدار مصرف: با غلظت ۱۰ تا حداکثر ۱۷ درصد با آب جوشیده تهیه میشود و به‌مقدار یک‌ششم وزن کودک حداکثر تا ۱۰۰۰ میلی‌لیتر در روز به‌طفل میخورانند.

بسته‌بندی: پودر ۵۰۰ گرم.

بها: ۱۳۷ ریال.

SEPARATED MILK FOOD
کواندگیت - انگلستان

ترکیب: در هر ۱۰۰ گرم: چربی ۰/۸ گرم + پروتئین ۳۵/۵ گرم + لاکتوز ۵۲/۸ گرم + املاح معدنی ۷/۹ گرم + آب ۳ گرم + کلسیم ۱/۰۴ گرم + فسفر ۰/۷۹ گرم + ۳۴۷ کالری در هر ۱۰۰ گرم.

موارد استعمال: تغذیه نوزادان سالم و ضعیف از ۴ ماهگی به بعد اختلالات معدی، روده‌ای، اسهالهای تابستانی.

مقدار مصرف: یک تا چند پیمانه در آب نسبتا گرم حل کرده و بصورت خوراک بالنسبه سفت به‌طفل میخورانند.

بسته‌بندی: پودر ۳۴۰ گرم.

بها: ۲۳۵ ریال.

SIMILAC
ابوت - آمریکا

ترکیب: کربوهیدرات ۵۵/۷ درصد + چربی ۲۷/۴ درصد + پروتئین ۱۱/۸ درصد + آب ۲ درصد + مواد معدنی ۳/۱ درصد + ویتامین های A + D و E و C و B_1 و B_2 + B_6 + اسید پانتوتنیک + اسید فولیک + ویتامین B_{12} + ۵۱۱ کالری در هر ۱۰۰ گرم.

موارد استعمال: نوزادان نارس، نوزادان سالم از ماه چهارم به‌بعد.

مقدار مصرف: برحسب سن طفل متفاوت است.

بسته‌بندی: پودر در قوطی سبز رنگ ۴۵۳ گرم.

بها: ۱۸۳ ریال.

SIMILAC Iron
ابوت-آمریکا

ترکیب: چربی ۲۷/۶ درصد + پروتئین ۱۱/۸ درصد + کربوهیدرات ۵۴/۸ درصد + ۹ اسید آمینه + ویتامین های سیمیلاک ساده + ۱۴۵ کالری در هر اونس پودر.

موارد استعمال: تغذیه اطفال سالم و ضعیف و نارس، مکمل شیر مادر از ابتدای تولد تا پایان شیرخوارگی.

مقدار مصرف: برحسب سن کودک متفاوت و از فرمول کلی پیروی میشود.

بسته بندی: پودر در قوطی طلائی رنگ ۴۵۳ گرم.

بها: ۱۸۳ ریال.

S. M. A
وایت-آمریکا

ترکیب: کربوهیدرات ۵۶ درصد + چربی ۲۸ درصد + پروتئین ۱۲ درصد + مواد معدنی ۲ درصد. در هر لیتر: ویتامین A ۲۶۵۰ واحد + ویتامین D ۴۲۰ واحد + ویتامین E ۶/۳ واحد + ویتامین B_1 ۰/۷۱ واحد + ویتامین B_2 ۱/۰۶ واحد + ویتامین C ۵۲ میلی گرم + ویتامین B_6 ۰/۴۲ میلی گرم + ویتامین B_{12} ۱/۰۶ میکروگرم + نیاسینامید ۵/۲۸ میلی گرم + کلسیم ۵۶۰ میلی گرم + فسفر ۴۴۴ میلی گرم + آهن ۱۲/۶ میلی گرم.

موارد استعمال: اطفال سالم، نوزادان نارس تا پایان دوره شیرخوارگی.

مقدار مصرف: یک پیمانه در ۳۰ میلی لیتر آب حل کرده به طفل میخورانند.

بسته بندی: پودر ۴۵۳ گرم.

بها: ۱۶۹ ریال.

VIT - A - RINA
لئودووینتر (مای بوی)-هلند

ترکیب: چربی ۸/۵ درصد + پروتئین ۱۴/۵ درصد + املاح معدنی ۶/۸ درصد + آب ۳ درصد + دکستروز ۷/۵ درصد + لاکتوز ۲۹/۲ درصد + ساکارز ۱۵/۲۶ درصد + نشاسته ۱۵/۲۴ درصد + ویتامین A ۱۲۵۰ واحد + ویتامین D_3 ۴۰۰ واحد + ویتامین B_1 ۰/۶ میلی گرم + ویتامین B_2 ۱ میلی گرم + ویتامین C ۲۵ میلی گرم + نیاسین ۷ میلی گرم + کلسیم ۸۰۰ میلی گرم +

آهن ۵ میلی‌گرم + ۴۰۳ کالری در هر ۱۰۰ گرم.

موارد استعمال: تغذیه کودکان سالم و ضعیف از ۳ ماهگی به بعد، خردسالان، ورزشکاران، پیران.

مقدار مصرف: با ۲ پیمانه در ۸۰ میلی‌لیتر آب در ۳ ماهگی آغاز میشود و بتدریج افزایش مییابد.

بسته بندی: پودر ۴۵۴ گرم.

بها: ۱۷۳ ریال.

28 DEC 1976

Call No. ____________ Date ____________

Acc. No. ____________

CENTRAL LIBRARY
THE UNIVERSITY OF KASHMIR

This book should be returned on or before the last date stamped above. An over-due charge of 10 Paise will be levied for each day, if the book is kept beyond that date.

فهرست درمانی داروها برحسب نام تجارتی

در این فهرست داروها با نام تجارتی برحسب خواص درمانی‌شان طبقه‌بندی شده‌اند . سه حرف سمت چپ هر دارو نشانه کد نام کارخانه سازنده داروست (برای شرح این کدها به علامت اختصاری نام کارخانه‌ها در صفحه ۳۴ مراجعه کنید) .

ANATOMICAL CLASSIFICATION

A ALIMENTARY TRACT AND METABOLISM

A1 STOMATOLOGICALS, MOUTH PREPARATIONS, MEDICINAL DENTIFRICES ETC.

A1A STOMATOLOGICALS

RIA	ABSEDENT	BTY	DENTOVAX
BOO	AMC	MYC	D.G.
ASR	ASCOXAL	MYC	D.G. POWDER
ASR	ASCOXAL–N	FRA	LYSO 6
MRN	BUCASEPTOL	OTT	ONE DROPS ONLY
AVI	DENTIFECTE	BER	PYRALVEX
VIR	DENTIGAR	SIG	TEEJEL

A2 ANTACIDS, ANTI-FLATULENTS AND ANTI-PEPTIC ULCERANTS

A2A ANTACIDS-ANTIFLATULANTS

A2A1 PLAIN ANTACIDS

D.P.	ALMACARB	PFZ	KOMPENSAN
	ALMAX	K.U.	KUDROX
WYE	ALUDROX	ROE	MAALOX
WYE	AMPHOJEL	MCS	MAGNEX
VIR	AL-SIGEL	ALR	NORMACIDIN
AVI	ANDOSALT	SPR	NOVISMUTH
CGA	ANTEPSIN	WIN	PEPSAMAR
DAN	BISMUTH MUCILAGE	WIN	PHILLIPS Milk of Magnesia
PRA	BISMUTH PHARMACHEN	BIT	PHOSPHALUGEL
BOI	BISMUTH TULASNE	RAB	RABRO
B.M.	DORITAL	NIC	RENNIE
BEA	GASTROPULGITE	A.H.	RIOPAN
W.L.	GELUSIL	A.A.	SALVITAE
BOO	GRIPE MIXTURE	HEU	SOLUGASTRIL
		B.D.	TRISIBAN

A 2A2 PLAIN ANTIFLATULANTS

ERC	AEROPAX

A 2A3 ANTACIDS + ANTISPASMODICS

WAL	ACTONORM
DLC	APP
AVI	BISMUPAN
VIR	GASTRALGIN
UCB	LIBRATAR

A 2A4 ANTACIDS + ANTIFLATULANTS

MID	BISMUTH GEL
SHC	DIGEL
IDI	GASTRYL
TOL	MAGEL
P.D.	MYLANTA
MID	POLYSILANE GEL
MID	POLYSILANE REGLISSE
WYE	SIMECO

A 2A5 A–ACID + A – FLAT + A – SPASM

WAL	ACTONORM-SED

A 2A6 ANTACIDS + OTHER DRUGS

WYE	OXAINE M

A 2B ANTIPEPTIC ULCERANTS

LAT	ACIDRINE
THX	AMINOSERYL
THX	OXYFERRISCORBONE SODIQUE
THX	OXYFERRISCORBONE SODIQUE ATROPINE
ROT	ROTER
SOL	SOLCOSERYL
SKF	TAGAMET

A3 GASTROINTESTINAL ANTI-SPASMODICS AND ANTI–CHOLINERGICS

A3A SYNTHETIC G.I. ANTISPASMODIC

CIB	ANTRENYL
CIB	ANTRENYL DUPLEX
AST	AVAFORTAN
B.I.	BUSCOPAN
LAK	CANTIL
LAK	DACTIL – OB
TOL	DILOMINE
ERC	ERCORIL
DEL	KHELLINE
UPS	LUOSTYL
END	MESOPIN
SEA	PRO BANTHINE
SEN	PROBANTHINE PA
LAK	PIPTAL
RBS	ROBINUL
ABT	TRAL

A 3B BELLADONNA & DERIVATIVES

OPO	ANTAL	A.H.	ATROPINE

A3 C G.I. ATARACTIC COMBINATIONS

LEP	DYSTAZINE	SKF	STELABID FORTE
ROC	LIBRAX	AST	TRANQUO ADAMON
SEA	PRO BANTHINE DART	B.I.	TRANQUO BUSCOPAN
SKF	STELABID		

A 3D GI ANALGESIC COMBINATIONS

IDI	ANALGEC	MCK	EUPACO
HOE	BARALGIN	ABD	FILLINE
SDZ	BELLADENAL	K.U.	LEVSIN P.B.
SDZ	BELLADENAL RETARD	END	MESOPIN P.B.
SDZ	BELLERGAL – Retard	LAK	PIPTAL
B.I.	BUSCOPAN COMPOS	RBS	ROBINUL
TOL	DILOMOINE P.B.	SIE	SPASLAR
AST	DOLO ADAMON	CIB	SPASMO CIBALGINE
RBS	DONNATAL	CIB	SPASMO CIBALGINE Comp.
RBS	DONNATAL EXTEN TAB	BAY	SPASMO DOLVIRAN

A4 ANTI-EMETICS AND ANTI-NAUSEANTS

A 4A ANTIEMETICS–ANT INAUSEANTS

M.B.	AVOMINE	ORM	PANCORTIN B6
SEA	DRAMAMINE		PANCORTIN PEDIATRIC
ROE	EMETROL	LEP	PLASIL
CHM	FOR TRAVEL	DGR	PRIMPERAN
LUI	MONOTREANE	SDZ	TORECAN
		THX	VOGALENE
		MYC	VOMYCINE

A5 CHOLAGOGUES AND HEPATIC PROTECTORS

A 5A CHOLAGOGUES-CHOLERETICS

EJI	BILICANTE	ASUP	HEPAX
HOU	BOLDINE	DEL	ICTERYL
B.I.	CHOLIPIN	UPS	NORMOGASTRYL
COP	COLEPAR	MYC	ODDIBIL
MIL	DECHOPHYLLINE Phenobarbital	AVI	REINOCHOLINE
		EVA	SORBAX
MIL	DECOPHYLLINE	DEL	SORBEX
THX	DYCHOLIUM		SORBITOL
			SORBOSAN
		LAT	SULFARLEM
		LAT	SULFARLEM CHOLINE
		MRN	VITASSEL

A 5B HEPATIC PROCT. LIPOTROPICS

ROA	COPHYTOL	L.B.	HEPAREXINE
LED	DELPHICOL	CHO	HEPATIQUE
FIT	.EPARGRISEOVIT	ROC	LITRISON
HEP	FOIE LYOPHILISE	ABD	METHOVIT
WAN	FOSEPAR	LEP	PHYSIO HEPATOL
P.D.	HEPA-DESICOL		

A 5C CHOLAGOG, LIPOTROPIC, COMBS.

ALR	BOURGET-INOSITOL	VIR	CITRO–SEL
ALR	BOURGET-INOSITOL Tab.		

A 6A LAXATIVES

A 6A1 LAXATIVE SOFTENERS

BOO	CREMAFFIN

A 6A2 LAXATIVE IRRITANTS

ROL	COMBEY LAX	MCS	LAXMEL
B.I.	DULCOLAX	MIN.	METHALAX
GOL	GOLAGARINE	MRN	PARAGARINE
SAN	HERBESAN	PUR	XPREP

A 6A3 LAXATIVE BULK PRODUCERS

MCS	ALBAGAR	BOO	FIGINE
CHR	BOLDOLAXINE	CHA	MUCINUM

A 6A4 LAXATIVE ENEMAS

LAB	MICROLAX

A 6A5 LAXATIVE SALINE PREPS.

WIN	ANDREWS	ABD	LIMOCITRIC Powder
PHR	LIMOLAX		

A 6A6 LAXATIVES, OTHERS + COMBS

SHG	KANDRMAL

A 7 ANTI-DIARRHOEALS AND INTESTINAL DISINFECTANTS

A 7A INTESTINAL ANTI–INFLCTIVE

A 7A1 A. DIARR. ANTI-INFECT PLAIN

DUM	COLIMEX	P.D.	HUMATIN
DEL	DIREXIODE	SDZ	INTESTOPAN
MAX	ENTROCOLI MAX	BEA	INTETRIX
CIB	ENTERO VIOFORM	GLX	NEOMIN
EAT	FUROXONE	GGY	SIOSTERAN
FIT	GABRORAL	SAP	SULFASALAZINE

A 7A2 A- DIARR ANTI-INFECT COMBS

CIB	CARBANTRENE	CIB	MEXAFORME
DUM	COLISTOP	BAY	OLETRON
MIN	CREMO S P K	ABD	PARAZOLINE
ROG	DIACOL	ABD	PAREGUAN
VIR	DIAREX	TOL	PEKA N
MYC	FURABEN	TOL	PEKA N P
MIN	FURAN	TOL	PULGIT N
BRI	KANTREXIL	RAM	RAMOSUCCIN
MYC	KAOLENE STREPTO	MIN	S P K
UPJ	KAOMYCIN	WYE	STREPTOMAGAMA
		TOL	SULFARILLA

A 7B INTESTINAL ADSORBENTS

BEA	ACTAPULGITE	UPJ	KAOPECTATE
RBS	DUNNAGEL	IDI	KAPECT
RBS	DONNAGEL PG	IDI	KAPECT P
MYC	KAOLEINE	MCK	ULTRA CARBONE

A 7C ANTIDIARPHOEALS, OTHERS

LYO	ANTIBIOPHILUS	TOL	PEKA
GOL	BISMOGOL	R.B.	SYNERLAC
JAC	GELOPECTOSE	BCX	ULTRA LEVURE
SEA	LOMOTIL		

A8 ANTI-OBESITY PREPARATIONS EXCLUDING DIETICS

A 8A3 OTHER CNS PREPS, PLAIN

SRV PONDERAL

A 8A5 ANTIOBESITY PREPS OTHERS

KLF FUCA EXCELLENT

A9 DIGESTIVES, INCLUDING DIGESTIVE ENZYMES

A 9A DIGESTIVES INC. ENZYMES

CHO	ALPHACHYMOTRIPSINE (CHO)	HOE	FESTAVITAL
UPJ	CARIPEPTIC	C.P.	GLUCITOL
LUI	COMBIZYM	CIB	MEXASE
SIE	DAMMAGAL	MCK	NUTRIZYME
DLC	DEANASE	WIN	ONDTON
DLC	DEANASE DC	ONO	ONOPROSE
RBS	DONNAZYME	THX	PANCREFLASH
RBS	ENTOCIMA	NOR	PANZYNORM
RBS	ENTOZYME	WAN	SPASMO CANULAS
LYO	ENZYLAC	P.D.	TAKA DIASTASE
THE	ENZYMOFLASH	B.M.	TRYZYMAL
NOR	ENZYNORM	P.D.	ZYMET
HOE	FESTAL		

A10 ANTI-DIABETIC THERAPY

A 10A INSULINES AND OTHER PARENTERALS

BER	INSULIN	BER	INSULIN PROTAMINE ZINC BERNA
ORG	INSULIN		
ORG	INSULIN PROTAMINE ZINC		

A 10B ORAL ANTIDIABETICS

HOE	DAONIL	ARO	GLUCOPHAGE
PFZ	DIABINESE	HOE	RASTINON
SRV	DIAMICRON	GRT	SILUBIN
LLY	DIAMELOR	UPJ	TOLINAS
B.M.	EUGLUCON		

A11 VITAMINS

A 11A MULTIVITAMINS + MINERALS

A11A1 M. VIT. + MIN. PRENATAL

LED	FILIBON	PFZ	OBRON
BYK	MULTISANOSTOL	LED	PRENATAL
P.D.	NATABEC		

A11A2 M. VIT. + MIN. PAEDIATRIC

BYK	MULTI SANOSTOL	MIN	SOLVIT

A 11A3 AVIT. + MIN. GERIATRIC

PHT	GERIATRIC	LED	GEVRINE
LED	GEVRAL	SHG	PRIMOGERON

A 11A4 M. VIT. + MIN OTHERS

MCS	BEXEL	UPJ	UNICAP T.
MCK	OMNIBIONTA	PFZ	VITERRA
ROC	SUPRADYD		

A 11B MULTIVIT WITHOUT MINERALS

A 11B2 M. VIT. W/O MIN. PAEDIATRIC

P.D	ABDEC	ABT	VIDAYLIN
P.D.	PALADAC	ABT	VI DAYLIN With Iron
MIN	SOLVIT	END	VI FORT

A 11B3 M. VIT. W/O MIN., GERIATRIC

MCK	GEROBION	MCK	SCLEROBION
MCK	HORMOGEROBION		

A 11B4 M. VIT. W/O MIN. OTHERS

FRR	A B C D	FRR	MULTI TABS
WAL	CONCAVIT	BRY	MULTIVITAMINE
DAG	DAGRAVIT TOTAL 8	IDI	NUTRIPLEX
A.H.	KAPSOVIT	TOL	TOLIVIT
FIT	KATABIOS	UPJ	UNICAP
MCK	MULITBIONTA Cap.	END	VIFORT
MCK	MULTIBIONTA eff.	D.P.	VITATEN
ABD	MULTINE		

A 11C VIT A & D INC. COMBS.

A 11C1 VITAMIN A PLAIN

ROC	AROVIT	MCK	NEO VOGAN
WAN	A. VIT	ROC	ROVIGON
DUP	DUPHASOL A	A.H.	VITAMIN A

A 11C2 VITAMIN D PLAIN

DUP	DUPHASOL	MCK	VIGANTOL
COD	SEVEN SEAS		

A 11C3 VITAMIN A & D COMBS (Continued on next page)

A 11C3 VITAMIN A & D COMBS

GLX	ADEXOLINE
DUP	DUPHASOL AD
A.H.	HALIBORANGE
FRR	IDO-CAMIN
LED	VIDELTA
A.H.	VITAMIN AD
POS	VITAMIN A D

A 11D VIT B1 & COMBS. B1. B6. B12

A 11D1 VIT. B1. PLAN OR WITH B6, B12

TAN	BESTON
DOP	B 300
TAN	BITREN
DOL	BUDODOUZE
GLX	CYTAMEN B1
MCK	NEUROBION
LAB	PRINCI B
BOU	SOPALAMIN 3B
LEP	THIOBANZYME
CON	TIAFA
CON	VIONEURIN
GLX	VIONEURIN 6
	VITAMINE B1

A 11D2 VIT. B1, B6, B12 + OTHERS

POO	B–COLEX
MCK	DOLO NEUROBION
ANK	M!LGAMMA

A 11E VITAMIN B COMPLEX

A 11E1 VITAMIN B COMPLEX PLAIN

POO	B COLEX B12
A.H.	B COMPLEX
MRN	BECOMARINE
ROC	BECOZYME
ABT	BEJECTAL C
ORG	BENUTREX
ORG	BENUTREX B12
FRR	BEVIPLEX
DAG	DAGRAVIT B COMPLEX
DUP	DUPHASOL B PLEX
MSD	HYPOBETA
LEP	PANBETIN
BAY	POLIVITAMIN
MCK	POLYBION
A.H.	PROBERON
HAU	SUPER LEVURE
SQB	VIPLEX
TOL	VITABEX
A.H.	VITAMIN B COMPLEX

A 11E2 VITAMIN B COMPLEX + VIT C.

ORG	BENUTREX C
PFZ	ROERIBEC

A 11E3 VITAMIN B COMPLEX, OTHERS

ORG	BENUTREX Oral
LED	LEDERPLEX
A.H.	PROBERON

A 11F VITAMIN B12 PLAIN

GLX	CYTAMEN
GLX	CYTATON
GLX	NEO CYTAMEN
A.H.	VITAMINE B12
A.H.	VITAMINE B12

A 11G VIT C. INC. MINERAL COMBS.

A 11G1 VITAMIN C PLAIN

TOL	ASCORVIT
MCK	CEBION
ABD	CECIL
MIN	C.M.
LEP	C–TAB
D.P.	IRACEVIT
LEP	NEW C TAB
RUZ	ORANGIN
ROC	REDOXON
EVA	VITA C EVA FORTE

A 11H OTHER PLAIN VITAMINS

A11 H1 NICOTINIC ACID

L.B.	NICOBION

A11 H2 VITAMIN B6

ROC	BENADON
SPE	BECILAN
EJI	EJISIX
A.H.	VITAMINE B6

A 11H3 OTHER PLAIN VITAMINS

ROC	BEPANTHENE
ROC	EPHYNAL
MCK	EVION

A 11J ALL OTHER VITAMINS

UCB	FOLACID

A12 MINERAL SUPPLEMENTS

A 12A CALCIUM

D.P.	CALCIGRAN
MRN	CALCIMARIN
GLX	CALCI OSTELIN
GLX	CALCI OSTELIN B12 Syrup
GLX	CALCI OSTELIN B12 Amp.
CHO	CALCIPARINE Amp.
LEO	CALCIPEN
COR	CALCIUM
SDZ	CALCIUM C
BAX	CALCIUM LEVULINATE
SDZ	CALCIUM SANDOZ Forte
A.H.	CALCYDIC
MCK	CEBION CALCIUM
THE	FRUBIOSES CALCIQUE
HEP	NICICALCIUM
GLX	OSTOCALCIUM

A 12B POTASSIUM

ASR	KALIUM DURULES	DGR	POTASSIUM

A13 TONICS

A 13A TONICS

HEP	ACTIVAROL	VIR	NEO FORTAMIN
MIN	ALERTONIC	DLC	NEO HEPACON
BAY	BAYER'S TONIC	EBE	NEURO GLUTAMIN
ICA	BIOCOSTENE	MCK	OPOTONIQUE
BMT	BIOMALT CALCIUM	SHG	PERNEXIN
IRA	CALORIT	SIE	PHOSELLITE B
ABD	GLYCEROVIT	RAM	PHOSVIQUIN
ROU	HEMOSTYL	SAE	SARGENOR
FRR	IDO-TONICUM	LUI	TONATONE
DAG	LIPOLIT	D.P.	VINOPHOS
P.D.	METATONE	A.H.	VI-NUPHOS
GLX	MINADEX	SRV	VITA THION

A14 ANABOLICS, SYSTEMIC

A 14A ANABOLIC HORMONES

A 14A1 ANABOLIC HORMONES PLAIN

ORG	DECA DURABOLIN	ORG	ORGABOLIN
CIB	DIANABOL	SHG	PRIMOBOLAN
ORG	DURABOLIN	FIT	STERANABOL
FIT	ORANABOL	THR	TROPHOBOLENE
		WIN	WINSTROL

A 14A2 ANABOLIC VITAMIN COMBS

CIB	DIANAVIT

A 14A3 OTHER ANABOLIC COMBS

ORG	DOCABOLIN

A15 APPETITE STIMULANTS

A 15A APPETITE STIMULANTS

K.U	URBAMIN

B BLOOD AND BLOOD FORMING ORGANS

B1 ANTI-COAGULANTS

B 1A ANTICOAGULANTS

B 1A1 ANTICOAGULANTS, ORAL

END	COUMADIN	GGY	TROMEXAN
GGY	SINTROM		

B 1A2 ANTICOAGULANTS INJECTABLE

CHO	HEPARINE

B2 ANTI-HAEMMORRHAGIES

B 2A ANTI-FIBRINOLYTICS

CHO	CAPRAMOL	DAI	TRANSAMIN
VIR	HEMOSTATIN		

B 2B VITAMIN K AND OTHERS

TAN	ADONA	ROC	KONAKION
FRA	CEPEVIT K	AYE	PREMARIN
LUI	CLAUDENE	ORG	STYPTANON
CIB	COAGULENE	MCK	STYPTOBION
OM	DICYNONE	ROC	SYNKAVIT
VIR	HEMORAGIN ERGOT		

B3 ANTI-ANAEMIC PREPARATIONS

B 3A HAEMATINICS, IRON & COMBS.

B 3A1 IRON, PLAIN

SKF	FEOSPAN	FIS	IMFERON
MJ	FER IN SOL IRON	ASR	JECTOFER
MAX	FERRO MAX	WHI	MOL IRON
SDZ	FERRONICUM	P.D.	SYBRON
GLX	FERSOLIN		

B 3A2 IRON COMBINATIONS

LED	AUTRIN		
END	ENDO GLOBIN		
SKF	FEFOL	ABD	HEMOVITE
HAM	FERRUM SR	PFZ	HEPTUNA PLUS
SKF	FESOVIT	LAK	IRCON OB
ABD	FOLICOFER	MRN	LIVER TONIC

(B 3A2 IRON COMBINATIONS Continued)

ORT	RARICAL	LLY	TRINSICON
SQB	RUBRATON B		

B 3B LIVER & COMBS WITH B12

ICA	EPATO C	DLC	HEPACON PLEX
JRF	GASTR Hema	MYC	HEPAMIN
LYO	GASTROPYLORE	ROL	HEPATROL
R.B.	GLOBISINE	A.H.	HEPOL B12
DLC	HEPACON 100	MRT	PANGADVINE
DLC	HEPACON 1000		
DLC	HEPACON B FORT	FIT	VENEMA

B 3C OTHER HAEMATINICS

COP	ANTIANEMA	SRV	VITATHION (A.T.P.)

B4 CHOLESTEROL REDUCERS AND ANTI-ATHEROMA PREPARATIONS

B 4A CHOLESTEROL REDUCERS AND ANTI-ATHEROMA PREPARATIONS

BAN	ANGININ	IDI	VASOLEX
ICI	ATROMID S		

B 5A1 PLASMA SUBSTITUTE-DEXTRAN

BAX	DEXTROSE IN SODIUM CHLORIDE	HDE	HEMACCEL
		BAX	VACOTRAN

B5 PLASMA SUBSTITUTES AND PERFUSION SOLUTIONS

B 5B I.V. SOLUTIONS OVER 50 ML.

BAX	ALCOHOL DEXTROSE IN WATER	BAX	DEXTROSE SALINE
		BAX	DEXTROSE WATER
BAX	DEXTROSE 1/3 – 2/3	A.H.	ST. DEXTROSE WATER
BAX	DEXTROSE IN W VIT.	BAX	TRANSFUSO-VAC

B5B2 ELECTEROLYTES

BAX	DARROW'S SOLUTION	IDI	NORMOLIT
BAX	LACTATED RINGER'S (HARTMAN'S)	A.H.	ST. DARROW

B 5B3 NORMAL SALINE

BAX	RINGER	A.H.	ST. RINGER
BAX	SODIUM CHLORIDE Inj.	A.H.	ST. SOD. CHLOR.
A.H.	ST. NORMAL SALINE	A.H.	ST. SOD. CHLOR. DEX

B 5B4 OTHER I.V. SOLUTIONS

PFR	AMINOFUSION L

B 6A OTHER HAEMATOLOGICALS

B 6A1 OTHER HAEMATOLOG; SYSTEMIC

SER	CHYMOSER BALSAMIQUE

B6 OTHER HAEMATOLOGICAL AGENTS, INCLUDING FIBRINOLYTICS AND HYALURONIDASE

B 6A2 OTHER HAEMATOLOG, TOPICAL

CHO	ALPHACHYMOTRIPSINE	P.D.	ELASE CHLOROMYCET
P.D.	ELASE		

C. CARDIOVASCULAR SYSTEM

C1 CARDIAC THERAPY

C 1A CARDIAC GLYCOSIDES & COMB

C 1A1 CARDIAC GLYCOSIDES, PLAIN

SDZ	CEIDIGOXIN	NLL	OUABAINE ARNAUD
SDZ	CEDILANIDE	NLL	NATIDIGOXINE
MCK	DIGIMERCK	NLL	NATISEDINE
SDZ	DIGOXINE	KNO	TALUSIN
WEL	LANOXIN DIGOXIN		

C 1B ANTIARRHYTHMICS

SAE	CARDIOQUINE	NLL	LONGACOR
HOU	HYDROQUINIDINE	SQB	PRONESTYL
WIN	ISUPREL	ROU	SEDO RYTHMODAN
ASR	KINIDIN DURULES		

C 1C CARDIAC & RESPIRATORY STM

END	AMINOPHYLLINE	MIL	INOPHYLLINE
D.P.	ANACARDONE	MIL	INOPHYLLINE PAP AV.
CIB	CORAMINE	MIL	INOPHYLLINE SED
B.I.	EFFORTIL	VIR.	NICOREX
DEL	ETAPHYLLINE Phenobarbital	MIN	NIKETHON
DEL	ETAPHYLLINE	P I.	SYMPATOCARD
	Phenobarbital Papaverine	D.I.	SYMPATOL
HOR	HOURAMID	WYE	WYAMINE

C 1D MYOCARDIAL THERAPY

C 1D1 CORONARY VASODILATORS

BAY	ADALAT	B.I.	PERSANTIN
ICI	ERALDIN	B.I.	PERSUMBRAX
HOM	ILDAMEN	HOM	SEDA ILDAMEN
KND	ISOPTIN	B.I.	SEDA PERSANTIN
KND	ISOPTIN S	HOE	SEGONTIN
ARO	IRRIGOR	LNZ	USTIMON
MEV	LENTRAT		

C 1D3 OTHER MYOCARDIAL AGENTS

BAN	ANGININ	GPL	NITROL INGUAL
DLC	CARDIACAP	UET	NITRONG
AYE	ISORDIL	SIE	SIEGODIN
NAP	NITROCONTIN	CHM	SPASMOCOR R
DTX	NITROGLYCERINE	R.B.	TRINITRINE
K.U.	NITROL	LNZ	USTIMON COMP
HOU	NITROLENT		

C 1E OTHER CARDIAC PREPS.

ABD	AMINOPHYLLINE	HOE	NEUTRAPHYLLINE Phenobarbital
DEL	HEPT A MYL	HOE	NEUTRAPHYLLINE Papaverine Phenobarbital
HOU	NEUTRAPHYLLINE		

C2 HYPOTENSIVES

C 2A RAUWOLFIA & DERIVATIVES

CIB	ADELPHAN	CIB	SERPASIL
B.I.	LAMORAN		

C 2B SYNTHETIC HYPOTENSIVES

MSD	ALDOMET	ERC	HYPERPAX
B.I.	CATAPRES	CIB	ISMELINE
DUM	DOPAMET		

C 2C HYPOTENSIVES + DIURETICS

C 2C1 RAUWOLFIA + DIURETIC COMB

CIB	ADELPHAN ESIDREX	B.M.	ISO TRIRAUPIN
ROU	BARONORME	B.M.	MODENOL
BAY	BENDIGON	SQB	RAUTRAX
SDZ	BRINERDIN	SIB	SERPASIL ESIDREX
GGY	HYGROTON	HDE	TERBOLAN

C 5A2 A. HAEMORRHOID W/O CORTIC

LUI	CLAUDEMOR	MCS	POSITOS
HAD	HADENSA	BER	RODANEX
SEC	HEMORROIDINE	PAR	SEDACO
MID	POMMADE MIDY		

C 5B TOP. ANTIVARICOSE PREPS

LUI	HIRUDOID	BAY	LASONIL

C 5C SYSTEMIC VASOPROTECTIVES

SRV	DAFLON	THX	RUTASCOL
CHI	DIFRAREL 100	SDZ	SANDOVENE F
CHI	DIFRAREL E	DAU	SOLURUTINE Papaverine
OM	DOXIUM	ZYM	VAREMOID
CIB	GLYVENOL	ZYM	VENORUTON P4
MDS	REPARIL		

C6 OTHER CARDIAC AND CIRCULATORY PRODUCTS

C 6A OTHER CARDIOVASCULAR

VIF	ANGOSEDIN	MSD	DEPROPANEX
BER	CALMICOR	MAN	EURHYTHON
TPW	CARDIOPON	BYK	ORTHANGIN
HEU	CARD OMPIN	BAX	TRINIDE
ZYM	CRATAEGUS	M.Z.	ZELLER

C7 BETA-BLOCKING AGENTS

C 7A BETA BLOCKING AGENTS, PLAINS

ASR	APTIN	ICI	TENORMIN
MSD	BLOCADREN	CIB	TRASICOR
ICI	INDERAL		

D DERMATOLOGICALS

D1 ANTI-FUNGALS, DERMATOLOGICAL

D 1A ANTIFUNGALS, DERMATOLOGICAL

D 1A1 TOPICAL ANTIFUNGALS

BAY	CANESTEN	D.P.	MYCIL
AYE	ENZACTIN	THX	MYCODECYL
HOE	JADIT	SQB	MYCOSTATIN
KNO	MULTIFUNGIN	SHC	TINADERM

D 1A2 SYSTEMIC, GRISEOFULVINS

GLX	GRISOVIN F.P.

D2 EMOLLIENTS AND PROTECTIVES

D 2A EMOLLIENTS & PROTECTIVES

TOL	VITADERM	C.B.	VITAMARCIDERME

D3 WOUND-HEALING AGENTS

D 3A CICATRIZANTS

ROC	BEPANTHENE	ABD	SINADUR
DET	DESITIN	SOL	SOLCOSERYL
ORT	MASSE Cream	SIE	UNGUENTOL
AYE	PREMARIN	C.B	VITAMRCIDERME

D4 ANTI-PRORITICS, INCLUDING TOPICAL ANTIHISTAMINES, ANAESTHETICS ETC.

D 4A TOPICAL ANTIPRURITICS

MAX	ALBATUM	SPE	PHENERGAN
A.H.	ALLERGIN	DET	PRURIDERM
M.B.	ANTHISAN	ASR	XYLOCAINE
GGY	EURAX		

D5 COAL TAR, SULPHUR AND RESORCIN PREPARATIONS, NOT OTHERWISE CLASSIFIED

D 5A COAL TAR, SULPHUR, RESORCIN

WHL	OXIPORVHC

D6 TOPICAL ANTIBIOTICS AND SULPHONAMIDES EXCLUDING COMBINATIONS WITH STEROIDS

D 6A TOPICAL ANTIBIOTICS PLAIN

LED	ACHROMYCIN	UPJ	MICIGUENT
POS	CHLORAMPHENICOL	POS	OXYTETRACYCLINE
POS	CHLORTETRACYCLINE	SPE	ROVAMYCIN
MRN	DERMEX	MYC	SULFADERM
SHC	GARAMYCIN	PFZ	TERRAMYCIN
HYM	GLOBENICOL	POS	TETRACYCLINE
SQB	GRANEODIN	FIT	TROFODERMIN
LED	LEDERMYCIN		

D 6B TOP. SULPHONAMIDE PLAIN

WAN	COLPO-SULFANA
WAN	SULFACOL
ABD	SULFADUR
MYC	SULFAMYCIN Powder
WIN	SULFAMYLON

D7 TOPICAL CORTICOSTEROIDS

D 7A TOP. CORTICOSTEROIDS, PLAIN

GLX	BETNESOL Retention Enema
GLX	BETNOVATE
SHC	CELESTODERM V
MSD	DECADRON
GLX	DERMOVATE
VIF	HYDROCORTIFOR
POS	HYDROCORTISONE
UPJ	MEDROL VERIDERM
SHG	NERISONA
SHG	ULTRALAN

D 7B TOP. CORTICOSTEROIDS COMBS.

D 7B1 ANTIBACTERIALS

LED	AUREOCORT
GLX	BETNOVATE C
GLX	BETNOVATE N
HOE	CAMBISON
SHC	CELESTODERM
MCK	DECODERM 3
ORG	DEXATOPIC
DIA	DIACORTICIN
SQB	KENACORT A GRAN
LED	LEDERCORT
CIB	LOCACORTENE Viofor
DET	LITERADERM
UPJ	NEO CORTEF
UPJ	NEO MEDROL Veriderm
UPJ	NEO MEDROL ACNE Lotion
SHG	NERISONA C
LEP	RIFODERM
SHG	SCHERICUR
GGY	STEROSAN HYDRO
GRT	SYNALAR N
PFZ	TERRA CORTRIL
ROU	TOPIFARM
SHC	VALISONE G

D 7B2 WITH ANTIFUNGALS

HOE	JADIT H
DET	LITRADERM

D 7B3 WITH ANTIBACT. ANTIFUNGALS

SQB	KENACOMB
MYM	PIMAFUCORT

D 7B4 TOP. STEROIDS + OTHER COMB

MIN	PANTOCREAM

D8 ANTISEPTICS AND DISINFECTANTS, EXCLUDING MEDICATED DRESSINGS

D 8A ANTISEPTICS- DISINFECTANTS

A.H.	ACRIFLEX	THX	HEXOMEDICINE Transcutanee
ALL	ALLERGAN	ICI	HIBISCRUB
A	ASEPSO	ICI	HIBITAN
PUR	BETADIN	POR	MARCIDERM
BOO	BURNOL	BAC	MANUSEPT
MCS	CALOX	BEZ	NATUSAN
ICI	CETAVLON	FRO	NEUTROGENA
MAX	DERMOMAX	INN	NOBACTER
REK	DETTOL	WIN	PHISOPHEX
EAT	FURACIN Soluble Dressing / FURACIN Soluble Powder	WIN	ROCCAL
EAT	FURACIN Solution	ICI	SAVLON
EAT	FURACIN Urethral Inserts	BRN	SENOPHIL
MYC	FURAZOL	CHA	SOLUBACTER
HEL	GERMAL	FBC	STELLISEPT
DER	GERODERM ACIDO	PHS	STERLANE
DER	GERODERM NEUTRO	GGY	STEROSAN
DER	GERODERM ZOLFO	ALL	TOTAL
THX	HEXOMEDINE	CIB	VIOFORM

D 9 MEDICATED DRESSINGS

D 9A MEDICATED DRESSINGS

ROU	SOFRA TULLE

D10 ANTI-ACNE PREPARATIONS

D 10A ANTI-ACNE PREPARATIONS

AFS	ACNE AID	IDI	CHLOFEX
IOT	ACNYL	SFL	PANOXYL
SFL	BRASIVOL	CIL	RETIN A

D11 OTHER DERMATOLOGICAL PREPARATIONS, INCLUDING MEDICATED SHAMPOOS

D 11A OTHER DERMATOLOGICALS

PHR	BBK	VIR	HADEX Pommade
PHM	CRINAGEN	PRC	LEUCODENINE B
BRS	DENISOL	PRC	MELADENINE
RCO	DERMOPHYLL	SFL	OILATUM
POS	GEL V	SFL	POLYTAR
VIR	HADEX	LAO	PRODERMIDE

(Continued on next page)

(Continued from D11A OTHER DERMATOLOGICALS)

SFL	SASTID	KAB	SELUKOS
CHF	SELENOL	IRA	SULFARIN
ABT	SELSUN	S–T	VALY
ABT	SELSUN BLUE		

G GENITO-URINARY SYSTEM AND SEX HORMONES

G1 GYNAECOLOGICAL ANTI-INFECTIVES

G 1A GYNAE. ANTI-INFECTIVES

G 1A1 GYNAE. ANTI-INFEC , SYSTEMIC

PFZ	FASIGYN	P.D.	MIDICEL
SPE	FLAGYL	ORT	SULTRIN TABLET

G 1A2 GYNAE. ANTI-INFEC., TOPICAL

ORT	ACI JEL	MAC	MACMIROR
SCH	ANIODOL	SQB	MYCOSTATIN
CHA	ATRICAN	MYM	PIMAFUCIN
PUR	BETADIN	FRA	SITUCIDINE
PHM	CANDEPTIN	ORT	SPOROSTACIN
BAY	CANESTEN	ORT	SULTRIN
C.P.	CENASERT	LEP	SYNTOMYCETINE
THR	COLPOITROPHIN	SQB	TALSUTIN
A.H.	DEQUADIN	PFZ	TERRAMYCIN
EJI	EJIFICOL	EAT	TRICOFURON Vaginal Suppositories
SPE	FLAGYL		
THX	GYNOPLIX	VIR	VAGICOL

G2 OTHER GYNAECOLOGICALS

G2A OXYTOCICS

A.H.	ERGOMETHRINE	SDZ	SYNTOCINON
SDZ	METHERGINE		

G2B TOPICAL CONTRACEPTIVES

ORT	DELFEN

G 2C OTHER GYNAECOLOGICALS

ORT	DINESTROL	ORT	NUTRISAL
AYE	PREMARIN		

G3 SEX HORMONES AND STIMULANTS OF GENITAL SYSTEM

G 3A ORAL CONTRACEPTIVES

SHG	EUGYNON	SHG	NORLESTRIN
ORG	LYNDIOL	WYE	OVRAL
SHG	MICROGYNON	SEA	OVULEN
SHG	NEOGYNON	SEA	OVULEN 50

G 3B ANDROGENS & COMBINATIONS

UPJ	DEPO TESTRONE	SHG	TESTOVIRON
UPJ	HALOTESTIN	SHG	TESTOVIRON Depot
ORG	NEO HOMBREOL	SHG	TONOVAN
MCK	PASUMA	CIB	TRIOLANDREN
DRG	SUSTANON		
VIF	TESTOSTERON Vifor		

G 3C OESTROGENS & COMBINATIONS

ORT	DIENOESTROL	D.P.	OESTROFORM
L.S.	ESTRADURIN	SDZ	PARLODEL
ERC	KLIMERCO	AYE	PREMARIN
EBE	NEO KLIMASTILBEN	SHG	PROGYNON
VIF	OESTRADIOL	SHG	PROGYNON Dept.
		SHG	PROGYNOVA
		ORG	SYNAPAUSE

G 3D PROGESTOGENS & COMBS

UPJ	DEPO PROVERA	SER	PROGESTINE
ORG	DIMENFORMON	SHG	PROLUTON
DUP	DUPHASTON	SHG	PROLUTON Depot.
ORG	GESTANON	UPJ	PROVERA
SHG	PRIMOLUT N	THR	TOCOGESTAN
SHG	PRIMOLUT NOR		

G 3E ANDROGEN + FEMALE HORMONE

G 3E 1 ANDROGEN + OESTROGEN

ORG	ESTANDRON PROLUNG	SHG	PRIMODIAN
CIB	FEMANDREN M		

G 3E2 ANDROGEN + PROGESTOGEN

SHG	TESTOLUTON

G 3E3 ANDROGEN + OESTROGEN + PROGESTOGEN

SHG	ABLACTON

G 3F OESTROGEN + PROGESTOGEN

SHG	CUMORIT
ORG	DI PRO
ORG	DIPRO Oleosom
ORG	DIPRO Emoltion
SHG	GRAVIBINAN
B.M.	GYNAECOSID
CIB	LUTOVOCYCLINE
SHG	PRIMOSISTON
D.P.	SECRODYL
HEP	SYNERGON

G 3G GONADOTROPHINS

SHG	ANETRON
M.T.	CLOMID
ORG	GESTYL
ORG	GESTYL TESTO
ORG	HUMEGON
DOP	IKACLOMIDE
SER	PERGONAL
ORG	PREGNYL
SER	PROFASI

G4 UROLOGICALS

G 4A URINARY ANTISEPTICS ANTI-INFECTIVES

G 4A1 SULPHONAMIDES + COMBS

PFZ	UROBIOTIC
BRI	UROPOL
HEU	UROSPASMON

G 4A2 OTHER URINARY ANTISEPTICS

EAT	FURADANTIN
ICA	FURILIN
EAT	FURADANTIN Sodium
ARF	FUROCYCLIN
EAT	MACRODANTIN
MDC	NALISSINA
WIN	NEG GRAM
DEB	NIBIOL
W.L.	PRODOXOL

G 4B OTHER UROLOGICALS

FRA	LESPENEPHRYL
FRA	LESPENEPHRYL Injectable
MDS	LITHOLENU
ZYM	UROSTOP

H SYSTEMIC HORMONAL PREPARATIONS EXCLUDING SEX HORMONES

H1 ACTH

H 1A A.C.T.H.

CHO	A C T H
CIB	SYNACTHEN

H2 SYSTEMIC CORTICOSTEROIDS

H 2A PLAIN CORTICOSTEROIDS

H 2A1 PLAIN CORTICOIDS INJECTION

SHC	CELESTONE	ORG	ORADEXON
MSD	DECADRON	CIB	PERCORTENE
UPJ	DEPO MEDROL	SHG	SCHERISOLON
SHG	DEXA SCHEROSON	UPJ	SOLU CORTEF
VIF	DESOXYCORTICOSTERON, "Vifor"	MCK	SOLUPACORTINE
ORG	DOCA	UPJ	SOLU MEDROL
ORM	FLEBOCORTID	ROU	SYNCORTYL

H 2A2 PLAIN CORTICOIDS, ORAL

GLX	BETNESOL	SQB	KENACORT
SHC	CELESTONE	LED	LEDERCORT
MSD	DECADRON	LEP	LEPTINOL
ROU	DECTANYCL	UPJ	MEDROL
PFZ	DELTACORTIL	UPJ	MEDROL MEDULES
SHG	DEXA SCHEROSON	ORG	OKADEXON
ORG	DI ADRESON F	CIB	PERCORTENE
EJI	EJIDOX	LEP	PREDNISOLON
HOE	HOSTACORTIN H	SOP	SOPACORTELON
ROU	HYDROCORTANCYL	SHG	ULTRALAN

H 2B SYSTEMIC CORTICOSTEROIDS COMBINATIONS INJECTABLE

PIR	CORTIPLEX	POS	CORTOL

H3 THYROID THERAPY

H 3A THYROID PREPARATIONS

SKF	CYNOMEL	ORG	THYRANON
CHO	EXTRAIT THYROIDIEN	CHO	THYROBULIN
MCK	NOVOTHYRAL		

H 3B ANTI-THYROID PREPARATIONS

NIC	NEO MERCAZOLE	LLY	TAPASOL

H 3C IODINE PREPARATIONS 60L + IODOGOL

GOL	IODOGOL PHOSPHATE

J GENERAL ANTI-INJFECTIVES, SYSTEMIC

J1 ANTIBIOTICS, SYSTEMIC INCLUDING TRIMETHOPRIM

J 1A TETRACYCLINES & COMBINATIONS

LED	ACHROMYCIN
LEP	AMBRAMYCIN
BRI	BRISTACIN
GRT	GRUNICYCLINE
HOE	HOSTACYCLINE
HOE	HOSTACYCLINE P
ICI	IMPERACIN
LED	LEDERMYCIN
LED	MINOCIN
SQB	MYSTECLIN V
HOE	REVERIN
SQB	SUMYCIN
LEP	TETRA AMBEZIM
BRI	TETREX
PFZ	TERRAMYCIN
MYM	VENDARCIN
PFZ	VIBRAMYCIN

J 1B CHLORAMPHENICOLS & COMBS

BCH	BIOPHENICOL
IDI	CHLOFEX
A.H.	CHLORAMPHENICOL
P.D.	CHLOROMYCETIN
P.D.	CHLOROSTREP
EJI	EJIFICOL
FIT	FARAMICETINA
MYM	GLOBENICOL
ISM	ISMICETIN
ERB	KEMICETINA
VIR	OVULE VAGICOL
B.M.	PARAXIN
SOP	SOPAMYCETIN
LEP	SYNTOMYCETINE

J 1C AMPICILLINS & COMBS

BEN	AMOXIL
MYM	AMFIPEN
TOL	AMPICIN
BEE	AMPICLOX
MIN	AMPICO
POO	AMPY-PENYL
I.C.I.	ARCOCILLIN
BAY	BINOTAL
GRT	CITOCILLIN
SQB	DEXACILLIN
M.J.	HICONCIL
IBI	IBIAMOX
IBI	LORACIN
BEE	PENBRITIN
IBS	PENIMOX
IDI	PENTIMYCIN
BRI	PENTREXYL
IBS	PENTRICIN
SRV	SERVICILLIN
M.J.	VERSAPEN

J 1D CEPHALOSPORTINS & COMBS

M.J.	CEFACIDAL
MIN	CEFALIN
BRI	CEFATREXYL
GLX	CEPORACIN
GLX	CEPORAN
IDI	CEPHALOMEX
GLX	CEPOREX
SKF	ESKACEF
IBI	IBILEX
LLY	KEFLEX
LLY	KEFLIN
LLY	KEFLODIN
BRI	PALITREX
SQB	VELOSEF

J 1E TRIMETHOPRIM COMBS

ROC	BACTRIM	MYC	SEPTIMYCIN
RUZ	METHOPRIM S	WEL	SEPTRIN
MIN	SEPTAPRIM		

J 1F MACROLIDES & SIMILAR TYPE

UPJ	DALACIN C	PIE	LAURYLIN
UPJ	EMU V	UPJ	LINOCIN
ABT	ERYTHROCIN	SPE	ROVAMYCINE
IDI	ERYTHROMEX	PFZ	TAO
LLY	ILOSONE		

J 1G STREPTOMYCIN & COMBS

SPE	DIDROMYCINE	SQB	STREPTOMYCINE
SPE	STREPTOMYCINE	HOE	STREPTOMYCINE Sulfate

J 1H OTHER PENICILLINS

IBS	BENECIL	HOE	OMNACILLIN
BEE	BROXIL	TOL	O PEN
HOE	CLIACIL	BEE	ORBENIN
SQB	CRYSTICILLIN	NOV	PEMILENT
NOV	DUOPEN	WYE	PENADUR —
M.J.	DYNAPEN	D.P	PENICILLIN
SPE	EXTENCILLINE 6, 3, 3	SPE	PENICILLIN
SPE	EXTENCILLINE	SQB	PENICILLIN
NOV	FENOXYPEN	HOE	PENICILLIN G HOECHST
BEN	FLOXAPEN	GRI	PROSTAPHLIN
PFZ	GEOCILLIN	BRI	PROSTAPHILIN A
PFZ	GIOPEN	GLX	SECLOPEN
PIH	GYNECOLOGIC	ASR	TIKACILLIN 600,000
	Lysocillin	ASR	TIKACILLIN 1,000,000
HOE	HOSTACILLINE AQUA	GLX	TRIPLOPEN
CON	KANACILLIN	TOL	ULTRAMOX
GRT	MEGACILLINE	SQB	VEETIDS
GRT	MEGACILLINE FORTE	IRA	VICILIN

J 1K ALL OTHER ANTIBIOTICS

J 1K1 AMINOGLYCOSIDES

SHC	GARAMYCIN	LEP	KANTREX

J 1K3 RIFAMPICIN/RIFAMYCIN

ARF	ARCHIDYN	LEP	RIFOCIN
LEP	RIFADIN	CIB	RIMACTANE

J 1K4 ALL OTHERS

SAY	AZALOMYCIN–F
DUM	COLIMEX
BNW	COLISTINE
FIT	GABROMICINA
UPJ	TROBICIN

J2 SYSTEMIC AGENTS FOR FUNGAL INFECTIONS, EXCLUDING GRISEOFULVIN

J 2A SYSTEMIC ANTIFUNGALS

SQB	MYCOSTATIN
MYM	PIMAFUCIN

J3 SULPHONAMIDES

J 3A PLAIN SULPHONAMIDES

ROC	GANTRISINE
LED	LEDERKYN
ROC	MADRIBON

J 3B SULPHA-ANTIBIOTIC

ABD	TRI–S

J4 TUBERCULOSTATICS, EXCLUDING STREPTOMYCIN

J 4A TUBERCULOSTATICS

GET	DIPASIC
ZDJ	ETIBI
ZDJ	ETIBI INH
SPE	ISONIAZID
LED	MYAMBUTOL
ERB	NEO-TIZID
A.H.	P A S
SPE	P A S
HEP	P.I.E.M.
THX	TREVINTIX

J6 SERA AND GAMMA GLOBULIN[۱]

T6A SERA & GAMMA GLOBULIN

BER	DIPHTHERIA Antitoxin
BER	Di Te Anatoxal
BER	Di Te Per Anatoxal
HOE	BERIGLOBIN
BER	GAMMAGLOBULIN
I.S.M.	HUMAN IMMUNO
BER	GLUBUMAN
BBS	HISTAGLOBINE
I.S.M.	HUMAN IMMUNE GLOBULINS
BER	MORATEN
IMM	PERBULIN
ORT	RHOGAM
BER	RHESUMAN Berna
BER	SERUM ANTIDIPHTER
RAZ	SERUM ANTITETANIQ
IMM	TETABULIN
BER	TETANUS Antitoxin
BER[۱]	TOSUMAN

J7 VACCINES

J7 A VACCINES

S.K.F	CENDEVAX	BER	GONOCOCCIC Vaccine
BER	Di Te Tab Vaccine	LEP	LYRUGEN
BER	D.P.T.	BER	POLIOMYELITIS Vaccine
HOE	D.P.T. Vaccine	BER	TAB VACCINE

M MUSCULO-SKELETAL SYSTEM

M1 ANTI-INFLAMMATORY AND ANTI-RHEUMATIC PRODUCTS

M 1A ANTIRHEUMATIC NON-STEROID

M 1A1 ANTIRHEUMATICS, PLAIN

BAY	ADIRO	MSD	INDOCID
P.D.	ARLEF	CHS	LIOMETACEN
ARC	ARCOBUTINA	CON	MERVAN
TSM	ASCRIPTIN	CHS	METACEN
BEZ	BENZOFLEX	BEZ	MOBUTAZON
BAN	BIOTAMINE	WIN	PLAQUINOL
BOD	BRUFEN	SIE	PRODISAN 300
GGY	BUTAZOLIDINE	SPE	SORIPAL
GGY	BUTAZOLIDINE Alka	GGY	TANDERIL
SHC	DROXARYL	ORG	TANTUM

M 1A2 ANTIRHEUMATICS, COMBS

MDC	ARTRONEURTIL	ABD	SALICO
LEP	BETASALYL	MAR	SALIMARINE
GEI	GT 50	MID	THIODERAZINE
KNO	OSADRIN	BYK	TOMANOL

M 1B ANTIRHEUMAT. STEROID COMBS

GGY	DELTA BUTAZOLIDINE	ORG	PREDNACYL
GLX	BETNELAN Intra Articular Injection	CIL	PREDNIFLEX
		SHC	SIGMAGEN

M2 TOPICAL ANTI-RHEUMATICS RUBEFACIENTS

M 2A ANTIRHEUMATICS, TOPICAL

LAT	ALGESAL	RUB	ANTIPHLOGISTINE
MID	ALPHA KADOL	BAY	BAYOLIN
DOP	ANTIPHLOGISTINE	GGY	BUTAZOL IDINE

(Continued on next page)

(Continued from M2A ANTIRHEUMATICS, TOPICAL)

DEN	DENCORUB	ABD	MYALGINE
B.I.	FINALGON	EBE	NICOTHERM
MAC	FORAPIN	RAM	RAMINOL
ICA	ICAR SON	MRN	RHUMACID
BCH	LUMBAGIN	PHR	RHUMACALMINE
MID	MIDALGAN	MIN	R–M
LUI	MOBILAT	MCS	SURIN

M3 MUSCLE RELAXANTS

M 3A MUSCLE RELAXANTS, INJECT.

AST	CURARIN	RBS	ROBAXIN
SPE	FLAXEDIL	AST	SUCCINYL
ORG	PAVULON	ABT	TUBOCURARINE Chloride
A.H.	SCOLINE		

M 3B OTHER SYSTEMIC RELAXANTS

M 3B1 PLAIN MUSCLE RELAXANTS

ROU	COLTRANYL	RBS	ROBAXIN
CIL	PARAFLEX		

M 3B2 COMB MUSCLE RELAXANTS

ROU	ADALGOR	RBS	ROBAXIN
RIK	NORGESIC	RBS	ROBAXISAL

M4 ANTI-GOUT PREPARATIONS

M4A ANTI-GOUT PREPARATIONS

LUN	ALLOPURIN	DOP	REDURIC
LAB	AMPLIVIX	PHR	VISEL
MSD	BENEMID	MED	URODAN
HOU	COLCHICIN	CHN	URODONAL
HOU	COLCHIMAX	WEL	ZYLORIC
MID	PIPERAZINE		

N CENTRAL NERVOUS SYSTEM

N1 ANAESTHETICS

N 1A ANAESTHETICS GENERAL

N 1A1 ANAESTHETICS, INHALATION

GLX	ALTHESIN	ICI	FLUOTHANE
HOE	HALOTHANE	ABT	PENTHRANE

N 1A2 ANAESTHETICS, INJECTABLE

BAY	EPONTOL
P.D.	KETALAR
M.B.	INTRAVAL Sodium
SPE	NESDONAL
ASR	XYLOCAINE
ASR	XYLOCAINE HEAVY

N 1B ANAESTHETICS, LOCAL

ASR	XYLOCAINE
ASR	XYLOCAINE HEAVY
ASR	XYLOCAINE VISCOUS

N2 ANALGESICS

N 2B NON-NAROTIC ANALGESICS

ACF	ACEFALGINE
ACF	ACETOPHEN
A.H.	A P C
B.M.	ALGAPHAN
D.P.	A S A
D.P.	ARAMIN
ABD	ASKIN
BAY	ASPIRINE
MCS	AXAR
MAX	B.B. PYRINE
TOL	BEPYRINE
WIN	BESEROL
ABD	BUTAPHEN
ABD	CAFIDON
ABD	CODIMAL
GLX	CODOPYRIN
ABD	CODRINE
LLY	DOLOXENE
BAY	DOLVIRAN
WYE	EQUAGESIC
LEP	FEMIDOL
ROU	GLIFANAN
MET	KALMIN
MYC	MYCIDON
HOE	NOVALGIN
SDZ	OPTALIDON
RIA	PARAMOL
LEP	PASSAL
WAL	PAXIDAL
BOO	PAXIDIN
P.D.	PONSTAN
TAN	PYRIPAN
BRL	PYROGAR
MAX	PYROMAX
SPE	RHONAL
MCK	SEDAL MERCK
TOL	SEDAPHEN ELIXIR
VIR	SEDON A
TOL	SODAPHEN
BAY	SPASMO-DOLVIRAN
WIN	TALWIN
M.J.	TEMPRA
SDZ	TONOPAN
SQB	VALADOL
VIR	VIRACO
WYE	ZACTIRIN

N 2C ANTI-MIGRAINE PREPS.

D.P.	ANCOFEN
AST	AVAMIGRAN
SDZ	CAFEROGOT
SDZ	CAFEROGOT PB
SDZ	DIHYDERGOT
CHM	MIGRAN FUX
WEL	MIGRIL
SPE	MIGRISTENE

N3 ANTI-EPILEPTICS

N 3A ANTI-EPILEPTICS

WAN	ANTISACER
WAN	ANTISACER Composition
BAY	COMITAL L
P.D.	DILANTIN
M.B.	GAROIN
ICI	MYSOLINE
BAY	OSPOLOT
GGY	TEGRETOL
P.D.	ZARONTIN

N4 ANTI-PARKINSON DRUGS

N 4A ANTI-PARKINSON DRUGS

N 4A1 ANTI-PARKINSON, INJECTABLE

KNO	AKINETON

N 4A1 ANTI-PARKINSON, OTHERS

KNO	AKINETON
LED	ARTANE
ROC	LARODOPA
ROC	MADOPAR
MSD	SINEMET
GGY	SYMMETREL

N5 PSYCHOLEPTICS

N 5A ATARACTICS

N 5A1 NEUROLEPTICS

SEA	DARTALAN
DGR	DOGMATIL
LEP	EQOILID
SKF	ESKAZINA
A.H.	FENTAZIN
LUN	FLUANXOL
LUN	FLUANXOL Retard
ABD	FLURAZINE
SPE	LARGACTIL
SPE	MAUEPTIL
SDZ	MELLERIL
SQB	MODECATE
SQB	MODITEN
SPE	NEULEPTIL
SPE	NOZINAN
WHI	PERMITIL
C.B.	PLEGICIL
SEA	SERENACE
SHC	SEVINOL RA
WYE	SPARINE
SHC	TRILAFON
MIN	V.M.

N 5A2 TRANQUILLIZERS

B.I.	ADUMBRAN
UCB	ATARAX
WYE	ATIVAN
ROC	LIBRIUM
IDI	NEUROLIBRIN
LEP	PERTRANQUIL
KAB	RESTENYL
WYE	SEREPAX
LUN	SORDINOL
ABD	TRANQUINE
DOP	TRANQUIPAM
MDC	TRANQUIRIT
C.B.	TRANXENE
ROC	VALIUM

N 5B HYPNOTICS & SEDATIVES

N 5B1 NON-BARBITURATE, PLAIN

SDZ	CALCIBRONAT
C.B.	DOREVANE
ASR	HEMINEVRIN
BOO	MELSEDIN
ROC	MOGADON
MCK	REVONAL
GLX	TRICORYL

N 5B2 NON-BARBITURATE COMBS.

MRN	BROMARINE	SAR	PASSIFLORINE
ABD	CALMOBROME	OPO	PASSIBROMINE
MAX	HYPNO BEBE	MYC	SEDOMYCINE
ROU	MANDRAX		

N 5B3 BARBITURATE, PLAIN

MIN	BUTABAR	BAY	LUMINALETTES
SPE	LENTERULES PHENOBARBITAL	GGY	MEDOMINE
BAY	LUMINAL	ABT	NEMBUTAL
		A.H.	PHENOBARBITONE

N 5B4 BARBITURATE COMBS

MAN	BEBECALMINE	CIB	PRISCOPHENE
SDZ	BELLERGAL	ABD	SEDORMA
MCS	BEVISED	HOR	SEVAL
IDI	LONGINE	CHA	SYMPATHYL
MAX	MAXONAL		

N6 PSYCHO-ANALEPTICS, EXCLUDING ANTI-OBESITY PREPARATIONS (SEE A8)

N 6A ANTI-DEPRESSANTS

B.M.	APONAL	DEL	PRIADEL
LLY	AVENTYL	BOO	PROTHIADEN
GGY	INSIDON	LUN	SAROTEN
SIE	ISTONIL	PFZ	SINEQUAN
ROC	MARPLAN	SPE	SURMONTIL
LAK	NORPRAMIN	GGY	TOFRANIL
LUN	NORTRILEN	MSD	TRYPTIZOL

N 6B PSYCHOSTIMULANTS

HOM	CAPTAGON	HOU	LEVOGLUTAMINE
B.I.	CATOVIT	TOL	NEUROCHOLINE
M.T.	COGITUM	UCB	NOOTROPIL
MCK	ENCEPHABOL	MCK	REACTIVAN
WIN	FENAROL	CIB	RITALIN

N7 OTHER CNS DRUGS, INCLUDING PARA-SYSMPATHETIC AGENTS

N 7A OTHER CNS PRODUCTS

MCK	ENCEPHABOL	ROC	PROSTIGMIN

P PARASITOLOGY

P1 ANTI-PARASITIC PRODUCTS

P 1A AMOEBICIDES

CIB	AMBILHAR
SPE	BEMARSAL
CHA	ATRICAN
MCK	DAMETIN
A.H.	EMETINE
WIN	MILIBIS
SPE	STOVARSOL

P 1B ANTHELMINITICS

M.B.	ANTIPHEN
WEL	ALCOPAR
WAN	ASCAPHEN
WIN	BRYREL
MIN	CESTOCIDE
FAZ	CITRAZINE
PFZ	COMBANTRIN
BRN	DIETELMIN
A.H.	HELMEZINE
MYC	HELMYCINE
ICI	KETRAX
MSD	MINTEZOL
FAR	OXYPEL
MER	OXYCEROL
PAR	PIPERFUGE
RAM	PIPRAMIN
ABD	PIROSILE
MIN	SOL PIPER
MYC	TELMEX
MIN	TENICIDE
BAY	UVILON
P.D.	VANQUIN
P.D.	VANPAR
PHM	VERMISOL
BAY	YOMESAN

P 1C SCHISTOSOMICIDES

BAY	FOUADIN

P 1D ANTI-MALARIALS

WIN	ARALEN
SPE	NIVAQUINE
BAY	RESOCHIN

P 1E SCABICIDES

ICI	TETMOSOL

P 1G OTHER ANTI-PARASITICS

SPE	GLUCANTIME

R RESPIRATORY SYSTEM

R1 NASAL DECONGESTANTS AND ANTI-INFECTIVES

(Continued on next page)

Continued from .... Nasal Decongestants and Anti-Infectives

R 1A NASAL DECONGESTANTS, TOP.

R 1A1 STEROIDS, NASAL

LEP	NISOLONE

R 1A2 NON-STEROIDS, NASAL

CIB	ANTISTINE PRIVIN
ABD	EFRINOSE
ABD	EFRINOSE B.B.
BOO	FENOX
MCK	ILIADINE
WIN	NEO SYNEPHRINE
WIN	N T R
CIB	OTRIVINE
PFZ	TYZINE

R 1A4 ANTI-INFECTIVES, NASAL

SRV	LOCABIOTAL

R 1A5 OTHER TOPICAL NASAL

AVI	FUMA GRIPPE
POS	NEO PHRINE
FAZ	RHINO FAZ
PHR	RHINO-GOUTTES
ROU	SOFRAMYCIN

R2 PHARYNGEAL DECONGESTANTS AND ANTI-INFECTIVES

R 2A PHARYNGEAL PREPARATIONS

MCS	AQUADRIN
A.H.	DEQUADIN
BAY	IVERSAL
THE	LYSOPAINE
UET	MENTHOLET
BOO	STREPSILS
VIC	VICKS

R3 ANTI-ASTHMATICS

R 3A BRONCHODILATORS-ANTI-ASMA

ORM	AMBEZIM
B.I.	ALUPENT
LEK	AMINOPHYLLINE
MAX	AMINOPHYLLINE
LUN	AMPHISOL
WAN	ASMAC Retard
ERC	ASMI
A.H.	BECOTIDE
ASR	BRICAN
BRN	CHIMIOPHYLLINE
BRN	CHIMIOPHYLLINE BUT
A.H	EPHEORINE
SKF	EXPANSYL SPANSULS
WIN	FRANOL
TAN	INOLIN
FIS	INTAL
LNZ	IPRADOL
RIK	MEDIHALER ISO
MIN	MINA INHALER
B.D.	RECTOSEPTOL BeBe
ORG	PREDASMAL
M.J.	QUIBRON
CHC	THIOPHYLLIN
NEV	VANTILAT
A.H.	VENTOLIN

R 3B OTHER RESP-ANTI-ASMA ATIM

LUN	AMPHISOL	RBS	DOPRAM
BER	ASPASTIN	GGY	MICOREN
CIB	CORAMIN EPHEDRINE		

R4 CHEST RUBS AND OTHER INHALANTS

R 4A CHEST RUBS & INHALANTS

FAZ	FAZ INHALAR	VIC	VICKS
BEP	LIBEROL	VIC	VICKS INHALAR

R5 COUGH AND COLD PREPARATIONS

R 5A COLD PREPARATIONS

LEP	BABY RHINOL	MYC	HISTAMOL
FAZ	BE BE FAZ	MCK	ILVICO
MIN	B—M SYRUP	MIN	MINALGIN
HOE	CANTACIN	MIN	MINALGIN Enfant
SHC	CORICIDIN	BAY	REFAGAN
SHC	CORICIDIN D	TOL	SEDARIN
PFZ	CORYBAN D	P.D.	SINUTAB
ABD	C PAROL	WIN	SYNEPHRICOL
ROG	GRIPIN	ABD	TRI-HISTA
RUZ	GRIPPE STOPP		

R 5C EXPECTORANTS

ORM	AMBEZIM BALSAMIC	LEP	MEPYRAL
AVI	BABY BRONCHE	LEP	MEPYRAL EXPECTORAN
AVI	BEBE BRONCHE	MIN	MINA BRONCHE
MAR	BEBE TUSSIN	MIN	MINA BRONCHE B B
MCS	BECOF	IDI	MUCOLIN
P.D.	BENADRYL EXPECTORAN	MYC	NEOPECT
P.D.	BENYLIN	FRR	PARADRYL EXPECTORAN
B.I.	BISOLVOMICIN	LEP	PECTO BEBE
B.I.	BISOLVON	FAZ	PECTO BROME
MIN	B.M.	RAM	PECTORAMIN
M.T	CAMPHOPENUMINE	RAM	PECTORAMIN ENFANT
	Adult	SPE	PHENERGAN EXPECTORAN
M.T.	CAMPHOPNEUMINE BeBe	A.H.	PIRITON
M.T.	CAMPHOPNEUMINE Enfant	SHC	POLARAMINE EXPECTORAN
RBS	DIMETANE EXPECTORAN	FRR	QUILLA CODEINE
TOL	HISTOLIT EXPECTORAN	FRR	QUILLA SIMPLEX
TOL	HISTOLIT EXPECTORANDC	ABD	THEO LITE
VIR	HYSTACODE	ABD	THEO LITE Tab.
MAX	MAXADRYL EXPECTORAN	BEI	TUSSIPECT

R 5D COUGH SEDATIVES

P.D.	AMBENYL EXPECTORAN	KNO	PARACODINE
AVI	AVIPULMINE	MCK	PECTAMED
MCS	AXON	D.P.	PECTAMOL
VIO	BE. BE Sedin	ABD	PECTOCODE
P.D.	BENAFED	GOL	PECTOGOL
BOO	CHERRY COUGH	MAX	PECTOMAX
PFZ	CORYBAN D	MYC	PECTOMYCINE
P.D.	COASNYL DM	MIN	PECTON Syrup
BAY	BETIGON	MIN	PECTON Tab.
VIR	DIPHENTORAL	LEP	PECTOVITE
THX	EFRYL	FAZ	PEDICOF
VIR	EPHECODE	PHR	PULMO-BEBE
MCK	EPHETONINE	PAR	PULNOREGAL
A.H.	METHININE	VIR	PULMOVITE
ROG	GRIPIN	SQB	SENODIN
SDZ	IPESANDRINE	B.I.	SILOMAT
MCS	METORCIN	DEL	SOLUCAMPHRE
MIN	METORPAN	ROL	TROPHIRES
BOU	NEO CODION Adult	AVI	TUSILAR
BOU	NEO CODION Enfant	ABD	TUSSICOF
MYC	NEOPECT	IDI	TUSSITEX
LEP	NEW PECTOVITE	VIC	VICKS 44
C.B.	PADERYL	BOO	WHOOPING COUGH MIX

R 5E NASAL DECONGESTANTS

ABD	CORYSAN	SHC	DRIXORAL
ABD	CORYSAN Enfant	SKF	ESKORANADE
HOE	COSAVIL	ABD	HISTATWO
FOU	DENORAL	BRI	NALDECOL
RBS	DIHETAPP	ABD	TRI HISTA

R 5F OTHER COUGH & COLD PREPS.

TAN	DEVORA	ZYM	PILKA
PRA	FEBRECTOL	ABD	PYRADINE
PAR	MENTHAN		

R6 SYSTEMIC, ANTIHISTAMINES

R 6A ANTIHISTAMINES SYSTEMIC

M.B.	ANTHISAN	P.D.	DENADRYL
CIB	ANTISTINE	B.M.	CALCISTIN
HOE	AVIL	LLY	CO PYRONIL
HOE	AVILETTES	D.P.	DILOSYN

(Continued on next page)

Continued from R6A Antihistamines, Systemic

RBS	DIMETANE	FRR	PARADRYL
RBS	DIMETANE EXTEN TAP	ABD	PARMAL
SPE	DOXERGAN	MSD	PERIACTIN
ZYM	FENISTIL	SPE	PHENERGAN
ZYM	FENISTIL RETARD	A.H.	PIRITON
MIN	HISTANIC	SHC	POLARAMINE
ROG	HISTIN	WEL	PRO ACTIDIL
TOL	HISTOLIT	DOP	PROMETHAZINE
SKF	HISTRYL SPANSULES	GGY	SYNOPEN
UCB	LONGIFENE	SDZ	TAVEGYL
DOP	MAL HISTIN	THX	THERALENE
MAX	MAXADRYL	M.B.	VALLERGAN
MYC	NEODRYIL		

S SENSORY ORGANS

S1 OPHTHALMOLOGICALS

S 1A ANTI-INFECTIVES, EYE

LED	ACHROMYCIN	UPJ	MICIGUENT
LED	AUREOMYCIN	MIN	MINACETAMIDE
ALL	BLEPH 10	UPJ	MYCIGUENT
ALL	BLEPN 30	OPT	OPTREX
POS	CHLORAMPHENICOL	POS	OXYTETRACYCLINE
CHI	CHLORAMPHENICOL	DOP	PHENICOL
CHI	CHLORANSULFA	ALL	POLYSPECTRIN
ALL	CHLOROPTIC	POS	SULFACETAMIDE
ALL	CONJUNCTIN	CHI	SULFACETAMIDE Chibret
SHC	GARAMYCIN	PFZ	TERRAMYCIN
SQB	GRANEODIN	POS	TETRACYCLINE
ALC	ISOPTO CETAMIDE		

S 1B STEROIDS, EYE

GLX	BETNESOL	ALL	HMS
SHC	CELESTONE	VIF	HYDROCORTIFOR
POS	CORTISONE	DOP	HYDROCORTISON
MSD	DECADRON	ZYM	ULTRACORTENOL
ALL	FML		

S 1C STEROIDS ANTI-INFEC, EYE

GLX	BETNESOL N	SHC	CELESTONE 5
ALL	BLEPHAMIDE	ALL	FML NEO

(Continued on next page)

Continued from S 1C STEROIDS ANTI INFECTIVE, EYE

VIF	HYDROCORTIFOR
ALC	ISOPTO CETAPRED
SQB	KENACORT A GRAN
RIT	NEBASONE
UPJ	NEO CORTEF
MSD	NEO DECADRON
POS	NEOMYCINE HYDROCOR
POS	O.F.
SHG	SCHEROSON F.
LEP	SYNTOPHTON
DOP	TERRACORTIN

S 1D OTHER EYE PREPARATIONS

ALL	ALBALON
ALC	ALCONEFRIN
POS	ATROPINE
POS	COLLYRE V
CHI	CHIBRO-ANALGOZINC
CHI	CHIBRO-PILOCARPINE
CHI	DACRINE
DOP	DIONIN
ALL	EPIFRIN
ERC	GLAUPAX
POS	HEPARINE
ALL	HERPLEX
POS	HOMATROPINE
ALL	HYDROCARE
TOL	IBATH
POS	IODOCOL
ALC	ISOPTO ATROPIN
ALC	ISOPTO CARPIN
ALC	ISOPTO MAXIDEX
ALL	LC 65
ALL	LIQUIFILM
ALL	LIQUIFILM WETTING
POS	MIDTEN
ABT	MURINE
POS	NAPHTAZOLIN
DOP	NAPHTAZOLIN ANT
POS	NEOMYCINE Hydrocortisone
ALL	PREFRIN A
DOP	SALYROSINE
ALL	SOAKARE
POS	SOPHTAL
POS	SULFATE DE ZINC
POS	TETRACAINE
FAU	VITA 3
CHI	VITAMIN A
EAU	VITA IODUROL
ALC	ZINCFRIN

S2 OTOLOGICALS

S 2A ANTI-INFECTIVES EAR

POS	CORTISONE
CHI	CHLORAMPHENICOL
P.D.	CHLOROMYCETIN
EJI	EJIFICOL
MYC	FURAZOL
MRN	OTIMARIN
VIR	OTOCOL
MIN	OTOGIN
RAM	OTORAMIN
B.M.	PARAXIN
POS	PILOCARPINE
CHI	PILOCARPINE Chibret
LEP	SYNTOMYCETINE
PFZ	TERRAMYCIN
FAU	VITA-IODUROL

S 2B STEROIDS, EAR

POS	CORTISONE

S 2C STEROIDS ANTI-INFEC, EAR

HOE	CAMBISON
SHG	SCHEROSON F

S 2D OTHER EAR PREPARATIONS

FRE	CERUMENEX	LEP	OREX
CIL	CILOPRINE	MAX	OTALMAX
CIL	CILOPRINE ANAESTHETICO		

S3 OPHTHALMOLOGICAL-OTOLOGICAL COMBINATIONS

S 3C STEROIDS A-INFEC EYE, EAR

ROU	SOFRADEX	PFZ	TERRA CORTRIL

V VARIOUS

V2 CYTOSTATIC AND IMMUNO-SUPPRESSIVE DRUGS

V 2A ANTI-LEUKAEMICS

UPJ	CYTOSAR	WEL	MYLERAN
WEL	LEUKERAN	LLY	ONCOVIN
LED	METHOTREXATE	WEL	PURI NETHOL
WEL	MILERAN	LED	THIOTEPA

V 2B OTHER CYTOSTATICS

FIY	ADRIBLASTINA	LED	METHOTREXATE
SHG	DEPOSTAT	KYO	MITOMYCIN
AST	ENDOXAN	ROC	NATULAN
ROC	FLUORO URACIL	ICI	NOLVADEX
AST	HONVAN	LLY	VELBE

V 2C IMMUNO-SUPPRESSIVES

WEL	IMURAN

V 3 ALL OTHER THERAPEUTIC PRODUCTS

V 3A OTHER THERAPEUTIC PRODUCTS

ROE	ANANASE	DEB	TADENAN
TOL	DRALIT	RIC	THIOSULFIN
DAI	GAMMALON	BAY	TRASYLOL

V4 DIAGNOSTIC AGENTS

V 4A RADIO CONTRAST MEDIA

SHG	BILIGRAFIN	SHG	ENDOGRAFIN
SHG	BILOPTIN	WIN	HYPAQUE
GLX	DIONOSYL	GUE	HYTRAST

(Continued on next page)

(Continued from V4A RADIO CONTRAST MEDIA)

MCK	NEOBAR	WIN	TELEPAQUE
GUE	ORABILIX	SHG	URDGRAFIN
ORT	SALPIX	GUE	VASOBRIX
GUE	TELEBRIX 38		

V 4B URINE TESTS

B.M. COMBUR TEST

V5 SURGICAL ANTISEPTICS

V 5A SURGICAL ANTISEPTICS

KIR	PURITABS	FBC	STERILLIUM

V6 GENERAL NUTRIENTS

V 6B PROTEIN SUPPLEMENTS

LED GEVRAL PROTEIN

V 6C INFANT FORMULAS

PST	APONTI	CCF	FRISOLAC
PST	PONTI AU MIEL	DOO	GITANA
PST	APONTI BANANAS	GUI	GUIGOZ 1
PST	APONTI CARROTS	GUI	GUIGOS 2
PST	APONTI CHOCOLATE	ABT	ISOMIL
PST	APONTI 3 CORN CEREAL	IMK	KANNY 1
PST	APONTI FRUITS	IMK	KANNY 2
PST	APONTI RICE CEREALS	BOR	KLIM
BAK	BAKER	LID	LIDAGEN
MLP	APTAMIL	MEI	MEIJI
NES	AROBON	MLP	MILUMIL
LJF	BEBE LAC CREAM Vanilla	MLP	MILUPA MILK CEREAL
LJF	BEBELAC HUMANIZED	MLP	MILUPA MILK & APPLE
JAC	BLEDINE BANANAS	MLP	MILUPA MILK & BANANA
JAC	BLEDINE GROWTH	MLP	MILUPA MILK & MIXED FRUITS
JAC	BLEDINE RICE	MLP	MILUPA MILK & ORANGES
NES	CERELAC	MLP	MILUVIT
D.D.	DILAC 1	HOL	MIOLAC
D.D.	DIALAC 2	MOG	MORINAGA
MYB	ELDACID 1	DUT	MORNY
MYB	ELDACID 2	MYB	MY BOY
NES	ELEDON	NES	NAN
MYB	ELDORIN	MLP	NECTAR MILE 1
COW	FORMULA M	MLP	NECTAR MILE 2
CCF	FRSINFLAG	NES	NESTOGEN FULL CREAM
CCF	FRISOCREM	NES	NESTOGEN HALF SKIMMED

(Continued on next page)

Continued from ...... V6C Infant Formulas

NUT	NUTRICIA
NES	PELARGON
NES	PRODIETON
COW	SEPARATED MILK FOOD
ABT	SIMILAC
ABT	SIMILAC IRON
WYE	S M A
MYB	VITARINA

V 6D OTHER GENERAL NUTRIENTS

AVI	ANDOLIT
MLP	MILUPA
WAN	OVOMALTIN
MLP	MILUPA MILK & APPLE
MLP	MILUPA MILK & BANANAS
MLP	MILUPA MILK & MIXED FRUITS
MLP	MILUPA MILK & ORANGE

V7 ALL OTHER NON THERAPEUTIC PRODUCTS

V 7A OTHER NON-THERAPEUTIC

UPJ	GELFOAM
BOO	SWEETEX

فهرست کارخانه‌ای

در این فهرست داروها برحسب نام کارخانه سازنده طبقه بندی شده‌اند. هم کارخانه‌ها و هم داروها برحسب الفبا تنظیم شده‌اند. سه حرف سمت‌راست هر دارو نشانه کد درمانی داروست (برای شرح این کدها به طبقه‌بندی درمانی صفحه ۴۰ مراجعه کنید) .

فرآورده‌های داروئی	کد درمانی
ABBOTT	
BEJECTAL C	A11E
BEJECTAL C LIVER	A11E
ERYTHROCIN	J01F
NEMBUTAL	N5B3
PENTHRANE	N1A1
SELSUN	D11A
SODIUM BICARBONATE % 704	B5B
SUCARYL	A10B
TRAL Gradumet	A03A
TUBOCURARINE Chloride	M3A
VI DAYLIN	A11B
VI-DAYLIN With Iron	A11B2
ABIDI	
ACETOPHEN	N02B
AMINOPHYLLINE	C01E
ASKIN	N02B
BUTAPHEN	N02B
CAFIDON	M1A
CALMOBROME	N05B
CECIL	A11G
•CODIMAL	N02B
CORISAN	R05E
CORISAN Enfant	R5E
EFRINOSE	R01A
EFRINOSE B.B.	R1A2
FILLINE	A03D
FLURAZINE	N05A
FOLICOFER	B03A
GLYCEROVIT	A13A
HISTATWO	R05E
LIMOCITRIC Powder	A6A5
METHOVIT	A05B
MULTINE	A11B
MYALGINE	M02A
PARAZOLINE	A07A
PAREGUAN	A07A
PARMAL	R06A
PECTOCODE	R05D
PYRADINE Expectorant	R05F
SALICO	M1A2
SEDORMA	N05B
SINADUR	D03A
SIPAT	N02B
THEOLITE	R05C

فرآورده‌های داروئی	کد درمانی
THEO LITE Tab.	R5C2
TRANQUINE	N05A
TRI – S	J3B
TUSSICOF	R05D
ALCON	
ALCONEFRIN	S01D
ISOPTO ATROPIN.	S01D
ISOPTO CARPINE	S01D
ISOPTO CETAMIDE	S01A
ISOPTO CETAPRED	S01C
ISOPTO MAXIDEX	S01D
ZINCFRIN	S01D
ALLARD	
BOURGET INOSITOL	A05C
BOURGET-INOSITOL Tab.	A5C
NORMACIDIN	A02A
ALLEN & HANBURYS	
ACRIFLEX	D08A
ALLERGIN	D04A
B COMPLEX	A11E
B 300	A11D
BECOTIDE	R03A
CALCYDIC	A12A
DEQUADIN LOZENGES	G01A
DEQUADIN PAINT	R02A
DEQUALINE Pessaries	D07B
ETHNINE	R05D
FENTAZIN	N05A
HALIBORANGE	A11C
HELMEZINE	P01B
NEPOL	B03B
PIRITON	R05C

فرآورده‌های داروئی	کد درمانی
PIRITON Expectorant	R06A
RIOPAN	A02A
SCOLINE	H3A
ST. DARRON	B05B
ST. DEXTROSE WATER	B05B
ST. NORMAL SALINE	B05B
ST. RINGER	B05B
ST. SOD. CHLOR.	B05B
ST. SOD. CHLOR. DEX	B05B
VI-NUPHOS	A13A
VITAMIN A	A11C
ALLERGAN	
ALBALON	S01D
ALLERGAN SOAKARE	D8A
BLEPH 10	S01A
BLEPH 30	S01A
BLEPHAMIDE	S01C
CHLOROPTIC	S01A
CONJUNCTIN	S01A
EPIFRIN	S01D
FML. Liquifilm	S01B
FML NEO	S01C
HERPLEX	S01D
HMS	S01B
HYDROCARE	S01D
LC 65	S01D
LIQUIFILM TEARS	S01D
LIQUIFILM WETTING	S01D
POLYSPECTRIN S.O.P.	S01A
PREFRIN A	S01D
TOTAL	S01D
AMERICAN APOTHEC	
SALVITAE	A02A
AMSTER. (A.C.F.)	
ACEFLAGINE	N02B

فرآورده‌های داروئی	کد درمانی
ANKERMANN	
MILGAMMA	A11D
ARCHIFAR	
FUROCYCLIN	G04A
ARCO	
ARCOBUTINA	M1A
ARON	
ARGYROPHEDRINE	R01A
GLUCOPHAGE	A10B
GLUCOPHAGE Retard	C01D
IRRIGOR	C01D
ASTA	
AVAFORTAN	A03A
AVAMIGRAN	N02C
CURARIN	M3A
DOLO ADAMON	A03D
ENDOXAN	V02B
HONVAN	V02B
SUCCINYL	M03A
TRANQUO ADAMON	A03C
ASTRA	
APTIN	C07A
APTIN DURULES	C1D2
ASCOXAL	A01A
ASCOXAL–N	A1A1
BRICAN	R03A
HEMINEVRIN	N05B
JECTOFER	B03A
KALIUM DURULES	A12B
KINIDIN DURULES	C01B
SECERGAN	A03A
TIKACILLIN 600,000	J01H
TIKACILLINE 1,000,000	J1H
XYLOCAINE Injection	N1A2

فرآورده‌های داروئی	کد درمانی
XYLOCAINE Ointment	D04A
XYLOCAINE Spray	N01B
XYLOCAINE HEAVY	N01B
XYLOCAINE VISCOUS	N01B
XYLOPROCT Ointment	C05A
AVICENNE	
ANDOSALT	A02A
AVIPULMINE	R05D
BABY BRONCHE	R05C
BISMUPAN	A02A
DENTIFECTE	A01A
FUMA GRIPPE	R01A
SORBAX	A05A
AYERST	
COLPRONE	G03D
ENZACTIN	D01A
ISORDIL	C01D
PREMARIN	B02B
PREMARIN	D03A
PREMARIN P.M.B.	G02C
PREMARIN P.M.T.	G03C
BANEW	
COLISTINE	J01K
BANYU	
ANGININ	C01D
BIOTAMINE	M1A1
BAXTER	
ALCOHOL Dextrose in Water	B5B1

فرآورده‌های داروئی	کد درمانی
CALCIUM LEVULINATE	A12A
DARROW'S SOLUTION	B5B2
DEXTROSE IN SODIUM CHLORIDE	B5B1
LACTATED RINGERS (HARTMAN'S)	B5B3
MOLAR SODIUM LACTATE	SB5
PERITONEAL DIALYSIS	B5D
SODIUM BICARBONATE	B5B
SODIUM CHLORIDE	B5E
SODIUM CHLORIDE INJECTION	B5B3
TRANSFUSO-VAC	B5B1
TRINIDE	C6A
VACOTRAN	B5A1
BAYER	
ADALAT	C01D
ADIRO	M01A
ASPIRINE	N02B
BAYER'S TONIC	A13A
BAYOLIN	M02A
BENDIGON	C02C
BINOTAL	J01C
CANESTEN	D01A
COMITAL L	N03A
DETIGON	R05D
DOLVIRAN	N02B
EPONTOL	N1A2
IVERSAL	R02A
LASONIL	C05B
LUMINAL	N05B
LUMINALETTES	N05B
OLETRON	A07A
OSPOLOT	N03A
PADUTIN	C04A
POLYVITAMIN "Bayer"	A11E
REFAGAN	R05A
RESOCHIN	P01D
SPASMO DOLVIRAN	A03D
TRASYLOL	V03A
UVILON	P01B
YOMESAN	P01B
BEAUFOUR	
ACTAPULGITE	A07B
GASTROPULGITE	A02A
INTETRIX	A07A
BEECHAM R.	
AMPICLOX	J01C
BROXIL	J01H
ORBENIN	J01H
PENBRITIN	J01C
BEIERSDORF	
TUSSIPECT Codeine	R05C
BELP	
LIBEROL Ointment	R04A
BENCARD	
AMOXIL	J01C
FLOXAPEN	J01H
PLEXAFER	B03A
BENZON	
BENZOFLEX	M01A
MOBUTAZON	M01A
NATUSAN	D08A
BERNA	
ANNEXINE	J07A
ASPASTIN	A3B
CALMICOR	C06A
DIPHTHERIA Antitoxin	J6A

فرآورده‌های داروئی	کد درمانی
Di Te Anatoxal	J6A
Di Te Per Anatoxal	J6A
Di Ti Tab Vaccine	J7A
GLUBUMAN	J6A
GONOCOCCIC Vaccine	J7A
INSULIN	A10A
INSULIN PROTAMINE ZINC BERNA	A10A
MORATEN	J6A
POLIMYELITIS Vaccine	J7A
PYRALVEX	A1A
RODANEX	C5A
RHESUMAN Berna	J6A
SERUM ANTITETANIQ	J6A
TAB VACCINE	J7A
TETANUS Antitoxine	J6A
TOSUMAN	J6A
BERTHIER DEROL	
TRISIBAM	A02A
BIOBASAL	
HISTAGLOBINE	J06A
BIOCHEMIE	
SEDOVIT	NB5
BIOCODEX	
ULTRA LEVURE	A07C
BIOTHERAX	
PHOSPHALUGEL	A02A
BOEHRINGER I	
ADUMBRAN	N05A
ALUPENT	R03A
BISOLVOMYCIN	R05C

فرآورده‌های داروئی	کد درمانی
BISOLVON	R05C
BUSCOPAN	A03A
BUSCOPAN COMPOSITUM	A03D
CATAPRES	C02B
CATOVIT	N06B
CHOLIPIN	A05A
DULCOLAX	A06A
EFFORTIL	C01C
FINALGON	M02A
LAMORAN	C2A
PERSANTIN	C01D
PERSUMBRAX	C01D
SEDA PERSANTIN	C01D
SOLU-PARAXINE	J1B
SILOMAT	R05D
SYMPATOCARD	C01C
SYMPATOL	C01C
TRANQUO BUSCOPAN	A03C
BOEHRINGER M.	
ALGAPHAN	N02B
APONAL	N06A
CALCISTIN	R06A
COMBUR TEST	V4B
DORITAL	A02A
EUGLUCON	A10B
GYNAECOSID	G03F
MODENOL	C02C
PARAXIN	J01B
TRIZYMAL	A9A
BOOTS	
A.M.C.	A01A
BRUFEN	M01A
BURNOL	D08A
CHERRY COUGH	R05D
CREMAFFIN	A06A
FENOX	R01A
FIGINE	A06A
GRIPE MIXTURE	A02A
MELSEDIN	N05B
PAXIDIN	N02B

فرآورده‌های داروئی	کد درمانی
PROTHIADEN	N06A
STREPSILS	R02A
SWEETEX	V07A
WHOOPING COUGH	R05D
BOUCHARA	
NEO CODION	R05D
NEO CODION Adult	R5D1
NEO CODION Enfant	R5D1
THIOBANZYME	A11D
BOUILLET	
•BISMUTH TULASNE	A02A
BOUTY	
DENTOVAX	A01A
BRISTOL	
BRISTACIN–A	J01A
CEFATEREXYL	J01D
KANTREX	J01K
NALDECOL	R05E
PALITREX	J01D
PENTREXYL	J01C
PROSTAPHL IN	J01H
PROSTAPHLIN A	J01H
TETREX	J01A
UROPOL	G04A
BRUNEAU	
CHIMIOPHYLLINE	R03A
CHIMIOPHYLLINE BUT	R03A
DIE TELMIN	P1B
BRYANT	
MULTIVITAMINE	A11B

فرآورده‌های داروئی	کد درمانی
BYK GULDEN	
ORTHANGIN	C06A
TOMANOL	M01A
CENTRAL PHAR-MACAL	
CENASERT	G01A
GLUCITOL	A09A
CHANTEREAU	
ATRICAN	G01A
MUCINUM	A06A
SOLUBACTER	D08A
SYMPATHYL	N05B
CHARPENTIER	
BOLDOLAXINE	A06A
CHEMIFARM	
SELENOL	D11A
CHEMOFUX	
FOR TRAVEL	A04A
SPASMOCOR R	C01D
CHIBRET	
CHIBRO-ANALGOZINC	S1D
CHIBRO BORALINE	S01D
CHIBRO IODO CALCIQUE	S01D
CHIBRO-PILOCARPINE	S1D
CHLORAMPHENICOL	S02A

فرآورده‌های داروئی	کد درمانی
CHLORAMPHENICOL + SULFACETAMID	S1A
CHLORANSULFA	S01A
DACRINE	S01D
DIFRAREL E	C05C
DIFRAREL 100	C05C
OLEOSORBATE 80	S03D
PILOCARPINE Chibret	S1D
SULFACETAMIDE Chibret	S1A
VITAMIN A Ointment	S01D
CHIESI	
LIOMETACEN	M01A
METACEN	M01A
CHIGAII	
ANTEPSIN	A02A
CHOAY	
A C T H	H01A
ALPHACHYMOTRIPSINE	A09A
ALPHACHYMOTRIPSINE	B06A
CALCIPARINE Amp.	A12A
CAPRAMOL	B02A
EXTRAIT THYROIDIEN	H03A
HEPARINE	B01A
HEPATIQUE	A05B
P C B	BCB
SULFATE DE PROTAMINE	B2A
THYROBOLIN	H03A
CIBA	
ADELPHAN	C02A
ADELPHAN ESIDREX	C02C
AMBILHAR	P1A
ANTISTINE	R06A
ANTISTINE PRIVIN	R01A
ANTRENYL'	A03A
ANTRENYL Duplex	A3A
CARBANTRENE	A07A

فرآورده‌های داروئی	کد درمانی
COAGULENE	B02B
CORAMINE	C01C
CORAMINE EPHEDRINE	R03B
DIANABOL	A14A
DIANAVIT	A14A
ENTERO VIOFORM	A07A
ESIDREX	CO3A
FEMANDREN M	G03E
GLYVENOL	C05C
ISMELINE	C02B
LOCACORTENE VIOFORM	D07B
MEXAFORME	A07A
MEXASE	A09A
NAVIDREX	C03A
OTRIVINE	R01A
PERCORTENE	H02A
PLIMASINE	R06A
PRISCOL	C04A
PRISCOPHENE	N05E
PRIVINE	R01A
RIMACTANE	J01K
RITALIN	N6B
SERPASIL	C02A
SERPASIL ESIDREX	C02C
SPASMO CIBALGINE	A03D
SPASMO CIBALGINE Comp	A3D
TRASICOR	C07A
TRIDLANDREN	G03B
ULTRACORTENOL	D07B
VIOFORT	D08A
CILAG	
CILOPRINE	S02D
CILOPRINE ANAESTHETICO	S2D
PARAFLEX	M03B
PREDNIFLEX	M01B
RETIN A	D10A
CLIN BYLA	
DOREVANE	N05B

فرآورده‌های داروئی	کد درمانی
PADERYL	R05D
PLEGICIL	N05A
TRANXENE	N05A
VITAMARCIDERME	D2A
COD LIVER	
SEVEN SEAS	A11C
CONTINENTAL PHARMA	
DROXARYL	M01A
KANACILLIN	J01H
MERVAN	M01A
VIONEURIN	A11D
VIOEURIN 6	A11D
CORBIERE	
CALCIUM	A12A
RECTOIDAL	C05A
COW & GATE	
FORMULA M	V06C
DAGRA	
DAGRAVIT B COMPLEX	A11E
DAGRAVIT TOTAL B	A11B
LIPOLIT	A13A
DAIICHI	
GAMMALON	V03A
TRANSAMIN	B2A

فرآورده‌های داروئی	کد درمانی
DANIEL BRUNET	
BISMUTH MUCILAGE	A02A
DAROU PAKHSH	
ALMACARB	A02A
ANCARDONE	C01C
ANCOFEN	N02C
ARAMIN	N02B
CALCIGRAN	A12A
DILOSYN	R06A
IRACEVIT	A11G1
MULTIVITAMINE	A11B4
MYCIL	D1A1
OESTROFORM	G3C
PECTAMOL	R5D
PENICILLIN	J1H
SECRODYL	G3F
VITATEN	A11B4
DAUSSE	
INTRAIT DE VALERIANE	A7A
PERVINCAMINE	C4A
SOLURUTINE	C2B
DEBAT	
NIBIOL Fort	G4A
TADENAN	G4A2
DELAGRANGE	
DOGMATIL Fort	A4A
NAUTAMINE	A4A
PRIMPERAN	A4A
DELALANDE	
DIREXIODE	A7A

فرآورده‌های داروئی	کد درمانی
ETAPHYLLINE	
ETAPHYLLINE Phenobarbital	CIC
ETAPHYLLINE Pherobarbital Papaverine	CIC
ICTERYL	ASA
KHELLINE	A3A
PRIADEL	N6A
SOLUCAMPHRE	R5D
SORBITOL	A5A
DELCON	
A P P	A2A
CARDIACAP	C1D
DEANASE	A9A
NEO HEPACON	A13A
DENVER	
ANTIPHLOGISTINE	M2A
DENCORUB	M2A
DERMON	
GERODERM	D8A
GERODERM NEUTRO	D8A
GERODERM ZOLFO	D8A
DESITIN	
DESITIN	D3A
DIADAL	
DIALAC	
LITRADERM	D7B2
DIAMANT	
DIACORTICIN	D7B1
FRUGALAN	A08A
DOLDER	
BUDODOUZE FORT	A11A
DOPAR	
A + D	A11C
ANTIPHLOGISTIN RUB	M2A
ARGYROL	S01D
B 300	A11D
BEVITA	V6D
BORATE ADRENALINE	S1D
DIONIN	S01D
HEPARINE	S1D1
MAL HISTIN	R06A
NAPHTAZOLIN ANT	S01D
PROMETHAZINE	R06A
REDURIC	M04A
TRANQUIPAM	N05A
DUMEX	
COLIMEX	A07A
COLIMEX	J01K
COLISTOP	A07A
DOPAMET	C02B
NAMEX	Vo6C
DUPHAR	
DUPHASOL	A11C
DUPHASOL A	A11C
DUPHASOL A D	A11C
DUPHASTON	G03D
DUVADILAN	C04A
DYSPNE INHAL	
DYSPNE INHAL	RO3

فرآورده‌های داروئی	کد درمانی
EATON	
FURACIN Soluble Dressing	D8A
FURACIN Soluble Powder	D8A
FURACIN Urethral Inserts	D8A
FURACIN Solution	R01A4
FURADANTIN	G04A
FURADANTIN Sodium	G4A2
FUROXONE	A07A
MACRODANTIN	G04A
TRICOFURON Vaginal Suppositories	G1A2
EBEWE	
NEO KLIMASTILBEN	G03C
NEURO GLUTAMIN	A13A
NICOTHERM	M02A
EGIC	
ASPEGIC	N02B
EJICE	
BILICANTE Capsules	A05A
EJIDOX	H02A
EJIFICOL OVULES	G01A2
EJIFICOL SUCCINAT	J01B
EJIFICOL	J01B
EJIFICOL OTIC	S02A
EJISIX	A11H
ELI LILLY	
AVENTYL	N06A
CO PYRONIL	R06A
DIMELOR	A10B
DOLOXENE Compound	N02B
ILOSONE	J01F
KEFLEX	J01D
KEFLIN	J01D
KEFLODIN	J01D
ONCOVIN	V02A
TAPAZOLE	H03B
TES TAPE	V04B
TRINSICON	B03A
VELBE	V02B
ENDO	
COUMADIN	B01A
ENDO GLOBIN	B03A
MESOPIN	A03A
MESOPIN P B	A03D
ERBA	
KEMICETINE	J01B
NEO-TIZID	J4A
ERCOPHARM	
AEROPAX	A02A
ASMI	R03A
ERCORIL	A03A
GLAUPAX	S01D
HYPERPAX	C02B
KLIMERCO	G03C
EVA	
BOURGET INOSITOL	
SORBEX	A5A
VITA.C. EVA FORTE	A11G1
FABRIC	
STERILLIUM	V05A
FARABI	
OXYPEL	P01B

فرآورده‌های داروئی	کد درمانی	فرآورده‌های داروئی	کد درمانی
FARMITALIA		**FRAYSSE**	
ADRIBLASTINA	V02B	CEPEVIT K	B02B
EPARGRISEOVIT	A05B	FONGITEX	D01A
FARLUTAL	G03D	LESPENEPHRYL	G04B
FARMICETINA	J01B	LESPENEPHRYL Injectable	G4B2
GABROMICINA	J01K	LYSO 6	A01A
GABRORAL	A07A	SITOCIDINE	G01A
KATABIOS	A11B		
STERANABOL	A14A		
TROFODERMIN	D06A	**FREDERICK**	
VENEMA	B03B	CERUMENEX	S02D
FAURE		**FROMONT**	
VITA IODUROL	S01D	NEUTROGENA	D08A
VITA 3	S01D		
		G.PHOL.BOSKAMP	
FAZ		NITROLINGUAL	C01D
BE,BE. FAZ	R5A		
FAZ INHALER	R04A		
PECTO BROME	R05C		
RHINO FAZ	R01A	**GEIGY**	
		BUTAZOLIDINE	M01A
		BUTAZOLIDINE ALKA	M01A
FERROSAN		DELTA BUTAZOLIDINE	M01B
A B C D	A11B	EURAX	D04A
BEVIPLEX	A11E	HYGROTON	C03B
IDO-CAMIN	A11C3	HYGROTON	C02C1
IDO-TONICUM	A13A	INSIDON	N06A
PARADRYL	R06A	MEDOMINE	N05B
PARADRYL EXPECT	R05C	MICOREN	R03B
QUILLA	R05C	SINTROM	B01A
QUILLA SIMPLEX	R5C2	SIOSTERAN	A07A
		STEROSAN	B08A
		STEROSAN HYDRO Corisone	D07B
FISONS		SYMMETREL	N04A
IMFERON	B03A	SYNOPENE	R06A
INTAL	R03A	TANDERIL	M1A1
		TEGRETOL	N3A
		TOFRANIL	N06A
FOURNIER		TROMEXAN	B01A
DENDRAL	R05E		

فرآورده‌های داروئی	کد درمانی
GEISTLICH	
DIPASIC	J4A
GT 50	M1A2
GLAXO	
ADEXOLINE	A11C
ALTHESIN	N1A1
ANETHAINE	D4A
BETNESOL Injection	H2A1
BETNESOL	H02A3
BETNESOL N	S01C
BETNELAN Intra Articular Injection	M1B
BETNESOL Retention Enema	D7A
BETNOVATE	C05A
BETNOVATE	D07A
BETNOVATE C	D07B
BETNOVATE N	D07B
CALCI OSTELIN B12 Amp.	A12A
CALCI OSTELIN B12 Syrup	A12A
CEPORACIN	J01D
CEPORAN	J01D
CEPOREX	J01D
CODOPYRIN	N02B
CYTAMEN	A11F
CYTAMEN B1	A11D
CYTATON	A11F
DERMOVATE	D07A
DIONOSYL	V4A
FERSOLIN	B03A
GRISOVIN F.P.	D01A
MINADEX	A13A
MYODIL	N04A
NEO CYTAMEN	A11E
OSTOCALCIUM	A12A
SECLOPEN	J1H
TRICLORYL	N05B
TRIPLOPEN	J01H
GOL	
BISMOGOL	A7C
GOLGARINE	A06A
IODOGOL	H03D
IODOGOL PHOSPHATE	H3C
PECTOGOL	R5D2
GRUENENTHAL	
CITOCILLIN	J01C
DIDROSULFON	S01A
GRUNICYCLINE	J1A
MEGACILLINE	J01H
MEGACILLINE FORT	J1H
SILUBIN Retard	A10B
SYNALAR N	D07B
GUERBET	
DIMER X	V04A
DUROLIOPAQUE	V04A
LIPIODOL Ultra Fluide	V04A
ORABILIK	V04A
TELEBRIX 38	V04A
VASURIX POLYVIDONE	V04A
GUIGOZ	
GUIGOZ	VO6C
HADENSA	
HADENSA	C5A2
HANKEL	
LAUDAMONIUM	DO8A

فهرست کارخانه‌ای

فرآورده‌های داروئی	کد درمانی
HAUSMANN	
EURHYTON	C6A
FERUM S R	303A
HEPATROL	
ACTIVAROL C 500	A13A
FOIE LYOPHILISE	A5B
HEPATROL	B3B
NICICALCIUM	A12A
P.I.E.M.	J4A
SYNERGON	G3F
HEUMANN	
CARD OMPIN	C6A
SOLUGASTRIL	A2A
UROSPASMON	G4A
HOECHST	
AVIL	D4A
BARALGIN	A3D
BERIGLOBIN	J6A
CANTACIN	R5A
CLIACIL	J01H
DAONIL	A10B
D P T Vaccine	J7A
FESTAL	A9A
FESTAVITAL	A9A
HALOTHANE	N1A
HEMACCEL	B5A
HOSTACILLINE (aqu. d.)	J01H
HOSTACORTIN H	H2A
HOSTACYCLINE	J1A
JADIT	D1A
JADET H	D7B
LASIX	C3B
NOVALGIN	N2B
OMNACILIN	J1H
RASTINON	A1B
REVERIN	J1A
SEGONTIN	C01D
STREPTOMYCINE	J01G
TERBOLAN	C2C
TRENTAL	C4A
HOLLAND	
MIOLAC	V6C
HOMBURG	
CAPTAGON	N6B
ILDAMEN	C01D
SEDA ILDAMEN	C01D
HOUDE	
BOLDINE	A5A
COLCHICIN HOUDE	M4A
COLCHIMAX	M4A
COLCHIPYRINE	M4A
GLYO 6	C4A
HYDROQUINIDINE	C1B
LEVOGLUTAMINE	N6B
NEUTRAPHYLLINE Phenobarbital	C1E
NEOTRAPHYLLINE Papaverine Phenobarbital	C1B
HOUR	
SEVAL	N5B4
I.B.I.	
IBIAMOX	J1C
IBILEX	J1D
I.C.I.	
ATROMID S	B4A
ARCOCILLIN	J1C
CETAVLON	D8A
ERALDIN	C1D1
FLUOTHANE	N1A

فرآورده‌های داروئی	کد درمانی
HIBITANE	D8A
INDERAL	C1A
KETRAX	P1B
MYSOLINE	N3A
NOLVADEX	V2B
SAVLON	D8A
TENORMIN	C7A
I.D.I.	
ANALGEC	A3D
CEPHALOMEX	J1D
ERYTHROMEX	J1F
GASTRYL	A2A
KAPECT	A7B
KAPECT P	A7B
LONGINE	N6B
MUCOLIN	R5C
NORMOLIT	B5B2
NEUROLIBRINE	N5A
NUTRIPLEX	A11B
PENTIMYCIN	J1C
VASOLEX	304A
IBSA	
BENECIL	J1H
PENIMOX	J1C
PENTRICIN	J1C
PROPACIN	J1C
ICAR	
BIOCOSTENE	A13A
DEVALIL CORTISONE	D7B
ICARSAN	M2A
IMEKO	
KANNY	V6C

فرآورده‌های داروئی	کد درمانی
IMMUNO	
FIBRINOGEN HUMAN	B2A
GAMMAGLOBULIN HUM.	J6A
PERBULIN	J6A
TETABULIN	J6A
INNOTHERA	
NOBACTER	D8A
IRAN DRUG	
CALORIT	A13A
SULFARIN	D11A
VICILIN	J1H
ISM	
HUMAN IMMUNE GLOBULINS	J6A
J.R. FREYSSINGE	
GASTRHEMA	B3B
JACQUEMAIRE	
BLEDINE BANANE	V6C
BLEDINE RICE	V6C
KABI	
RESTENYL	N5A
SELUKOS	D11A
KIRBY	
PURITABS	V5A
KLOSTERFRAU	
FUCA EXCELLENT	A8A

فرآورده‌های داروئی	کد درمانی
KNOLL	
AKINETON	N4A
ISOPTIN	C1D
ISOPTIN S	C1D
MULTIFUNGIN	C1A
OSADRIN	D1A
PARACODINE	M1A
TALUSIN	C1A
KREMERS URBAN	
KUDROX	A2A
LEVSIN P.B.	A3D
NITROL	C1D
URBAMIN	A15A
LABAZ	
ADRENOXYL	B2A
AMPLIVIX	M4A
CORDARONE	C1D
FRAGIVIX	C5C
MICROLAX	A6A
PRINCI B	A11D
LAKESIDE	
CANTIL	A3A
DACTIL OB	A3A
DACTILASE	A9A
IRCON OB	B03A
NORPRAMIN	N6A
PIPTAL Drop	A3A
PIPTAL Tab.	A3D
LALON	
PRODERMIDE	D11A
LATEMA	
ACIDRINE	A2B
ALGESAL	M2A
PRESSYL	C1C

فرآورده‌های داروئی	کد درمانی
SULFARLEM	A5A
SULFARLEM CHOLINE	A5A
LEDERLE	
ACHROMYCIN	D6A
ACHROMYCIN	J1A
ACHROMYCIN	S1A
AQUAMOX	C2C2
ARTANE	N4A
AUREOCORT	D7B
AUREOMYCIN	S1A
AUTRIN	B3A
DELPHICOL	A5B
DIAMOX	C3B
FILIBON	A11A
GEVRAL	A11A
GEVRAL PROTEIN	V6B
GEVRINE	A11A
LEDERCORT Acetonide	D7B
LEDERCORT	H2A2
LEDERKYN	J3A
LEDERMYCIN	J1A
LEDERPLEX	A11E
METHOTREXATE	V02B
METHOTREXATE	V02A
MINOCIN	J02A
PERIHEMIN	B3A
PRENATAL	A11A
THIOTEPA	V2A
VIDELTA	A11C
LEK	
AMINOPHYLLINE	R03A
LEMATTE & BIONOT	
HEPAREXINE	A05B
NICOBION 500	A11H
NICYL	C04A
NICYL B6	C04A
NICYL PAPAVERINE	C04A
NOVACYL	B04A

فرآورده‌های داروئی	کد درمانی
TONICORINE	C1C
LEO	
CALCIPEN	A12A
PLURYL K	C03A
PLURYL K R	C02C
LEO SWEDEN	
ESTRADURIN	G03C
LEPETIT	
AMBRAMYCIN	D06A
AMBRAMYCIN	J01A
BABY RHINOL	R05A
BETASALYL	M1A2
C-TAB	A11G1
DYSTAZINE	A03C
EQUILID	N05A
FEMIDOL	N02B
LEPTINOL	H02A
MEPYRAL	R5C2
MEPYRAL EXPECTORANT	R05C
NEW C TAB	A11G
NEW PECTOVITE	R5D2
NISOLONE	R01A
OREX	S02D
PANBETIN	A11E
PASSAL	N02B
PECTO BEBE	R05C
PERTRANQUIL	N05A
PHYSIO HEPATOL	A05B
PLASIL	A04A
PREDNISOLON	H02A
RIFADIN	J01K
RIFOCIN	S1A
RIFODERM	D07B
SYNTOMYCETINE	G01A
SYNTOPHTON	S01C
TETRA AMBEZIM	J01A

فرآورده‌های داروئی	کد درمانی
LINZ	
INSTENON	C04A
IPRADOL	R03A
TOSMILEN 0.25	S01D
USTIMON	C01D
USTIMON COMOSITIUM	C01D
LUITPOLO	
CLAUDENE	B02B
COMBIZYM	A09A
HIRUDOIDE	C05B
MOBILAT	M02A
MONOTREAN	A04A
TONATONE	A13A
LUNDBECK	
ALLOPURIN	M04A
AMPHISOL	R3B
FLUANXOL	N05A
NORTRILEN	N06A
SAROTEN	N06A
SORDINOL	N5A2
LYOCENTRE	
ANTIBIOPHILUS	A07C
ENZYLAC	A09A
GASTROPYLORE	B03B
HELIOFER	B03A

فرآورده‌های داروئی	کد درمانی
MACK	
FORAPIN	M02A
MADAUS	
LITHOLEN U	G04B
REPARIL	C05C
MARCOPHARM	
BE.BE. TUSSIN	R5C
MARIN	
BEBECALMINE	N05B
BECOMARINE	A11E
BROMARINE	N05B
BUCASEPTOL	A01A
CALCIMARIN	A12A
DERMEX	D06A
LIVER TONIC	B03A
OTIMARIN	S02A
PABEX	A11E
PARAGARINE	A06A
PULMOTON	R05C
RHINOMARIN	R01A
RHUMACIO	M02A
VITASSEL	A05A
MARTINET	
PANGADUINE	B03B
MATERNA SULGEN	
MATERNA	V06C
MAUCHANT	
DESCLIDIUM	C04A
MAX	
ALBATUM	D4A
ALMAX	A02A
B B PYRINE	N02B
ENTEROCOLI MAX	A07A
MAXADRYL	R06A
MAXADRYL EXPECT	R05C
MAY & BAKER	
ANTHISAN	D04A
ANTHISAN	R06A
AVOMINE	A04A
GARDIN	N03A
INTRAVAL Sodium	N1A2
PROPAMIDINE	D08A
VALLERGAN	R06A
MCKESSON	
ALBAGAR	A06A
AQUADRIN	R02A
AXAR	N02B
AXON	R5D2
BECOF	R05C
BEVISED	N05B
BEXEL	A11A
CALOX	D08A
LAXMEL	A06A
MAGNEX	A02A
METORCIN	R05D
POSITOS	C05A
SURIN	M02A
MEAD JOHNSON	
DYNAPEN	J01H
FER IN SOL IRON	B03A
HICONCIL	J01C
QUIBRON	R03A
TEMPRA	N02B
VERSAPEN	J01C

فرآورده‌های داروئی	کد درمانی	فرآورده‌های داروئی	کد درمانی
MEDEXPORT		REVONAL	N05B
URODAN.	M4A	SCLEROBION	A11B
MEDICAMENTA		SEDAL MERCK	N02B
ARTRONEURIL	M01A	SOLUDACORTINE	H02A
NALISSINA	G04A	SORBOSAN	A05A
TRANQUIRIT	N05A	STYPTOBION	B02B
MEDINOVA		ULTRACARBONE	A07B
LENTRAT	C01D	VIGANTOL Fort	A11C
LENTRAT A	N5B2	**MERCK SHARP & Dohme**	
NITROLENT	C01D	ALDOMET	C02B
MEIJI		BENEMID	M04A
KANAMYCIN	J01K	BLOCADREN	C07A
MEIJI	V06C	DECADRON	H02A
MERCK AG		DEPROPANEX	C06A
CEBION	A11G	DICHLOTRIDE	C03A
CEBION CALCIUM	A12A	EDECRIN	C03B
DAMETIN	P01A	HYDROMET	C02C
DECODERM 3	D07B	HYPOBETA	A11E
DOLO NEUROBION	A11D	INDOCID	M01A
ENCEPHABOL	N06B	MINTEZOL	P01B
EPHETONINE Syrup	R05D	MODURETIC	C03A
EUPACO	A03D	NEO DECADRON	S01C
EVION	A11H	PERIACTIN	R06A
GEROBION	A11B	SINEMET	N04A
HORMOGEROBION	A11B	TRYPTIZOL	N06A
HORMO-GEROBION Tab.	A11B3	**MERRELL TORAUDE**	
ILIADINE	R01A	BACTISUBTIL	A07C
MULTIBIONTA eff.	A11B4	CAMPHOPNEUMINE	R05C
NEO VOGAN	A11C	CAMPHOPNEUMINE Be'Be'	R5C2
NEOBAR	V04A	CLOMID	G03G
NEUROBION	A11D	COGITUM	N06B
NOVOTHYRAL	H03A	**METADIER**	
NUTRIZYME	A09A	KALAMIN	N2B
OMNIBIONTA	A11A		
PASUMA Forte	G03B		
PECTAMED	R05D		
POLYBION	A11B		
REACTIVAN	N06A		

فرآورده‌های داروئی	کد درمانی
MIDY	
ALPHA KADOL	M02A
MIDALGAN	M02A
MIDY BISMUTH GEL	A2C
PIPERAZINE	M04A
POLYSILANE	A02A
POLYSILANE REGLISSE	A2A4
THIODERAZINE	M1A2
MILCO	
BABY MILEX	V06C
MILLOT	
DECHOPHYLINE	A5A
DECHOPHYLINE	A5A
Phenobarbital	A05A
INOPHYLLINE	C01C
INOPHYLLINE PAPAV.	C01C
INOPHYLLINE SED	C01C
PERVON	C04A
MILUPA	
MILUPA	V06D
MILUPA FOOD	V06C
MILUPA MILK	V06C
MILUVIT	V06C
MINA	
ALERTONIC	A13A
AMPICO	J01C
B–M SYRUP	R5A
BABY LIFE	N05B
BUTABAR	N05B
C.M.	A11G
CALMINA	N02B
CEFALIN	J01D
CESTOCIDE	P01B
CREMO S P K	A07A

فرآورده‌های داروئی	کد درمانی
FURAN	A07A
METHALAX	A6A2
METORPAN	R05D
MINALGIN Enfant	R5A
MINA BRONCHE	R05C
MINA BRONCHE B B	R05C
MINACETAMIDE	S1A
MINA INHALER	R03A
MINALGIN	R05A
NIKETHON	C1C
OTINOL	S02A
OTOGIN	S02A
PANTOCREAM	D07B
PECTON TAB.	R5D2
PECTON	R05D
R–M	M02A
S P K	A07A
SOLPIPER	P01B
SOLVIT	A11B
TENICIDE	P1B
V.m.	N05A
MORINAGA	
MORINAGA	V06C
MY BOY	
MY BOY	V06C
MY BOY ELDACID	V06C
MY BOY ELDORIN	V06C
MYCINE	
CALMYCIN	M02A
D.G. DROP	A01A
D.G. POWDER	A1A
FURABEN	A07A
FURAZOL	D08A
HELMYCINE	P1B
HEPAMIN	B03B
NEO-DRIL	R6A

فرآورده‌های داروئی	کد درمانی
INHALMYCINE	R01A
KADLENE STREPTO	A07A
MYCIDON	N02B
NEORIL	R06A
PECTOMYCINE	R05B
REINOCHOLINE	A5A
SEDOMYCINE	N05B
SULFADERM	D06A
SULFAMYCIN	D06B
SULFAMYCIN Powder	D6B
TELMEX	P1B
VOMYCINE	A04A
MYCOFARM	
ACIPEN V K	J01H
AMFIPEN	J01C
PIMAFUCIN	G01A
PIMAFUCIN	J02A
PIMAFUCORT	D07B
VENDARCIN	J01A
NAPP	
NITROCONTIN	C01D
NATIVELLE	
CARDIOQUINE	C01B
DIGITALIN	C01A
NATIDIGOXINE	C01A
NATISEDINE	C01A
NESTLE	
AROBON	V06C
CERELAC	V06C
ELEDON	V06C
NESTOGEN	V06C
NICHOLAS	
NEO MERCAZOLE	H03B
PALAPRIN	N02B

فرآورده‌های داروئی	کد درمانی
RENNIE	A02A
NORDMARK	
ENZYNORMA	A9A
PANZYNORM	A9A
NOVO	
FENOXYPEN	J01H
INSULIN	A10A
PENILENT	J01H
NUTRICIA	
NUTRICIA	VC6
OM	
DICYNONE	B02B
DOXIUM	C05C
ONO	
ONOPROSE	A09A
OPOCHIMIOTHERAPIE	
ANTAL	A3B
PASSIBROMINE	N05B
ORGANON	
BENUTREX Otal	A11E
BENUTREX B 12	A11E
BENUTREX C	A11E
DAVITAMON 10	A11B
DECA DURABOLIN	A14A
DEXATOPIC	D07B

فرآورده‌های داروئی	کد درمانی
DI ADRESON F	H02A
DIMENFORMON	G3D
DIPRO Oleosom	G3F
DIPRO Emoltion	G3F
DOCA	H02A
DOCABOLIN	A14A
DURABOLIN	A14A
ESTANDORON PROLUNG ATUM	G03E
FERRO-BIFACTON	B3A
GESTANON	G03D
GESTYL	G03G
GESTYL TESTO	G03G
HUMEGON	G03G
INSULIN	A10A
LYNDIOL	G03A
ORGABOLIN	A14A
PAVULON	M03A
PREDASMAL	R03A
PREDNACYL	M01B
PREGNYL	G03G
PROGESTINE	G03D
STYPTANON	B02B
SUSTANON	G03B
SYNAPAUSE	G03C
TANTUM	M01A
THYRANON	H03A
ORMONOTER. RICHTER	
AMBEZIM	R03A
AMBEZIM BLASAMIC	R05C
ATIPI	C06A
CORTIPLEX	H02B
FLEBOCORTID	H02A
PANCORTIN 8 6	A04A
RUBROHEPAR B PLEX	B03B
ORTHO	
ACI JEL	G01A
DELFEN	G02B
DIENOESTROL	G03C
DINESTROL	G02C

فرآورده‌های داروئی	کد درمانی
MASSE	D03A
NUTRISAL	G2C
RARICAL	B3A2
SALPIX	V4A
SPOROSTACIN Cream	G01A
SULTRIN Cream	G1A2
SULTRIN Tablet	G1A1
OTTO MULLER	
ONE DROP ONLY	A01A
PARK	
ALGINAL	N02B
ARAM	N02B
MENTHAN	R5F
PECTOPARK	R05D
PULMOREGAL	R5D2
REGAFLORIN	N05B
RHINOPHENE	R01A
SEDACO	C5A2
PARKE DAVIS	
ABDEC	A11B
ALOPHEN	A06A
AMBENYL EXPECT	R05D
AMBODRYL	R06A
ARLEF	M01A
BARDASE	A03D
BENADRYL	R06A
BENADRYL EXPECT	R05C
BENAFED	R05D
BENYLIN	R05C
CALADRYL	D04A
CHLOROMYCETIN	J01B
CHLOROSTREP	J01B
COMBEX	A11E
COSANYL DM	R05D
DILANTIN	N03A
DILANTIN Phenobarbital	N03A
ELASE	B06A
ELASE CHLOROMYCETIN	B06A

فرآورده‌های داروئی	کد درمانی
GERIPLEX	A11A
HEPA-DESICOL	A5B
HUMATIN	A07A
KETALAR	N01A
METATON	A13A
MIDICEL	G1A1
MYLANTA	A02A
NATABEC	A11A
NORLESTRIN	G03A
PALADAC	A11B
PONSTAN	N02B
SYBRON	B03A
TAKA DIASTASE Fe	A09A
VANPAR	P01B
VANQUIN	P01B
ZARONTIN	N03A
ZYMET	A09A
PFIZER	
COMBANTRIN	P01B
CORTRIL	S01B
CORYBAN D	R05A
DELTACORTRIL	H02A
DIABINESE	A10B
FASIGYN	G01A
GEOCILLIN	J01H
GEOPEN	J01H
GIOPEN	J1H
HEPTUNA PLUS	B03A
KOMPENSAN	A02A
OBRON	A11A
ROERIBEG	A11E
SINEQUAN	N06A
TAO	J01F
TERRA CORTRIL	D07B
TERRAMYCIN	D06A
TERRAMYCIN Vaginal Tab.	G01A
TERRAMYCIN Interavenous	J01A
TERRAMYCIN Oph.	S01A
TERRAMYCIN Eardrop	S02A
TERRAMYCIN S F	J1A
TYZINE	R01A
UROBIOTIC	G01A

فرآورده‌های داروئی	کد درمانی
VIBRAMYCIN	J01A
VITERRA	A11A
PFRIMMER	
AMINOFUSIN L	B05B
PHARIA	
BE BE BROMINE	N05B
HISTOGAN EXPECTORANT	R05C
LIMOLAX	A06A
LIMAX	A6A5
PULMO-BEBE	R5D2
RHINO-GOUTTES	R1A5
RHUMACALMINE	M2A
PHARMACHIMIE	
BISMUTH PHARMACHEMIE	A02A
CENASERT	G1A2
FEBRECTOL	R5F
KALDIL	C4A
PHARMATON	
GERIATRIC PHARMATON	A11A
PHARMAX	
CANDEPTIN	G01A
CRINAGEN Cream	D11A
PEPTACOL	A03D
PIERREL	
LAURYLIN	J01F
PINHEIROS	
GYNECOLOGIC LYSOCILLIN	J1H

فرآورده‌های داروئی	کد درمانی
POLI CHIMICA	
MACMIROR	G01A
PORCHER	
MARCIDERM	D08A
VITA MARCIDERM	D03A
P. O. S.	
CHLORAMPHENICOL	S01A
CORTISONE	SIB
CORTOL	H2B
GEL V	D11A
HOMATROPINE	S010
IODOCOL	S01D
MIOTIN	S01D
NAPHTAZOLIN	S01D
NEO PHRINE	R01A
NEOMYCINE HYDROCORTTSINE	S01C
O.F.	S01C
OXYTETRACYCLINE	D06A
PILOCARPINE	S1D
PROCAIN ADRENALIN	S01D
SULFA BLU	S01A
SULFATE DE ZINC + Procaine	S01A
SULFATE DE ZINC	S01D
TETRACAINE	S01D
V–COLLŸRE (jell)	J5A
VITAMINE A	D03A
PROMEDICA	
LEUCODENINE B	D11A
MELADENINE	D11A
PROTO	
AMPY-PENYL	J01C
B–COLEX	A11D2
B COLEX B12	A11E
SYNALAR N	D7B1
PURDUE FREDERICK	
BETADIN	D8M
BETADIN	G1A2
X PREP	A06A
RABRO	
RABRO	A02A
RAMIN	
BENJOMIN	R1A
OTORAMIN	S02A
PECTORAMIN	R5C2
PECTORAMIN ENFANT	R5C2
PHOSVIQUIN	A13A
RAMINOL	M2A
RAMOUSUCCIN	A7A2
RECKITT & COLMAN	
DETTOL	D08A
RECTERS	
RECTER	A02A
RICKER	
MEDIHALER ISO	R03A
NORGESIC	M03B
RIT	
NEBASONE	S01C
RITA	
ABSEDENT	A01A
ENTERODIN	P01A
PARAMOL	N02B

فرآورده‌های داروئی	کد درمانی
ROBERT & CARRIERS	
DECONTRACTYL	M2A
HEPACHOLIN SORBITOL	A05B
ROBINS	
DIMETANE	R06A
DIMETANE EXPECTORANT	R05C
DIMETANE EXTEN TAB	R06A
DIMETAPP	R05E
DONNAGEL P G	A07B
DONNATAL	A03D
DONNATAL EXTEN TAB	A03D
DONNAZYME	A09A
ENTEROQUINE	A7A
ENTOCIMA	A09A
ROBAXIN	H03A
ROBAXISAL	M03B
ROBINUL	A03A
ROCHE	
AROVIT	A11C
BACTRIM	J01E
BECOZYME	A11E
BENADON	A11H
EPHYNAL	A11N
FLUORO URACIL	V028
GANTRISINE	J03A
KONAKION	B02B
LARODOPA	N04A
LIBRAX	A03C
LIBRIUM	N05A
LITRISON	A05B
MADOPAR	N04A
MADRIBON	J03A
MARPLAN	N06A
MOGADON	N05B
NATULAN	V02B
PROSTIGMIN	N07A
REDOXON	A11G
RONICOL	C04A
RONICOL Retard	C4A
ROVIGON	A11A
SUPRADYN	A11A
SYNKAVIT	B02B
VALIUM	N05A
ROGE	
DIACOL	A07A
GRIPIN	R05D
HISTIN	R06A
ROGER BELLON	
GLOBISINE	B03B
SYNERLAC	A7C
TRINITRINE Retard	C01D
TRINITRINE	C01D
ROLLAND	
COMBEY LAX	A06A
HEPATROL	B03B
F.I.E.M.	J04A
TROPHIRES	R05D
RORER	
ANANASE	V03A
EMETROL	A04A
MAALOX	A02A
ROSA	
CO PHYTOL	A5B
ROTER	
ROTER	A02B

Product	Code
ROUSSEL	
ADALGOR	M03B
BARDNORME	C02C
COLTRANYL	M03B
DECTANCYL	H02A
GLIFANAN	N02B
HEMOSTYL	A13A
HYDRO CORTISONE	S01B
HYDROCORTANCYL	H02A
MANDRAX	N05B
SEDO RYTHMODAN	C01B
SOFRADEX	S03C
SYNCORTYL	H2A1
TIFOMYCINE	J01B
TOPIFRAM	D7B
TRIDOCELAN	A11D
RUZA	
METHOPRIM S	J01E
ORANGIN	A11G
SANDERS	
HERBESAN	A06A
SANDOZ	
BELLADENAL	A03D
BELLADENAL Retard	A3D
BELLERGAL	N05B
BELLERGAL Retard	N5B4
BRINERDIN	C02C
CAFERGOT	N02C
CAFERGOT P B	N02C
CALCIBRONAT	N05B
CALCIUM	A12A
CALCIUM SANDOZ Forte	A12A
CEDILANIDE	C01A
DIGOXINE	C01A
DIHYDERGOT	N02C
FERRONICUM	B03A
HYDERGINE	C04A
INTESTOPAN	A07A
IPESANDRINE	R05D
MELLERIL	N05A
METHERGINE	G02A
OPTALIDON	N02B
PARLODEL	G03C
SANDOVENE F	C05C
SYNTOCINON	G02A
TAVEGYL	R06A
TONOPAN	N02B
TORECAN	A04A
SANKYO	
AZALOMYCINE-F	J1K4
SAREP	
PASSIFLORINE	N05B
SARGET	
SARGENOR	A13A
CARDIOQUINE	CIE
SAVA PHARM	
SULFASALAZINE	A7A1
ALLUPURINOL	M04A
SCHERING AG	
ABLACTON	G03E
ANTERON	G03G
ANGIOGRAFIN	V4A
BILIGRAFIN	V04A
BILOPTIN	V04A
DEPOSTAT	V02B
DEXA SCHEROSON	H02A
ENDOGRAFIN	V04A

فرآورده‌های داروئی	کد درمانی
EUGYNON	G03A
GONDAFON	A10B
GRAVIBINAN	G03F
KANORMAL	A06A
MICROGYNON	G03A
NERISONA	D07A
NERISONA C	D07B
PERNEXIN	A13A
PRIMOBOLAN Depot	A14A
PRIMOGERON	A11A
PRIMOGONYL	G03G
PRIMOLUT NOR	G03D
PRIMOSISTON	G03F
PROGYNON	G03C
PROGYNON Depot	G3C2
PROGYNON C	G03C
PROGYNOVA	G03C
PROLUTON Depot	G3D
PROVIRON	G03B
SCHERICUR	D07B
SCHERIPROCT	C05A
SCHERISOLON	H2A1
SCHEROSON Ear Drop	S01C
SCHEROSON F oph.	S02C
TESTOLUTON	G03E
TESTOVIRON	G03B
TESTOVIRON Depot.	G3B
TONOVAN	G03B
ULTRALAN Cream	D07A
ULTRALAN Oral	H02A2
ULTRAPROCT	C05A
UROGRAFIN	V04A
SCHERING CORP.	
CELESTONE Chronodose	D07A
CELESTONE	H2A2
CELESTONE	H02A1
CELESTONE	S01B
CELESTONE S	S1C
CELESTONE S	S01C
CORICIDIN	R05A

فرآورده‌های داروئی	کد درمانی
CORICIDIN D	R05A
DI GEL	A02A
GARAMYCIN Cream & Ointment	D06A
CARAMYCIN Injection	J01K
CARAMYCIN Ophthalmic	S01A
POLARAMINE	R06A
POLARAMINE EXPECT.	R05C
SEVINOL	N05A
TINADERN	D01A
TRILAFON	N05A
VALISON G	D07B
SEARLE	
ALDACTONE A	C03B
DARTALAN	N05A
DRAMAMINE	A04A
LOMOTIL	A07C
OVULEN 50	G03A
PRO BANTHINE	A03A
PRO BANTHINE DART.	A03C
PROBANTHINE PA	A03A
SERENACE	N05A
SECTA	
HEMORROIDINE	C05A
SERONO	
CHYMOSER Balsmique	B06A
PERGONAL	G03G
PROFASI	G03G
SERVIER	
DAFLON	C05C
DIAMICRON	A10B
HYDROSARPAN	C04A
LOCABIOTAL	R01A
PONDERAL	A08A
VASTAREL Fort	C01D
VITATHION (A.T.P.)	A13A

فرآورده‌های داروئی	کد درمانی
SIEGFRIED	
DAMMAGAL	A09A
ISTONIL	N06A
PHOSELLITE B	A13A
PRODISAN 300	M01A
SPASLAR	A03D
UNGUENTOLAN	D03A
SIGMA	
CEREMUNEX	S2D
TEEJEL	A01A
SMITH KLINE FRENCH	
CENDEVAX	J7A
CYNOMEL	H03A
DYAZIDE	C03A
DYTIDE	C03A
ESKACEF	J01D
ESKAZINA	N05A
ESKORNADE	R05E
EXPANSYL	R03A
FEFOL	B03A
FEOSPAN	B03A
FESOVIT	B03A
HISTRYL	R06A
STELABID	A03C
STELABID FORTE	A3C
TAGAMET	A02B
SOLCO	
AMBREDIN	R3A
SOLCOSERYL	A02B
SOLCOSERYL	D03A
SOPAR	
SOPALAMIN 38	A11D
SOPAMYCETIN Succinate	J01B

فرآورده‌های داروئی	کد درمانی
SPECIA	
BECILAN	A11H
BEMARSAL	P1A
DOXERGAN	R06A
EXTENCILLINE	J01H
EXTENCILLINE 6, 3, 3	J1H
FLAGYL	G01A
FLAXEDIL	M03A
GLUCANTIME	P01G
LARGACTIL	N05A
LENTERULES de Gardenal	N05B
MAJEPTIL	N05A
MIGRISTENE	N02C
NESDONAL	N01A
NEULEPTIL	N05A
NIVAQUINE	P1D
NOZINAN	N05A
PHENERGAN Cream	D04A
PHENERGAN	R06A
PHENÉRGAN Expectorant	R05C
RHONAL	N02B
ROVAMYCINE Pommade	D06A
ROVAMYCINE	J01F
SORIPAL	M01A
SPECILLINE G	J01H
SURMONTIL	N06A
SPRET	
DESCLIDIUM	C4A
SQUIBB	
CRYSTICILLIN	J01H
DEXACILLIN	J01C
GRANEODIN	D06A
KENACOMB	D07B
KENACORT	H02A
KENACORT	H2A2

فرآورده‌های دارویی	کد درمانی
KENACORT	D07B
KENACORT	D07B
KENACORT	S01C
MODITEN	N05A
MYCOSTATIN	D01A
PENICILLIN	J01H
PRONESTYL	C01B
RAUTRAX Improved	C02C
RUBRATON B	B03A
SENDOIN	R05D
STREPTOMYCINE	J01G
SUMYCIN	J01A
TALSUTIN	G01A
VALADOL	N02B
VEETIDS	J01H
VELOSEF	J01D
VIPLEX	A11E
STERLING WINTHROP	
ANDREWS	A06A
ARALEN	P01D
BESEROL	N02B
BRYREL	P01B
FRANOL	R03A
HYPAQUE	V04A
LEVOPHED	C01C
MILIBIS	P01A
MILK OF MAGNESIA	A02A
N T R	R01A
NEG GRAM	G04A
NEO SYNEPHRINE	R01A
ONOTON	A09A
PEPSAMAR	A02A
PHISOHEX	D08A
PLAQUINOL	M01A
SULFAMYLON	D06B
SYNEPHRICOL	R05A
TALWIN	N02B
TELEPAQUE	V04A
WINSTROL	A14A

فرآورده‌های دارویی	کد درمانی
STIEFEL	
BRASIVOL	D10A
PANOXYL	D10A
TANABE	
ADONA	B02B
BESTON	A11D
BITREN	A11D
DEVORA	R05F
INOLIN	R03A
PYRIPAN	N02B
THERAMEX	
COLPOTROPHIN	G01A
TOCOGESTAN	G03D
TROPHOBOLENE	A14A
THERAPEUTIQUE	
AMINOSERYL	A2B
ENZYMOFLASH	A09A
FRUBIOSE CALCIQUE Forte	A12A
LYSOPAINE	R02A
PANCREFLASH	A9A
THERAPLIX	
A T S	D04A
DYCHOLIUM	A05A
EFRYL	R05D
HEXOMEDINE	D08A
HEXOMEDINE TRANSCUTANEE	D8A
MYCODECYL	D01A
OXIFERRISCORBONE SODIQUE	A02B
OXYFERRISCORBONE SODIQUE ATROPINE	A2B
RUTASCOL	C05C
THERALENE	R06A
TREVINTIX	J4A
VOGALENE	A04A

فرآورده‌های داروئی	کد درمانی
TOLIDARU	
AMPICIN	J01C
AMPICIN FORT	J1C
ASCORVIT	A11G
BEPYRINE	N02B
DILOMINE	A03A
DILOMINE P.B.	A03D
HISTOLIT EXPECT.	R05C
HISTOLIT EXPECT.DC	R05C
O–PEN	J1H
IBATH	S01D
MAGEL	A02A
NEUROCHOLINE	N06B
O PEN	J01H
ORALIT	V03A
PEKA	A07C
PEKA P	A07A
PULGIT N	A07A
SEDARIN	R05A
SEDAPHEN ELIXIR	N2B
SULFARILLA	A07A
TOLIVIT	A11B
ULTRAMOX	J01H
VITABEX	A11E
VITADERM	D02A
TOTAL	
PECTOMIN	R05C
TROPONWERKE	
CARDIOPON	C6A
DILATOL	C4A
U.C.B.	
ATARAX	N05A
FOLACID	A11J
LIBRATAR	A02A

فرآورده‌های داروئی	کد درمانی
LONGIFENE	R06A
NOOTROPIL	N06B
PREDNIMOVIRENE N	M01B
UPJOHN	
CARIPEPTIC Liquid	A09A
CYTOSAR	V02A
DALACIN C	J01F
DEPO MEDROL	H02A
DEPO PROVERA	G03D
DEPO TESTRONE	G03B
EMU V	J01F
GELFOAM	V7A
HALOTESTIN	G03B
KAOMYCIN	A07A
KAOPECTATE	A07B
LINCOCIN	J01F
MEDROL	H02A
MEDROL MEDULES	H02A
MEDROL VERIDERM	D7A
MYCIGUENT	S1A
NEO CORTEF Ointment	D07B
NEO CORTEF Eye, Ear	S01C
NEO MEDROL	D07B
NEO-MEDROL ACNE Lotion	D7B1
PROVERA	G03D
SOLU CORTEF	H02A
SOLU MEDROL	H02A
TOLINAS	A10B
TROBICIN	J01K
UNICAP Cap.	A11B
UPSA	
LUOSTYL	A03A
NORMOGASTRYL	A05A
US ETHICALS	
NITRONG	C01D

کد درمانی	فرآورده‌های دارویی
	VANDER
R3A	ASMAC
R3A	ASMAC Retard
N3A	ANTISACER
N3A	ANTISACER Composition
P1B	ASCAPHEN
R03A	ASMAC
D6B	COLPO-SULFANA
	VIO
R5D2	BE.BE. SEDIN
A6A	FORTOLAX
	VICK INTERNATIONAL
R02A	VICKS
	VIFOR
C6A	ANGOSEDIN
H2A1	DESOXYCORTICOSTERON "VIFOR"
S1B	HYDROCORTIFOR
G3C	OESTRADIOL
G3B	TESTOSTERON "Vifor"
	VIRA
A2A1	AL-SI-GEL
A5C	CITRO-SEL
A01A	DENTIGAR
A07A	DIAREX
R05D	DIPHENTORAL
R5O2	EPHECODE
A02A	GASTRALGINE
D11A	HADEX
D11A	HADEX Pommode
P01B	HELMIPAR
B02B	HEMORAGIN ERGOT
A13A	NEO FORTAMIN
C1C	NICOREX
S02A	OTOCOL

کد درمانی	فرآورده‌های دارویی
J1B	OVULE VAGICOL
A6A	PHENOLAGARINE
R05D	PULMOVITE
C05A	RUTINOL
P01B	TENIAX
G01A	VAGICOL
	WALLACE
A02A	ACTONORM
A11B	CONCAVIT
A7A	INTRAIT VALADON
N02B	PAXIDAL
	WANDER LAMBERT
A02A	GELUSIL
G04A	PRODOXOL
	WELLCOME
P01B	ALCOPAR
7JA	ALMEVAX
P01B	ANTEPAR
C02B	ESBATAL
C01A	LANOXIN
V02A	LEUKERAN
N02C	MIGRIL
V02A	MILERAN
V2A	MYELERAN
R06A	PRO ACTIDIL
V02A	PURI NETHOL
J01E	SEPTRIN
M04A	ZYLORIC
	WHITE
B03A	MOL IRON
N05A	PERMITIL Chronotabs

فرآورده‌های داروئی	کد درمانی
WHITEHALL	
OXIPOR VHC	D05A
WINTROP	
FENAROL	N6B
ISUPREL	C1B
NTR	R1A2
PHILLIPS Milk of Magnesia	A2A1
WULFING	
COMPLAMIN	C04A
COMPLAMIN Retard	C4A
WYETH	
ALUDROX	A02A
AMPHOJEL	A02A
ATIVAN	N05A
EQUAGESIC	N02B
OVRAL	G03A
OXAINE – M	A02A
PENADUR	J01H
S M A	V06C
SEREPAX	N05A
SIMECO	A02A
SPARINE	N05A
STREPTOMAGMA	A07A
WYAMINE	C01C
ZACTIRIN	N02B

فرآورده‌های داروئی	کد درمانی
ZOJA	
ETIBI	J04A
ETIBI INH	J4A
ZYMA	
FENISTIL	R06A
FENISTIL RETARD	R6A
PILKA	R05F
PRISCOL	C04A
UROSTOP	G04B
VARECORT	C05A
VAREMOID	C05C
VENORUTON 10%	C05C

فهرست الفبائی نام ژنریک داروها برحسب نام تجارتی

داروهائی که با علامت ستاره مشخص شده‌اند فقط حاوی یک ماده موثره ژنریک هستند. داروهای دیگر علاوه‌برهمین ماده موثره، ترکیبات دیگری هم دارند.

ACEDIASULFONE
Ciloprine cum Anaesthetico

ACENOCOUMARIN
* Sintrom

ACETAMINOPHEN
* Acetophen
Aramin
Askine
Babyrhinol
Beserol
Butaphen
Coryban-D
Femidol
* Norgesic
* Paramol
* Sedaphen Elixir
Sinutab
Synephricol
Tempra
Valadol

ACETANILIDE
Aram

ACETARSON, SODIUM
Gynoplix
* Stovarsol

ACETAZOLAMIDE
* Diamox
* Glaupax

ACETOHEXAMIDE
* Dimelor

ACETYL DIGOXIN
* Cedigocine

ACETYLPROMAZINE MALEATE
* Plegicil

ACHILLEA
Orthangin

ACHILLEA MILLEFOLIUM
Orthangin

ACONITE TINCTURE
Avipulmine
Campho-Pnenumin Adults
Neo-Codion Adults
Pectone Syrup
Pectone Tab.
Solucamphre Sirop

ACRIFLAVINE
Burnol

AD-205
Cholipin

ADENOSINE PHOSPHATE
Artroneuril

ADENOSINE SODIUM TRIPHOSPHATE
Artroneuril
* Atipi
Vita-Iodurol

ADENOSINE TRIPHOSPHATE
Vitathion (A. T. P)

ADONIS VERNALIS
Card Ompin

ADRENALONE, HCL
Hemorrodine

ADRENOXYL
* Adrenoxyl

AGAR
Paragarine

AJMALICINE
Hydrosarpan
Modenol

ALANINE
Aminofusinl
Aminofusin T.P.N.

ALBUMIN, NORMAL HUMAN SERUM
Human Albumine 20%
Human Albumine 20%

ALCLOFENAC
* Mervan
Mervan Fort

ALLANTOIN
Crinagen Cream

ALLOBARBITAL
Spasmo-Cibalgin

ALLOPURINOL
* Allopurin

ALLYLESTERNOL
* Gestanon

ALOE
Fuca Excellent

ALOIN
Boldine

ALPHAETHYNIL ESTRADIOL
Hormo-Gerobion Amp.
Hormo-Gerobion Tab.

ALPRENOLOL
* Aptin
* Aptin Durules

ALUMINIUM CHLORIDE
Neo Medrol Acne Lotion

ALUMINIUM HYDROXIDE, GEL
Almacarb
Almax
Alsigel
Aludrox
* Amphojel
Butazolidine Alka
Co-Pyronil
Di-Gel
Dorital
Gastryl
Gastropulgite
Gelusil
Kompensan
Magel Sus
Magel Tab.
Magnex
Metacen
Mylanta
Normacidine
Oxaine-M
* Pepsamar
Polysilane Reglisse
Simeco
Solugastril

ALUMINIUM HYDROXIDE GEL DRIED
Actonorme

ALUMINIUM OXIDE
Brasivol
Kudrox

ALUMINIUM SILICATE
* Gastropulgite
* Panoxyl 10% Gel
* Panoxyl 5%

ALUMINIUM SUBACETATE

Xylocaine
Xyloproct Ointment

AMANTADINE HCL
* Symmetrel

AMBAZONE
* Iversal

AMILASE
Festavital

AMINACRINE, HCL
Acriflex

AMINO ACIDS
Aminofusini L

AMINOACRIDINE UNDECYLATE
Cenasert

AMINOCAPROIC ACID
* Capramol

AMINOPHYLLINE
* Aminophylline
Campho-Pneumine Adults
Dechophyline Phenobarbital
Inophyline Millote
Inophyline Sedative
Inophyline Sedative Supp.

AMINOPYRINE
Algaphan
Alginal
Artroneuril
Bromarine
Optalidon
Osadrine
Spasmo-Cibalgin Compositum

AMITRIPTYLINE HCL
* Saroten
* Tryptizol

AMMONIUM ACETATE
Pulmo Be Be

AMMONIUM BROMIDE
Be Be Calmine
Bevised
Tussicof

AMMONIUM CHLORIDE
Ambenyl Expectorant
Benadryl
Benadryl Expectorant
Benafed
Diphen Toral
Histogan Expectorant
Maxadryl Exp.
Metorpan
Neopect Expectorant
Paradryl
Pectamed
Pectone Syrup
Pectone Tab.
Piriton Expectorant
Quilla Codeine
Quilla Simplex

AMMONIUM FERROUS CITRATE
Minadex

AMMONIUM SAPONITE MIXTURE
Tussipect Codeine

AMOBARBITAL
Klimerco
Lentrat
Lentrat-A
Sedo-Rythmodan

AMOXICILLIN
* Ibiamox
* Penimox
* Penimox
* Penimox
* Penimox

AMOXICILLIN SODIUM
* Ibiamox

AMOXICILLIN TRIHYDRATE
* Amoxil
* Ampy-Penyl
* Hiconcil

* Ibiamox
* Ultramox

AMPHOTERICIN B
Talsutin

AMPICILLIN
Amfipen
Ampiclox
Penimycin
Pentricine

AMPICILLIN TRIHYDRATE
* Ampicin
* Ampicin Forte
* Binotal
* Pentrexyl Susp.
* Pentrexyl Tab.
* Pentrexyl Pediatric
* Pentricine
* Propacin

AMYL-META-CROSOL
* A.M.C.
Strepsils

AMYLASE
Combizim

AMYLOCAINE, HCL
D.G. Drop
Lavorine
Otinol
Synthomycetine

ANANASE
Mexase
Nutrizym

ANETHOLE TRITHIONE
Sulfarlem
Sulfarlem Choline

ANISE (Compound)
Combey Lax
Lespenephryl
Mucinum

ANTAZOLINE HCL
* Antistine

ANTAZOLINE SULFATE
Antistine - Privine

ANTHOCYANOSIDE
Difrarel 100
Difrarel -E

ANTIPYRINE
Abcedent
Alginal
Dentigar
Otimarine
Pulmo Be Be
Sedaco
Tussicof

APROTININ
* Trasylol

ASCORBIC ACID
A. B. C. D.
Abdec
Achromycin
Aminofusinl
Ascoxal
Autrin
Axar
Benutrex C
Benutrex Oral
Bristacin-A
C-M
Calcigran
Calcium Corbiere
* Cebion
* Cecil
Concavit
CorybanD
Dargravit Total
Davitamon 10
Dianavit
Eldec
Endoglobin
Fesovit

Festavital
Gevral Protein
Haliborange
Hepamine
Hormo Gerobion
* Iracevit
Katabios
Minalgin Enfant
Minalgin Adult
Multibionta Cap.
Multibionta Eff.
Mutine
Multi Tabs
Natabec
Neo-Codion Adultes
Neuleptil
New C. Tab.
Orangen
Orangen
Paladac
Perihemin
Prenatal Cap.
Redoxon
Roeribeg
Sol Vit
Styptobion
Supradyn
Terramycin Intravenous
Trinsicon
Unicap Therapeutic
Viplex
* Vita C. Eva Forte
Vitaten
Vitathion (A. T. P)
Viterra

ASPIRIN
A.P.P.
* Adiro
Aram
Askine
Aspirin
Axar
Axar for Children
* Bepyrine
Codopyrin
Colchipirine
Coricidin
Doloxene Compound
Equagesic
Femidol
Gripin
Minalgin Adult
Mycidon
Passal
Paxedin
* Rhonal
Robaxisal
Zactirin

ATENOLOL
* Tenormin

ATRICAN
* Atrican

ATROPINE SULFATE
Actonorm
* Bardase
Chibro Atropine 1%
Diacol
Donnagel P G
Donnatal
Gastralgine
Lomotil
Normacidine
Oxyferriscorbone-Sodique Atropine

AUBEPINE TINCTURE
Passibromine
Passiflorine

AVAPYRAZONE
Avafortan

AVOMINE
* Avomine
* Vomycine

AXEROPHTOLUM (VITAMIN A)
Dianavit

AZAPROPAZON
* Prodisan 300

AZATHIOPRINE
* Imuran

AZULENE
Rectoidal Corbiere

BACITRACIN
Nebasone
Sulfaderm

BARIUM SULFATE
* Neobar

BASIC ALUMINIUM SUCROSE SULFATE
* Antepsin

BECLOMETHASONE DI PROPIONATE
* Becotide

BEE VENOM
Forapin

BELLADONNA
Avipulmine
Belladenal
Belladenal Retard
Bellergal
Bellergal Retard
Cafergot P.B.
Campho-Pneumine Adults
Ipesandrine
Mucinum
Paderyl
Paderyl
Pecto Be Be
Sedaco
Solucamphre Sirop
Tussicof
Urostope
Whooping Cough

BENETHAMINE PENICILLIN G.
Triplopen

BENFOTIAMINE
* Biotamine

BENTONITE (MAGMA)
Brasivol

BENZALKONIUM CHLORIDE
Allergan Soakare
N. T. R.
Neo-Phrine
Neo-Synephrine
Neo-Synephrine
Neo-Synephrine
Sporostancin Cream

BENZARONE
* Fragivix

BENZATHINE PENICILLIN G
Extencilline
Extencilline (6-3-3)
* Penadur L.A.
Penadur L.A.

BENZETHONIUM CHLORIDE
Cenasert

BENZIODARONE
* Amplivix

BENZOCAINE
* Al-Si-Gel
Aqua-Drin
Dermex
Otimarine
Oxipor V.H.C.
Vitaderm

BENZODODECINIUM BROMIDE
Rectoidal Corbiere

BENZOIC ACID
Calox
Denti Fecte
Marciderm
Paracodine

BENZOIN (TINCTURE, COMPOUND)
Fuma Grippe
Mina Inhaler

BENZOYL PEROXIDE
Panoxyl
Panoxyl

BENZYL NICOTINATE
Bayolin
Forapin

BENZYLEPHEDRINE
Franol

BEPHENIUM HYDROXYNAPHTHOATE
* Alcopar

BERBERINE, HCL
Ibath

BETA CAROTENE
Difrarel 100

BETAMETASONE ACETATE
Celestone Chronodose

BETAMETHASONE
Betnelan
* Celestone
Celestone Chronodose
Celestone-S

BETAMETHASONE SODIUM PHOSPHATE
* Betnesol
* Betnesol Injection
* Betnesol Retention Emena
* Betnesol
Betnesol-N

BETAMETHASONE VALERATE
* Betnovate
Betnovate-C
Betnovate-N
Celestoderm

BETHANIDINE SULFATE
* Esbatal

BILE EXTRACT
Enzymoflash
Mucinum
Onoton

BILE SALTS
Donazyme
Festavital

BILICANT
* Bilicant Capsule

BILIJODON NATRIUM
* Duroliopaque

BIOTIN (VITAMIN H)
Becozyme
Litrison
Multibionta Cap.
Multibionta Eff.
Multine
Polybion
Polybion
Supradyn

BIPERIDEN HYDROCHLORIDE
* Akineton

BISACODYL
* Dulcolax
* Methalax
* Rectolax for Adult

BISMUTH ALUMINOCARBONATE
Dorital

BISMUTH IODOCHLOROXYQUIN
Carbantren

BISMUTH SUBGALLATE
Xylocaine

BISMUTH SUBNITRATE
Bismupan
* Bismuth Mucilag
Bismuth Pharmachimie
Libratar Complex
Rabro
Roter

BISMUTH SUBSALICYLATE
Bismogol

BOLDINE

Boldine

BOLDO, EXTRACT
Mucinum
Sympathyl

BORAX
Dentifecte

BORNYL SALICYLATE
Forapin

BOURDAINE PULV
Mucinum

BRASIVOL BASE
Brasivol

BROBENZOXALDINE
Intestopan

BROMHEXINE HCL
Bisolvomycin
* Bisolvon

BROMOCRIPTINE
METHANE SULPHONATE
* Parlodel

BROMODIPHENHYDRAMINE HCL
Ambenyl Expectorant
* Ambodryl

BROMOFORM
Campho-Pneumine Adults
Neo-Codion Adults
Pectobrom

BROMPHENIRAMINE MALEATE
* Dimetane
Dimetane Expectorant
Dimetapp Extentabs

BUCLIZINE
Longifene

BUCLOSAMIDE
Jadit
Jadit H

BUPHENINE, HCL
Cardiopon

BUSULFAN
* Myleran

BUTALBITAL
Cafergot P. B.
Optalidon
Tonopan

BUTAMBEN
Hemorrodine

BUTETHAL
Chimiophylline Butobarbital

BUTOXYL ETHYL NICOTINATE
Finalgon

BUTYLATED HYDROXYTOLUENE
* Indocid
Penthrane

BUTYLSCOPOLAMINE BROMIDE
* Buscopan
Buscopan Compositom
Tranquo Buscopan

CAFFEINE
Ancofen
Aram
Askine
Avamigran
Axar
Cafergot P.B.
Coricidin
Coryban-D
Doloxene Compound
Dolviran
Femidol
Gripin
Migril
Minalgin
Optalidon
Passal

Pharmax
Refagan
* Sedalmerck
Synephricol
Tonopan

CAFFEINE CITRATE
Micorene

CALAMINE
Allergine

CALAMUS
Rabro
Roter

CALCIUM ASCORBATE
* Filibon Prenatal

CALCIUM BROMIDE
Be Be Calmine
Bromarine
Passibromine
Pulmo Be Be

CALCIUM BROMOLACTOBIONATE
* Calcibronat

CALCIUM CASEINATE
Gevral Protein

CALCIUM CARBONATE, PRECIPITATED
* Actonorm
Calcium Sandoz Forte
Dorital
Eldec
Filibon
Libratar Complex
Natabec
* Normacidine
Rabro
Solugastril

CALCIUM CHLORIDE
Calci-Ostelin
Chibro-1000-Calcique
Dextrose 5% in Lactated Ringer
Hermorragine Ergotinee
Iodocol
Lactated Ringer's
Peritoneal Dialysis
Peritoneal Dialysis
Polysilane Reglisse
Ringer's Solution
Steriflex

CALCIUM DISODIUM EDETATE
Dimer-X
Hypaque
Telebrix 38

CALCIUM GLUCOHEPTOGLUCONATE
Calcium Corbiere

CALCIUM GLUCOHEPTONATE
Calcimarine

CALCIUM GLUCOLACTOBIONATE
* Calcium Sandoz

CALCIUM GLUCONATE
Multisanostal

CALCIUM GLYCEROPHOSPHATE
Metatone
Minadex
Vi-nuphos
Supradyn

CALCIUM LACTATE
Calcistine
Oralit

CALCIUM LEVULINATE
Argyrophedrine

CALCIUM OXYTETRACYCLINE
* Terramyçin

CALCIUM PANTOTHENATE
A. B. C. D.
Alertonic
B-Colex
Becozyme
Benutrex
Davitamon 10

Fesovit
Festavital
Katabios
Gevral Protein
Lederplex Cap.
Multi Tabs
Panbetine Forte
Paraxin
Paraxin
Pernexin
Physiohepato
Roeribeg
Solvit
Supradyn
Unicap Therapeutic

CALCIUM PHOSPAHTE, DIBASIC
Geriplex
Gevral Protein
Roeribeg
Vitaten
Viterra

CALCIUM PHOSPHATE TRIBASIC
Calci-Ostelin
Calci-Ostelin B12
Calcigran
Ostocalcium

CALCIUM PHOSPHOLACTATE
Multisanostl

CALCIUM SODIUM LACTATE
Ostocalcium

CALCIUM + POLYPEPTID
Haemaccel

CALCICREIN
* Padutin Retard

CAMPHAMEDRINE
Solucamphre Sirop

CAMPHOR
Fuma grippe
Ibath
Myalgine Ointment
Rhumacide
Valy Pommad
Vicks

CAMPHORATED OPIUM TINCTURE
Ramosuccin

CAMYLOFINE
Avafortan
Avamigran

CANDICIDIN
* Candeptin

CAPSAICIN
Midalgan

CAPSICUM
Rhumacide

CARBACHOL
Neol-Klimastilben

CARBAMAZEPINE
Tegretol

CARBAZOCHROME SODIUM SULFATE
* Adona

CARBENICILLIN INDANYL SODIUM
* Geocillin

CARBIDOPA
Sinemet

CARBOCYSTEINE
* Mucolin

CASCARA FLUID EXTRACT, AROMATIC
Ritalax

CASCARA SAGRADA
Fuca Excellent

CEDAR LEAF OIL
Vicks

CELLULASE

* Combizym

CELLULOSE, OXIDIZED
Blocardren

CEPHALEXIN
Cephaiomex
Ibilix

CEPHALEXIN MONOHYDRATE
* Cephalomex
* Ceporex
* Keflex
* Keflex
* Palitrex

CEPHALORIDINE
* Ceporan
* Keflodin

CEPHRADINE
* Eskacef
* Velosef

CETALKONIUM CHLORIDE
Teejel

CETRIMONIUM BROMIDE
* Cetavlon
Savlon

CETYLPYRIDINIUM CHLORIDE
Aqua-Drin
Ibath
Xylocaine Spray

CHARCOAL, ACTIVATED
Carbantren
Ultracarbone

CHLORAL HYDRATE
Be Be Calmine
D. G. Drop
D. G. Powder
Lavorine

CHLORAMBUCIL
* Leukeran

CHLORAMPHENICOL
* Chloramphenicol
* Chloramphenicol Sterille
* Chloramphenicol Sulfacetamide
Chloransulfa
* Chloromycetin
Chloropti
Cortol
Eiificol Otic
Ejificol Ovules
* Elase
Elase-Chloromycetin
Gabbroral
Globenicol
Hydrocortifor
Kemicetine Succinate
* Otocol Goutte
* Otoramin
Paraxin
Scheroson F oph
Scheroson Ear Drop
Synthomycetine
Syntophtone
* Vagicol Ovule

CHLORAMPHENICOL PALMITATE
* Chloromycetin
* Ejificol

CHLORAMPHENICOL SODIUM SUCCINATE
* Chloromycetin
* Ejificol Succinat
* Farmicetina
* Kemicetine Succinate
* Paraxin
* Sopamycetin Succinate

CHLORDANTION
Sporostacin Cream

CHLORDIAZEPOXIDE
Librax
* Librium

CHLORGUANIDE HCL
* Paludrine

CHLORHEXIDINE GLUCONATE

Dacrine
* Hibitan
Savlon

CHLORHYDRATE DE DIFEMERINE
* Luostyl

CHLORMEZANONE
Beserol

CHLOROPYRAMINE
* Synopene

CHLOROQUINE PHOSPHATE
* Aralen
* Resochin

CHLOROQUINOLINOL
Decoderm

CHLORPHENESIN
* Mycil

CHLORPHENIRAMINE MALEATE
BabyRHinol
Coricidin
Coricidin D
Corisan Enfant
Coryban-D
Femidol
Gripin
Hista Two
Histin
Histolit Expectorant
Histolit Expectorant DC
Metorcin
Metorpan
Minalgin Enfant
Minalgin Adult
Mycidon
Naldecol
Naldecol
New Pectovit
Pectomycine
Pectone Syrup
Pecton Tab.
* Piriton
Piriton Expectorant
Pyradin Expectorant
Theo-Lite Tab.
Tri-Histle

CHLORPROMAZINE HYDROCHLORIDE
* Largactil

CHLORPROPAMIDE
* Diabinese

CHLORQUINALDOL
Nerisona C
* Siostern
Sterosan

CHLORTETRACYCLINE, HCL
* Chlortetracycline

CHLORTHALIDONE
* Hygroton
Hygroton Reserpine

CHLORTHIAZOLE ETHANEDISULFONATE
* Heminevrin

CHLORZOXAZONE
* Benzoflex
* Paraflex

CHOLECALCIFEROL
A. B. C. D.
Calcigran
Duphasol A + D3
Duphasol Multivitamin
Duphasol A
Katabios
Multine
Multi Tabs
Multi Sanostol
Omnibionta
Sol Vit
* Vigantol Fort
Viplex

Vitaten
Viterra

CHOLIN BITARTRATE
Eldec
Festavital
Gevral Protein
Lederplex Cap.
Lederplex Syrup
Litrison
Sulfarlem
Sulfarlem Choline

CHOLINE CITRATE
Delphicol
Hepacholin Sorbitol
Panbetin Forte

CHOLINE DIHYDROGEN CITRATE
Geriplex
Lederplex Cap.
Lederplex Syrup

CHOLINE OROTATE
Physiohepatole

CHOLINE SALICYLATE
Teejel

CHYMOTRYPSIN
Alphachymotrypsine
Ambezim

CICLONIUM BROMIDE
Dolo-Adamon
Tranquo Adamon

CIMETIDINE
* Tagamet

CINCHONA
Phos. Viquine (Tonic)

CITRIC ACID
Capramol
Cedilanid
Heparexine
Laxmel
Limax
Limocitric Powder
Limolax
Oralit
Reverin

CLAUDEN
* Claudene

CLEMASTINE
* Tavegyl

CLEMIZOLE HEXACHLOROPHENATE
Schericur

CLEMIZOLE PENICILLIN G
* Megacilline
Megacilline Forte

CLEMIZOLE UNDECYLATE
Scheriproct
Ultraproct

CLIDINIUM BROMIDE
Librax

CLINDAMYCIN HCL
Dalacin C

CLOBETASOL -17 PROPIONATE
* Dermovate

CLOBUTINOL
* Silomat
Silomat-Compositum

CLOFIBRATE
* Atromid-S

CLOMIPHEN CITRATE
* Clomid

CLONIDINE HCL

* Catapres

CLOPAMIDE
* Brinerdin

CLOPENTHIXOL
DIHYDROCHLORIDE
* Sordinol

CLORAZEPATE
DIPOTASSIUM
* Tranxene

CLOTRIMAZOLE
* Canesten

CLOVE OIL
D. G. Drop
Figine

CLOXACILLIN
Ampiclox
* Prostaphilin-A

COAL TAR
Oxipor V H C

COCILLANA
Becof

COCHENILLE TINCTURE
D. G. Drop
D. G. Powder

COCOA
Arobon

COD LIVER OIL
Desitin
Ejificol
Haliborange
* Unguentolan
Vitaderm

CODEINE
Campho-Pneumine Adults
Pectocode
* Pectogol
Pectomycine
Pectone Syrup
Pectone Tab.
Tussicof
Tussipect Codeine

CODEINE CAMPHOSULFONATE
Neo-Codion Adult
Solucamphre Sirop

CODEINE HCL
Bisolvon

CODEINE HYDROBROMIDE
Paderyl

CODEINE PHOSPHATE
Avipulmine
Codopyrin
Dolo-Adamon
Dolviran
Gripin
Histolit Expectorant
Histolit Expectorant D. C.
Mepyral Expectorant
Paxedin
Pectobrom
Pectocode
Pectomycin
Pyradine Expectorant
Quilla Simplex
Quilla Codeine
Spasmo-Cibalgin-Compositum

CODEINE SULFATE
Ambenyl Expectorant
Senodin

COLCHICINE
* Colchicine Houde
Colchimax
Colchipirine

COLISTIN SULFATE
* Colimexe
* Colistine
Colistop

COMPLEX CHYMOTRYPSIQUE

Alpha Kadol

CONVALLARIA, COMPOUND
Card Ompin
Orthagin

COPPER SULFATE
Ascoxal
Fersolin
Minadex

CORIANDER OIL
Combey Lax

CORTICOTROPIN
* A. C. T. H.
* Cortrosyn Depot

CORTISONE ACETATE
* Cortisone 0.5%
* Cortisone

CRATAEGUS, EXTRACT
Card Ompin
Orthangin
Passiflorine
Seval
Sympathyl
Sympathyl

CROMOLYN DISODIUM
* Intal

CROPROPAMIDE
Micorene

CROTAMITON
* Eurax

CROTARBITAL
Dolo-Adamon

CROTETHAMIDE
Micorene
Micoren

CYANOCOBALAMIN
Abdec
Artroneuril
B-Colex
Benutrex B12
Benutrex Oral
Bexel
Biocositene
Bitren
Budodouze Fort
Calci-Ostelin B12 Syrup
Calcimarine
Cytamen 1000 + Vitamin B1
* Cytaton
Davitamon 10
Delphicol
Dianavit
Dolo-Neurobion
Filibon Prenatal
Folicofer
Geriplex Pharmaton
Gevral Protein
Hepamine
Hypobeta -20
Lederplex Cap.
Lederplex Syrup
Litrison
Multibionta
Multitabs
Natabec
Neurobion
Obron
Paladac
Panbetine Forte
Perihemin
Pernexin
Physio-hepatol
Polybion
Prenatal Cap.
Princi B
Rubraton-B
Sopalamin 3B
Supradyn
Trinsicon
Unicap Therapeutic
Urbamin
Vioneurin Forte
Viplex
Vitabex

Viterra

CYCLIZINE HYDROCHLORIDE
Fortravel
Migril

CYCLOPENTAMINE, HCL
Co-Pyronil

CYCLOPENTHIAZIDE
* Navidrex
*

CYCLOPHOSPHAMIDE
* Endoxan

CYCLOPHOSPHAMIDE MONOHYDRATE
* Endoxan

CYCLOSERINE
* Farmisetina

CYPROHEPTADINE HCL
* Periactin

CYTARABINE
* Cytosar

CYTIDINE DIPHOSPHATE CHOLINE
* Neurocholine

DEFEROXAMINE MESYLATE
* Desferal

DEHYDROCHOLIC ACID
Dechophyline Phenobarbital
Dycholium
Mexase

DEHYDROEMETINE HCL
* Dametine

DEMECARIUM BROMIDE
* Tosmilen 0.25

DEMECLOCYCLINE, HCL
* Ledermycin

DEOXYCHOLIC ACID
* Dycholium

DEQUALINIUM CHLORIDE
Allergine
* Dequadin Lozenges

DESCLIDIUM
* Descalidium

DESESSARDZE
Campho-Pneumine Adults

DESIPRAMINE HCL
* Norpramin

DESLANOSIDE
* Cedilanid

DESOXYCORTICOSTERONE ACETATE
* Desoxycorticosteron "Vifor"
* Doca
* Percortene

DESOXYCORTICOSTERONE PHENYLPROPIONATE
Docabolin

DESOXYMETHASONE
Topifram

DESOXYRIBONUCLEASE
Elase
Elase-Chloromycetin

DEXAMETHASONE
* Decadron
* Dexa-Scheroson
* Ejidox
* Isoptomaxidex
* Oradexon

DEXAMETHASONE ACETATE
Decoderm
* Dectancyl

DEXAMETHASONE HEMISULFATE

SODIUM
* Dexa-Scheroson

DEXAMETHASONE SODIUM PHOSPHATE
Decadron
* Oradexon

DEXAMETHASONE SODIUM SULFOBENZOATE
Sofradex

DEXAMETHASONE 21-DISODIUM PHOSPHATE
Neo-Decadron

DEXBROMPHENIRAMINE MALEATE
Drixoral

DEXCHLORPHENIRAMINE MALEATE
* Polaramine
Polaramine Expectorant

DEXPANTENOL
Abdec
Becozyme
* Bepanthen
Beviplex
Dagravit Total
Duphasol A
Duphasol B Complex
Duphasol Multivitamin
Eldec
Endoglobin
Hepamine
Hypobeta-20
Metorpan
Multisanostol
Multine
Panbetin Forte
Pantocream
Polybion
Rubraton-B
Viplex
Vitabex

DEXTRAN
* Vacotran

DEXTROMETHORPHAN HYDROBROMIDE
Benafed
Coryban-D
Cosanyl D.M.
Gripin
Metorcin
Metorpan
New Pectovite
* Vicks

DEXTROPROPOXYPHENE NAPSYLATE
Doloxene Compound

DEXTROSE
Alcohol + Dextrose
Dextrose in Saline
Dextrose in water
* Dextrose 50%
Dextrose in Sodium Chloride
Fortravel
Peritoneal Dialysis
Sodium Chloride
Steriflex
Trinide

DIATRIZOIC ACID
Angiografin
Urografin

DIAZEPAM
* Neurolibrine
* Tranquine
* Valium

DIBENCOZIDE
Thiobanzyme

DIBUCAINE HYDROCHLORIDE
Butazolidine
Ciloprine Anaesthetico
Scheriproct
Tomanol
Ultraproct

DICYCLOMINE HCL

Dilomine P. B.

DIENESTROL
* Dienoestrol Cream
Neo-Klimastilben

DIETHYLAMINE SALICYLATE
Icarsan
Myalgine Ointment

DIETHYLSTILBESTROL
Globenicol

DIETHYLSTILBESTROL DIPHOSPHATE TETRASODIUM
* Honvan

DIFLUCORTOLONE VALERATE
* Nerisona
Nerisona C

DIGITOXIN
* Digitaline-Nativelle

DIGOXIN
* Lanoxin
* Natidigoxine

DIHYDRALAZINE
Adelphan-Esidrex

DIHYDRALAZINE SULFATE
Adelphan

DIHYDROERGOCRISTINE
Brinerdin
Sandovene F

DIHYDROERGOTAMINE MESYLATE
* Dihydergot
Tonopan

DIHYDROSTREPTOMYCIN SULFATE
Colistop

DIHYDROXYALUMINIUM AMINOACETATE
Acidrine
Dorital

DIIODOHYDROXYQUIN
* Direxiode

DIMENHYDRINATE
* Dramamine

DIMETHACRINE TARTRATE
* Istonil

DIMETHICONE
* Aeropax
* Gastryl
Mylanta
Polysilane Reglisse
* Polysilane Gel
Simeco

DIMETHINDENE MALEATE
* Fenistil
* Fenistil Retard

DIMETHOTHIAZINE
* Migristene

DIPERODON, HCL
Furazol

DIPHENHYDRAMINE HYDROCHLORIDE
Ambenyl Expectorant
* Benadryl
Benadryl Expectorant
Benafed
Benylin Pediatric
Bisolvon
* Dimedrol
Diphentoral
Herplex
Histogan Expectorant
Mandrax
Maxadryl
Maxadryl Expectorant
Neo-pect

DIPHENHYDRAMINE METHYL SULFOMETHYLATE

* Allerga

DIPHENOXYLATE HCL
Lomotil

DIPHENYLPYRALINE HCL
Eskornade
Expansyl
* Histryl

DIPHTHERIA ANTITOXIN
* Diphtheria-Antitoxin

DIPHTHERIA TOXOID, ADSORBED
Di Te Par Anatoxal
Di Te Anatoxal
Di Te Tab Vaccine

DIPONIUM BROMATUM
Spaslar

DIPYRIDAMOLE
* Persantin
Sedapersantin

DIPYRONE (METHAMPYRONE)
* Acefalgin
Analgec
Artroneuril
Avafortan
Baralgin
Buscopan Compositum
Buscopan
Dolo-Adamon
Dolo-Neurobion
* Novalgine

DISODIUM CARBENICILLIN
* Geopen

DISODIUM EDETATE
Adelphan-Esidrex
Allergan Soakare
Angiografin
Urografin

DISOPYRAMIDE
Sedo-Rythmodan

DITHRANOL
* Lasan

DOTHIEPIN HCL
* Prothiaden

DOXAPRAM HYDROCHLORIDE
* Dopram

DOXIUM
* Doxium

DOXEPIN, HCL
* Aponal
* Sinequan

DOXORUBICIN HCL
* Adriblastina

DOXYCYCLINE HYCLATE
*Vibramycin

DOXYCYCLINE, HCL
* Vibramycin

DOXYLAMINE SUCCINATE
Vicks

DROSERA, COMPOUND
Pecto-Be Be
Pecto brom
Pilka

DYBENAL
Strepsils

DYDROGESTERONE
* Duphaston

DYPHYLLINE
* Neutraphylline
Neutraphylline Papaverine
Neutraphylline Phenobarbital
Neutraphylline Phenobarbital

ELECTROLYTES
Aminofusin

ENZYME MIXTURE
* Caripeptic Liquid
Enzymoflash

EPHEDRINE
Cosanil D. M.
Whooping Cough

EPHEDRINE HCL
Benafed
Bisolvon
Cherry Cough
Efryl
Ipesandrine
Nisolon
Paradryl
Sedalmerck
Tussipect Codeine

EPHEDRINE LEVULINATE
Argyrophedrine

EPHEDRINE SULFATE
Expansyl
Polaramine Expectorant
Theo-Lite

EPICILLIN
* Dexacillin

EPICILLIN SODIUM
* Dexacillin

EPINEPHRINE
Borate-Adrenaline
Epifrin 2%
Procain + Adrenaline

ERGOCALCIFEROL
Abdec
Bexel
Calci-Ostelin
Calci-Ostelin B12 Amp.
Calci-Ostelin B12 Syrup
Calcimarine
Calcium Corbiere
Concavit
Davitamon 10
Filibon Prenatal
Gevral Protein
GT-50
Haliborange
Ketabios
Minadex
Natabec
Obron
Ostocalcium
Prenatal Cap.
Supradyn
Unicap-Therapeutic
Videlta

ERGOSTEROL
Abdec
Paladac

ERGOTAMINE TARTRATE
Ancofen
Avamigran
Bellergal
Bellergal Retard
Cafergot- P.B.
Dystazine
Migril

ERGOTINE
Hemorragine Ergotinee

ERYTHROMYCIN ESTOLATE
* Erythromex
* Ilosone
* Laurylin

ERYTHROMYCIN ETHYL SUCCINATE
* Erythrocin

ERYTHROMYCIN LACTOBIONATE
* Erythrocin

ERYTHROMYCIN STEARATE
* Erythrocin

ESCULIN
Sandoven-F

ESTRADIOL BENZOATE
Ablacton
Cumorit

Dipro Emution
Dipro-Oleosom
Estandron Prolongatum
Femandren-M
* Oestradiol
* Oestroform
Primosiston
* Progynon Boleosum

ESTRADIOL BUTYRYLACETATE
Gynaecosid

ESTRADIOL DIPROPIONATE
Lut-Ovocyclin

ESTRADIOL NICOTINATE PROPIONATE
Trophobolene

ESTRADIOL PHENYL PROPIONATE
Estandron Prolongatum

ESTRADIOL SODIUM SUCCINATE
Styptanon

ESTRADIOL VALERATE
Ablacton
Gravibinan
Primodian Depot
* Progynon
* Progynova

ESTRIOL SUCCINATE
* Synapause

ESTROGENS CONJUGATED
* Premarin
* Premarin (P. M. B.)
* Premarin (P. M. T.)

ESTRONE
Eldec

ETHACRIDINE LACTATE
Hadex

ETHACRYNIC ACID
* Edecrin

ETHAMBUTOL DIHCL
* E-Ti-Bi
* Myambutol

ETHAMIVAN
* Instenon

ETHAMSYLATE
* Dicynone

ETHANOLAMINE IOXYTALAMATE
Vasobrix-32

ETHINYL ESTRADIOL
Eugynon
Hormo-Gerobion Amp.
Hormo-Gerobion Tab.
Lyndiol 2.5
Neogynon
Norlestrin Fe
Ovral
Ovulen 50
* Progynon

ETHIODIZED OIL
* Lipiodol Ultra-Fluide
* Ethionamide

ETHOHEPTAZINE CITRATE
Equagesic
Zactirin

ETHOSUXIMIDE
* Zarontin

ETHYL BISCOUMACETATE
* Tromexan

ETHYLESTRENOL
* Orgabolin

ETHYLMORPHINE CAMPHOSULFONATE
Neo-Codion Adult
Solucamphre Sirop

ETHYLMORPHINE, HCL

Efryl
Sedelmerck

ETHYLPHENYLEPHRINE, HCl
* Effortil

ETHYNODIOL DIACETATE
Ovulen 50

ETOPHYLATE
Etaphylline Phenobarbital
Etaphylline-Phenobarbital
Papaverine
* Inophyline Milote
Inophyline Sedative
Inophyline Sedative Supp.

EUCALIPTUS OIL
Campho-Pneumine Adults
Dentifecte
Faz Inhaler
Fuma Grippe
Mina Inhaler
Myalgine Ointment
Rhumacide
Trophires
Vicks

EUPAVERIN
Eupaco
Sorbosan

EUPHORBIA
Becof

EXT. SANGUIS C.
THROMBOKINASE
* Coagulene

EXTRAIT OBONIDIS SPINDASE
Fuca Excellent

FENFLURAMINE HCL
* Ponderal

FENPIPRAMIDE METHOBROMIDE
Baralgin

FERRIC AMMONIUM CITRATE
Bexel
Rubraton-B
Viplex

FERRIC CHLORIDE
Panbetin Forte

FERROUS CARBONIC SACCHARATE
Supradyn

FERRIC OF ERROSOSODIQUE
COMPLEX OF DICETO
GLUCONIQUE ACID
Oxyferriscorbone-Sodique Atropine

FERRICOSODIQUE COMPLEX OF
ALLOXANIQUE ACID
Oxyferriscorbone-Sodique Atropine

FERROUS FUMARATE
Autrin
Endoglobin
Filibon Prenatal
Gevral Protein
* Ircon O.B.
Perihemin
Trinsicon

FERROUS GLUCONATE
* Ferronicum
Pernexin

FERROUS SODIUM EDATATE
* Sybron

FERROUS SULFATE
Eldec
Fefol-Spansule
* Feospan
* Fer-in-Sol
* Ferro-Sol
Fersolin
Fesovit
Festavital
Geriplex
Hepamine
Multi Tabs
Natabec
Omnibionta
Unicap-Therapeutic

Viterra

FIBRINOGEN
Fibrinogen Human

FIBRINOLYZIN
Elase
Elase-Chloromycetin

FIG EXTRACT
Figine

FLUMETHASONE PIVALATE
Locacorten Vioform

• FLUOCINOLONE ACETONIDE
Pantocream
Synalar-N

FLUOCORTOLONE
Ultralan Cream
Ultralan Ointment
Ultralan Oral

FLUOCORTOLONE ACETATE
Ultralan Cream

FLUOCORTOLONE CAPROATE
Ultralan Cream
Ultralan Ointment
Ultraproct

FLUOCORTOLONE TRIMETHYL ACETATE
Ultralan Cream
Ultraproct

FLUOROMETHOLONE
F M L Liquifilm
F M L Neo

FLUOROURACIL
* Fluoro-Uracil

FLUOXYMESTERONE
* Halotestin

FLUPENTHIXOL DIHYDROCHLORIDE
* Fluanxol

FLUPHENAZINE DIHYDROCHLORIDE
* Moditen
* Permitil Chronotab
* Sevinol

FLUPREDNISOLONE ACETATE
Nisolon

FOLIC ACID
Autrin
Davitamon 10
Delphicol
Eldec
Fefol
Festavital
Filibon Prenatal
* Folacia
Folicofer
Ircon O B
Multi Tabs
Paraxin
Perihemin
Prenatal Cap
Trinsicon
Unicap-Therapeutic

FRANGULA
Fuca Excellent
Rabro
Roter

F. S. H.
Pergonal

FUCI VESICULOSI
Fuca Excellent

FUMARIA (COMPOUND)
* Oddibil

FUNGAL ENXYME
Trizymal

FURAZOLIDONE
Diarex
* Furoxone
Parazoline Suspension

FURFENOREX CYCLOHEXYLSULFONATE
* Frugalan

FUROSEMIDE
* Lasix
Terbolan

FUSAFUNGINE
* Locabiotal

GALACTONE SULFATE
Acidrine

GAMMALON
* Gammalon

GELATIN
Ambezim

GENTAMICIN SULFATE
* Garamycin Cream & Ointment
* Garamycin Injection
* Garamycin Ophthalmic

GENTISIC ACID ETHANOLAMIDE
Becozyme

GERMAN MEASLES VACCINE
* Almevax
* Cendevax

GESTONDRONE CAPROATE
* Depostat

GLAPHENINE
Adalgor
* Glifanan

GLIBEN CLAMIDE
* Daonil
* Euglucon

GLICLAZIDE
Diamicron

GLOBULIN, IMMUNE SERUM
* Beriglobin
* Gamma Globulin Human Immune
Globuman
Histaglobin
Human Immune Globulins
* Perbulin
* Tetanus Antitoxin

GLUTAMIC ACID
* Neuroglutamine
Vita Marciderme

GLYCOBIARSOL
* Milibis

GLYCOL SALICYLATE
Bayolin
Midalgan

GLYCOPYRFOLATE
* Robinul
Robinol PH

GLYVENOL
* Glyvenol

GONADOTROPIN SERUM
Gestyl
Gestyl Testo
* Humegon

GONADOTROPIN, CHORIONIC
* Pregnyl
* Primogonyl
* Profasi

GONOCOCCUS VACCINE
* Gonococcic Vaccine

GRAMICIDIN
Graneodin
Kenacomb
Kenacort A
Sofradex
Topifram

GRANDELIA
Paracodine

GRISEOFULVIN
* Grisovin F. P.

GUAIFENESIN
Ambezime Balsamic
Coryban-D
Dimetane Expectorant
Histolit Expectorant
Hystacode
Metorcin
New Pectovite
Polaramine Expectorant
Pyradine Expectorant
Quibron
Theo-Lite

GUANETHIDINE SULFATE
* Ismelin

GUI
Paderyl

HALIBUT LIVER OIL
Haliborange

HALOPERIDOL
* Serenace

HALOTHANE
* Fluothane
* Halothane

HAMAMELIS, COMPOUND
Hadex
Hemorragine Ergotine
Sedaco

HEMICELLULASE
Onoton

HEPARIN
* Heparine

HEPARINOID
Bayolin
Lasonil

HEPTABARBITAL
* Medomine

HEPTAMINOL HCL
* Heptamyl

HESPIRIDINE
Festavital
* Vasolex

HEXAPOTASSIUM HEXA SODIUM PENTA CITRATE
* Litholen -U

HEXABENDIN
* Instenon

HEXABENDIN DI, HCL
Instenon

HEXACHLOROPHENE
Scheriproct
Ultraproct

HEXAMEDINE DIISETHIONATE
* Hexomedine
* Hexomedine Transqutanee

HEXOCYCLIUM
* Tral Gradumet

HEXOPROTERENOL SULFATE
* Ipradol

HEXYL NICOTINATE
* Nicotherm

HIDRASTIS (COMPOUND)

Hemorragine Ergotine

HISTAMINE, DI HCL
Histaglobin
Midalgan

HISTAPYRRODIN HCL
Calcistin

HOMATROPINE HYDROBROMIDE
* Homatropine
* Mesopin
Mesopin P. B.

HOMATROPINE METHYL BROMIDE
Dystazine
* Mesopin
Mesopin P. B.
Sedorma

HYALURONIDASES
Lasonil

HYDERGINE (DIHYDROERGOTOXIN)
* Hydergine

HYDRASTINE, HCL
Ibath

HYDROCHLOROTHIAZIDE
Adelphan-Esidrex
* Dichlotride
Dyazide
Esidrex
Hydromet
Moduretic

HYDROCORTISONE
Hydrocortancyl
Hydrocortifor
Jadit H
Pimafucort
Rectoidal
Schericur
Scheroson-F oph
Sterosan
Terra-Cortril

HYDROCORTISONE ACETATE
* Cortril
* Hydrocortisone
* Hydrocortisone
Jadit H
Neo Cortef Eye, Ear
Neo Cortef Ointment
Neomycine + Hydrocortisone
Xyloproct Ointment

HYDROCORTISONE CAPROATE
Scheroson -F OPH

HYDROCORTISONE SODIUM SUCC'NATE
* Flebocortid
* Solu-Cortef

HYDROFLUMETHIAZIDE
Rautrax Improved

HYDROQUINIDINE GLUCONATE
* Hydroquinidine

HYDROQUINIDINE HCL
* Hydroquinidine

HYDROXOCOBALAMIN
* Neo-cytamin
Tridocelan

HYDROXYCHLOROQUINE SULFATE
* Plaquinol

HYDROXYPHENYLBUTAZONE
* Tanderil

HYDROXYPROGESTERONE CAPROATE
Gravibinan
Primosiston
* Proluton
* Proluton Depot

HYDROXYZINE DI, HCL
* Atarax

ذ.ر.یك به تجارى

HYOSOYAMINE (SCOPOLAMINE)
Sedaco

HYOSCYAMINE SULFATE
Bardase
Donnagel P. G.
Donnatal
Donnazyme
Gastralgine
Levsin P. B.

HYOSCYAMUS (COMPOUND)
Paderyl

HYSOP
Paderyl

IBUPROFEN
* Brufen

ICHTHAMMOL
Dermex

ICTERYL
* Icteryl

IDOXURIDINE
* Herplex
* Gel "V"

ILDAMEN
Seda Ildamen

IMIPRAMINE HYDROCHLORIDE
* Tofranil

IMOLAMINE, HCL
* Irrigor

INDOMETHACIN
* Indocid
* Metacen

INOSITOCALCIUM
Vitathion (A. T. P.)

INOSITOL
Delphicol
Gevral Protein
Lederplex Cap.
Lederplex Syrup
Vitabex

INOSITOL NIACINATE
Bendigon

INSULIN
* Insulin
* Insulin Berna
* Insulin Protamine Zinc
Insulin Protamine Zinc Berna
* Insulin N.P.H.

INSULIN CRYST. PROTAMINE
* Insulin Protamine Zinc
* Insulin N. P. H.

INSULIN ZINC, EXTENDED
Insulin Protamine Zinc

INSULIN ZINC PROTAMINE
* Insulin N.P.H.
* Insulin Protamine Zinc

INSULIN, ISOPHANE
* Salminsulin NPH Berna

INTRINSIC FACTOR
Autrin

IODIPAMIDE
Biligrafin
Endografin

IODIZED OIL
* Lipiodol 40%

IODOCHLORHYDROXYQUIN
Betnovate - C
* Entro - Coli Max
Entero-Vioforme
Locacorten-Vioforme
* Mexaform

Mexase
Sinadur

IOPANOIC ACID
* Telepaque

IOPYDONE
Hytrast

IPECA, BROMHYDRATE
Ipesandrine
Senodin
Solucamphre Sirop

IPECAC (SYRUP)
Pectrobrom
Pectocode
Phenegran-Expectorant
Whooping Cough

IRON DEXTRAN
* Imferon

IRON SORBITEX
* Jectofer

ISOEPHEDRINE SULFATE
Drixoral

ISOPROPAMIDE
Eskornade

ISOPROTERENOL HCL
* Isuprel

ISOPROTERENOL SULFATE
* Medihaler-Iso

ISOPYRIN HCL
Tomanol

ISOPYRIN HYDROGENTARTRATE
Tomanol

ISOSORBIDE DINITRATE
* Isordil

ISOXSUPRINE HCL
* Duvadilan

JUSQUIAME EXTRACT
Paderyl

KANAMYCIN SULFATE
Kanacillin
* Kanamycin
* Kantrex

KAOLIN
Bisumupan
Bismuth Pharmachimie
Bismuth Tulasne
Cantil Tablet
Colistop
Cremo S. P. K.
Donnagel P. G.
Gabbroral
Kaoleine Strepto
Kaopectate
Kapect
Kapect.P
Normacidine
Pareguan
Peka
Peka P
Ramosuccin
S. P. K.
Ultracarbon

KETAMINE, HCL
* Ketalar

LACTIC ACID
D. G. Drop
D. G. Powder

LACTOSE
Adriblastina
Benadryl

Buscopan
Chloromycetin
Esidrex
Globenicol
Isordil
Oncovin
Ponstan
Premarin
Profasi

LANATOSIDE, C, DESACETYL
* Cedilanid

LAURIER CERISE WATER
Neo-Codion Adults

LEMON OIL
Dietelmin
Litholen-U

LESPEDEZA CAPITATE
* Lespenephryl

LEUKODININE BC
* Leukodinine-B

LEVAMISOLE, HCL
* Ketrax
* Vermizol

LEVARTERENOL BITARTRATE
* Levophed

LEVO-EPINEPHRINE HCL
* Epifrin 1%

LEVODOPA
* Larodopa
* Madopar
Sinement

LEVOGLUTAMINE
* Levoglutamin

LH
Pergonal

CHLORBENZOXAMINE
Libratar Complex

LIDOCAINE
Terramycin-Intramuscular
Xylocaine Heavy
Xylocaine Injection
* Xylocaine Jelly
Xylocaine Ointment
Xylocaine Spray 10
* Xylocaine Solution
Xylocaine Viscous
Xyloproct Ointment

LIDOCAINE HYDROCHLORIDE
Bristacin-A
Dynapen
Megacilline Forte
Mervan
Reverin
Rifocin
Tridocelan
Versapen
* Xylocaine Heavy
* Xylocaine Injection
* Xylocaine Jelly
* Xylocaine Ointment
Xylocaine Spray 10
Xylocaine Solution
Xylocaine Viscous

LINCOMYCIN HYDROCHLORIDE
* Lincocin

LIPASE
Combizim

LITHIUM CARBONATE
* Priadel

LIVER EXTRACT (COMPOUND)
Alertonic
Lederplex Cap.
Lederplex Syrup

LIVER-STOMACH CONCENTRATE
Trinsicon

LYNESTRENOL
Lyndiol 2.5

LYSINE MONOHYDROCHLORIDE
Urbamin

MAGALDRATE
* Riopan

MAGNESIA, MILK OF
Di-Gel
Mylanta

MAGNESIUM CARBONTE
Actonorm
Almacarb
* Gastropulgite
Libratar Complex
Limax
Limocitric Powder
Limolax
Magnex
Normacidine
Rabro
Roter
Simeco
* Sirolax

MAGNESIUM GLUCONATE
Bristacain -A
Reverin

MAGNESIUM
GLYCEROPHOSPHATE
Supradyn

MAGNESIUM HYDROXIDE
Almax
Aludrox
Gastryl
Kudrox
Laxmel
Maalox
Magel
Mylanta
Oxaine-M
* Phillips Milk of Magnesia
Simeco

MAGNESIUM OXIDE
Filibon Prenatal
Multi Sanostol
Rabro

MAGNESIUM SILICATE
Gastropulgite

MAGNESIUM SULFATE
Andrews
Oralit
Viterra

MAGNESIUM TRICILICATE
Actonorm
Alsigel
Butazolidin
Butazolidin Alka
Gelusil
Magel
Magnex
Metacen
Normacidine
Polysilane Reglisse

MALT
Figine

MALTIN
Actonorm
Normacidine

MANGANESE
GLYCEROPHOSPHATE
Biocostene
Metaton

MANGANESE OXIDE
Filibon Prenatal

MANGANESE SULFATE
Fersolin
Festavital
Geriplex
Minadex
Multi Sanostol
Prenatal Cap.
Supradyn
Unicap-Therapeutic
Vinuphos
Viterra

MANNITOL
Liometacen
* Mannitol in water
Nolvadex

MEASLES VIRUS VACCINE, LIVE ATTENUATED
* Moraten

MEBHYDROLINE NAPHTALENEDISULFONATE
Refagan

MECLIZINE
Ancofen

MEDROGESTONE
* Colprone

MEDROXYPROGESTERONE ACETATE
* Farlutal
* Provera

MEDRYLAMINE
Longifene

MEDRYSONE
H. M. S.

MEFENAMIC ACID
* Ponstan

MEFUSIDE
Bendigon

MEGLUMINE
Angiografin
Biligrafin
Endografin
Liometacen
Urografin

MEGLUMINE ACETRIZOATE
* Vasurix-Poly-Vidone

MEGLUMINE DIATRIZOATE
* Hypaque

MEGLUMINE INDOMETHACINATE
Liometacen

MEGLUMINE IOCARMATE
Dimer. X

MEGLUMINE IOTHALAMATE
Telebrix (38)

MEGLUMINE IOXYTALAMATE
Vasobrix-32

MENADIOL DIACETATE (VIT.K4)
Sodium Salicylate Compound

MENADIOL DIBUTYRATE
Styptobion

MENADIOL SODIUM DIPHOSPHATE
Styptobion
* Synkavit

MENADIONE (VIT. K3)
Salimarine

MEPENZOLATE BROMIDE
Cantil Tablet

MEPHENESIN
Aramin
Midalgan

MEPHENTERMINE SULFATE
* Wyamine

MEPHOBARBITAL
Comital-L

MEPIVACAINE
Ejificol Succinat

MEPIVACAINE HCL
Estradurin

MEPROBAMATE

Adalgor
Equagesic
* Pertranquil
Restenil
Tranquo-Adamon

MEPYRAMINE MALEATE
* Anthisan
Efrinose
Efrinose B. B.
Hista-Two
* Parmal
Prefrin-A
Pyradine Expectorant
Tri-hista

MERCAPTOPURINE
* Puri-nethol

MESTEROLONE
* Proviron
Tonovan

METAPROTERENOL SULFATE
* Alupent
Silomat-Compositum

METFORMIN HCL
* Glucophage

METHACHOLINE CHLORIDE
Surin

METHALLENESTRIL
Klimerco

METHANDROSTENOLONE
* Dianabol
Dianavit

METHAPYRILENE HCL
Co-Pyronil
* Theo-Lite
Theo-Lite Tab.

METHAQUALONE
Mandrax
* Melsedin
* Revonal

METHDILAZINE HCL
* Dilosyn

METHENAMINE
Sympathyl

METHENOLONE ENANTATE
* Primobolan Depot

METHIMAZOLE
* Tapazole

METHIONINE
Eldec
Festavital
Litrison
Physihepatole
Urbamin

METHOCARBAMOL
* Robaxin
Robaxisal

METHOTREXATE
* Methotrexate

METHOTRIMEPRAZINE MALEATE
* Nozinan

METHOTRIMEPRAZINE, HCL
* Nozinan

METHOXALEN
* Meladinine

METHOXYFLURANE
* Penthrane

METHOXYPHENAMINE, HCL
* Asmi

METHYL ESTRADIOL
Gynaecosid

METHYL NICOTINATE
- Icarsan
- Midalgan

METHYL SALICYLATE
- Calox
- Denti Fect
- Rhumacide
- Surin
- Vicks

METHYLDOPA
- * Aldomet
- * Dopamet
- Hydromet
- * Hyperpax

METHYLENE BLUE
- Sulfa-Blue

METHYLEPHEDRINE, HCL
- * Ventilat

METHYLERGONOVINE MALEATE
- * Methergin

METHYLPREDNISOLONE
- * Medro
- * Medrol Medules

METHYLPREDNISOLONE ACETATE
- * Depo-Medrol
- * Medrol Veriderm
- Neo Medrol Acne Lotion

METHYLPREDNISOLONE SODIUM SUCCINATE
- * Solu-Medrol

METHYLTESTOSTERONE
- Eldec
- Hormo-Gerobion Amp.
- Hormo-Gerobion Tab
- Neo-Klimastiblen

METOCLOPRAMIDE DIHYDROCHLORIDE
- * Plasil
- * Primperan

METOCLOPRAMIDE, HCL
- * Plasil

METOPIMAZINE
- * Vogalene

METRONIDAZOLE
- * Flagyl Suspension

MILLOPHYLINE
- Dechophyline
- Dechophyline Phenobarbital

MILLOPHYLINE IODOMETHYLATE
- Iodaphyline

MINOCYCLINE HCL
- * Minocin

MINT OIL
- Normacidine

MIRAMINE T,A
- Hydrocare

MITOMYCIN C
- * Mitomycine

MOL IRON 130
- * Mol-Iron

MORPHINE (INJECTION)
- Ipesandrine

MORPHINE HCL
- Cherry Cough
- Ipesandrine

MYRISTYL OXYBUTYLAMINE HCL
- Cenasert
- Vicks

NAFTIDROFURYL OXALATE ACID

* Praxilene

NALIDIXIC ACID
* Neg-Gram

NANDROLONE DECANOATE
Deca-Durabolin

NANDROLONE PHENPROPIONATE
Docabolin
* Durabolin

NANDROLONE UNDOCYLATE
Trophobolene

NAPHAZOLINE NITRATE
Antistine-Privine
* Naphtazoline
Naphtazoline + Antihistamine
Nisolone
Rhinomarine

NAPHAZOLINE, HCL
Albalon

NARCOTINE HCL
Bisolvon

NATIVE CONVALLARIA GLYCOSIDES
Cardiopon

NEOMYCIN B SULFATE
Sofradex
Topifram

NEOMYCIN SULFATE
Betnesol-N
Betnesol Retention Enema
Betnovate
Betnovate-N
Betnovate-C
Celestoderm
Conjunctin
Decoderm
Diacol
F. M. L. Liquifilm
F. M. L. Neo
Graneodin
Kenacomb
Kenacort
Kenacort A
* Myciguent
Neo Cortef Eye, Ear
Neo Cortef Ointment
Neo Medrol Acne Lotion
Neo Medrol Veriderm
Neo-Decadron
* Neomin
Neomycine + Hydrocortisone
Pimafucort
Pulgit-N
Sulfaderm
* Sulfamycine
Synalar-N
Valy Pommad

NEOSTIGMINE BROMIDE
GT-50
* Prostigmin

NEOSTIGMINE METHYLSULFATE
* Prostigmin

NIACINAMIDE
A. B. C. D.
Abdec
Alertonic
B-Colex
Becomarine
Becozyme
Benutrex B12
Benutrex C
* Benutrex Oral
Beviplex
Bexel
Biocostene
Calcium Corbiere
Catovit
Concavit
Dagravit Total
Davitamon 10
Dextrose in Saline

Dianavit
Duphasol Multivitamin
Eldec
Endoglobin
Estradurin
Fesovit
Festavital
Filibon Prenatal
Geriplex
Gevral Cap.
Gevral Protein
Hepamine
Hormo-Gerobion Amp.
Hormo-Gerobion Tab
Katabios
Lederplex Cap.
Lederplex Syrup
Litrison
Multi Tabs
Multin
Natabec
* Nicobion 500
Paladac
Panbetin Forte
Pernexin
Physio-hepatole
Polybion
Prenatal Cap.
Proberon
Roeribec
Rubraton-B
Sol-Vit
Supradyn
Unicap Therapeutic
Viplex
Vita Marciderm
Vitabex
Vitaten
Viterra

NICLOSAMIDE
* Telmex
* Teniax
* Tenicide

NICOTINIC ACID
* Nicyl
Nicyl B6
Nicyl Papaverine
Spasmocor-R

NIFEDIPINE
* Adalat

NIFURATEL
* Macmiror

NIFUROXIME
Furacin Soluble Dressing
Furacin Soluble Powder
Furacin Solution
Furacin Urethral Inserts
Furazole

NIKETHAMIDE
* Anacardon
* Coramine
* Coramine Ephedrine

NIRIDAZOLE
* Ambilhar

NITRAZEPAM
* Mogadon

NITROFURANTOIN
* Furadantin
* Furadantin Sodium
* Macrodantin
Urospasmon

NITROFURAZONE
* Furacin Soluble Dressing
* Furacin Soluble Powder
* Furacin Solution
* Furacin Urethral Inserts
* Furanit
* Furazole
Hydrocortifor

NITROGLYCERIN
* Nitro Lent
* Nitrocontin
* Nitrolingual
* Nitrong
Spasmocor-R

ژنریک به تجارتی

NITROXOLINE
* Nibiol Fotte

NONOXYNOL
* Delfen Cream

NONYLIC ACID VANILAMIDE
Finalgon
Forapin

NOPOXAMINE LAURYL SULFATE
Acidrine

NORETHINDRONE ACETATE
Ablacton
Norlestrin Fe
* Primolut Nor

NORGESTREL
Eugynon
* Microgynon 30
Neogynon
Ovral

NORMETHANDRONE
Gynaecosid

NORTRIPTYLINE HYDROCHLORIDE
* Aventyl
* Nortrilen

NYSTATIN
Kenacomb
* Mycostatin
* Mycostatin
Mysteclin-V

O-BENZOYL THIAMINE DISULFIDE
* Beston

OMNADINE
Omnacillin

ONOPROSE
* Onoprose

OPIPRAMOL DIHYDROCHLORIDE
* Insidon

OPIUM
Colchimax

OPIUM (COMPOUND)
Donnagel P. G.
Kapet
Kapet P
Parazolin Suspension
Pareguan

OPIUM POPPY
Abcedent
D. G. Drop
D. G. Powder

ORPHENADRINE CITRATE
Noegesic

ORTHOHYDROXYQUINOLINE SULFATE
Aci-Gel
Dermex
Marciderm
Otimarine
Sulfaderm

OUABAIN
* Ouabaine Arnaud

OX BILE
Nutrizym
Trizymal

OXAZEPAM
* Adumbran
* Serepax
Tranquo Adamon
Tranquo Buscopan

OXELADIN CITRATE
* Pectamol

OXETHAZAINE
Oxaine-M

OXOLINIC ACID

ذرّ ات به اختصاری

* Prodoxol

OXOMEMAZINE
* Doxergan

OXPRENOLOL HCL
* Transicor 80

OXYFEDRINE HCL (ILDAMEN)
* Ildamen

OXYFERRISCORBONE SODIUM
Oxyferriscorbone-Sodique Atropine

OXYHEMOGLOBIN
Vitathion (A. T. P.)

OXYMESTERONE
* Oranabol

OXYMETAZOLINE
* Iliadine

OXYMETHOLONE
* Adroyd

OXYMETHUREA
Ciloprine
Ciloprine Anaesthetico

OXYPHENONIUM BROMIDE
* Antrenyl
Mexaform

OXYTETRACYCLINE
* Terramycin
Terramycin-Intramuscular

OXYTETRACYCLINE HYDROCHLORIDE
Terra-Cortril
* Terramycin
Terramycin Intervenous
Terramycin
* Terramycin Intramuscular
Terramycin, OPH
Terramycin Pom.
Terramycin SF
Terramycin Vaginal Tablet

OXYTOCIN
* Syntocinon

PC1 (FENIPENTOL)
Cholipin

PANCREATIN
Actonorm
Damagal
Donnazyme
Enzymoflash
Mexase
Normacidine
Nutrizyme
Onoton
Trizymal

PANCURONIUM BROMIDE
* Pavulon

(d-1) PANTOTHENIL ALCOHOL
Eldec
Endoglobin

PAPAIN
Damagal
PAPAVERINE
Inophyline Millote
Inophyline Sedative
Inophyline Sedative Supp.
Monotrean

.PAPAVERINE HYDROBROMIDE
Paderyl

PAPAVERINE HYDROCHLORIDE
Actonorm
Bisolvon
* Etaphylline-Phenobarbital
Neutraphylline Papaverine Phenobarbital
Neutraphylline-Phenobarbital
Neutraphylline
Normacidine

PAPAVERINE MANDELATE
Nicyl Papaverine

PARA AMINOBENZOIC ACID (VIT. BX)
Osadrine

PARADRYL
* Paradryl

PARAFFIN, LIQUID
* Albagar

PAREGORIC
Cremo S.P.K.
Kaoleine Strepto
Pareguan
Peka. P.

PAROMOMYCIN SULFATE
* Gabbroral
* Gabromicin
* Humatin

PASADEN
Seda Ildamen

PASINIAZIDE
P. I. E. M.

PASSIFLORA, FLUID EXTRACT
Passibromine
Passiflorine
Seval

PECTIN
Cantil Tablet
Carbantrene
Cremo S. P. K.
Diarex
Donnagel P. G.
Kaoleine Strepo
Kaopectate
Kapect
Kapect. P.
Peka
Peka P
Ramosuccin
S. P. K.

PENTAERYTHRITOL TETRAACETATE
Lentrat
Lentrat-A
Spasmocor R

PENTAZOCINE
* Talwin

PENTOXIFYLLIN
* Trental

PENTYLENETETRAZOLE
Sympatocard

PEPERMINT OIL
Abcedent
Figine
Gripe Mixture

PEPSIN
Damagal
Donazyme
Zymet

PEPTONE
Sympathyl

PERICYAZINE
* Neuleptil

PERPHENAZINE
* Fentazin
* Trilafon

PERTUSSIS IMMUNE GLOBULIN
* Tosuman

PHANQUONE
Mexaform
Mexase

PHENACETIN

Axar
Codopyrin
Coricidin
Coryban-D
Doloxene Compound
Dolviran
Passal
Paxidin
Refagan
Sedalmerck

PHENAZOPYRIDINE
Urospasmon

PHENAZOPYRIDINE, HCL
Uropol

PHENETHYL ALCOHOL
Neomycine + Hydrocortisone

PHENIRAMINE AMINOSALICYLATE
* Avil
Ultraproct

PHENIRAMINE MALEATE
* Avil

PHENIRAMINE TANNATE
Histamex

PHENOBARBITAL
Actonorm
Alginal
Aram
Askine
Bardase
Belladenal Retard
Bellergal
Bellergal Retard
Bevised
Bromarine
Colchimax
Comital-L
Dechophyline
Dechophyline Phenobarbital
Dilomine P. B.
Dolviran
Donnatal
Donazyme
Etaphylline Phenobarbital
Etaphylline Phenobarbital Papaverine
Eupaco
Franol
Inophyline-Sedative
Inophyline-Sedative Enfants
Iodaphyline-Sedative Supp.
Isoptin-S
Lenterules De Gardenal
Levsin P. B.
* Luminal
* Luminalettes
Mesopin P. B.
Neo-Klimastilben
Neutraphylline Phenobarbital
Neutraphylline Papaverine Phenobarbital
New Pectovit
Normacidine
Passal
Passibromine
Pecto-brom
Pectocode
Piptal Drop
Priscophene
Robinul P. H.
Sedapersantin
Sedo-Carena
Spasmocor R
Sympathyl
Theo-Lite Tab.
Ventilat

PHENOL LIQUEFIED
Abcedent
Lavorine

PHENOLPHTALEIN
Mucinum
* Paragarine

PHENOPYRAZONE
Artroneuril
Osadrine

PHENOXYMETHYL PENICILLIN
* Fenoxypen
* Tikacilline 600,000
* Tikacilline 100,000

PHENYL SALICYLATE
Bismogol
Bucaseptol

PHENYL TOLOXAMINE CITRATE
Sinutab

PHENYLBUTAZONE
Alpha Kadol
* Butazolidine
Butazolidine Alka
Delta-Butazolidine
Tomanol

PHENYLCINAMATE HCL
* Paderyl

PHENYLEPHRINE HYDROCHLORIDE
Alcon Efrin 25
Alcon Efrin 14
Aqua-Drin
Coricidin
Corisan
Corisan Enfant
Coryban-D
Dimetane
Dimetane Expectorant
Dimetap Extentabs
Efrinos
Efrinos B. B.
Fenox
Gripin
Gripin Mixture
* Hista-Two
Histolit Expectorant
Histolit Expectorant D. C.
Metorpan
Mycidon
N. T. R.
Naldecol
Neo Pherine
* Neo-Synephrine
Pectomycine
Pecton Tab.
Prefrin-A
Pyradine Expectorant
Rhinomarine
* Rhinophene
Synephricol
Tri-hista

PHENYLMERCURIC NITRATE
Chloroptic
Estradurin
Salyrosine

PHENYLPROPANOLAMINE, HCL
Babyrhinol
Coryban-D
Dimetane Expectorant
Dimetapp Extentabs
Eskornade
Hista-Two
Histolit Expectorant
Histolit Expectorant D.C.
Metorpan
Naldecol
Pyradin-Expectorant
Sinutab
Trihista

PHENYLTOLOXAMINE
Naldecol
Tri-hista

PHENYLTOLOXAMINE HCL
Naldecol

PHENYTOIN
Comital-L
* Dilantin

PHENYTOIN SODIUM
* Dilantin
* Dilantin Phenobarbital
Garoin

PHOLCODINE
* Ethine
Trophires

PHOSPHORYLCHOLINE
* Heparexine

PHOSPHORYL ETHANOLAMINE

Physiohepatole

PHYSOSTIGMINE
* Eserine Huileuse

PHYTONADIONE
* Konakion

PILOCARPINE HYDROCHLORIDE
* Isopto Carpine

PILOCARPINE NITRATE
* Chibro-pilocarpine
* Miotine
* Pilocarpine Chibret

PIMARICIN
* Pimafucin
Pimafucort

PINGUICULA, TINCTURE
Pilka

PIPENZOLATE BROMIDE
* Piptal Tab.
* Piptal Drop

PIPERATECOL
Hydrosarpan

PIPERAZINE
Vanpar

PIPERAZINE ADIPATE
* Dietelmin

PIPERAZINE CITRATE
Vanpar

PIPERAZINE HEXAHYDRATE
* Bryrel

PIPERAZINE PHOSPHATE
* Antepar
* Helmezine

PIPERIDOLATE HCL
* Dactil

PIRIDOXILATE
* Glyo-6

PLASMA PROTEIN FRACTION
Human Immune Globulins

POLYESTRADIOL PHOSPHATE
Estradurin

POLYETHYLENE GLYCOL
OINTMENT
Furacin
Leucodinine-B
Metacen
Xylocaine Ointment
Zarontin

POLYMYXIN B SULFATE
Conjunctin

POLYPEPTIDE
* Cerumenex
* Haemaccel

POLYVINYL ALCOHOL
Albalon
* Allergan Soakare
Bleph 10
Bleph 30
Conjunctin
F.M.L. Liquifilm
F. M. L. Neo
H. M. S.
Herplex
* Liquifilm Tears
* Liquifilm Wetting

POTASSIUM BROMIDE
Tussicof

POTASSIUM CHLORATE
D. G. Drop
D. G. Powder

POTASSIUM CHLORIDE
Abcedent
Darrow's Solution

Dextrose
Haemaccel
Hartman's Solution B.P.
* Kalium Durules
Lactated Ringer's (Hartman's)
Multi Tabs
Oralit
* Potassium Logiais
* Potassium Chloride
Rautrax, Improved
Ringer's Solution
Steriflox

POTASSIUM GLYCEROPHOSPHATE
Minadex
Vinuphos

POTASSIUM GUIACOLSULFONATE
Ambenyl Expectorant
Avipulmine
Metorpan
Pecto- Be Be
Pectocode
Pectomycine
Pectone Syrup
Pectone Tab.
Pectoramin
Phenergan Expectorant
Pyradine Expectorant

POTASSIUM HETACILLIN
* Versapen

POTASSIUM HYDROXIDE
Aminofusin L Forte

POTASSIUM IODIDE
Chibro Iodo Calcique
Eldec
Festavital
Filibon Prenatal
Gevral Cap.
Gevral Protein
Iodocol
Unicap Therapeutic
Vita-Iodurol
Viterra

POTASSIUM PENICILLIN G
Crysticillin
* Penicillin
* Penicillin G. K.

POTASSIUM PHENETHICILLIN
* Broxil

POTASSIUM PHENOXYMETHYL PENICILLIN
* Acipen V-K
* Cliacil
* O-Pen
* Tikacilline 600,000
* Tikacilline 1,000,000
* Vicilin

POTASSIUM PHOSPHATE
Liometacen

POTASSIUM SULFATE
Filibon Prenatal
Gevral Protein
Unicap-Therapeutic

POVIDONE
Vasurix-Poly-Vidone

POVIDONE IODINE
* Betadine

PREDNISOLONE
* Deltacortril
* Di-Adreson F
* Hostacortin-H
* Leptinol

PREDNISOLONE ACETATE
Isopto-cetapred
Rifoderm

PREDNISOLONE CAPROATE
Scheriproct

PREDNISOLONE
SODIUM SUCCINATE
* Solu-Dacortin

PREDNISOLONE SODIUM SULFOBENZOATE
Cortol

PREDNISOLONE TRIMETHYLACETATE
* Ultracortenol

PREDNISONE
Delta-Butazolidine

PRENYLAMINE LACTATE
* Segontin

PRIMIDONE
* Mysoline

PROBENECID
* Benemid

PROCAINAMIDE HYDROCHLORIDE
* Pronestyl

PROCAINE HYDROCHLORIDE
Abcedent
Dolo-Neurobion
GT-50
Procaine + Adrenaline
Sulfate de Zinc + Procaine
Terramycin Intramuscular

PROCAINE PENICILLIN G
Crysticillin
Extencilline (6- 3 - 3)
*! Hostacillin
Hostacillin (aqu. ol.)
Kanacillin
Omnacillin
Penicillin
Penicillin G.K.
Penilente
Triplopen

PROCARBAZINE HYDROCHLORIDE
* Natulan

PROGESTERONE
Cumorit Oral
Dipro Emulsion
Dipro-Olesum
GT - 50
Gynaecosid
* Progestine
* Proluton
Proluton Drop
Testoluton Fort
Tocogestan

PROGESTERONE ENANTATE
Trophobolene

PROGESTIN
Lut-Ovocycline

PROLINTANE
Catovit

PROMAZINE HYDROCHLORIDE
* Sparine

PROMETHAZINE
* Phenergan
Phenergan Cream
Phenergan Expectorant

PROMETHAZINE HYDROCHLORIDE
* Neo-dril
Pectomycine
* Phenergan
* Phenergan Cream
Phenergan - Expectorant

PROPAMIDINE ISETHIONATE
* Propamidine

PROPANIDID
* Epontol

PROPANTHELINE BROMIDE
* Ercoril
* Pro-Banthine
Pro-Banthine Dartalan

PROPIOMAZINE MALEATE
* Dorevane

PROPOXYPHENE HYDROCHLORIDE
* Algaphan
Doloxene Compound
Femidol

PROPRANOLOL, HCL

Inderal

PROPYLIODONE
* Dionosyl
Hytrast

PROPYPHENAZONE
Eupaco
Sedalmerck
Tonopan

PROTAMINE SULFATE
Insulin N. P. H.
Insulin
Insulin Berna
* Sulfate de Protamine

PROTEASE
Combizim

PROTEIN HYDROLYSATE
* Aminoseryl

PROTHIONAMIDE
* Trevintix

PSEUDOTROPINE BENZYLATE, HCL
Eupaco

PYRANTEL PAMOATE
* Combantrin

PYRIDINE METHANOL
* Ronicol
* Ronicol Retard

PYRIDINEMETHANOL TARTRATE
* Ronicol

PYRIDINOL CARBAMATE
* Anginin

PYRIDOXINE
A. B. C. D.
Multi Tabs
Thiobanzyme

PYRIDOXINE HYDROCHLORIDE
Abdec
* Becibin
Becomarine
Becozyme
* Benadon
Benutrex B12
Benutrex C
Benutrex Oral
Beviplex
Bexel
Biocostene
Budodouze Forte
Catovit
Concavit
Dagravit B Complex
Dagravit Total
Davitamon 10
Dianavit
Dolo-Neurobion
Duphasol A
Duphasol Vitamine A + D3
Duphasol Multivitamin
* Ejisix
Endoglobin
Eldec
Fesovit
Festavital
Filibon Prenatal
Folicofer
Gevral Protein
Hepamine
Hormo-Gerobion Amp.
Hormo-Gerobion Tab
Hydrosol Polyvitamine
Katabios
Lederplex Cap.
Lederplex Syrup
Multi Sanostol
Multibionta Cap.
Multibionta Eff.
Multin
Natabec
Neurobion
Obron
Omnibionta
Paladac
Panbetine Forte
Pernexin

Physiohepatole
Polybion
Princi B
Proberon
Roeribec
Rubraton-B
Sol Vit
Sclerobion
Sopalamin 3B
Supradyn
Tridocelan
Unicap Cap.
Urbamin
Vitabex
Vitaten
Viterra

PYRITHIOXIN
* Encephabol

PYROBUTAMINE PHOSPHATE
Co-Pyronil

PYROLIDONE ACETAMIDE
* Nootropil

PYRVINIUM PAMOATE
Vanpar
* Vanquin

QUILLAJA
Quilla Codeine
Quilla Simplex

QUINIDINE BISULFATE
* Kinidin Durules

QUINIDINE PHENOBARBITAL
* Natisedine

QUINIDINE POLYGALACTURONATE
* Cardioquine

QUINIDINE SULFATE
* Quinicardine

QUININE HCL
Monotrean

RAUWOLFIA SERPENTINA
Rautrax Improved

RESCINNAMINE
Modenol

RESERPINE
Adelphan
Adelphan-Esidrex
Bendigon
Brinerdin
Hygroton Reserpine
Modenol
* Serpasil
* Serpasil Esidre
Terbolan

RETINOIC ACID
* Retin-A

RIBOFLAVINE
A. B. C. D.
Abdec
B-Colex
Becomarine
Becozyme
Benutrex Oral
Biocostene
Catovit
Concavit
Dagravit B Complex
Dagravit Total
Davitamon 10
Dianavit
Eldec
Endoglobin
Fesovit
Festavital
Filibon Prenatal
Geriplex
Gevral Cap.
Gevral Protein
Hypobeta-20
Ido-Becoplex
Katabios

Lederplex Cap.
Lederplex Syrup
Litrison
Multi Tabs
Natabec
Panbetine Forte
Pernexin
Physiohepatol
Polybion
Prenatal Cap.
Proberon
Sol-Vit
Supradyn
Unicap Therapeutic
Vitaten
Viterra

RIBOFLAVINE SODIUM
PHOSPHATE
Alertonic
Benutrex B12
Benutrex C
Benutrex Oral
Beviplex
Bexel
Duphasol A
Duphasol Vitamin A + D3
Duphasol Multivitamin
Hepamine
Hormo-Gerobion Amp.
Hormo-Gerobion Tab.
Multi-Sanostol
Multibionta Cap;
Multibionta Eff.
Multine
Paladac
Panbetin Forte
Polybion

RIBOFLAVINE SODIUM
PHOSPHATE
Rubraton-B
Supradyn
Viplex
Vitabex

RICINOLEIC ACID
Aci-Gel

RIFAMPICIN
* Rifadine
* Rimactan

ROLITETRACYCLINE
Reverin

ROLITETRACYCLINE NITRATE
* Bristacin-A

RUTIN
Hemorrodine
Hormo-Gerobion Amp.
Hormo-Gerobion Tab.
Sandoven-F
Styptobion

RUTIN SODIUM DIPHOSPHATE
Styptobion

SACCHAROMYCES BOULARDIL 17
Ultra-Levure

SLABUTAMOL
* Ventolin Inhaler

SALBUTAMOL SULFATE
* Ventolin (Syrup, Tablet)

SALICYLAMIDE
Aramin
Coryban-D
Dolviran
Refagan

SALICYLAZOSULFAPYRIDINE
* Salazopyrin
* Sulfasalazine

SALICYCLIC ACID
A. T. S.
Crinagen Cream
D. G. Drop
D. G. Powder
Jadit
Jadit
Jadit H
Lavorine

Marciderm
Oxipor V. H. C.
Salyrosine

SANGUINARIA
Senodin

SAULE EXTRACT
Passiflorine

SASSAFRAS OIL
Vicks

SCAMMON RESIN
Mucinum

SCOPOLAMINE HYDROBROMIDE
Bardase
Donnagel P. G.
Donnatal
Donnazyme

SECONDARY OCTYL PHENOL
Calox

SELENIUM SULFIDE
* Selukos

SENEGA, POLYGALA
Becor
Senodin

SENNA
Combey Lax
Figine
Mucinum
Pectobrom
Solucamphre Sirop

SENNOSIDE
* X-Prep

SERPYLLIE LIQUID EXTRACT
Pectobrom

SODIUM ACEDIASULFONE
Ciloprine
Ciloprine Anaesthetico
Decadron

SODIUM ACETATE
Marciderm
Peritoneal Dialysis

SODIUM AESCINATE
Reparil

SODIUM ALGINATE
Albagar

SODIUM AMPICILLIN
* Amfipen
* Binotal
* Penimycin
* Pentrexyl

SODIUM ASCORBATE
Geriplex

SODIUM BENZOATE
Avipulmine
Campho Pneumine Adults
Efryl
Ibath
New Pectovit
Normogastryl
Pecto Be Be
Pecto Brom
Pectocode
Pectone Syrup
Pectone Tab.
Pulmo Be Be
Tussicof
Vicks

SODIUM BICARBONATE
* Andrews
Gastralgine
Normacidine
Phillips Milk of Magnesia
Rabro
Roter

SODIUM BICARBONATE
(INJECTION)
Gripe Mixture
* Sodium Bicarbonate
* Sodium Bicarbonate

SODIUM BORATE
Borate-Adrenaline
Chibrobor Aline

SODIUM BROMIDE
Be Be Calmine
Bevised
Bromarine
Gastralgine
Normogastryl
Passibromine
Pecto Be Be
Pecto Bron
Pectone Syrup
Pectone Tab.
Sedomycine B. B.
Seval
Tussicof

SODIUM BUTABARBITAL
Butabar Syrup
Butaphen Syrup

SODIUM CAMPHOSULFONATE
Campho-Pneumine Adults
Pectone Syrup
Pectone Tab.

SODIUM CARBONATE
Kompensan

SODIUM CEPHALEXIN
* Ibilex

SODIUM CEPHALOTHIN
* Cephalomex
* Ceporacin
* Keflin

SODIUM CITRATE
Benadryl
Benadryl Expectorant
Benafed
Benylin Pediatric
Hostacillin (Aqu. ol.)
Oralit
Vicks

SODIUM COLISTIMETHATE
* Colimex

SODIUM DEHYDROCHOLATE
Damagal
* Dycholitum

SODIUM DIATRIZOATE
Hypaque

SODIUM DIOLOXACILLIN, H_2O
* Dynapen

SODIUM FLUCLOXACILLIN
* Citocillin
* Floxapen

SODIUM FLUORIDE
Multi Tabs

SODIUM GLYCEROPHOSPHATE
Metatone
Vinuphos

SODIUM HEPARIN
Alphachymotrypsine
* Heparine
* Heparine

SODIUM IOTHALAMATE
Telebrix (38)

SODIUM LACTATE
Darrow
Darrow Steriflex No. 10
* Darrow's Solution
Dextrose in Lactated Ringer
Lactated Ringer's (Hartman's)
* Molar Sodium Lactate
Steriflex No. 10

SODIUM LEVOTHYROXINE
Novothyral

SODIUM LIOTHYRONINE
* Cynomel
Novothyral

SODIUM MOLIBDATE
Filibon Prenatal
Supradyn
Viterra

SODIUM NEUCLEINATE
Biocostene

SODIUM NITROFURANTOIN
* Furadantin Sodium
* Furilin

SODIUM OXACILLIN
* Prostaphilin
* Prostaphilin-A

* SODIUM PANTOTHENATE
Abdec
Dagravit B Complex
Paladac

SODIUM PARA AMINOBENZOATE
Salico

SODIUM PENICILLIN G
Extencilline (6-3-3)
Hostacillin (Aqu. ol.)
Kanacillin
Megacilline
Megacilline Forte
Omnacillin
* Penicillin
* Penicillin G Krist.
* Penicillin G
* Penilente
* Penimycin
* Specilline-G
Triplopen

SODIUM PENTOBARBITAL
* Nesdonal
Sedorma

SODIUM PERCARBONATE
Ascoxal

SODIUM PHENOBARBITAL
Garoin
Lenterules De Gardenal
Seval

SODIUM PHENYLBUTAZONE
Butazolidine
Butazolidine Alka
Tomanol

SODIUM PHOSPHATE
* Oralit

SODIUM RIFAMYCIN S. V.
Rifocin
Rifoderm

SODIUM SALICYLATE
Efryl
Salico
Salimarine

SODIUM SULFACETAMIDE
* Bleph 10
Bleph 30
Celestone-S
Chloranusulfa
* Isopto Cetamide
Isoptocetapred
Oti-nol
Sulfa-Blue
* Sulfacetamide

SODIUM SULFATE
Normogastryl

SODIUM SULFITE
Thiobanzyme

SODIUM THIOPENTAL
Intraval Sodium

SODIUM TRIIODOTHYRONINE
Hormo Gerobion Tab.
Hormo Gerobion Amp.

SODIUM WARFARIN
* Coumadin

SORBITOL
* Glucitol
Hepacholin Sorbitol
Praxilene
* Sorbitol

Sorbosan
* Sorbax
Sorbax Eva

SOYBEAN LECITHIN
Pernexin

SPIRAMYCIN
* Rovamycine Pommade

SPIRONOLACTONE
* Aldactone A

SPONGE, ABSORBABLE GELATIN
* Gelfoam

SQUILL
Senodin

STANOZOLOL
* Winstrol

STERANABOL RITARDO
Steranabol

STREPTOMYCIN SULFATE
* Streptomycin Sulphate

STROPHANTHIN
Inophyline Sedative

STRYCHNINE GLYCEROPHOSPHATE
Pasuma Forte

STRYCHNINE NITRATE
Tonovan

STRYCHNINE SULFATE
Metaton
Vi-nuphos

SUCCINYL SULFATHIAZOLE
Colistop
Cremo S. P. K.
Paraguan
Ramosuccin
S. P. K.
* Sulfarilla

SUCCINYLCHOLINE CHLORIDE
* Succinyl

SULFABENZAMIDE
Sultrin Cream
Sultrin Tablet

SULFACETAMIDE
Sulfacetamide
Sultrin Cream
Sultrin Tablet

SULFADIAZINE
Urospasmon

SULFADIMETHOXINE
* Madribone

SULFAGUANIDINE
Gabbroral

SULFAMETHIZOLE
Uropol

SULFAMETHOXAZOLE
Bactrim
Septrin

SULFAMETHOXYPYRIDAZINE
* Lederkyn
* Midicel

SULFANILAMIDE
Otogin

SULFATHIAZOLE
Sultrin Cream
Sultrin Tablet

SULFISOXAZOLE
* Gantrisin

SULFUR, PRECIPITATED
* Acne Aid
Neo Medrol Acne Lotion

SULPIRIDE
* Dogmatil Fort

* Equilid

SULTHIAME
* Ospolot

SUMACH
Urostop

SYNEPHRINE TARTRATE
Chibrobor aline
Dacrine
. Sympatocard
* Symptol

TAKA DIASTASE
Actonorm
Eldec
Geriplex
Taka Combex
* Taka-Diastase
Zymet

TAMOXIFEN CITRATE
Hydrocare
Nolvadex

TERBUTALINE SULFATE
* Brican

TERPIN HYDRATE
Ambezim Balsamic
New Pectovit
Pectocode
Pe ctomycine
Pectone Syrup
Pectone Tab.

TERT-PENTYLPHENOL
Calox

TESTOSTERONE
Gestyl

TESTOSTERONE CYPIONATE
Depot-Testron

TESTOSTERONE DECANOATE
Sustanon

TESTOSTERONE ENANTHATE
Ablacton
Primodian Depot
Testoviron
Testoviron Depot

TESTOSTERONE ISOBUTYRATE
Femandren-M

TESTOSTERONE ISOCAPROATE
Estandron Prolongatum
Sustanon

TESTOSTERONE PHENYL PROPIONATE
Estandron Prolongatum
Sustanon

TESTOSTERONE PROPIONATE
Estandron Prolongatum
Pasuma Forte
Sustanon
Testoluton Forte
* Testosterone Vifar
* Testoviron
Testoviron Depot
Triolandren

TESTOSTERONE UNDECYLATE
Triolandren

TESTOSTERONE VALERATE
Triolandren

TETANUS ANTITOXIN
* Serum Antitetanique
Tetabuline
* Tetanus Antitoxine

TETANUS IMMUNE GLOBULIN
* Serum Antitetanique

TETANUS TOXOID
* Tetanus Antitoxin

TETANUS TOXOID, ADSORBED
Di Te Tab Vaccine

TETRACAINE HYDROCHLORIDE
Dentigar
* Orex
* Tetracaine F

TETRACYCLINE
* Tetrex

TETRACYCLINE HYDROCHLORIDE
* Achromycin
* Ambramycin
* Hostacycline (Aqu. ol.)
Mysteclin-V
• * Sumycin
Talsutin
Tetrex

TETRACYCLINE PHOSPHATE
Tetrox
Uropol

TETRAETHYLTHIURAM MONOSULFIDE
* Termosol
* Tetmosol

TETRAHYDROZOLINE, HCL
* Tyzine
* Tyzine Pediatric

THENYLDIAMINE HCL
N. T. R.
Synephricol

THEOBROMINE
Neo-Klimastilben

THEOPHYLLINE
* Aminophylline
Chimiophylline
* Chimiophylline Butabarbital
Franol
Inophyline Millote
Inophyline Sedative
Inophyline Sedative Supp.
Quibron
Theo-Lite Tab.
Ventilat

THEOPHYLLINE PROPANE SULFONATE DE PAPAVERINE
* Kaldil

THIABENDAZOLE
* Mintezol

THIABUTAZIDE
Modenol

THIAMIN DISULFIDE
Neurobion

THIAMINE DICHLORIDE
Polybion

THIAMINE HYDROCHLORIDE
A. B. C. D.
Abdec
Actonorm
Alertonic
Artroneuril
B-Colex
Becomarine
Becozyme
Benutrex B12
Benutrex C
Benutrex Oral
Beviplex
Bexel
Biocositene
Budodouze Forte
Catovit
Colchipirine
Concavit
Cytamen 1000 with B1
Dagravit B Complex
Dagravit Total
Damagal
Dolo Neurobion
Duphasol A
Duphasol Vitamine A + D3
Duphasol Multivitamin
Geriplex
GT-50
Hepamine
Hypobeta-20
Katabios
Lederplex Cap.

Lederplex Syrup
Litrison
Metaton
Multi Sanostol
Multine
Multi Tabs
Neurobion
Normacidine
Paladac
Panbetin Forte
Pernexin
Polybion
Princi B
Proberon
Salimarine
Sol-Vit
Sopalamin 3B
Taka Complex
Thiodrazine
Tridocelan
Trinidex
Urbamin
Vinuphos
Vioneurin-6
Viplex
Vita 3
Vitabex
Vitaten
Vitathion (A. T. P.)

THIAMINE MONONITRATE
Abdec
Artroneuril
Benutrex Oral
Budodouze Forte
Davitamon 10
Dianavit
Dolo Neurobion
Eldec
Endoglobin
Fesovit Spansule
Festavital
Filibon Prenatal
Gevral Cap.
Gevral Protein
Ido-Becoplex
Lederplex
Multibionta
Natabec
Obron
Omnibionta

Panbetine Forte
Physiophepatole
Prenatal Cap.
Roeribeg
Rubraton-B
Supradyn
Taka Combex
Thiobanzyme
* Tiafa 300
Unicap Therapeutic
Unicap. Cap.
Viterra

THIAMINE MONOPHOSPHATE
Hormo-Gerobion Amp.
Hormo-Gerobion Tab.

THIETHYLPERAZINE DIMALEATE
* Torecan

THIMEROSLA
Allergan Soakare
Alphachymotrypsine
Bleph 10
Bleph 30
Conjunctin
Elase

THIOCOLCHIICOSIDE
Adalgor
* Coltramyl

THIOPERAZINE DIMETHANE SULFONATE
* Flurazine
* Majeptil

THIOPROPAZATE DIHYDROCHLORIDE
* Dartalan
Pro-Banthine Dartalan

THIORIDAZINE HYDROCHORIDE
Melleril

THYME
Pilka
Tussipect Codeine

THYMOL
Burnol

Crinagen Cream
Dentifect
Myalgine Ointment

THYROID
* Extrait Thyroidien
* Thyranon
* Thyroboline

TIEMONIUM IODIDE
Colchimax

TIEMONIUM METHYL SULFATE
* Analgec

TIMOLOL MALEATE
Blocadren

TINCTURE BADIAN
Gastralgine

TINCTURE GINGER
Gripe Mixture

TINIDAZOLE
* Fasigyn

TIPEPIDINE HIBENZATE
* Devora

TOCOPHEROLUM
Dianavit

TOLAZAMIDE
* Tolinase

TOLAZOLINE
Priscophene

TOLAZOLINE HYDROCHLORIDE
* Priscol

TOLNAFTATE
* Tinaderm Solution

TOLU (COMPOUND)
Avipulmine
Becof
Campho. Pneumine Adults
Neo Codion Adults
Neocodion Enfant
New Pectovit
Pecto Be Be
Pecto-brom
Pectoramin
Whooping Cough

TRANEXAMIC ACID
* Transamin

TRASENTINE A
Priscophene
Spasmo-Cibalgin
Spasmo-Cibalgin Comp.

TRIACETIN
* Enzactin

TRIACETYL CLINDAMYCIN HCL
* T. A. O.

TRIAMCINOLONE
Kenacort
Kenacort A
Ledercort
Ledercort Aectonide

TRIAMCINOLONE ACETONIDE
Kenacomb
Kenacort
* Kenacort A
* Ledercort
* Ledercort Aectonide

TRIAMTERENE
Dyazide
Dytide

TRICHLORO ACETIC ACID
A. T. S.

TRICHLOROCARBANILIDE
Crinagen Cream
* Nobacter

TRICHLOROETHYLENE

* Tricloryl

TRIETHANOLAMINE
Cerumenex

TRIFLUOPERAZINE DIHYDROCHLORIDE
* Eskazina
Expansyl
Stelabid
Stelabid Forte

TRIFLUPROMAZINE HYDROCHLORIDE
*. V. M.

TRIHEXYPHENIDYL HYDROCHLORIDE
* Artane

TRIMEPRAZINE TARTRATE
* Theralene
* Vallergan
* Vallergan

TRIMETHOPRIME
Bactrim
Bactrim Adult
Bactrim-Pediatric
* Metoprime S.
Septrin

TRIMIPRAMINE
* Surmontil

TRIMIPRAMINE MALEATE
* Surmontil

TRIPROLIDINE HYDROCHLORIDE
* Pro-Acitidil

TRYPSIN
Ambezim
Combizim Balaamic
Festavital

TRYPSIN + CHYMOTRYPSIN
Ambezim Balsamic
* Ambezim

TRYPTOPHAN
Vita Marciderm

TUBOCURARINE CHLORIDE
* Curarin
Tubocurarine Chloride

TYPHOID VACCINE
Di Te Tab Vaccine
* T A B Vaccine

UNDECYLENIC ACID
Mycodecyl

UREA
* Hadex
Hadex Pommade
Otogin

UVA URSI
Urostope

UVELINE(R)
* Uveline

VALERIAN, FLUID EXTRACT
Andonicoeur
Card Ompin
Paderyl
Passibromine
Seval

VERAPAMIL HYDROCHLORIDE
* Isoptin
Isoptin-S

VIBRINIUM, TINCTURE
Hemorragine Ergotine

VINBLASTINE SULFATE
* Velbe

VINCAMINE
* Pervincamine
* Pervone

VINCRISTINE SULFATE

زنریک به تجارتی

* Velbe

VINCAMINE
* Pervincamine
* Pervone

VINCRISTINE SULFATE
* Oncovin

VISCUM ALBUM
Paderyl

VITAMIN A
A. B. C. D.
Concavit
* Duphasol A
Festavital
Idocamin
Katabios
Minadex
Multi Tabs
Multi Sanostol
Multibionta Cap.
Multibionta Eff.
Obron
Omnibionta
Sol-Vit
Unicap Cap.
* Vitamin-A Pom.
Vitamin A Ointment
Vitaten
Viterra

VITAMIN A ACETATE
Abdec
Eldec
Filibon Prenatal
Geriplex
Gevral Cap.
Gevral Protein
Hormo-Gerobion Amp
Hormo-Gerobion Tab.
Natabec
Prenatal Cap.
Sclerobion

VITAMIN A PALMITATE
Abdec
* Arovit
Bexel
Dagravit Total
Davitamon 10
Duphasol A
Vitamine
Duphasol A. D. 3
Duphasol Multivitamin
Haliborange
Katabios
Multin
* Neo Vogan
Paladac
Physiohepatole
Rovigon
Supradyn
Videlta
* Viplex

VITAMIN E
Arovit
Concavit
Difrarel -E
Katabios
Multin
Multi Tabs
Vitaten

VITAMIN E ACETATE
* Ephynal
* Evion
* Festavital
Gevral Cap.
Gevral Protein
Hormogerobion Amp.
Hormo-Gerobion Tab.
Multi Sanostol
Pasuma Forte
Rovigon
Sclerobion
Supradyn
Tonovan
Unicap Cap.
Viterra

VITAMIN E SUCCINATE
Abdec
Geriplex
Physio-hepatole

VITAMIN E PALMITATE
Tocogestin

WILLOW, EXTRACT
Passiflorine

XANTHINOL NIACINATE
* Complamin

XYLOMETAZOLINE, HCL
* Otrivine

YOHIMBINE, HCL
Tonovan

YOHIMBINE GLYCEROPHOSPHATE
Pasuma Forte

ZINC OXIDE
Dermex
Desitin
Filibon Parenatal
Gevral Protein
Hadex
Hadex Pommade
Multi Tabs
Pantocream
Sinadur
Sulfaderm
Unicap Cap.
Vitaderm
Xylocaine
Xyloproct

ZINC PHENOLSULFONATE
Bismogol

ZINC SULFATE
Geriplex
Sulfate De Zinc Procaine
Supradyn
Viterra
Zincfrin

ZINC UNDECYLATE
Mycodecyl

5-7 DIBROMO-8 QINOLINOL
Intestopan

7-(BETA-HYDROXYETHYL)-THEOPHYLLINE
Cardiopon

فهرست فارماکولوژیکی- درمانی داروها برحسب نام ژنریک

در این فهرست داروها برحسب خواص فارماکولوژیکی و درمانی‌شان طبقه‌بندی شده‌اند. در زیر هر عنوان از نام ژنریک استفاده شده است

Abortifacient, Therapeutic
Prostaglandins

Acidifier, Gastric
Glutamic Acid Hydrochloride
Hydrochloric Acid, Diluted

Acidifier, Urinary
Ammonium Chloride
Sodium Biphosphate

Adrenergic
Ephedrine
Ephedrine Hydrochloride
Ephedrine Sulfate
Epinephrine
Phenylephrine Hydrochloride
Pseudoephedrine Hydrochloride

Adrenergic, Bronchodilator
Albuterol
Ephedrine
Ephedrine Hydrochloride
Ephedrine Sulfate
Epinephrine
Epinephrine Bitartrate
Epinephrine Hydrochloride
Isoproterenol Hydrochloride
Isoproterenol Sulfate
Methoxyphenamine Hydrochloride
Pseudoephedrine Hydrochloride

Adrenergic, Ophthalmic
Epinephrine Bitartrate
Hydroxyamphetamine Hydrobromide
Phenylephrine Hydrochloride

Adrenergic, Vasopressor
Cyclopentamine Hydrochloride
Hydroxyamphetamine Hydrobromide
Levarterenol Bitartrate
Levonordefrin
Mephentermine Sulfate
Metaraminol Bitartrate
Methoxamine Hydrochloride
Methylhexamine
Naphazoline Hydrochloride
Oxymetazoline Hydrochloride
Phenylephrine Hydrochloride
Phenylpropanolamine Hydrochloride
Propylhexedrine
Tetrahydrozoline Hydrochloride
Tuaminoheptane
Tuaminoheptane Sulfate
Xylometazoline Hydrochloride

Adrenocortical Steroid (see *Glucocorticoid, Mineralocorticoid*)

Adrenocorticotropic Hormone

Corticotropin (Injection)
Corticotropin, Repository (Injection)
Corticotropin Zinc Hydroxide (Injection)

Adsorbent
Charcoal, Activated
Kaolin

Alcoholism Treatment
Calcium Carbimide
Disulfiram

Alkalizer, Systemic and/or Urinary
Potassic Saline Injection, Lactated
Potassium Acetate
Potassium Citrate
Ringer's Injection, Lactated
Sodium Acetate
Sodium Bicarbonate
Tromethamine

Amebicide (see *Antiamebic*)

Ammoniemia Antagonist
Arginine Glutamate
Arginine Hydrochloride
Sodium Glutamate

Analeptic
Nikethamide

Analgesic, Dental
Chlorobutanol
Clove Oil
Creosote
Eugenol

Analgesic, General
Acetaminophen
Acetanilid
Aminopyrine
Antipyrine
Aspirin
Choline Salicylate
Cinchophen
Ethoheptazine Citrate
Indomethacin
Mefenamic Acid
Methotrimeprazine
Neocinchophen
Oxyphenbutazone
Phenacetin
Phenylbutazone
Phenyramidol Hydrochloride
Phenyramidol Salicylate
Propoxyphene Hydrochloride
Propoxyphene Napsylate
Salicylamide
Sodium Salicylate
Trichloroethylene

Analgesic, Migraine
Dihydroergotamine Mesylate
Ergotamine Tartrate
Methysergide Maleate (*prophylactic*)

Analgesic, Narcotic
Alphaprodine Hydrochloride
Anileridine Hydrochloride
Anileridine Phosphate
Codeine
Codeine Phosphate
Codeine Sulfate
Dextromoramide Tartrate
Diacetylmorphine Hydrochloride
Dipipanone Hydrochloride
Ethylmorphine Hydrochloride
Fentanyl Citrate
Hydrocodone Bitartrate
Hydromorphone Hydrochloride
Levorphanol Tartrate
Meperidine Hydrochloride
Methadone Hydrochloride
Morphine Sulfate
Oxycodone Hydrochloride
Oxymorphone Hydrochloride
Pentazocine
Phenazocine Hydrobromide
Piminodine Esylate

Analgesic, Trigeminal Neuralgia
Carbamazepine

Analgesic, Urinary Tract
Ethoxazene Hydrochloride
Phenazopyridine Hydrochloride

Androgen
Dromostanolone Propionate
Ethylestrenol
Fluoxymesterone
Methandriol

Methandrostenolone
Methyltestosterone
Nandrolone Decanoate
Nandrolone Phenpropionate
Norethandrolone
Oxandrolone
Oxymetholone
Stanozolol
Testosterone
Testosterone Cypionate
Testosterone Enanthate
Testosterone Propionate

Anesthetic, General (Inhalation)

Chloroform
Cyclopropane
Ether
Ethyl Chloride
Ethylene
Fluroxene
Halothane
Methoxyflurane
Nitrous Oxide
Vinyl Ether

Anesthetic, General (Intravenous)

Ketamine Hydrochloride
Methohexital Sodium
Thialbarbitone Sodium
Thiamylal Sodium
Thiopental Sodium

Anesthetic, Local

Bupivacaine Hydrochloride
Butethamine Hydrochloride
Chloroprocaine Hydrochloride
Dibucaine Hydrochloride
Hexylcaine Hydrochloride
Isobucaine Hydrochloride
Lidocaine
Lidocaine Hydrochloride
Mepivacaine Hydrochloride
Metabutethamine Hydrochloride
Piperocaine Hydrochloride
Prilocaine Hydrochloride
Procaine Hydrochloride
Propoxycaine Hydrochloride
Tetracaine Hydrochloride

Anesthetic, Topical

Antipyrine
Benoxinate Hydrochloride
Benzocaine
Butacaine Sulfate
Butyl Aminobenzoate
Cocaine
Cocaine Hydrochloride
Cyclomethycaine
Dibucaine
Dimethisoquin Hydrochloride
Diperodon Hydrochloride
Dyclonine Hydrochloride
Ethyl Chloride
Lidocaine
Lidocaine Hydrochloride
Menthol
Phenacaine Hydrochloride
Phenol
Piperocaine Hydrochloride
Pramoxine Hydrochloride
Proparacaine Hydrochloride
Tetracaine
Tetracaine Hydrochloride

Anorexiant

Amphetamine Phosphate
Amphetamine Sulfate
Benzphetamine Hydrochloride
Chlorphentermine Hydrochloride
Dextroamphetamine Phosphate
Dextroamphetamine Sulfate
Diethylpropion Hydrochloride
Methamphetamine Hydrochloride
Phendimetrazine Tartrate
Phenmetrazine Hydrochloride
Phentermine
Phentermine Hydrochloride

Antacid

Aluminum Hydroxide Gel
Aluminum Phosphate Gel
Bismuth Subcarbonate
Calcium Carbonate, Precipitated
Calcium Phosphate, Tribasic
Dihydroxyaluminum
  Aminoacetate
Magaldrate
Magnesium Carbonate

Magnesium Hydroxide
Magnesium Oxide
Magnesium Phosphate
Magnesium Trisilicate
Milk of Magnesia
Sodium Bicarbonate

Anthelmintic
Aspidium Oleoresin
Bephenium Hydroxynaphthoate
Carbon Tetrachloride (obsolete)
Chenopodium Oil
Gentian Violet
Hexylresorcinol
Niclosamide
Piperazine Citrate
Pyrantel Pamoate
Pyrvinium Pamoate
Quinacrine Hydrochloride
Santonin
Tetrachloroethylene
Thiabendazole

Antiamebic
Acetarsone
Carbarsone
Chiniofon
Chloroquine Phosphate
Diiodohydroxyquin
Emetine Hydrochloride
Emetine and Bismuth Iodide
Erythromycin
Glycobiarsol
Iodochlorhydroxyquin
Ipecac (obsolete)
Metronidazole
Paromomycin
Phanquone

Antianginal
Aminophylline
Amyl Nitrite
Dipyridamole
Erythrityl Tetranitrate
Isosorbide Dinitrate
Mannitol Hexanitrate
Nitroglycerin
Papaverine Hydrochloride
Pentaerythrityl Tetranitrate
Propranolol Hydrochloride
Sodium Nitrite
Trolnitrate Phosphate

Antianxiety Agent (Minor Tranquilizer)
Benactyzine Hydrochloride
Chlordiazepoxide
Chlordiazepoxide Hydrochloride
Chlormezanone
Clorazepate Dipotassium
Diazepam
Doxepin Hydrochloride
Hydroxyzine Hydrochloride
Hydroxyzine Pamoate
Meprobamate
Oxazepam
Phenaglycodol
Tybamate

Antiarrhythmic (see *Cardiac Depressant, Antiarrhythmic*)

Antibacterial (see *Antibiotic, Antibacterial; Anti-infective, Topical; Sulfonamides*)

Antibiotic, Antibacterial*
Actinobolin
Amphomycin
Ampicillin
Bacitracin
Benzathine Penicillin G
Capreomycin
Carbenicillin
Cephalexin
Cephaloglycin
Cephaloridine
Cephalothin
Cephapirin
Chloramphenicol
Chlortetracycline
Clindamycin
Cloxacillin
Colistin
Colistimethate, Sodium
Cycloserine
Demeclocycline
Dicloxacillin
Dihydrostreptomycin
Doxycycline
Erythromycin
Flucloxacillin

Gentamicin
Gramicidin
Kanamycin
Lincomycin
Methacycline
Methicillin
Minocycline
Nafcillin
Neomycin
Novobiocin
Oleandomycin
Oxacillin
Oxytetracycline
Paromomycin
Penicillin G (Benzyl Penicillin)
Penicillin V (Phenoxymethyl Penicillin)
Phenethicillin
Polymyxin B
Procaine Penicillin G
Puromycin
Rifampin
Ristocetin
Rolitetracycline
Sodium Colistimethate
Spectinomycin
Streptomycin
Tetracycline
Tobramycin
Troleandomycin
Tyrocidin
Tyrothricin
Vancomycin
Viomycin

Antibiotic, Antimycotic*
Amphotericin B
Candicidin
Griseofulvin
Nystatin

Antibiotic, Antineoplastic*
Actinomycins
Adriamycin
Bleomycin
Dactinomycin
Daunomycin
Mithramycin
Mitomycin C
Porfiromycin
Streptozotocin

Antibiotic, Antiprotozoal*
Erythromycin
Paromomycin
Penicillin G (spirochete)

Antibiotic, Antirickettsial*
Chloramphenicol
Chlortetracycline
Demeclocycline
Methacycline
Oxytetracycline
Tetracycline

Anticholinergic
Aminopentamide Sulfate
Anisotropine Methylbromide
Atropine
Atropine Sulfate
Belladonna
Benztropine Mesylate
Biperiden
Biperiden Hydrochloride
Cycrimine Hydrochloride
Diphemanil Methylsulfate
Ethopropazine Hydrochloride
Glycopyrrolate
Hexocyclium Methylsulfate
Homatropine Methylbromide
Hyoscyamine Hydrobromide
Hyoscyamine Sulfate
Isopropamide Iodide
Mepenzolate Bromide
Methantheline Bromide
Methixene Hydrochloride
Methscopolamine Bromide
Methylatropine Nitrate
Oxyphencyclimine Hydrochloride
Oxyphenonium Bromide
Pipenzolate Bromide
Piperidolate Hydrochloride
Poldine Methylsulfate
Propantheline Bromide
Scopolamine Hydrobromide
Stramonium
Tridihexethyl Chloride
Trihexyphenidyl Hydrochloride

Anticholinergic, Ophthalmic

فارماکولوژی کلینیکی- درمانهای دامپزشکی

Atropine Sulfate
Cyclopentolate Hydrochloride
Eucatropine Hydrochloride
Homatropine Hydrobromide
Scopolamine Hydrobromide
Tropicamide

Anticoagulant
Acenocoumarol
Anisindione
Dicumarol
Diphenadione
Phenindione
Phenprocoumon
Potassium Warfarin
Sodium Citrate
Sodium Heparin
Sodium Warfarin

Anticonvulsant
Carbamazepine
Diazepam
Diphenylhydantoin
Diphenylhydantoin Sodium
Ethosuximide
Ethotoin
Magnesium Sulfate
Mephenytoin
Mephobarbital
Metharbital
Methsuximide
Paraldehyde
Paramethadione
Phenacemide
Phenobarbital
Phenobarbital Sodium
Phensuximide
Primidone
Sodium Bromide
Trimeprazine Tartrate
Trimethadione

Antidepressant
Amitriptyline Hydrochloride
Desipramine Hydrochloride
Doxepin Hydrochloride
Imipramine Hydrochloride
Isocarboxazid
Nialamide
Nortriptyline Hydrochloride
Phenelzine Sulfate
Protriptyline Hydrochloride
Tranylcypromine Sulfate

Antidiabetic (see *Hypoglycemic, Insulins*)

Antidiarrheal
Diphenoxylate Hydrochloride
Furazolidone
Kaolin
Paregoric
Pectin
Polycarbophil

Antidiuretic
Vasopressin Injection

Antidote, Arsenic
Dimercaprol

Antidote, Barium
Magnesium Sulfate

Antidote, Curariform Drug
Edrophonium Chloride
Neostigmine Methylsulfate

Antidote, Cyanide
Methylene Blue
Sodium Nitrite
Sodium Thiosulfate

Antidote, Fluoride
Calcium Gluconate

Antidote, General Purpose
Activated Charcoal

Antidote, Gold
Dimercaprol

Antidote, Heparin
Protamine Sulfate

Antidote, Lead
Calcium Disodium Edetate

Antidote, Mercury
Dimercaprol

Antidote, Narcotic
Levallorphan Tartrate

Antidote, Organophosphate
Pralidoxime Chloride

Antidote, Oxalic Acid
Calcium Gluconate

Antieczematic, Topical
Anthralin
Coal Tar

Juniper Tar
Pine Tar

Antiemetic
Chlorpromazine
Chlorpromazine Hydrochloride
Chlorprothixene
Cyclizine Hydrochloride
Cyclizine Lactate
Dimenhydrinate
Diphenhydramine Hydrochloride
Diphenidol
Diphenidol Hydrochloride
Fluphenazine Hydrochloride
Hydroxyzine Hydrochloride
Hydroxyzine Pamoate
Meclizine Hydrochloride
Perphenazine
Prochlorperazine
Prochlorperazine Edisylate
Prochlorperazine Maleate
Promazine Hydrochloride
Promethazine Hydrochloride
Propiomazine Hydrochloride
Scopolamine Hydrobromide
Thiethylperazine Maleate
Trifluoperazine Hydrochloride
Triflupromazine Hydrochloride
Trimethobenzamide
Hydrochloride

Antifibrotic
Aminobenzoic Acid

Antifilarial
Diethylcarbamazine Citrate
Sodium Suramin

Antifoam, Gastrointestinal
Simethicone

Antifungal (see *Antimycotic*)

Antihemophilic
Plasma, Antihemophilic Human

Antihistaminic
Antazoline Phosphate
Brompheniramine Maleate
Carbinoxamine Maleate
Chlorcyclizine Hydrochloride
Chlorothen Citrate
Chlorpheniramine Maleate
Cyproheptadine Hydrochloride
Dexbrompheniramine Maleate
Dexchlorpheniramine Maleate
Dimethindene Maleate
Diphenhydramine Hydrochloride
Diphenylpyraline Hydrochloride
Doxylamine Succinate
Methapyrilene Hydrochloride
Methdilazine
Methdilazine Hydrochloride
Phenindamine Tartrate
Pheniramine Maleate
Promethazine Hydrochloride
Pyrilamine Maleate
Pyrrobutamine Phosphate
Rotoxamine Tartrate
Tripelennamine Citrate
Tripelennamine Hydrochloride
Triprolidine Hydrochloride

Antihypercholesterolemic (see *Hypocholesterolemic*)

Antihypertensive
Bendroflumethiazide
Benzthiazide
Chlorthalidone
Cyclothiazide
Deserpidine
Diazoxide
Guanethidine Sulfate
Hexamethonium Chloride
Hydralazine Hydrochloride
Hydrochlorothiazide
Hydroflumethiazide
Mebutamate
Mecamylamine Hydrochloride
Methyclothiazide
Methyldopa
Methyldopate Hydrochloride
Pargyline Hydrochloride
Pempidine Tartrate
Pentolinium Tartrate
Polythiazide
Quinethazone
Rauwolfia Serpentina
Rescinnamine
Reserpine
Syrosingopine
Trichlormethiazide
Trimethaphan Camsylate
Trimethidinium Methosulfate

Veratrum Viride Alkaloids

Anti-infective, Topical
- Acriflavine Hydrochloride
- Alcohol
- Aminacrine Hydrochloride
- Benzalkonium Chloride
- Benzethonium Chloride
- Boric Acid
- Cetrimide
- Chlorhexidine
- Dequalinium Acetate
- Dequalinium Chloride
- Dibromopropamidine Isethionate
- Domiphen Bromide
- Fuchsin, Basic
- Gentian Violet
- Hexachlorophene
- Hydrogen Peroxide Solution
- Ichthammol
- Iodine Solution
- Iodine Tincture
- Iodochlorhydroxyquin
- Iodoform
- Merbromin
- Mercuric Oxide, Yellow
- Mercury, Ammoniated
- Nitrofurazone
- Nitromersol
- Parachlorophenol, Camphorated
- Phenylmercuric Nitrate
- Potassium Permanganate
- Povidone-Iodine
- Proflavine Hemisulfate
- Silver Nitrate
- Silver Protein, Mild
- Sodium Hypochlorite Solution, Diluted
- Sodium Perborate
- Thimerosal
- Triclobisonium Chloride
- Zinc Peroxide, Medicinal

Anti-inflammatory, Nonsteroid
- Indomethacin
- Oxyphenbutazone
- Phenylbutazone

Antileishmanial
- Hydroxystilbamidine Isethionate
- Pentamidine Isethionate
- Sodium Stibogluconate

Antimalarial
- Amodiaquine Hydrochloride
- Chloroquine Hydrochloride
- Chloroquine Phosphate
- Cinchona
- Cinchonidine
- Cinchonine
- Hydroxychloroquine Sulfate
- Primaquine Phosphate
- Proguanil (Chloroguanide) Hydrochloride
- Pyrimethamine
- Quinacrine Hydrochloride
- Quinine
- Quinine Dihydrochloride
- Quinine Sulfate

Antimotion-sickness
- Cyclizine Hydrochloride
- Dimenhydrinate
- Meclizine Hydrochloride
- Promethazine Hydrochloride
- Scopolamine Hydrobromide

Antimycotic (see also *Antibiotic, Antimycotic*)
- Acetic Acid
- Acrisorcin
- Benzoic Acid
- Carbol-Fuchsin Solution
- Chlordantoin
- Chlorothymol
- Chlorphenesin
- Chlorquinaldol
- Cupric Sulfate
- Dequalinium Acetate
- Dequalinium Chloride
- Dibromopropamidine Isethionate
- Domiphen Bromide
- Flucytosine
- Gentian Violet
- Haloprogin
- Hydroxystilbamidine Isethionate
- Methylparaben
- Nifuroxime
- Resorcinol
- Salicylanilide
- Sodium Propionate
- Sodium Thiosulfate

Sulfurated Potash
Thymol
Tolnaftate
Undecylenic Acid
Zinc Undecylenate

Antineoplastic (see also *Antibiotic, Antineoplastic*, and article on *Cytotoxic Agents*)
Asparaginase
Azaserine
Azauridine
Busulfan
Chlorambucil
Cyclophosphamide
Cytarabine
Dromostanolone Propionate
Floxuridine
Fluorouracil
Gold Au 198 Injection
Hydroxyurea
Mechlorethamine Hydrochloride
Medroxyprogesterone Acetate
Megestrol Acetate
Mercaptopurine
Methotrexate
Mitotane
Pipobroman
Procarbazine Hydrochloride
Sodium Iodide I 131 Solution
Sodium Phosphate P 32 Solution
Testolactone
Thioguanine
Thiotepa
Triethylenemelamine
Uracil Mustard
Urethan
Vinblastine Sulfate
Vincristine Sulfate

Antiparkinsonism
Amantadine Hydrochloride
Atropine
Atropine Sulfate
Belladonna
Benztropine Mesylate
Biperiden
Biperiden Hydrochloride
Chlorphenoxamine Hydrochloride
Cycrimine Hydrochloride
Ethopropazine Hydrochloride
Hyoscyamine Sulfate
Levodopa
Orphenadrine Citrate
Orphenadrine Hydrochloride
Procyclidine Hydrochloride
Scopolamine Hydrobromide
Trihexyphenidyl Hydrochloride

Antiperistaltic (see *Antidiarrheal*)

Antipruritic
Cholestyramine Resin
Cyproheptadine Hydrochloride
Methdilazine
Methdilazine Hydrochloride
Trimeprazine Tartrate

Antipruritic, Topical
Benzyl Alcohol
Camphor
Iodochlorhydroxyquin
Menthol
Phenol, Liquefied
Resorcinol
Zinc Stearate

Antipsoriatic
Anthralin
Chrysarobin
Coal Tar
Glucocorticoids, Topical
Methotrexate
Salicylic Acid

Antipsychotic (Major Tranquilizer)
Acetophenazine Maleate
Butaperazine Maleate
Carphenazine Maleate
Chlorpromazine
Chlorpromazine Hydrochloride
Chlorprothixene
Fluphenazine Enanthate
Fluphenazine Hydrochloride
Haloperidol
Lithium Carbonate
Mesoridazine
Perphenazine
Piperacetazine
Prochlorperazine
Prochlorperazine Edisylate

Prochlorperazine Maleate
Promazine Hydrochloride
Thiopropazate Hydrochloride
Thioridazine Hydrochloride
Thiothixene
Trifluoperazine Hydrochloride
Triflupromazine Hydrochloride

Antipyretic
Acetaminophen
Acetanilid
Aminopyrine
Antipyrine
Aspirin
Dipyrone
Indomethacin
Mefenamic Acid
Neocinchophen
Phenacetin
Phenylbutazone
Salicylamide
Sodium Salicylate

Antirheumatic (see also *Glucocorticoid*)
Aspirin
Aurothioglucose
Chloroquine Phosphate
Gold Sodium Thiomalate
Hydroxychloroquine Sulfate
Oxyphenbutazone
Phenylbutazone
Sodium Salicylate

Antirickettsial (see also *Antibiotic, Antirickettsial*)
Aminobenzoic Acid

Antischistosomal
Antimony Potassium Tartrate
Hycanthone
Lucanthone Hydrochloride
Niridazole
Sodium Antimonylgluconate
Stibophen

Antiseborrheic
Cadmium Sulfide
Green Soap
Green Soap Tincture
Resorcinol
Resorcinol Monoacetate
Selenium Sulfide

Antispasmodic (see *Anticholinergic*)

Antithyroid (see *Thyroid Inhibitor*)

Antitrichomonal
Acetarsone
Carbarsone
Diiodohydroxyquin
Furazolidone
Glycobiarsol
Iodochlorhydroxyquin
Metronidazole
Triclobisonium Chloride

Antitrypanosomal
Antimony Potassium Tartrate
Hydroxystilbamidine Isethionate
Melarsoprol
Nitrofurazone
Pentamidine Isethionate
Sodium Suramin
Tryparsamide

Antituberculous Agents (see *Tuberculostatic*)

Antitussive
Benzonatate
Chlophedianol Hydrochloride
Codeine
Codeine Phosphate
Codeine Sulfate
Dextromethorphan Hydrobromide
Dihydrocodeine
Ethylmorphine Hydrochloride
Glyceryl Guaiacolate
Hydrocodone Hydrochloride
Levopropoxyphene Napsylate
Methadone Hydrochloride
Morphine Sulfate
Noscapine
Noscapine Hydrochloride
Oxycodone Hydrochloride
Pholcodine
Pipazethate Hydrochloride

Antiviral
Amantadine Hydrochloride
Idoxuridine

Astringent
Acetic Acid
Alcohol

Alum
Aluminum Acetate Solution
Aluminum Chloride
Aluminum Subacetate Solution
Bismuth, Milk of
Bismuth Subcarbonate
Bismuth Subgallate
Bismuth Subnitrate
Calamine
Calcium Hydroxide Solution
Cupric Sulfate
Silver Nitrate
Tannic Acid
White Lotion
Zinc Chloride
Zinc Oxide
Zinc Sulfate

Blood-Calcium Regulator
Dihydrotachysterol
Parathyroid Injection

Blood Replenisher
Blood, Whole
Blood Cells, Packed Human

Blood Volume Supporter
Albumin, Normal Human Serum
Plasma, Normal Human
Plasma Protein Fraction

Blood Isoagglutinins Neutralizer
Blood Group Specific Substances A and B

Bronchodilator (see also *Adrenergic, Bronchodilator*)
Aminophylline
Dyphylline
Oxtriphylline
Theophylline

Calcium Replenisher or Supplement
Calcium Chloride
Calcium Gluconate
Calcium Lactate
Calcium Phosphate, Dibasic
Calcium Phosphate, Tribasic

Carbonic Anhydrase Inhibitor
Acetazolamide
Dichlorphenamide
Ethoxzolamide
Methazolamide
Sodium Acetazolamide

Cardiac Depressant, Antiarrhythmic
Bretylium Tosylate
Lidocaine Hydrochloride
Procainamide Hydrochloride
Propranolol Hydrochloride
Quinidine Gluconate
Quinidine Sulfate

Cardiotonic
Acetyldigitoxin
Deslanoside
Digitalis, Powdered
Digitoxin
Digoxin
Gitalin
Lanatoside C
Ouabain
Strophanthin

Cathartic (see *Evacuant*)

Caustic
Acetic Acid, Glacial
Phenol, Liquefied
Podophyllum Resin
Silver Nitrate, Toughened
Trichloroacetic Acid
Zinc Chloride

Choleretic–Hydrocholeretic
Dehydrocholic Acid
Florantyrone
Ox Bile Extract
Sodium Dehydrocholate

Cholinergic
Ambenonium Chloride
Bethanechol Chloride
Hexafluorenium Bromide
Methacholine Bromide
Methacholine Chloride
Neostigmine Bromide
Neostigmine Methylsulfate
Pyridostigmine Bromide

Cholinergic, Ophthalmic
Carbachol
Demecarium Bromide
Echothiophate Iodide
Isoflurophate Ophthalmic Solution
Physostigmine

فارماکولوژی و کاربرد بالینی داروها

Physostigmine Salicylate
Physostigmine Sulfate
Pilocarpine Hydrochloride
Pilocarpine Nitrate

Cholinesterase Reactivator
Pralidoxime Chloride

Coagulant, Clotting Factor
Fibrinogen

Contraceptive, Oral (see article on *Oral Contraceptives*)

Contrast Medium (see *Radiopaque Medium*)

Convulsant, Inhalant
Flurothyl

Counterirritant
Camphor
Capsicum
Chloroform
Menthol
Methyl Salicylate

Decongestant, Nasal
Cyclopentamine Hydrochloride
Ephedrine
Ephedrine Hydrochloride
Ephedrine Sulfate
Epinephrine Hydrochloride
Mephentermine
Mephentermine Hydrochloride
Naphazoline Hydrochloride
Oxymetazoline Hydrochloride
Phenylephrine Hydrochloride
Phenylpropanolamine Hydrochloride
Propylhexedrine
Tetrahydrozoline Hydrochloride
Xylometazoline Hydrochloride

Dental Caries Prophylactic
Sodium Fluoride
Stannous Fluoride

Dental Desensitizer
Zinc Chloride

Depigmenting Agent
Hydroquinone
Methoxsalen
Monobenzone

Dermatitis Herpetiformis Suppressant
Dapsone
Sulfapyridine

Detergent
Green Soap
Green Soap Tincture

Diagnostic Aid (see also *Radiopaque Medium*)

ADRENOCORTICAL INSUFFICIENCY
Corticotropin

AMYLOIDOSIS
Congo Red

ANTERIOR PITUITARY FUNCTION
Metyrapone

BLASTOMYCOSIS
Blastomycin

BLOOD VOLUME
Evans Blue
Sodium Chromate Cr 51 Injection

BLOOD VOLUME AND CARDIAC OUTPUT
Indocyanine Green
Iodinated I 125 Serum Albumin
Iodinated I 131 Serum Albumin

CIRCULATION TIME
Sodium Dehydrocholate

CORNEAL TRAUMA
Sodium Fluorescein

DIPHTHERIA SUSCEPTIBILITY
Diagnostic Diphtheria Toxin
Inactivated Diagnostic Diphtheria Toxin

GASTRIC SECRETION
Azuresin
Betazole Hydrochloride
Histamine Phosphate

HEPATIC FUNCTION
Indocyanine Green
Sodium Benzoate
Sodium Rose Bengal I 131 Injection
Sodium Sulfobromophthalein

HISTOPLASMOSIS
Histoplasmin

HYPOPARATHYROIDISM
Disodium Edetate

LIVER SCANNING
Gold Au 198 Injection

PERNICIOUS ANEMIA
Cyanocobalamin Co 57
Cyanocobalamin Co 60

RENAL FUNCTION
Mannitol
Phenolsulfonphthalein
Sodium Aminohippurate
Sodium Indigotindisulfonate
Sodium Iodohippurate I 131

THYROID FUNCTION
Sodium Iodide I 125
Sodium Iodide I 131

TRICHINOSIS
Trichinella Extract

TUBERCULOSIS
Old Tuberculin
Purified Protein Derivative of Tuberculin

TUMOR LOCALIZATION
Chlormerodrin Hg 197 Injection
Chlormerodrin Hg 203 Injection
Sodium Phosphate P 32 Solution

Disinfectant (see also *Anti-infective, Topical*)
Chlorinated Lime
Creosote
Cresol, Saponated Solution
Formaldehyde
Halazone
Iodine
Mercury Bichloride
Methylbenzethonium Chloride
Phenol
Potassium Permanganate
Sodium Hypochlorite Solution

Diuretic (see also article on *Renal Therapeutic Agents*)
Acetazolamide
Amiloride
Aminophylline
Amisometradine
Ammonium Chloride
Bendroflumethiazide
Benzthiazide
Chlormerodrin
Chlorothiazide
Chlorthalidone
Cyclothiazide
Ethacrynic Acid
Furosemide
Hydrochlorothiazide
Hydroflumethiazide
Mannitol
Meralluride
Merethoxylline Procaine
Mersalyl
Methyclothiazide
Metolazone
Polythiazide
Potassium Citrate
Quinethazone
Sodium Chlorothiazide
Sodium Mercaptomerin
Spironolactone
Theobromine
Theophylline
Triamterene
Trichlormethiazide
Urea

Dusting Powder
Absorbable Dusting Powder
Kaolin
Starch
Talc
Zinc Stearate

Electrolyte Replenisher
Calcium Chloride
Calcium Gluconate
Calcium Lactate
Potassium Bicarbonate
Potassium Chloride
Potassium Gluconate
Sodium Chloride

Emetic

Apomorphine Hydrochloride
Ipecac Syrup
Zinc Sulfate

Emollient
Almond Oil
Cold Cream
Corn Oil
Cottonseed Oil
Glycerin
Olive Oil
Theobroma Oil

Enzymes
Alpha Amylase
Bromelains
Chymotrypsin
Fibrinolysin (Human)
Pancreatic Dornase
Pancreatin
Papain
Penicillinase
Pepsin
Proteolytic Enzymes from Carica Papaya
Streptokinase-Streptodornase
Sutilains
Trypsin Crystallized

Estrogen
Benzestrol
Chlorotrianisene
Dienestrol
Diethylstilbestrol
Diethylstilbestrol Diphosphate
Diethylstilbestrol Dipropionate
Estradiol
Estradiol Benzoate
Estradiol Cypionate
Estradiol Dipropionate
Estradiol Valerate
Estrogens, Conjugated
Estrogens, Esterified
Estrone
Estrone Sulfate, Piperazine
Ethinyl Estradiol
Hexestrol
Mestranol
Methallenestril
Polyestradiol Phosphate
Promethestrol Dipropionate

Evacuant
Agar
Aloe
Aloin
Bisacodyl
Calomel
Cascara Sagrada
Castor Oil
Colocynth
Danthron
Dioctyl Calcium Sulfosuccinate
Dioctyl Sodium Sulfosuccinate
Gamboge
Ipomea
Jalap
Magnesia, Milk of
Magnesium Citrate Solution
Magnesium Hydroxide
Magnesium Oxide
Magnesium Sulfate
Methylcellulose
Mineral Oil
Oxyphenisatin
Oxyphenisatin Acetate
Phenolphthalein
Plantago Seed
Podophyllum
Podophyllum Resin
Poloxalkol
Potassium Bitartrate
Potassium Sodium Tartrate
Rhubarb
Senna
Sodium Carboxymethylcellulose
Sodium Phosphate
Sodium Sulfate
Sulfur

Expectorant
Ammonium Carbonate
Ammonium Chloride
Antimony Potassium Tartrate
Benzoin, Compound Tincture
Glyceryl Guaiacolate
Guaiacol
Ipecac
Potassium Citrate
Potassium Guaiacolsulfonate
Potassium Iodide
Storax

Terpin Hydrate
Tolu Balsam

Fluid, Electrolyte and/or Nutrient Replenisher
Dextrose Injection
Dextrose and Sodium Chloride Injection
Fructose Injection
Fructose and Sodium Chloride Injection
Potassic Saline Injection, Lactated
Protein Hydrolysate Injection
Ringer's Injection
Ringer's Injection, Lactated
Sodium Chloride Injection
Sodium Lactate Injection

Glucocorticoid
Betamethasone
Betamethasone Acetate
Betamethasone Sodium Phosphate
Betamethasone Valerate
Cortisone Acetate
Dexamethasone
Dexamethasone Sodium Phosphate
Fluocinolone Acetonide
Fluocinonide
Fluorometholone
Fluprednisolone
Flurandrenolone
Hydrocortisone
Hydrocortisone Acetate
Hydrocortisone Sodium Phosphate
Hydrocortisone Sodium Succinate
Meprednisone
Methylprednisolone
Methylprednisolone Acetate
Methylprednisolone Sodium Succinate
Paramethasone Acetate
Prednisolone
Prednisolone Acetate
Prednisolone Sodium Phosphate
Prednisolone Succinate
Prednisolone Tebutate
Prednisone
Triamcinolone
Triamcinolone Acetonide
Triamcinolone Diacetate

Gout Suppressant (see also *Glucocorticoids*)
Allopurinol
Aspirin
Colchicine
Indomethacin
Oxyphenbutazone
Phenylbutazone
Probenecid
Sodium Salicylate
Sulfinpyrazone

Hallucinogen
Cannabis
Lysergic Acid Diethylamide

Hematinic
Ferric Ammonium Citrate
Ferrocholinate
Ferrous Fumarate
Ferrous Gluconate
Ferrous Sulfate
Iron Dextran Injection
Iron Sorbitex Injection
Polyferose
Reduced Iron
Saccharated Iron Oxide

Hemostatic
Aminocaproic Acid
Carbazochrome Salicylate

Hemostatic, Local
Cellulose, Oxidized
Fibrin Foam, Human
Gelatin Sponge, Absorbable
Thrombin

Hormone, Adrenocorticotropic
Corticotropin (Injection)
Corticotropin, Repository (Injection)
Corticotropin Zinc Hydroxide (Suspension)

Hormone, Gonadotropic
Gonadotropin, Chorionic
Gonadotropin, Serum

Hormone, Pituitary (see article on

فارماکولوژی-کتابهای دوره‌ای پزشکی پارسی

Pituitary Hormones and Factors)

Hormone, Thyroid
- Sodium Levothyroxine
- Sodium Liothyronine
- Thyroid

Hyperglycemic
- Glucagon

Hypocholesterolemic
- Clofibrate
- Niacin
- Sitosterols
- Sodium Dextrothyroxine

Hypoglycemic (Insulins)

RAPID ACTION
- Insulin Injection
- Prompt Insulin Zinc Suspension

INTERMEDIATE ACTION
- Globin Zinc Insulin Injection
- Isophane Insulin Suspension
- Insulin Zinc Suspension

LONG ACTION
- Protamine Zinc Insulin Suspension
- Extended Insulin Zinc Suspension

Hypoglycemic (Oral)
- Acetohexamide
- Chlorpropamide
- Phenformin Hydrochloride
- Tolazamide
- Tolbutamide

Immunizing Agent, Active
- Bacillus Calmette-Guérin (BCG) Vaccine
- Botulism Antitoxin
- Cholera Vaccine
- Diphtheria Toxoid
- Diphtheria Toxoid, Adsorbed
- Diphtheria and Tetanus Toxoids
- Diphtheria and Tetanus Toxoids, Adsorbed
- Diphtheria and Tetanus Toxoids and Pertussis Vaccine
- Diphtheria and Tetanus Toxoids and Pertussis Vaccine, Adsorbed
- Influenza Virus Vaccine
- Measles Virus Vaccine, Live Attenuated
- Pertussis Vaccine
- Pertussis Vaccine, Adsorbed
- Plague Vaccine
- Poliomyelitis Vaccine
- Poliovirus Vaccine, Live, Oral
- Rabies Vaccine
- Rubella Virus Vaccine, Live
- Smallpox Vaccine
- Tetanus Toxoid
- Tetanus Toxoid, Adsorbed
- Tetanus and Diphtheria Toxoids, Adsorbed
- Typhoid Vaccine
- Typhus Vaccine
- Yellow Fever Vaccine

Immunizing Agent, Passive
- Antirabies Serum
- Botulism Antitoxin
- Crotaline Antivenin, Polyvalent
- Diphtheria Antitoxin
- Globulin, Immune Serum
- Measles Immune Globulin
- Pertussis Immune Globulin
- Tetanus Antitoxin
- Tetanus and Gas Gangrene Antitoxins
- Tetanus Immune Globulin

Insect Repellant
- Diethyltoluamide
- Dimethyl Phthalate
- Ethohexadiol

Ion-Exchange Resin
- Cholestyramine Resin
- Sodium Polystyrene Sulfonate

Irrigating Solution
- Aminoacetic Acid
- Sodium Chloride

Keratolytic
- Resorcinol
- Resorcinol Monoacetate
- Salicylic Acid
- Sulfurated Potash

Laxative (see *Evacuant*)

Leprostatic
- Dapsone
- Sodium Acetosulfone
- Sodium Glucosulfone
- Sodium Sulfoxone
- Solapsone

Lipotropic
- Choline Dihydrogen Citrate
- Inositol
- Methionine

Lupus Erythematosus Suppressant
- Chloroquine Phosphate
- Hydroxychloroquine Phosphate

Metal-Complexing Agent
- Calcium Disodium Edetate
- Disodium Edetate
- Penicillamine

Migraine Analgesic (see *Analgesic, Migraine*)

Migraine Preventive
- Methysergide Maleate

Mineralocorticoid
- Aldosterone
- Corticosterone
- Desoxycorticosterone Acetate
- Desoxycorticosterone Pivalate
- Fludrocortisone Acetate

Mucolytic
- Acetylcysteine
- Pancreatic Dornase
- Streptokinase-Streptodornase

Mydriatic (see *Anticholinergic, Ophthalmic*)

Neuroleptic
- Droperidol

Ointment Base
- Cold Cream
- Hydrophilic Ointment
- Hydrophilic Petrolatum
- Lanolin
- Lanolin, Anhydrous
- Petrolatum
- Polyethylene Glycol Ointment
- Rose Water Ointment
- White Ointment
- White Petrolatum
- Yellow Ointment

Ovulatory
- Clomiphene Citrate

Oxytocic
- Ergonovine Maleate
- Methylergonovine Maleate
- Oxytocin Injection
- Prostaglandins
- Sparteine Sulfate

Pediculicide
- Benzene Hexachloride, Gamma
- Chlorophenothane

Penicillin Adjuvant
- Probenecid

Pharmaceutic Aid

ACID
- Acetic Acid
- Acetic Acid, Glacial
- Citric Acid
- Hydrochloric Acid
- Nitric Acid
- Phosphoric Acid
- Tartaric Acid

ALKALI
- Potassium Bicarbonate
- Potassium Hydroxide
- Sodium Bicarbonate
- Sodium Borate
- Sodium Carbonate
- Sodium Hydroxide
- Triethanolamine

ANTIMICROBIAL
- Benzyl Alcohol
- Chlorobutanol
- Cresol
- Phenol

ANTIMYCOTIC
- Benzoic Acid
- Methylparaben
- Propylparaben
- Sodium Benzoate

ANTIOXIDANT
- Hypophosphorous Acid
- Sodium Bisulfite

Sulfur Dioxide

FLAVOR

Caraway
Caraway Oil
Cardamom
Cardamom Oil
Cinnamon
Cinnamon Oil
Clove Oil
Cocoa
Coriander
Coriander Oil
Ethyl Vanillin
Eucalyptol
Eucalyptus Oil
Fennel Oil
Ginger
Glucose, Liquid
Glycyrrhiza Extract, Pure
Honey
Lemon Oil
Lemon Tincture
Methyl Salicylate
Orange Flower Oil
Orange Oil
Orange Spirit, Compound
Peppermint Oil
Peppermint Spirit
Saccharin
Sorbitol
Spearmint Oil
Sucrose
Vanilla
Vanillin

HUMECTANT

Glycerin
Propylene Glycol
Sorbitol Solution

LEVIGATING AGENT

Mineral Oil

SOLVENT

Acetone
Alcohol
Chloroform
Corn Oil
Cottonseed Oil
Glycerin
Isopropyl Alcohol
Olive Oil
Peanut Oil
Polyethylene Glycol 300
Propylene Glycol
Sesame Oil
Water
Water for Injection
Water, Purified

STIFFENING AGENT

Cetyl Alcohol
Paraffin
Spermaceti
Stearyl Alcohol
White Wax
Yellow Wax

SURFACTANT

Polyoxyl 40 Stearate
Polysorbate 80
Sodium Lauryl Sulfate

SUSPENDING AGENT

Acacia
Agar
Bentonite
Gelatin
Methylcellulose
Pectin
Povidone
Sodium Alginate
Sodium Carboxymethyl-cellulose
Tragacanth

VEHICLE

Acacia Syrup
Aromatic Elixir
Cherry Syrup
Citric Acid Syrup
Cocoa Syrup
Eriodictyon Syrup, Aromatic
Glycyrrhiza Syrup
Orange Syrup
Raspberry Syrup
Syrup
Tolu Balsam Syrup
Wild Cherry Syrup

Progestogen

Chlormadinone Acetate

Dimethisterone
Dydrogesterone
Ethisterone
Ethynodiol Diacetate
Hydroxyprogesterone Caproate
Medroxyprogesterone Acetate
Megestrol Acetate
Norethindrone
Norethindrone Acetate
Norethynodrel
Norgestrel
Progesterone

Protectant
Aluminum
Benzoin, Compound Tincture
Bismuth Subcarbonate
Calamine
Collodion, Flexible
Dimethicone
Kaolin
Pectin
Peruvian Balsam
Petrolatum
Titanium Dioxide
Zinc Oxide

Radiopaque Medium

ANGIOCARDIOGRAPHIC
Meglumine Diatrizoate
Sodium Iothalamate

ANGIOGRAPHIC, CEREBRAL
Meglumine Iothalamate

ARTERIOGRAPHIC, PERIPHERAL
Meglumine Iothalamate

BRONCHOGRAPHIC
Iodized Oil
Propyliodone

CHOLECYSTOGRAPHIC
Calcium Ipodate
Iodoalphionic Acid
Iopanoic Acid
Meglumine Iodipamide
Sodium Iodipamide
Sodium Ipodate

GASTROINTESTINAL
Barium Sulfate

HYSTEROSALPINGOGRAPHIC
Iodized Oil

MYELOGRAPHIC
Iophendylate

UROGRAPHIC
Iodopyracet
Meglumine Diatrizoate
Meglumine Iothalamate
Methiodal Sodium
Sodium Diatrizoate

Relaxant, Skeletal Muscle
Carisoprodol
Chlorphenesin Carbamate
Chlorpromazine Hydrochloride
Chlorzoxazone
Decamethonium Bromide
Diazepam
Dimethyl Tubocurarine Chloride
Dimethyl Tubocurarine Iodide
Gallamine Triethiodide
Mephenesin
Meprobamate
Methocarbamol
Orphenadrine Citrate
Quinine
Succinylcholine Chloride
Trihexyphenidyl Hydrochloride
Tubocurarine Chloride

Relaxant, Smooth Muscle
Adiphenine Hydrochloride
Alverine Citrate
Aminophylline
Dicyclomine Hydrochloride
Dioxyline Phosphate
Methixene Hydrochloride
Papaverine Hydrochloride
Theophylline
Theophylline Sodium Acetate
Theophylline Sodium Glycinate

Rubefacient
Alcohol, Rubbing
Isopropyl Rubbing Alcohol
Mustard, Black
Peruvian Balsam
Pine Tar
Thyme Oil

Scabicide

Benzene Hexachloride, Gamma
Benzyl Benzoate
Crotamiton
Sulfur, Precipitated
Sulfur, Sublimed

Sclerosing Agent
Sodium Morrhuate Injection

Sedative/Hypnotic, Barbiturate

LONG ACTION
Barbital
Mephobarbital
Metharbital
Phenobarbital
Phenobarbital Sodium

INTERMEDIATE ACTION
Amobarbital
Amobarbital Sodium
Aprobarbital
Butabarbital Sodium
Butalbital
Diallylbarbituric Acid
Talbutal

SHORT ACTION
Heptabarbital
Pentobarbital Sodium
Secobarbital
Secobarbital Sodium

ULTRASHORT ACTION
See *Anesthetic, General (Intravenous)*

Sedative/Hypnotic, Nonbarbiturate
Bromisovalum
Carbromal
Chloral Hydrate
Ethchlorvynol
Ethinamate
Flurazepam Hydrochloride
Glutethimide
Methaqualone
Methyprylon
Paraldehyde
Promethazine Hydrochloride
Propiomazine Hydrochloride
Sodium Bromide
Triclofos Sodium

Stimulant, Central
Amphetamine Phosphate
Amphetamine Sulfate
Caffeine
Caffeine, Citrated
Caffeine and Sodium Benzoate
Dextroamphetamine Phosphate
Dextroamphetamine Sulfate
Doxapram Hydrochloride
Ethamivan
Methamphetamine Hydrochloride
Methylphenidate Hydrochloride
Nikethamide
Pentylenetetrazol
Picrotoxin
Pipradrol Hydrochloride

Stimulant, Respiratory
Ammonia, Aromatic Spirit
Carbon Dioxide
Doxapram Hydrochloride
Ethamivan
Nikethamide
Oxygen
Picrotoxin

Sulfonamides, Antibacterial
Mafenide
Salicylazosulfapyridine
Sodium Sulfacetamide
Sodium Sulfadiazine
Sulfacetamide
Sulfachlorpyridazine
Sulfadiazine
Sulfadimethoxine
Sulfaethidole
Sulfamerazine
Sulfameter
Sulfamethazine
Sulfamethizole
Sulfamethoxazole
Sulfamethoxypyridazine
Sulfanilamide
Sulfapyridine
Sulfathiazole
Sulfisomidine
Sulfisoxazole
Trisulfapyrimidines

Sweetener, Nonnutritive
Calcium Cyclamate
Calcium Saccharin

Saccharin
Sodium Cyclamate
Sodium Saccharin

Thyroid Inhibitor
Carbimazole
Methimazole
Methylthiouracil
Propylthiouracil

Tuberculostatic
Aminosalicylic Acid
Calcium Aminosalicylate
Calcium Benzoylpas
Capreomycin
Cycloserine
Ethambutol Hydrochloride
Ethionamide
Isoniazid
Kanamycin Sulfate
Potassium Aminosalicylate
Pyrazinamide
Sodium Aminosalicylate
Streptomycin Sulfate
Viomycin Sulfate

Uricosuric (see *Uricosuric Agents* in article on *Renal Therapeutic Agents*)
Probenecid
Sulfinpyrazone

Urinary Tract Antibacterial
Methenamine
Methenamine Mandelate
Nalidixic Acid
Nitrofurantoin
Sulfachlorpyridazine
Sulfadimethoxine
Sulfaethidole
Sulfameter
Sulfamethizole
Sulfamethoxazole
Sulfamethoxypyridazine
Sulfisomidine
Sulfisoxazole

Urinary Tract Spasmolytic
Flavoxate Hydrochloride

Vasodilator, Coronary (see *Antianginal Agents*)

Vasodilator, Peripheral
Azapetine Phosphate
Cyclandelate
Dioxyline Phosphate
Isoxsuprine Hydrochloride
Niacin
Nylidrin Hydrochloride
Papaverine Hydrochloride
Phenoxybenzamine Hydrochloride
Tolazoline Hydrochloride

Vasopressor, Nonadrenergic (see also *Adrenergic, Vasopressor*)
Angiotensin Amide

Vitamin
Ascorbic Acid
Calcium Pantothenate
Cholecalciferol
Cod Liver Oil
Cyanocobalamin
Decavitamin Capsules
Decavitamin Tablets
Ergocalciferol
Folic Acid
Halibut Liver Oil
Hydroxocobalamin
Menadiol Sodium Diphosphate
Menadione
Menadione Sodium Bisulfite
Niacin
Niacinamide
Phytonadione
Pyridoxine Hydrochloride
Riboflavin
Thiamine Hydrochloride
Thiamine Nitrate
Vitamin A
Vitamin E

Xanthine Oxidase Inhibitor
Allopurinol

انتشارات تکنولوژی داروهای ...

اطلاعات داروئی

(شماره‌هائی‌که مقابل هرعنوان آمده است شمارهٔ مربوط به‌منابع آن است. برای پیداکردن فهرست منابع به‌ابتدای کتاب رجوع کنید.)

فهرست مطالب اطلاعات داروئی

چه هنگام و چگونه برخی از داروها را مصرف کنیم (۱۴)

جدول شماره ۱

پس از غذا یا همراه با غذا

ترکیب برحسب نام ژنریک	نام تجارتی
کلریدرات بی‌پریدین	Akineton
اسپیرونولاکتون + هایدروکلروتیازید	Aldactazide
اسپیرونولاکتون	Aldactone
متیل دوپا	Aldomet
متیل دوپا + هایدروکلروتیازید	Aldoril
تئوفیلین اتیلن دی آمین	Aminophylline
سولفین پیرازون	Anturane
کلروکین فسفات	Aralen HCl
اسیداستیل سالیسیلیک	Aspirin
کلوفیبرات	Atromid-S
فنیل بوتازون	Azolid
سولفاسالازین	Azulfidine
فنیل بوتازون	Butazolidin
آمودیاکین	Camoquin
تری کلرو استالدئیدمنو هیدرات	Chloral Hydrate
نیتروفورانتوئین	Cyantin
سیکلاندلات	Cyclospasmol
فن فورمین	DBI
پی‌پرید ولات + آنزیم	Dactilase
دانترولن سدیم	Dantrium
کلر پروپامید	Diabinese
دی فنیل هیدانتوئین سدیم	Dilantin
دوناتال + آنزیم	Donnazyme
لودوپا	Dopar
استوهگزامید	Dymelor

Dyrenium	تریامترن
Enzypan	آنزیم
Feosol	سولفات فرو
Fergon	گلوکونات فرو
Festal	آنزیم
Flagyl	مترونیدازول
Fulvicin	گریزوفولوین
Furadantin	نیتروفورانتوئین
Furoxone	فورازولیدین
Grifulvin	گریزوفولوین
Grisactin	گریزوفولوین
Hydrocortisone	هیدروکورتیزون
Hygroton	کلرتالیدون
Iberet	سولفات فرو + ویتامین
Iberol	سولفات فرو
Ilidar	آزاپتین فسفات
Indocin	اندومتاسین
Iron salts and/or preparations	املاح آهن و فرآورده‌های آهن‌دار
Isordil	ایزوسوربايد دی‌نیترات
Isoniazid	ایزونیازید
Kaochlor	کلرور پتاسیم
Kaon	گلوکونات پتاسیم
Kay Ciel	کلرور پتاسیم
Kemadrin	کلریدرات پرو سیکلیدین
K-Lor	کلرور پتاسیم
Larodopa	لوودوپا
Macrodantin	نیتروفورانتوئین
Marax	کلریدرات هیدروکسی زین + تئوفیلین ـ سولفات افدرین
Midicel	سولفات متوکسی پیریدازین
Mintezol	تیابندازول
Motrin	ایبوپروفن
Muripsin	اسید گلوتامیک + پپسین
NegGram	اسید نالیدیکسیک
Noctec	کلرال هیدراته
Oral hypoglycemics	پائین آورنده‌های قند خون (خوراکی)
Orinase	تولبوتامید
Oxalid	اکسی فن بوتازون
Pagitane	کلریدرات سیکلیرمین
Phenoxene	کلرفنوکسامین
Ponstel	اسید مفنامیک

Prednisone/Prednisolone ______ پردنیزون و پرد نیزولون
Potassium salts ______ املاح پتاسیم و فرآورده‌های حاوی پتاسیم
and/or preparations ______
Pyridium ______ کلریدرات فنازوپیریدین
Quadrinal ______ کلریدرات افدرین + فنوباربیتال + تئوفیلین کلسیم
سالیسیلات + یدور پتاسیم
Quibron ______ تئوفیلین گلیسریل گایا کولات
Quinamm ______ کینین + آمینو فیلین
Paudixin ______ پودر روولفیا سرپانتینا
Regroton ______ کلرتالیدون + رزرپین
Rela ______ کاریزوپرودول
Reserpine ______ رزرپین
Salicylates ______ سالیسیلات‌ها
Sansert متی سرژید
Serpasil رزرپین
Sinemet کاری دوپا + لوودوپا
Sterazolidin فنیل بوتازون + پردنیزون + کلرور آلومینیم
Tandearil اکسی فن بوتازون
Thorazine کلرپرومازین
Tofranil کلریدرات ایمی پرامین
Tolinase ______ تولازامید
Troph-Iron ______ ویتامین B_1 + ویتامین B_{12} + آهن
Trophite ______ ویتامین B_1 + ویتامین B_{12}
Urecholine ______ کلرور بتانکول
Zyloprim ______ اللوپورنیول

با معـده خالی

Antepar ______ سیترات پی پرازین
Alcopara ______ هیدروکسی نفتوات بفنیوم
Castor Oil ______ روغن کرچک
Crystoids ______ هگزیل رزورسینول
Duotrate ______ پنتا اریتریتول تترانیترات
Lincocin ______ کلریدرات لینکومایسین
Neoloid ______ روغن کرچک
Peritrate SA ______ پنتا اریتریتول تترا نیترات
Sorbitrate Oral ______ ایزوسور باید دی نیترات

یکساعت پیش از هر غذا

Anticholinergics	آنتی کلی نرژیک‌ها
Banthine (PB)	برمور متانتلین
Cantil (PB)	برمور مپنزولات
Combid	پروکلرپرازین + ایزوپروپامید
Cotazym	آنزیم پانکرآتیک
Cytellin	سیتوسترول‌های آلفا و بتا و گاما
Donnatal	فنو باربیتال + سولفات هیوسیامین + سولفات آتروپین + هیدروبرمور هیوسین
Librax	کلرد یازپوکسید + برمور کلیرینیوم
Pondimin	کلریدرات فن فلورامین
Preludin	کلریدرات فن مترازین
Pro-Bathine (PB)	برمور پروبانتلین
Robinul (PH) (Forte)	گلیکوپیرولات + فنوباربیتال
Serenium	اتوکسازون
Tenuate	کلریدرات دی اتیل‌پروپیون
Tepanil	کلریدرات دی اتیل پروپیون
Tral (PB)	متیل سولفات اگزوسیکلیوم
Valpin (PB)	متیل برمور اکتاتروپین

یکساعت پیش از هرغذا یا دو ساعت پس از هر غذا

Achromycin-V	کلریدرات تتراسیکلین
Alpen	فنی تیسیلین پتاسیم
Amcill	آمپی سیلین
Ampicillin	آمپی سیلین
Ancef	سفازولین سدیم
Azo-Gantrisin	سولفی سوکسازول + فنازوپیریدین
Azotrex	فسفات تتراسیکلین + سولفامتیزول + فنازوپیریدین
Bactocill	اکساسیلین سدیم
Bactrim	کوتریموکسازول
Cuemid	کولستیرامین رزین
Cyclopar	کلریدرات تتراسیکلین
Declomycin	کلریدرات دمکلو سیکلین
Declostatin	دمکلو سیکلین + نیستاتین
Dynapen	دی کلوگزاسیلین
Erythromycin	اریترومایسین

Erythrocin	ارتیرومایسین
Gantrisin	سولفی سوکسازول دیولامین
Ilosone	اریترومایسین استولیت
Ilotycin	اریترومایسین
Lipo-Gantrisin	استیل سولفی سوکسازول
Mysteclin-F	تتراسیکلین + آمفوتریسین B
Omnipen	آمپی سیلین
Panmycin	کلریدرات تتراسیکلین
Pathocil	دی کلوگزاسیلین
Pediamycin	اریترومایسین اتیل سوکسینات
Pen-A	آمپی سیلین تری هیدرات
Penbritin	آمپی سیلین
Penicillin	پنی‌سیلین
Pensyn	آمپی سیلین
Pen-Vee-(K)	پنی سیلین وی پتاسیم
Pfizer-E	اریترومایسین‌استئارات
Polycillin	آمپی سیلین
Principen	آمپی سیلین
Questran	کولستیرامین
Rifadin	ریفامپی سین
Rimactane	ریفامپی سین
Robitet	کلریدرات تتراسیکلین
Rondomycin	کلریدرات تترا سیکلین
Septra	کوتریموکسازول
Sumycin	کلریدرات تترا سیکلین
TAO	ترولیندومایسین
Tegopen	کلوگزاسیلین سدیم
Terramycin	کلریدرات اکسی تتراسیکلین
Tetracycline	تتراسیکلین
Tetracyn	تتراسیکلین
Tetrex-(S)	فسفات تتراسیکلین
Totacillin	آمپی سیلین
Unipen	نافسیلین سدیم
Urobiotic	فنازوپیریدین + اکسی تتراسیکلین سدیم + سولفات متی زول
Uticillin (VK)	پنی‌سیلین وی پتاسیم
Veracillin	دی کلوگزاسیلین سدیم
Versapen	هتاسیلین
V-Cillin-(K)	پنی‌سیلین وی پتاسیم

بدون توجه به غذا

Amoxil	(آموکسی سیـ ـن)
Anspor	سفرادین
Clecoin	کلریدرات کلینداما یسین
Kafocin	سفالوگلیسین
E-Mycin	اریترومایسین
Keflex	سفالکسین
Larotid	آموکسی سیلین
Minocin	کلریدرات ماینوسیکلین
Pentritol	پنتا اریتریتول تترا نیترات
Polymox	آموکسی سیلین
Vectrin	کلریدرات ماینو سیکلین
Velosef	سفرادین
Vibramycin	دوکسی سیکلین

زبانی یا زیرزبانی

Oreton (Buccal)	متیل تستوسترون
Metandřen Linguets	متیل تستوسترون
Papase	پاپائین
Percorten Linguets	استات دزوکسی کورتیکوسترون

همراه با مقادیر کافی مایعات

Azo-Mandelamine	ماندلات مقنامین + کلریدرات فنازوپیریدین
Azo-Gantanol	سولفامتوکسازول + کلریدرات فنازوپیریدین
Azo-Gantrisin	سولفی سوکسازول + فنازوپیریدین
Anturane	سولفین پیرازون
Azulifidine	سولفا سالازین
Azotrex	فسفات تتراسیکلین + سولفامتیزول + فنازوپیریدین
Bactrim	کوتریموکسازول
Benemid	پروبنسید
Cellothyl	متیل سلولز
ColBenemid	پروبنسید + کلشی سین
Cuemid	کولیسترامین رزین
Eskalith	کربنات لیتیم
Gantanol	سولفا متوکسازول

Gantrisin	سولفا سوکسازول
Hiprex	مفنامین هیپورات
Konsyl	موسیلاژ غشاء دانه بارهنگ
L.A. Formula	موسیلاژ غشاء دانه بارهنگ
Lithane	کربنات لیتیم
Mandelamine	ماندلات مفنامین
Metamucil	موسیلاژ غشاء دانه بارهنگ
Methylcellulose	متیل سلولز
Movicol	صمغ
Questran	کولستیرامین
Senokot	عصاره میوه سنا
Septra	کوتریموکسازول
Sulfonamides	سولفونامیدها
Urex	مفنامین هیپورات
Zyloprim	آللوپورینول

نباید با روغنهای‌معدنی‌مصرف شود

Colace	دی اکتیل سدیم سولفوسوکسینات
Dorbantyl	دانترون + دی اکتیل سدیم سولفو سوکسینات
Doxidan	دی اکتیل کلسیم سولفوسوکسینات
Doxinate	دی اکتیل سدیم سولفو سوکسینات
Calcium or Sodium Sulfosuccinate and/or preparations	سولفو سوکسینات کلسیم یا سدیم و یا فرآورده‌های حاوی آن
Vitamins A, D, E, K and/or preparations	ویتامین A ، D ، E ، K و فرآورده‌های حاوی آن
Peri-Colace	کازانترانول + دی اکتیل سدیم سولفوسوکسینات
Sulfasuxidine	سولفا سوکسیدین
Sulfathalidine	سولفا تالادین

نباید با شیر، لبنیات و آنتی اسیدها مصرف شود

Achromycin-V	کلریدرات تتراسیکلین
Bisacodyl	بیساکودیل
Cyclopar	کلریدرات تترا سیکلین
Declomycin	کلریدرات دمکلو سیکلین
Declostatin	کلریدرات دمکلو سیکلین + نیستاتین

Dulcolax	بیساکودیل
Feosol	سولفات فرو
Fergon	گلوکونات فرو
Iberet	سولفات فرو + ویتامین
Iberol	سولفات فرو + ویتامین
Iron salts and/or preparations	املاح آهن و فرآورده‌های آهن‌دار
Kaochlor	کلرور پتاسیم
Kaon	گلوکونات پتاسیم
Kay Ciel	کلرور پتاسیم
Panmycin	کلریدرات تتراسیکلین
Potassium salts and/or preparations	املاح پتاسیم و فرآورده‌های حاوی پتاسیم
Robitet	کلریدرات تتراسیکلین
Slow-K	کلرور پتاسیم
Sumycin	کلریدرات تتراسیکلین
Terramycin	اکسی تتراسیکلین
Tetracycline and/or preparations	تتراسیکلین و فرآورده‌های حاوی تتراسیکلین
Tetracyn	تتراسیکلین
Tetrex-(S)	فسفات تتراسیکلین
Troph-Iron	ویتامین B_1 + ویتامین B_{12} + آهن
Trophite	ویتامین B_1 + ویتامین B_{12}

زیرزبانی

Cardilate Sublingual	اریتریتول تترانیترات
Hydergine	دی هیدرو ارگوکورنین + دی هیدرو ارگو کریپتین
Isordil Sublingual	ایزو سورباید دی نیترات
Isuprel Glossets	کلریدرات ایزو پروترنول
Nitroglycerin	نیترو گلیسرین
Nitrostat	نیترو گلیسرین
Peritrate w/Nitroglycerin	پنتا اریتریل تترا نیترات
Sorbitrate Sublingual	ایزوسور باید دی نیترات

قرص یا کپسول را بجوید ، از بلعیدن آن خودداری کنید .

مکلیزین	Antivert Chewable
اریتریتول‌تترانیترات	Cardilate Chewable
تریپسین + کیموتریپسین	Chymoral
هیدروکسید آلومینیم + تری سیلیکات منیزیم	Gaviscon
لاکتو باسیلوس اسید و فیلوس + ل . بولگاریکوس	Lactinex tablets
تیا بندازول	Mintezol
هیدروکسید آلومینیم + هیدروکسید منیزیم + سایمتیکون	Mylanta (II)
سایمتیکون	Mylicon (80)
ایزوسورباید دی نیترات	Sorbitrate Chewable
متدیلازین	Tacaryl Chewable
مبندازول	Vermox

قرص یا کپسول را ببلعید ، از جویدن آن خودداری کنید*

کیموتریپسین کریستال	Avazyme
سولفا سالازین	Azulfidine EN-tabs
برمور متانتلین	Banthine (PB)
سوکسینات روکسیلامین + پیروکسیدین	Bendectin
بیساکودیل	Bisacodyl
متیل سلولز	Cellothyl
کلرال هیدراته	Chloral Hydrate
کلرامفنیکل	Chlormycetin
پی پریدولات + آنزیم	Dactilase
دوناتال + آنزیم	Donnazyme
بیساکودیل	Dulcolax
پنتا اریتریتول تترانیترات	Duotrate
اریترومایسین	E-Mycin
پانکراتین + پپسین + صفرا	Entozyme
آنزیم	Enzypan

---

* فرآورده‌هائی که حاوی رنگ یا مواد دیگری هستند که از تماس طولانی آنها با دندانها یا مخاط دهانی باید پرهیز شود .

داروهائی که روکشی دارند که در روده باز میشود و فرمولاسیون آنها بدین شکل است که یک لایه خارجی دارند که در معده حل میشود ویک لایه داخلی‌کددرمحیط قلیائی روده کوچک باز شده و مواد فعال خود را آزاد میسازند .

Festal	آنزیم
Ilotycin	ارتیرومایسین
Isordil Tembids	ایزوسورباید دی نیترات
Kanulase	سلولاز + پانکراتین + اسید گلوتامیک + صفرای گاو
Muripsin	اسید گلوتامیک + پپسین
Nitrobid	نیتروگلیسرین
Nitroglyn	نیتروگلیسرین
Noctec	کلرال هیدراته
Orenzyme	آنزیم
Pavabid	کلریدرات پاپاورین
Peritrate SA (with PR)	پنتا اریتریتول ترا نیترات
Povan	پیروینیوم پاموآت
Preludin Endurets	کلریدرات فن مترازین
Somnos	کلرال هیدراته
Tenuate Dospan	کلریدرات دی اتیل پروپیون
Tepanil Tentab	کلریدرات دی اتیل پروپیون
Tessalon	نیتروناتات

کپسول یا قرص را میتوان جوید ، بلعید یا در آب دهان حل کرد .

Aluminium Hydroxide Gel	ژل هیدروکسید آلومینیم
Adeflor Chewable	فلوئورور سدیم + ویتامین‌ها
Bucladin-S Softab	کلریدرات بوکلیزین
Erythromycin Chewable	ارتیرومایسین
Kinesed	الکالوئیدهای بلادون + فنوباربیتال
Magnesium Hydroxide Gel	ژل هیدروکسید منیزیم
Papase	آنزیم پروتئولیتیک حاصل از کاریکاپاپایا
Pediamycin Chewable	اریترومایسین اتیل سوکسینات
Orexin Softab	ویتامین‌های گروه B
Silain Gel	سایمتیکون

جدول شمارهٔ ۲ ـ داروهائی‌که مدفوع یا ادرار را رنگین می‌کنند .

داروها بر حسب نام ژنریک تنظیم شده‌اند و نام تجارتی‌آنهادرداخل‌پرانتزآمده است .

دارو	رنگ ایجاد شده
Antacids, Aluminium Hydroxide Types	سفید رنگ یا لکه‌دار
Anthraquinones	زرد تا سبز
Antibiotics, Oral	سبز مایل به خاکستری
Anticoagulants, All	صورتی تا قرمز یا سیاه **
Bismuth Containing Preparations	سبز مایل به سیاه
Charcoal	سیاه
1, 8-Dihydroxyanthraquinone *	قهوه‌ای شدن مخاط رکتوم
Ferrous Salts	سیاه
Heparin	صورتی تا قرمز یا سیاه **
Indocyanine green	سبز
Indomethacin (Indocin)	سبز
Oxyphenbutazone (Oxilid* Tandearil*)	صورتی تا قرمز یا سیاه **
Phenazopyridine (Pyridium*)	نارنجی مایل به قرمز
Phenylbutazone (Azolid* Butazolidin*)	صورتی تا قرمز یا سیاه **
Pyrvinium (Povan*)	قرمز
Rifampin (Rifadin*, Rimactane*)	نارنجی مایل به قرمز
Salicylates, Especially Aspirin	صورتی تا قرمز یا سیاه **

* در بسیاری از داروهائی که حاوی دی اکتیل‌سدیم سولفو سوکسینات هستند یافت می‌شود .

** این رنگها ممکن است نشانه خونریزی روده‌ها باشد .

جدول شماره ۳ــ داروهائی که ادرار را رنگین می‌کنند.

دارو	رنگ ایجاد شده
Acetanilid	زرد یا قرمز
Aminopyrine	قرمز
Aminosalicylic Acid (Panisyl*)	بیرنگ شدن
Amitriptyline (Elavil*)	آبی مایل به سبز
Anthraquinones	زرد تا قرمز یا قهوه‌ای مایل به قرمز
Antipyrine	زرد تا قرمز
Azuresin (Diagnex Blue*)	آبی تا سبز
Chloroquine (Aralen*)	زردتا قهوه‌ای
Chlorzoxazone (Paraflex*)	نارنجی تا قرمز ارغوانی
Danthron (Dorbane*)	صورتی تا قرمز
Dantrolene (Dantrium*)	نارنجی تا قرمز
1, δ -Dihydroxypanthraqulnone*	صورتی‌تاقرمزیاقهوه‌ای‌مایل‌به‌قرمز
Emodin	صورتی‌تاقرمزیاقهوه‌ای‌مایل‌به‌قرمزدرادرارقلیائی
Ethoxazene (Serenium*)	نارنجی تا قرمز
Ferrous Salts	سیاه
Furazolidone (Furoxone*)	زرد تا قهوه‌ای
Indandiones	نارنجی در ادرار قلیائی
Indomethacin (Indocin*)	سبز
Iron Sorbitex (Jactoler*)	سیاه
Levodopa (Dopar*, Larodopa*)	در اثر ماندن سیاه‌رنگ میشود
Methocarbamol (Robaxin*)	در اثر ماندن سیاه‌رنگ میشود
Methyldopa (Aldomet*)	در اثر ماندن قرمز تا سیاهرنگ میشود
Methylene Blue	آبی مایل به سبز
Metronidazole (Flagyl*)	سیاه
Nitrorurantoin (Furadantin Macrodantin*)	زرد تا قهوه‌ای
Pamaquine (Plasmochin*)	زرد قهوه‌ای
Phenacetin	در اثر ماندن قهوه‌ای تیره تا سیاهرنگ میشود
Phenazopyridine (Pyridium	نارنجی تا قرمز
Phenolphthalein	صورتی تا قرمز در ادرار قلیائی
Phenosulfonphthalein (PSP)	صورتی تا قرمز در ادرار قلیائی
Phenothiazines	صورتی تا قرمز یا قهوه‌ای مایل به قرمز
Phensuximide (Milontin)	صورتی تا قرمز یا قهوه‌ای‌مایل‌به‌قرمز
Phenytoin (Dilantin*)	زرد تا قهوه‌ای
Primaquine	صورتی تا قرمز یا قهوه‌ای مایل به قرمز

رنگ ایجاد شده	دارو
زرد	Quinacrine (Atabrine)
قهوه‌ای تا سیاهرنگ	Quinine
سبز تیره	Resorcinol
زرد	Riboflavin
نارنجی مایل به قرمز روشن	Rifampin (Rifadin*, Rimactane*)
زرد مایل به نارنجی در ادرار قلیائی	Sulfasalazine (Azulifidine*)
زرد تا قهوه‌ای یا سیاهرنگ	Sultonamides, Antibacterial
آبی مایل به سبز	Tolonlum (Blutene)
فلوئورسانس آبی کمرنگ	Triamterene (Dyronium)
نارنجی	Warfarin (Coumadin)

* در بسیاری از داروهائی که حاوی دی اکتیل سدیم سولفوسوکسینات‌هستند یافت می‌شود.

جدول شماره ۴

برخی خوردنی‌های اسیدی که ممکن است ادرار را اسیدی کنند.					
نان	پنیر	تخم‌مرغ	رشته	کلوچه	آجیل
کیک	ذرت	حبوبات	عدس	آلو	

جدول شماره ۵

برخی خوردنی‌های بازی که ممکن است ادرار را قلیائی کنند.	
بادام	شیر و فرآورده‌های ساخته شده از شیر
فندق	میوه‌ها (بجز آلو)
نارگیل	سبزیها (بجز عدس)

جدول شماره ۶

برخی داروهائی که از آنها میتوان برای قلیائی‌کردن ادرار استفاده کرد .

Polycitra Syrup	(۱ گرم خوراکی)	(چهاربار در روز
Potassium acetate	(۱ گرم خوراکی)	(سه بار در روز
Potassium citrate		
Sodium acetate	(۱/۵ گرم خوراکی)	(چهاربار در روز
Sodium bicarbonate	(۱ گرم خوراکی)	(چهاربار در روز
Sodium citrate	(۱ گرم خوراکی)	(چهاربار در روز

جدول شماره ۷

برخی داروهائی که ممکن است سبب بیرنگ کردن مو و یا پوست و یا رنگین کردن الیاف شوند .

Anthra-derm ____ آنترالین
Aralen ____ فسفات کلروکین
Azulifidine ____ سولفا سالازین
Benoxyl ____ بنزوئیل پراکساید
Betadine ____ پلی وینیل پیرولیدین آیوداید
Camoquin ____ آمودیاکین
Eldopaque Forte ____ هیدروکینون
Eldoquin ____ هیدروکینون
Fungizone ____ هیدروکینون
Gentian Violet ____ آمفوتریسین ب
Iodine tincture ____ ویوله دوژانسیان
Iodocort (HC) ____ تنطورید
Loroxide (HC) ____ کلر هیدروکسی کینولئین + بنزوئیل پراکساید + هیدروکورتیزون
Mercurochrome. ____ مرکورکرم
Merthiolate tincture ____ تی مروسال
Oxy-5, 10 (HC) ____ بنزوئیل پراکساید
Pabanol ____ اسید پارا آمینو بنزوئیک

Persadox	بنزوئیل پراکساید
PanOxyl-5, 10	بنزوئیل پراکساید
Potassium Permanganate	پرمنگنات پتاسیم
Povan	پیروینیوم پاموآت
Povidone-Iodine	پلی وینیل پیرولیدون آیوداید
Sebizon	سولفاستامید سدیم
Selsun	سولفات سلنیم
Vanoxide (HC)	بنزوئیل پراکساید + کلرهیدروکسی کینولین
Vioform (HC)	کورتیزون + ید و کلرو هیدروکسی کین
Vytone	دی ید و هیدروکسی کین + هیدروکوتیزون
Zetar Emulsion, Shampoo	قطران زغال

جدول شماره ۸

برخی داروهائی که ممکن است سبب بروز حساسیت به نور شود *

Achromycin – V	اکرومایسین
Akrinol	آمیناکرین هگزیل رزورسینات
Aldactazide	اکری سورسین
Aldactone	اسپیرونولاکتون
Aldomet	متیل دوپا
Anticonvulsants	داروهای ضد تشنج
Aldoril	متیل دوپا + هیدروکلرو تیازید
Antihistamines	آنتی هیستامین‌ها
Antimalarials	ضد مالاریاها
Arsenicals	داروهای آرسینکی
Aurecomycin	کلر تترا سیکلین
Aventyl	کلریدرات نورتریپتیلین
Azolid	فنیل بوتازون
Azotrex	تترا سیکلین فسفات + سولفا متیزول + فنازوپیریدین
Bactrim	کوتریموکسازول
Barbiturates	باربیتورات‌ها
Benadryl	دیفن هیدرامین
Bleph-10, 30	سولفاستامید
Butazolidin	فنیل بوتازون

Compazine ______ پروکلر پرازین
Dantrium ______ دانترولن سدیم
Dartal ______ تیوپروپازاد
Declomycin ______ کلریدرات دمکلو سیکلین
Diabinese ______ کلر پروپامید
Diethylstillbestrol ______ دی اتیل استیل بسترول
Dilantin ______ دی فنیل هیدانتوئین سدیم
Diupres ______ رزرپین + کلروتیازید
Diuril ______ کلروتیازید
Dymelor ______ استو هگزامید
Efudex ______ فلورو اوراسیل
Enduron ______ متیل کلر تیازید
Esidrix ______ هیدرو کلرتیازید
Fluorouracil ______ فلورواوراسیل
Fulvicin ______ گریزوفولوین
Gantanol ______ سولفامتوکسازول
Gantrisin ______ سولفی‌سوکسازول دیالامین
Gold salts ______ املاح طلا
Grifulvin ______ گریزوفولوین
Grisactin ______ گریزوفولوین
Griseofulvin ______ گریزوفولوین
Hexachlorophene ______ هگزا کلروفن
Hydrodiuril ______ هیدرو کلروتیازید
Hydromox ______ کوئین تازون
Imipramine ______ ایمی پیرامین
Isoto-cetamide ______ سولفاستامید
Levoprome ______ متوتری میرازین
Librium ______ کلردیازپوکسازید
Metahydrin ______ تری کلرمتیازید
Minocin ______ ماینوسیکلین
Naturetin ______ بندروفلومتیازید
Naqua ______ تری کلر متیازید
NegGram ______ اسید نالیدیکسیک
Norpramin ______ دزیپرامین
Oral contraceptives ______ ضد آبستنی‌های خوراکی
Orinase ______ تولبوتامید
Panmycin ______ تتراسیکلین
Pertofrane ______ دزیپرامین
Phenergan ______ پرومتازین
Phenothiazines ______ فنوتیازین‌ها
Polythiazide ______ پلی تیازید

Povan	پیروینیوم پاموآت
Presamine	ایمی پرامین
Procaine anesthetics	بیحس کننده‌های پروکائینی
Promethazine	پرومتازین
Quinine	کینین
Renese	پلی تیازید
Ronodomycin	متاسیکلین
Septra	کوتریموکسازول
Silver salts	املاح نقره
Sulfacetamide	سولفاستامید
Sulfonamides	سولفامیدها
Sulfonylureas	سولفونیل اوره‌ها
Sparine	پرومازین
Sulamyd	ان استیل سولفا نیلامید
Sumycin	تتراسیکلین
Tegretol	کاربامازین
Temaril	تری میپرازین
Terramycin	اکسی تتراسیکلین
Tetracycline	تتراسیکلین
Tetracyn	تتراسیکلین
Tetrex	فسفات تتراسیکلین
Thorazine	کلرپرومازین
Tofranil	ایمی پرامین
Tolinase	تولازامید
Trilafon	پرفنازین
Urobiotic	اکسی تتراسیکلین + سولفامتیزول + فنازوپیریدین
Vectrin	مینوسیکلین
Vesprin	هتا سیلین
Vibramycin	داکسی سیلین
Vivactil	پروتریپتیلین
Zeter emulsion	قطران زغال پاراکلرومتاسینلول

* این واکنش‌ها ممکن است به صورت تغییرات حاد یا مزمن درقسمتهائی از پوست که مجاورنور قرارگرفته‌اند بروزکنند. این تغییرات ممکن‌است از یک آفتاب‌سوختگی شدید یا خیز، اگزمای پوسته پوسته‌ای، بثورات، ماکوپاپولاروکهیر متغیر باشد.

جدول شماره ۹

برخی خوراکی‌های غنی از پتاسیم*(درهر ۱۰۰ گرم ۵۰۰ میلی‌گرم یا بیشتر پتاسیم وجود دارد)

گوشت	غذاهای دریائی	آب میوه	سبزیها
گوشت گاو	تمام انواع ماهیها	آب پرتقال	لوبیا
جوجه	ساردین	آب آناناس	باقلا
جگر		آب آلو	چغندر
گوشت گوساله		آب نارنگی	سیر
		آب گوجه‌فرنگی	ترب
			عدس
			قارچ
لبنیات	**میوه‌ها**	**خشکبار**	پیاز خشک
			جعفری
شیر	زردآلوی خشک‌شده	بادام	نخود سبزخشک
شیرخشک	موز	شاه‌بلوط خشک	سیب‌زمینی سرخ‌کرده
شیربدون‌چربی	خرمای خشک	نارگیل خشک	لوبیای سویا
	انجیر خشک	فندق	رب گوجه‌فرنگی
	هلو خشک	بادام‌زمینی برشته	
	آلو	پسته	
	کشمش		

* ــ بیمارانی که مدت زیادی تحت درمان با داروها، بویژه تیازیدها، هستند ممکن است برای پیشگیری یا درمان هیپوکالمی به پتاسیم نیاز پیدا کنند. اگرچه استفاده از پتاسیم در سالهای اخیر گسترش زیادی یافته است، مکمل‌های غذائی حاوی پتاسیم نیز مفید بوده و شاید برای بعضی بیماران قابل قبول‌تر باشد.
فهرست خوراکیهای حاوی مقدار زیاد پتاسیم بسیار طولانی است، فهرست فوق یک فهرست مختصر است وگرنه خوراکیهای بسیار دیگری نیز حاوی‌پتاسیم هستند

جدول شماره ۱۰

برخی خوراکیهای غنی از سدیم* درهر ۱۰۰ گرم ۳۰۰ میلیگرم یا بیشتر سدیم وجود دارد.

گوشت	سبزیها	غذاهای دریائی	لبنیات
کنسرو گوشت	کنسرو مارچوبه	خاویار	دوغ
سوسیس	کنسرو لوبیا	قزل‌آلا	پنیر
	زیتون سبز	تون ماهی	مایونز
	ترشیها	ساردین	
	پوره سیب‌زمینی		
	رب گوجه‌فرنگی		
	سس گوجه‌فرنگی		

نان و بیسکویت
کراکر نمکی
انواع مختلف کورن فلکس

* بسیاری از بیماران مبتلابه‌نارسائی‌های‌احتقانی‌قلبی و سایر بیماریهای قلبی، عروقی ممکن است یک رژیم غذائی حاوی مقدار کمی سدیم داشته باشند تعداد غذاهای حاوی مقدار زیادی سدیم زیاد است. فهرست فوق یک فهرست مختصر است.

جدول شماره ۱۱
پایداری مخلوطهای مختلف انسولین

مخلوط	نسبت	پایداری
Neutral Regular NPH	بهر نسبتی میتوان مخلوط کرد .	۲ تا ۳ ماه پیش ازتزریق میتوان مخلوط کرد .
Acid Regular NPH	بهر نسبتی میتوان مخلوط کرد	فقط پیش از مصرف مخلوط کنید
Netural Regular Lente	بهر نسبتی میتوان مخلوط کرد	۲ – ۳ ماه پیش از تزریق میتوان مخلوط کرد .
Acid Regular Lente	بیش از ۱ : ۱ مخلوط نکنید	فقط پیش از تزریق مخلوط کنید
Lentes	بهر نسبتی میتوان مخلوط مخلوط کرد	بمدت نامحدود پایداراست میتوان پیشاپیش مخلوط کرد
Neutral or Acid Regular: PZI	1:1 = PZI 2:1 = NPH 3:1 = NPH+Reg	فقط پیش از تزریق مخلوط کنید .

اگر فراورده‌های انسولین مخلوط شوند :

۱ ــ باید از روش توصیه‌شده برای مخلوط‌کردن آن‌ها پیروی کرد .

۲ ــ نوع ساخت و مدل سرنگ و سوزن انسولین را نباید تغییر داد .

معکوس کردن ترتیب اختلاط انسولینها نسبت آنها را تغییر خواهد داد زیرا بعلت انسولین موجود در محفظه سرنگ یا محفظه انتهای سوزن یا مجرای آن سبب بروز خطای ناشی از دوز انسولین میشود . اگر مقدار انسولین برای بیمار تثبیت شود ، اختلاف مقدار انسولین میتواند نتایج خطرناکی ببار آورد .

علاوه برآن اگر بیمار به انسولین خوک یا گاو عادت کرده باشد توصیه میشود که بدون دلیل نوع انسولین را تغییر ندهید زیرا انواع انسولین‌ها ازلحاظ آنتی‌ــ ژنی‌سیته تفاوت میکنند و برحسب واحد دوز نمیتوان آنها را بجای همدیگر تجویز کرد . هنگامیکه مخلوطی از انسولین PZI و انسولین معمولی مصرف میکنید ابتداء باید انسولین معمولی را ازویال بیرون‌آورید بطوریکه ویال معمولی با انسولین پروتامین زینک (PZI) آلوده نشود .

جدول شماره ۱۲

داروهای پائین‌آورنده قند خون

۱ – فراورده‌های حاوی انسولین 1,2

نام ژنریک	منبع	نام تجارتی	آغاز اثر (برحسب ساعت)	طول اثر (برحسب ساعت)
Regular[3]	Beef, Pork	Iletin (Lilly)	درظرف یکساعت	5-7
Semilente Zinc	Beef	Semilente Iletin (Lilly)	درظرف یکساعت	12-16
Globin Zinc[3]	Beef	Globin Insulin with Zinc (Squibb)	1-2	18-24
Isophane (NPH)	Beef, Pork	NPH Iletin (Lilly) NPH Insulin (Squibb)	2	24-28
Lente	Beef, Pork	Lente Iletin (Lilly) Lente Insulin (Squibb)	2-4	24-28
Protamine Zinc	Beef, Pork	Protamine Zinc Iletin (Lilly) Protamine Zinc Insulin (Squibb)	4-6	36
Extended Insulin Zinc	Beef	Ultra Lente Iletin (Lilly) Ultra Lente Insulin (Squibb)	4-6	36

۲– فرآورده‌های خوراکی

نام تجارتی	نام ژنریک		سازنده	طول اثر (برحسب ساعت)
Dymelor	Acetohexamide	(sulfonylurea)	Lilly	12-24
Diabinese	Chloropropamide	(sulfonylurea)	Pfizer	24
Tolinase	Tolazamide	(sulfonylurea)	Upjohn	10-14
Orinase	Tolbutamide	(sulfonylurea)	Upjohn	6-12
Meltrol	Phenoformin	(biguanide)	USV	4-6
DBI	Phenoformin	(biguanide)	Geigy	4-6
DBI-TD[4]	Phenoformin	(biguanide)	Geigy	8-14
Meltrol-50, 100[4]	Phenoformin	(biguanide)	USV	8-14

۱ – انسولین برحسب نوع مصرف بطریق زیرپوستی یا داخل عضلانی توسط بیمار مصرف میشود .

۲ – اگر تاریخ گذشته است آنرا مصرف نکنید

۳ – پیش از مصرف آنرا تکان ندهید ، زیرا یک محلول واقعی است و سوسپانسیون نیست . اگر محلول تیره یابد رنگ است آنرا بدور بریزید

۴ – برحسب زمان آزاد میشود .

اصطلاحات واشکال داروئی (۱۸)

فرآورده‌های داروئی از دوران قدیم تاکنون باشکال مختلف مورد استفاده قرار گرفته است . از ابتدای پیدایش علوم داروئی استفاده از اندامهای مختلف گیاهان، عصاره کشی وتهیه پمادها و ضمادهای مختلف متداول گشت و باپیشرفت این دانش اشکال تازه‌تری از فرآورده‌های داروئی عرضه‌شد . باوجوداین‌هنوز گاه‌وبیگاه از اشکال قدیمی نیز استفاده میشود . در زیـــر اصطلاحات و تعاریف رایج در این زمینه را می‌خوانیم .

Application	فرآورده برای استعمال خارجی
Auristilla	فرآورده برای استعمال در داخل گوش
Bacillula	قرص مکیدنی استوانه‌ای شکل
Bacillum	یک نوع بوژی (رجوع کنید به Bougie)
Bolus	یک نوع قرص بزرگ (بوزن بیش از ۵ گرم)
Bougie	شمع ، ابزار یا داروئی برای قرار دادن در پیشابراه یا سایر حفرات بدن
Buginarium	یک نوع بوژی مخصوص بینی
Cerates	سراها ، موادروغنی و چرب حاوی مواد داروئی که دارای‌موم هستند
Chrisma	یک نوع پماد
Clyster	تنقیه

Collunarium	محاولی برای شستشوی بینی (بینی شویه)
Collutorium	دهان شویه
Collyrium	چشم شویه
Confection	شیرینی داروئی ، معجون شیرین ، مجموعه‌ای از مواد شیرین (شربت قند و عسل) و دارو رجوع کنید به Electuarium, Conserve
Conserve	معجون شیرینی که از داروهای تازه تهیه شده باشد
Cordial	فرآورده داروئی الکل‌دار و شیرین
Cremor	کرم
Curatio	پانسمان
Decoction	فرآورده مایعی که از جوشاندن گیاهان با آب بدست می‌آید
Dental Liniments	فرآورده داروئی که بعلت داشتن خواص‌محرک وبی‌حس‌کننده موضعی به لثه‌ها مالیده میشود .
Effervescent salts	نمکهای جوشان ، گردو یا گرانولی که از یک مواد داروئی ، اسیدتارتریک ، اسیدسیتریک و بیکربناتها درست شدداست .
Electuarium	فرآورده‌های خمیری شکل که از مخلوط کردن مواد داروئی خشک با شربت یا عسل تهیه میشود .
Embrocation	مرهم رقیق ، لینیمان ، فرآورده مایع و روغنی شکل برای مالیدن برسطح بدن
Enema	تنقیه
Escharotic	فرآورده سوزآور
Essence	اسانس
Foment	فرآورده مایعی که آنرا در حالیکه گرم است بر روی یک تکه پارچه پشمی می‌گذارند و بر موضع می‌مالند .
Fotus	رجوع کنید به Foment
Fluidglycerates	مایعی‌است شبیه عصاره‌های مائی امافقط ۵۰ درصدگلیسیرین دارد و دارای الکل نیست .
Gelatin	فرآورده نیمه جامد که مصارف داخلی یا خارجی دارد و از هیدرولیز بافت‌های کلاژن بدست می‌آید .

Glycerinum	گلیسریت ، محلول یا مخلوط مواد داروئی در گلیسیرین
Granula	نمک گرانول شده و جوشان
Granule	دانه‌ها و گلوله‌های شکر که به ماده داروئی آغشته شده است
Gutta	قطره
Haustus	جرعه ، مقدار مایع داروئی که یک باره بلعیده میشود
Infused Oils	محلول‌های روغنی حاوی ترکیبات محلول گیاهی
Infusion	دم کرده ، مطبوخ ، جریان استخراج مواد داروئی یک گیاه توسط آب سرد یا گرم بدون جوشاندن آن
Insufflation	انفیه
Inunction	روغن‌مالی ، مالیدن ماده‌ای چرب به پوست برای جذب آن
Irrigation	محلولی که برای شستشوی یک ناحیه بکار میرود
Lamel, Lamella	یک صفحه (دیسک) گلیسروژلاتین حاوی ماده داروئی که در زیر پلک قرار میدهند .
Laviation	دهان‌شویه
Ligamentum	بانداژ
Linctus	مایع شیرین و غلیظی که آنرا به‌آهستگی نوشیده یا می‌مکند
Litus	فرآورده مایعی که بوسیله بروس آنرا بر موضع می‌مالند
Lohoch	رجوع کنید به Linctus
Masses	خمیری که شامل ماده موثره داروئی ، حلال واکسیپیان است و سپس تبدیل به قرص میشود
Medicated pencil	مواد داروئی ، خمیر حاوی ماده داروئی (mass) که بصورت استوانه درآمده است و برای مالیدن ماده داروئی برروی پوست بکار میرود .
Moxa	فتیله ، ماده نرم و آتشگیری که آنرا روی پوست می‌سوزانند
Oculentum	پماد چشمی
Oleate	فرآورده مایع یا نیمه جامد که از ترکیب آلکالوئیدها ، هیدروکسیدها یا اکسیدهای بازی با اسید اولئیک تهیه میشود
Oleum Infusion	محلول‌های روغنی تهیه شده از اجزاء گیاهی

Orbicule	گلوله شکر
Oxymel	عسل ترش، عسلی که بوسیله جوهر سرکه اسیدیفیه شده ودر ترکیب شربت‌های سرفه وارد میشود
Parvule	قرص کوچک دارای روکش قندی
Pastille	یک نوع قرص مکیدنی و نیز یک توده معطر سوزاندنی که‌برای دود دادن بکار میرود.
Pessum or Pessarium	شیاف مهبلی حاوی ماده داروئی
Pigmentum	پیگمان، رنگدانه
Pilula Entrica	قرص مخصوص بازشدن در روده
Pomatum	چربی که از مواد خوشبو اشباع شده است
Potus or Potion	جرعه، مقدار داروئی که یکباره بلعیده میشود
Sinapismus	مشمع حاوی اسانس خردل
Solvella	قرص محلول در آب برای استعمال خارجی
Species	اسپس، دم‌کرده گیاهی
Stili Medicamentorum	رجوع کنید به Medicated pencils
Stilus Dissolubilis	مواد داروئی که حاوی یک ماده سوزاننده یا قابض است
Stilus unguentis	مواد داروئی که خنک کننده، ضدعفونی کننده وقابض است
Stupe	پانسمان مرطوب گرم و ضد تحریک، پارچه یا اسفنجی که‌پس از آغشته شدن با آب گرم و فشرده شدن خشک شده وباماده ضدتحریک آغشته میگردد
Tea	رجوع کنید به Species
Vapor	بخار ساده یا حاوی ماده داروئی
Vapor Siccus	ماده داروئی خشک برای استنشاق
Vinegar	محلول اسید استیک رقیق حاوی ماده موثره داروئی
Vinum	رجوع کنید به Wine
Wine	فرآورده‌های شبیه تنتور که در آن از شراب بعنوان حلال استفاده شده است.

(۱۳و۱۸)

اشکال تجارتی داروها

این مقاله راهنمای نام‌های اشکال مختلف تجارتی داروها است که دکتر چارلز وینک Charles Winck فراهم آورده است. این اشکال داروئی بنحوی فرموله شده‌اند که جذب یا دفع دارو را تغییر داده زیاد یا کم میکنند. این نوع فرمولاسیون فواید متعددی برای بیمار دارد، از جمله جلوگیری از اختلال در خواب (بخاطر خوردن دارو در ساعتی معین)، بیدار شدن مجدد بیمار برای مصرف دارو و یا فراموش‌کردن مصرف دارو بعلت تعداد دفعات زیاد آن.

در متن به اصطلاحات مختلفی برخورد میکنیم که هر کدام نشانهٔ اثر دارو در یک شکل داروئی معین است مانند:

Long acting, prolonged action, timed release, Sustained release

که همگی نشانه طول اثر دارو هستند. بنابراین همه این اصطلاحات را میتوانیم به سه گروه زیر تقسیم کنیم.

۱ ــ شکل داروئی که مادهٔ موثرهٔ آن بطور مداوم آزاد میشود.

Sustained Release

داروئی است که پس از مصرف به غلظت لازم برای بروز اثر فارما کولوژیک معین در بدن میرسد. غلظت آن در وهله اول (در چند ساعت معین) بیش از یک دوز واحد و معمولی داروئی است. برای داشتن یک غلظت معین باید فرمولاسیون و عوامل فیزیولوژیکی بنحوی باشد که جذب دارو به میزان پیوسته و ثابتی باشد و این میزان برابر است با شدت دفع دارو پس از جذب آن در بدن. (منحنی


زیر را ببینید) .

۲– شکل داروئی که اثرش طولانی است Prolonged action

فرآورده‌ای است که در همان وهله اول غلظتش به مقدار لازم برای بروز اثر درمانی معین میرسد و یا غلظت آن بحدی است که فراتر از غلظت خطرناک دارو نمیرود و بنحوی تهیه شده است که زمان فعالیت دارو افزایش یافته است. همچنانکه با مقایسه فعالیت یک دوز واحد دارو در منحنی‌های زیر دیده میشود. (منحنی را ببینید) .

۳– شکل داروئی که اثرش مکرر است. Repeat action

فرآورده‌ای است که هر بار یک دوز واحد دارو را آزاد میکند و بنحوی فرموله شده است که پس از یک مدت مشخص یک دوز دیگر دارو را آزاد میسازد. (منحنی زیر را ببینید) .



«رابطهٔ بین فعالیت دارو و زمان آن در خون»

در طی چند دههٔ اخیر، صنایع داروسازی فرآورده‌های داروئی متنوع و مختلفی عرضه کرده‌اند که هر کدام خصوصیت و شکل تجارتی ویژه‌ای دارند. برخی دارای اثر طولانی برخی برای کودکان و برخی دیگر برای جذب در محل مخصوصی از بدن تهیه شده‌اند. بدینترتیب هر کارخانه‌ای نام مخصوصی را برای فرآوردهٔ خود انتخاب کرده است. در زیر فهرست این اشکال داروئی با شرح مختصر آنها را ملاحظه میکنید. نام کارخانه سازنده در داخل پرانتز آمده است.

Abboject (ABBOTT) سرنگهای تزریقی یکبار مصرف

Abbo - Litter (Abbott) یک نوع ظرف مخصوص برای محلولهای استریل

Abbo-Vac (Abbott) یک نوع ظرف حاوی محلول و بدون هوا برای نمونه‌برداری از خون

Aerohale (Abbott) وسیله‌ای جهت آئروسل کردن پودرها برای قسمت‌های فوقانی دستگاه تنفس و ششها. این دستگاه حاوی یک قسمت تخلیه کننده است که ثابت بوده و قسمتهائی که با بینی و دهان در تماس‌اند قابل تعویض هستند.

Aerotrol (Abbott) وسیله‌ای که با آن مقدار کنترل شده‌ای از دارو را میتوان به داخل دهان اسپری کرد.

Aspirol (Lilly) محفظهٔ اسپری شیشه‌ای، نازک، شکننده، دارای پوشش پارچه‌ای.

Bitab (Merrell-National) قرصهائی با دو قدرت اثر متفاوت.

Bucalet (Ciba) قرصهای لوبیائی شکل که بشکل زیرزبانی یا داخل دهان مصرف میشوند.

Caplet (Wintrop) قرصهای دراز و بدون پوشش

Capsulette (Armur) قرصهای کپسولی شکل

Catrid (Lilly) کارپول‌هائی که دارای یک دوز داروئی برای تزریق است

Centri-Vac (Baxter) محفظهٔ استریل غیرپیروژن که بوسیلهٔ خلاء برای نمونه‌گیری خون و یا تهیه سرم و پلاسما با سانتریفوژ بکارمیرود.

Cherro - Chew Tab (Philips Roxane) قرصهای جویدنی خوش طعم

Chewable (Squibb) قرصهای نرم و محلول

Chronosule (Shering) کپسولهائی که بطور مداوم مادهٔ موٴثرهٔ خود را آزاد میکنند

Chronotab (Shering) قرصهائی که بطور مداوم مادهٔ موٴثرهٔ خود را آزاد میکنند

Clipsule (Lederlie) کپسول ژلاتینی جویدنی که به راحتی برای خردسالان قابل مصرف است

Color-break ampule (Astra) آمپولهائی که محل شکستن آنها با خط رنگینی مشخص شده است.

Compak (Searle)	کیف حاوی قرص‌های ضد حاملگی با جدول مصرف .
Dialpak (Ortho)	محفظه‌های پلاستیکی حاوی قرص همراه با جدول مصرف .
Disket (Lilly)	قرصهائی که روی آنها حروف و اعداد چاپ شده است .
Dispensa Jar (Dow)	محفظه‌های پلاستیکی مخصوصی که حاوی صفحه‌ای است که مقادیر کمی کرم یا پماد را از آن خارج میکند .
Dospak (upjohn)	بسته‌های حاوی یک دوز واحد داروئی که باید طبق جدول مصرف شوند .
Dospan (Marrell-National)	قرصهائی که ماده‌ٔ موٴثره‌ٔ خود را بطور مداوم آزاد میکنند
Dosule (Organon)	لوله حاوی پمادی که دارای مقدار مشخصی از هورمون است
Dri-Cap (Lederle)	کپسولهائی که در شرایط خشک پر شده‌اند
Dropprette(Cooper)	لوله‌های یکبار مصرف استریل ، حاوی محلولهای استریل که مخصوص‌شرایط‌آسپتیک برای‌جراحیهای‌چشمی ساخته‌شده‌اند
Drop-Tainer(Alcon)	محفظه‌های محلولهای چشمی که سر آنها بصورت قطره چکان است .
Duchette (Purdue Frederick)	بسته‌بندی مخصوص پودرهائی که بصورت پاشیدنی از آن استفاده میشود .
Dulcet (Abbott)	قرصهای مکعبی شکل ، محلول و شیرین
Durabond (Mallinckrodt)	داروهائی با اثر طولانی که عموما " از املاح تاناتها هستند
Duratab (Cooper)	قرص با اثر مداوم
Emplet(Park- (Park-Davis)	قرصی که در روده باز میشود ، همراه با روکش مخصوص سرخ رنگ
Encoat (Merrell - National)	قرص روکش‌داری که در روده باز میشود .
Enduret (Geigy)	قرص با اثر طولانی
Enkeric (Rorer)	یکنوع تجارتی قرص روده‌ای
Enseal(Lilly)	یک نوع قرص روده‌ای که طبق زمان معینی قسمت به‌قسمت در روده باز میشود .
Enterab (Abbott)	قرص روکش‌دار روده‌ای

Envale(Glenwood)	بسته داروی خالص که بدور از آلودگی ، رطوبت ، و نور بسته بندی شده
Extentab (Robins)	قرص با اثر مداوم
Filmtab (Abbott)	قرص دارای روکش نازک برای بازشدن سریع در روده
Flexidose (Squibb)	قطره‌چکان مدرج که حجم مشخصی را بیرون میدهد
Flo-Pak (Burroughs Wellcome)	پودرخشک ، استریل در بطریهای پلاستیکی نرم که میتوانـد به شیوهٔ خاصی داخل محلولهای تزریقی داخل وریدی‌شود
Fluor-I-strip (Ayerst)	قطره‌چکان استریل انفرادی
Gelseal (Lilly)	کپسول ژلاتینی سربسته
Glosset (Winthrop)	قرص زیرزبانی
Gradumet (Abbott)	قرصی با اثر طولانی
Granucap (tutag)	کپسول با اثر مداوم
Hafgram (Warner-Chilcott)	قرص نیم‌گرمی روکش‌دار
Hafs(Breon)	قرصهائی که استحکام آنها نصف استحکام قرص‌معمولی‌است
Hypoglossal (Carnrick)	کپسول زیرزبانی یا دهانی
Hyploid (Burroughs Wellcome)	یک نام تجارتی برای محلولهای تزریقی
Immunogen (Park-Davis)	نام تجارتی یک آنتی‌ژن مخصوص که از سطح بدنهٔ باکتریها بدست میآید (بنام اکتوانتی‌ژن) این انتی‌ژن اساسا" عاری از پروتئین‌های خارجی‌باکتری و مواد تجزیه‌شده‌باکتری‌است
Infatab (Park-Davis)	قرصهای مثلثی شکل ، شیاردار ، خوش‌طعم برای استفادهٔ کودکان .
Inlag-tab (Dorsey)	قرصهای دوکی‌شکل (شبیه کپسول) و مسطح ، دارای دو نوع مادهٔ موءثرهٔ داروئی که یکی از آنها درلایه‌ای درون‌دیگری قرار دارد و هرلایه دارای یک رنگ است .
Ion-O-trate(Abbott)	و یالهای حاوی محلولهای غلیظ برای اضافه کردن به درون محلولهای Abbo-Liter
Isoject (Pfizer)	سیستم تزریقی یکبارمصرف که قبلا" از محلول پرشده است

Jetomizer (Wyeth)	وسیلهٔ راحت و موثری جهت چکاندن دارو در قسمتهای بالائی بینی
Juvelet (Dorsey)	قرصهای مخصوص کودکان که مادهٔ موثرهٔ آن بر طبق زمان مشخصی آزاد میگردد. و دارای روکش بدون طعمی است
Kapseal(Park-Davis)	کپسول سخت که دو قسمت آن بوسیلهٔ یک نوع نوارمخصوص از ژلاتین بیکدیگر متصل شده‌اند.
Kof-ball (Philips Roxane)	کپسول ژلاتینی و جویدنی که مادهٔ موثرهٔ درون آن بشکل محلول است.
Lacrivial (Copper)	ظرف پلاستیکی استریل حاوی محلولهای چشمی همراه با قطره‌چکان
Linguet (Ciba)	قرصی است که از راه بافتهای مخاطی جذب میشود.
Lingusorb (Ayerst)	قرصهای دهانی و زیرزبانی
Liquiflm(Allergan)	قطره چشمی ، همراه یک حامل پلیمر که یک ورقهٔ لاستیکی بر روی پلکها وحاشیه‌پلکها تشکیل میدهد. این ورقه باعث‌آزاد شدن دارو در طی یک مدت طولانی میشود.
Lontab (Ciba)	قرص با اثر طولانی
Lozi-tab (Davies Rose Hoyt)	قرص مکیدنی
Loz-tablet (Warren-teed)	قرصی که ۵ دقیقه قبل از بلع در دهان حل‌میشود.
Lyovac (Merck Sharp & Dohme)	فرآورده‌های داروئی‌که درخلاء خشک شده بصورت لیوفیلیزه درآمده است و در موقع مصرف با حلال همراه خود مخلوط شده و به حجم اولیه خود میرسد.
Mendet (lederlie)	قرص جویدنی خوش‌طعم
Medihaler (Ricker)	یک نوع ائروسل
Medilet (Schering)	قرصهای خال‌دار مخصوص بچه‌ها
Medule (Upjohn)	قرص با روکشی مخصوص که اثر آنرا طولانی میسازد
Melet (Dow)	قرص جویدنی مدور یا کشیده
Membrette (Wyeth)	قرص محلول برای مصرف هورمونهای خوراکی از طریق‌دهان

Memorette (Syntex)	نوعی بسته‌بندی قرص باصفحات‌تقویم‌دارکه دارای دریچه‌ای جهت قرص است
Merseal (Merck Sharp & Dohme	قرص‌های دارای یک لایه‌ٔ روکش
Oret (Smith Miller & Path)	قرص فشرده
Ovoid (Winthrop)	قرص بیضی‌شکل با روکش قندی
Pakket (Mead Johnson)	کیف حاوی مادهٔ داروئی همراه با جدول مقدار دارو
Peditab (Philips Roxane)	یک نوع قرص فشرده خوش‌طعم
Pilpak (Wyeth)	کیسهٔ‌حاوی مادهٔ‌داروئی همراه با جدول مقدار مصرف‌داروی روزانه
Plasma-Vac (Baxter)	کیسه‌های استریل ،آپیروژن باخلاء ،برای گرفتن ،دخیره‌کردن و ارائه خون ، پلاسما ، سرم از کیسه‌ها و ظروف دیگر.
Plastule (Ives)	قرص فشرده
Plateau cap (Marion)	کپسول با اثر مداوم
Pilapak (Abbott)	کیسهٔ پلاستیکی ، یکبارمصرف برای ذخیرهٔ‌خون
Pressule (Squibb)	یک دوز انفرادی دارو در یک محفظه پلاستیکی فشردنی
Pressure Pak (Abbott)	یک محفظهٔ آئروسل
Prestab (McNeil)	قرص با اثر طولانی
Pulvo-Cap (Dow)	کپسولی که در شرایط خشک تهیه شده است
Pulvule (Lilly)	کپسول شبیه گلوله از جنس ژلاتین سخت که حاوی مادهٔ داروئی است
Purogenated (Lederie)	یک فرآوردهٔ بیولوژیکی که با روشهای فیزیکی و شیمیائی خالص شده است
Radiocap (Abbott)	کپسول حاوی یک ایزوتوپ رادیواکتیو
Rectisert (Ayerst)	اپلیکاتور مقعدی با یک دوز واحد داروئی
Repetab (Schering	قرص با اثر مکرر
Respihaler (Merck Sharp & Dohme)	ائروسل برای استنشاق از راه دهان
Saftiflask (Cutter)	فلاسک نگهداری و تجویز محلولهای تزریقی داخل‌وریدی

Saftifuge (Cutter)	فلاسک کاملا " دربسته ، حاوی خلاء برای گرفتن خون و تهیه پلاسما از آن بوسیلهٔ سانتریفوژ .
Saftivac (Cutter)	فلاسک سربسته حاوی خلاء برای گرفتن خون تام
Savoret (Lilly)	قرص خوش‌طعم حاوی مادهٔ داروئی
Secule (Ayerst)	ویال دربسته حاوی مادهٔ تزریقی بصورت خشک
Sequel (Lederle)	کپسول با اثر مداوم
Serobacterin (Merck Sharp & Dohme)	نام تجارتی یک نوع واکسن باکتریائی حساس شده (واکسن باکتریائی همراه با سرم ایمنی دهندهٔ آن)
Sheroid (Cooper)	قرص مخصوص ویتامین‌دار با روکش ژلاتینی
Sifter Cartridge (Abbott)	محفظه پلاستیکی ،کوچک و یکبارمصرف که حاوی دارو بشکل پودر خشک است و بوسیلهٔ آئروهالر مصرف میشود .
Singlet (Dow)	فرم داروئی که بطور مداوم مادهٔ داروئی آن آزاد میشود .
Sofcream (Merrell-National)	داروئی که بشکل کرم کف مانند است و از یک آئروسل خارج میشود .
Softab (Stuart)	قرص نرمی که در دهان حل میشود (به‌آب احتیاجی‌ندارد)
Solodose (Cooper)	پاکت با پودر داروئی
Soloid (Burroughs Wellcome)	نام تجارتی برای فرآورده‌های داروئی که بسرعت‌حل‌میشوند
Solvet (Lilly)	قرص محلول
Spansule (Lederlie)	کپسول حاوی مواد داروئی بصورت دانه‌های‌ریز و رنگینی که مادهٔ داروئی خود را بطور پیوسته آزاد میکند .
Spersoid (Lederlie)	پودر محلول و قابل انتشار
Sprayomizer (Ayerst)	اسپری فشردنی مخصوص گلو
Spraypak (Smith Kline & French)	محفظه پلاستیکی نرم که اسپری بر سر آن قرار دارد .
Steraject (Pfizer)	یک دوز واحد دارو در یک ظرف استریل که دارای یک سوزن آمادهٔ تزریق است .
Sterap (Lilly)	بستهٔ استریل حاوی دارو بشکل پودر برای مصرف موضعی
Sterllope (Abbott)	دوبسته‌توام استریل حاوی‌دارو بشکل‌پودر برای‌مصرف‌موضعی

Steri-tainer (Ophthalmos)	محفظهٔ حاوی محلولهای چشمی با قطره‌چکان که اتوکلاو شده است
Steri-Vial (Park-Davis)	ویال استریل – تزریقی
Sub-U-tab (Abbott)	قرص زیرزبانی
Supposicone (Searle)	شیاف که بعلت داشتن اکسیپیان مخصوص احتیاج به یخچال ندارد .
Suppositab (Dorsey)	قرصی با شکل خاص برای مصرف داخل مهبلی
Supprette (Webcon)	شیافی که حامل آن در آب حل میشود
Tabloid (Burroughs Wellcome)	نام تجارتی ثبت شده یک نوع قرص
Tabule (Mallinckrodt)	قرص دراز و کپسولی‌شکل
Tastitab (Roering)	قرص محلول و خوش‌طعم
Tembid (Ives)	قرصی که بعلت داشتن هسته مخصوص درون آن ، دارو بطور تدریجی و به مقدار مشخص در دستگاه آزاد میشود .
Tempule	یک شکل داروئی که بشکل قسمت به قسمت آزاد میشود .
Ten-tab (Merrell-National)	قرصی که مادهٔ داروئی را بطور مداوم آزاد میکند .
Testpac (Upjohn)	یک نوع اشانتیون قرص برای شروع مصرف دارو
Timecap (Kremers-Urban)	یک نوع کپسول که بطورمداوم ، مادهٔ داروئی را آزاد میسازد
Timespan (Roche)	قرصی که مادهٔ موثرهٔ خود را بطور مداوم آزاد میسازد
Timetab (Kremers-Urban)	قرصی که بنحوی ساخته شده است که مادهٔ موثرهٔ خود را برحسب زمان آزاد میسازد . اثردرمانی آن تا ۱۰ – ۱۲ ساعت ادامه میابد .
Titradose (Ives)	قرصهای شیاردار که براحتی به چندین قسمت تقسیم میشود
Trablet (Ames)	قرص ذوزنقه‌ای دارای روکش برای بازشدن در روده
Transfuso vac (Baxter)	ظرفهای حاوی خلاء آپیروژن ، استریل ، دارای مادهٔ ضد انعقادی برای گرفتن ، ذخیره‌کردن ، حمل و نقل و ارائهٔ خون و همچنین تهیه پلاسما .
Trinidex (Baxter)	محلولهای تزریقی در محفظه‌های واکولیتر که حاوی ویتامین نیاسینامید ریبوفلاوین و کلریدرات تیامین است .

Tubex (Wyeth)	یک سیستم تزریقی سربسته همراه با کارپول و سوزن
Tubule(Warren-teed)	محفظه ژلاتینی حاوی یک‌مقدار واحد داروبصورت پماد مقعدی
Tubinaire (Merck Sharp & Dohme)	اپلیکاتور برای مصارف داخل بینی
Tym cap (Amfer-Grant)	کپسولی که در زمان مشخص قسمت به قسمت از هم بازمیشود
Tymtab (Amfer-Grant)	قرصی که در زمان مشخص قسمت به قسمت از آن بازمیشود.
Tubinaire (Merck Sharp & Dohme)	اپلیکاتور برای مصارف داخل بینی
Unimatic (Squibb)	سرنگ یکبار مصرف برای تزریق داخل عضلانی
Univial (Abbott)	و یال دوخانه‌ای که معمولا" در یک خانه ماده‌ٔ موٴثر و در خانه دیگر حلال یا ماده‌ای است که در طی یک زمان طولانی با ماده‌ٔ موٴثر سازگاری ندارد. این دوخانه توسط دیواره‌ای از همدیگر جدا هستند. هنگام استفاده یک خانه را فشار میدهند تا دیواره بشکند و پس از حل کردن یا مخلوط کردن دو ماده آنرا مصرف میکنند.
Vaccine-Vial (Cooper)	و یال سرپوش لاستیکی پرده‌دار، حاوی محلولهای تزریقی
Vacoliter (Baxter)	محفظه‌های آماده‌ٔ مصرف، استریل، آپیروژن، محلولهای تزریقی تحت خلاء.
Vacule (Merck Sharp & Dohme)	و یالهائی با درب و جدار لاستیکی، حاوی محلولهای تزریقی
Vaporole (Burroughs Wellcome)	محفظه‌ٔ استنشاقی (اینهالر) از جنس شیشه نازک با پوشش پارچه‌ای.
Vaporole (Burroughs Wellcome)	ظروف شیشه‌ای نازک شکستنی محتوی ماده استنشاقی که در پارچه پیچیده شده است.
Wyseal (Wyeth)	قرصهائی که روکش ویژه‌ای دارند
Zestab (Roche)	قرصهای خوش‌طعم جویدنی برای کودکان

(۲۱و۲۵)

اشکال جالینوسی داروها

آمپلاترها: ترکیبات نرم‌کش داری هستند که روی پوست گذاشته میشوند معمولا" آنها را بر روی نواری از پارچه می‌گسترند و استعمال میکنند. باین پارچه‌های آمپلاتردار نام مشمع اطلاق میشود.

ترکیب آمپلاترها را اجسام مختلف از قبیل چربیها، مومها، رزین‌ها، و صابونهای اکسید سرب تشکیل میدهد. بعلاوه ممکن است باین مواد برخی از عصاره‌ها و گردها را نیز افزود.

اسانس‌ها: مخلوطی از مواد مختلف با ترکیبات شیمیائی بسیار متفاوت ازیکدیگرند و از بافتهای مختلف گیاهی بدست میآیند. اسانسها در حرارت معمولی حالت مایع دارند و فقط تعداد کمی از آنها جامداند اسانسها معمولا" دارای بوی قوی و نافذاند و چون عموما" فراراند ازاین جهت بنام روغنهای فرار (Volatile Oils) نیز نامیده شده‌اند. اسانسها معمولا" ماده بودار گیاهان را تشکیل میدهند که یا درون بافتهای آن وجود دارند و یا دراثر واکنش برخی ترکیبات درون‌بافت‌های گیاهی هنگام مجاورت با آب ایجاد میشوند.

اسپس‌ها: زیر عنوان اسپس‌ها میتوان از مخلوط چندین گیاه و یا قسمتی از چندین گیاه خشک شده را که به تکه‌های کوچک تقسیم شده باشند یاد کرد:

اگر اسپس از اختلاط قسمتی از چندگیاه حاصل میشود باید قسمتهای معین آن

گیاهان را با هم مخلوط کرد مثلا" گل را با گل و ریشه را با ریشه. در غیر اینصورت با هم خوب مخلوط نمیشوند. گذشته از این اگر این نکته رعایت نشود هنگامیکه میخواهند آب گرم بر روی آنها بریزند، ماده موثره یکی زودتر از دیگری در آب حل میشود.

اکسیپیان‌ها: مواد مختلفی را گویند که داروها بکمک آنها بصور مورد نظر در میآیند. اکسیپیان‌ها ممکن است از دسته مواد خشک (گرد قند) یا نرم (عصاره‌ها، مواد چرب) یا مایعات (هیدرولاها، روغنها) و غیره باشند.

الکتوئرها، الکتوئرها یا معجونها مواد داروئی خمیری شکل هستند که از مخلوط کردن گردهای بسیار نرم با شربت ساده یا یک شربت مرکب یا عسل و گاهی یک رزین مایع بدست میآیند. در تهیه الکتوئرها گاهی موادی نظیر پولپ‌ها، عصاره‌هاو ترکیبات مشابه آنها بکار میرود.

الکلاها، مایعاتی هستند که از خیساندن یک یا چندماده داروئی (بحالت تازه یا خشک‌شده) در الکل وسپس تقطیر محلول حاصل بدست میآیند. برای تهیه آنها معمولا" الکل ۸۰ درجه مصرف میکنند ولی برای تهیه الکلای وولنرر (Al. Vulneraire) الکل ۶۰ درجه بکار میبرند. الکلاها معمولا" بیرنگ و دارای بوی معطر و قوی‌تر از بوی الکلی هستند که درتهیه آنها بکار رفته است. الکلاها به مرور زمان بوئی مطبوع‌تر حاصل میکنند. از مشخصات آنها معمولا" این است که اگر آب به آنها افزوده شود کدر میگردند و بوی محسوس‌تر پیدا میکنند. الکلاها اگر در شیشه‌های محفوظ سربسته دور از روشنائی و در محل خنک نگهداری شوند فاسد نمیگردند

الکلاتورها: الکلاتورها بصور داروئی اطلاق میشوند که از اثر الکل برروی گیاه تازه بدست میآیند. غالبا" الکلاتورها را از گیاهانی تهیه میکنند که مواد موثر آنها دراثر خشک‌کردن تغییر شکل میدهند از قبیل گیاهان تیره‌آلاله.

برای تهیه الکلاتورها غالبا" الکل ۷۵ – ۸۰ – ۹۵ درجه بکار میبرند تا آب موجود در گیاهان که درجه الکلی را پائین میآورند نتوانند آنها را به الکل با درجه ضعیف تبدیل کنند. سپس آنرا صاف کرده به‌مصارف‌درمانی میرسانند. عیب عمده الکلاتورهاسرعت فساد آنها است و این فساد درنتیجه اکسیداسیون داخلی دراثر مخمرها حاصل میشود برای جلوگیری از این اتفاق بهتر است گیاه را ثابت کرد یعنی مخمرها یا فرمانها را بوسیله بخار الکل در اتوکلاو از بین برد.

درجه الکلی نیز که برای تهیه الکلاتورها بکار میرود به تناسب نوع گیاه تفاوت

میکند مانند آنکه الکلاتورآنمون با الکل ۹۵ درجه و الکلاتورها پوست لیموترش، با الکل ۸۰ درجه تهیه میگردد.

الگزیرهای داروئی : الگزیرهای داروئی فرآوردههائی هستند که از اختلاط شربت قند یا گلسیرین با الکل که دارای مواد داروئی یا مواد معطر باشد حاصل میشوند درجه الکلی الگزیرها باید لااقل در حدود ۳۰ باشد. ازالگزیرها برای خوش طعم‌کردن مواد داروئی و بعنوان حامل استفادهمیشود مانند الگزیر دگزامتازون یا الگزیر فنوباربیتال ترکیب عمده الگزیرها الکل و آب است اما از گلیسرین، سوربیتول، پروپیلن گلیکول، مواد محافظو طعم‌دهنده و شربت در تهیه محصول نهائی استفاده میشود.

امولسیون : امولسیون‌ها، مایعاتی با منظره کدر و شیری شکل میباشند و درآنها ذرات بسیار کوچک و غیرمحلول روغن، رزین و غیره بحالت تعلیق در آب قرار گرفته است.

یک امولسیون یک سیستم دوفازی است که فاز مایع بشکل قطرات ریز بطور یکنواخت درون مایع دیگری پراکنده شده است. امولسیونهای طبیعی ازصلابه‌کردن دانه‌های روغن‌دار در مجاورت آب و امولسیونهای مصنوعی بکمک مواد مختلفی نظیر صمغ عربی، کتیرا، زرده تخم‌مرغ، شیر، کازئین و غیره از مواد چرب رزین‌ها و گم‌رزین‌ها تهیه میگردد.

اصولا" دونوع امولسیون وجود داردیکی امولسیون روغن درآب (oil in water, o/w) و دیگر امولسیون آب در روغن (water in oil, w/o). درامولسیون‌های معمولی ماده امولسیون‌شده یا ماده پخش‌شده بدرشتی ۱۰۰ تا ۰/۱ مو میباشدو موقعی امولسیون را کلوئیدی گویند که درشتی ذرات به ۱ تا ۰/۰۰۱ موبرسد.

انتره‌ها : عصاره‌هائی که باگیاهان استابیلیزه تهیه شوند به آنها نام انتره میگذارند. انتره‌ها عینا" دارای مواد ترکیب گیاه مربوط بخود میباشند زیرا دراثر استابیلیزه‌کردن گیاهان مواد داخلی آن تثبیت میگردد و هیچگونه تغییر شکلی درآنها داده نمیشود، مانند انتره کلشیک و انتره‌گی.

اونگان‌ها : مواد داروئی برای استعمال خارج‌اند که ازرزین‌ها و اجسام چرب ساخته میشوند. در ترکیب بعضی از انواع آنها نیز بتفاوت ممکن است املاح مختلف عصاره‌ها، گم‌رزین‌ها و اسانسها بکار رفته باشد. اونگان‌ها براثر دارا‌بودن اکسیپیان رزینی، از پمادها متمایز میگردند. بعضی از اونگان‌ها نیز با آنکه مانند پمادها، فاقد ماده رزین‌دار هستند، بهمان نام اونگان نامیده میشوند. مانند اونگان‌گری

اوول‌ها : اوول‌ها ، شکل بیضوی شبیه زیتون و حالت تقریبا" جامد داشته به مصارف پانسمانهای مهبلی میرسند . اوول‌ها ، شامل مواد داروئی مختلف‌بوده و در تهیه آنها مخلوطی از گلیسرین و ژلاتین و آب و یا بوردوکاکائو همراه با کمی موم بکار میرود . توسط اوول‌ها داروهای محلول یا نامحلول را وارد بدن میکنند وزن اوول‌ها متفاوت است و ممکن است بین ۱۰ — ۱۵ گرم باشد .

بوژی‌ها : بوژیها (شمع‌ها) ترکیباتی هستند که برای واردکردن دارو در مجرای ادرار بکار برده میشوند معمولا" آنها را از موسیلاژ صمغ عربی و گلیسرین و مواد موثر داروئی تهیه میکنند .

قطر بوژی‌ها از ۲ — ۴ میلیمتر و طول آنها از ۱۵ تا ۲۰ سانتیمتر متغیر است . این شکل داروئی امروزه بندرت مصرف میشود .

پاستیل‌ها : پاستیلها ساکاروله‌های جامدی هستند که شامل قند و یک یا چند ماده داروئی و یا مواد معطر هستند . برای تهیه آنها اسانس را به قند می‌افزایند و آنرا در یک دهم وزنش آب بقدری گرم میکنند تا بجوش آید و باین طریق مقداری از قند در آب حل میشود . ممکن است ماده داروئی را نیزقبلا" درآب حل کرد . قندی را که باین طریق به خمیر تبدیل شد بر روی صفحه فلزی قطره‌قطره میریزند تا بصورت جامد درآید ممکن است آنرا درحرارت ۳۵ تا ۴۰ درجه نیز خشک کرد .

پرل‌ها : پرلها کراتی هستند که برای جادادن مواد داروئی بکار میروند . جنس آنها شبیه کپسول است و از گلیسرین و ژلاتین و آب درست شده‌اند . پرل‌ها نمیتوانند بیش از ۰/۱۰ گرم مایع را در خود جا بدهند . پرلها بر خلاف کپسول‌ها که درداروخانه برای پرکردن دارو بکار میروند غالبا" در کارخانه ازداروهای مخصوص پر و در آنها بسته میشوند مانند پرل‌اتر . پر کردن آنها بدین‌وسیله صورت میگیرد که پرل را از ماده‌داروئی پرمیکنند و سرآنرا با یک قطره از محلول ژلاتین ذوب‌شده می‌بندند سپس آنرا از سر وارد در محلول ژلاتین ذوب‌شده میکنند تا کاملا" روی‌آن بسته شود .

پمادها : ترکیبات داروئی نرمی هستند که در تهیه آنها مواد داروئی و اجسام چرب نظیر پیه خوک ، وازلین ، روغن زیتون و غیره بکار رفته است . از پمادها برای مالیدن بر روی عضو استفاده میکنند پمادها با همه مشابهتی که با اونگان‌ها دارنـــدچون فاقد مواد رزینی‌اند بخوبی از آنها تشخیص داده میشوند .

پوسیون‌ها : پوسیون‌ها داروهای آبی قند داری هستند که در ترکیب آنها یک یا چند ماده داروئی وارد میشود . پوسیون‌ها به سه‌دسته تقسیم میشوندکه‌عبارتند

از پوسیون‌ها ژولپ‌و لوک‌ها.

۱ ـ پوسیون‌ها ـ معمولا" شامل شربت ساده‌اند که مواد داروئی درآن حل‌شده است.

۲ ـ ژولپ‌ها ـ نام ژولپ برپوسیون‌هائی اطلاق میشود که ظاهر آنها زلال نباشد و در ترکیب آنها صمغ وجود داشته باشد و بعضی اوقات پوسیون‌های بدون صمغ را ژولپ ساده نیز میگویند.

۳ ـ لوک‌ها ـ لوک‌ها پوسیون‌هائی هستند که دارای یک امولسیون روغنی باشند امولسیون روغنی یک لوک بکمک برخی از موسیلاژها فراهم میشود مانندلوک روغنی بادام یا لوک سفید.

تابلت‌ها: تابلت‌ها ساکاروله‌های جامدی هستند که از یک مخلوط قند و ماده داروئی ترکیب شده‌اند. ابتدا قند و ماده داروئی را به کمک یک موسیلاژ بصورت خمیر در می‌آورند آنگاه آنرا به قطعات مختلف تقسیم کرده و در اتو و خشک میکنند.

تنتورها: تنتورها مایعات الکلی هستند که از اثر الکل بدرجات مختلف بر روی مواد خشک گیاهی، حیوانی و شیمیائی بدست می‌آیند. تنتورها را میتوان برحسب آنکه در تهیه آنها یک یا چند ماده داروئی بکار رفته باشد به تنتورهای ساده و مرکب تقسیم‌بندی کرد

برای تهیه تنتورها باید در انتخاب ماده داروئی و الکل دقت فراوان کرد. ماده داروئی باید خالص و الکل اتیلیک بادرجه معلوم باشد.

تنقیه‌ها: ترکیباتی هستند که از راه راست‌روده (رکتوم) مصرف میشوند. هدف از مصرف آنها تخلیه روده‌ها، واردکردن دارو به دستگاه عمومی بدن از طریق جذب و یا اثر موضعی برمحل است. برای اینکار روغن کرچک و یا روغن زیتون بکار میبرند از اختلاط ۱ ـ ۲ قاشق سوپخوری روغن در ۲۰۰ تا ۳۰۰ گرم آب مایع تنقیه بدست می‌آید.

تیزان‌ها و آپوزم‌ها: تیزان‌ها عبارت از مایعاتی هستند که توسط انحلال‌ساده انحلالهای استخراجی، ماسراسیون، انفوزیون، دکوکسیون و دیژسیون وحتی لیکسیویاسیون از مواد گیاهی بدست می‌آیند.

آپوزم‌ها مایعاتی هستند که توسط طبیب دستور داده میشود و آنها را مانند تیزان‌ها تهیه میکنند ولی دارای مقدار زیادتری ماده موثر میباشند

تیزان‌ها بسرعت روبه فساد میگذارند و نمیتوان آنها را بیش از ۲۴ ساعت نگاهداری کرد. تیزان‌ها را از قسمتهای مختلف اغلب گیاهان مانند برگ

(تیول) گل (بنفشه) چوب (کاسیا) ریشه (والرین) ، کاکل (ذرت) ، میوه (انیس) ، دانه (کتان) ، تمامی گیاه (پرسیاوشان) نوک گلدار (زوفا) ، وغیره تهیه میکنند .

حب‌ها : مواد داروئی را گویندکه به اشکال مختلف کروی، عدسی شکل وغیره مورد استفاده قرار میگیرند. وزن آنها از ۰/۱۰ تا ۰/۳۰ و حتی ۰/۵۰ گرم متغیر است .

حب‌ها از انواع مختلف مواد داروئی مانند گردهای گیاهی و حیوانی ، رزین‌ها عصاره‌ها ، املاح معدنی ، املاح آلی ، صمغ‌ها ، گودرون‌ها و غبره ساخته میشود اگر مواد داروئی قابلیت حب‌شدن را داشته باشد مستقیما" و درغیراینصورت به تناسب نوع داروی مورد مصرف با افزودن موادی اثر جامدیا مایع (اکسیپیان-ها) آنها را بصورت حب درمیآورند . اکسیپیان‌هائی که معمولا" مورد استفاده در ساختن حب‌ها قرار میگیرند عبارتند از شربت ساده عسل ، گردختمی ، گرد ریشه شیرین‌بیان ، صمغ عربی و غیره .

خمیرهای قندی یا ساکاروله‌ها : خمیرها ساکاروله‌هائی هستند که ظاهری نیم‌نرم دارند و به انگشت نمی‌چسبند عموما ازقند و صمغ عربی تشکیل یافته‌اند . تهیه آنها از انحلال این دوماده و مواد مختلف داروئی درآب صورت میگیرد . خمیرها از نظر ظاهر بدونوع تقسیم میشوند .

۱ ــ خمیرهای شفاف ،از انحلال قند و صمغ عربی درآب بدون هم‌زدن بدست میآیند .

۲ ــ خمیرهای کدر ،از انحلال موادقندی و صمغ درآب و هم‌زدن مداوم آن در حرارت حاصل میشوند .

میتوان روی خمیرهای قندی را از یک ورقه‌گرد پوشانید .

دم‌کرده‌ها : محلولهای داروئی را گویند که با واردکردن آب‌جوش برروی جسم داروئی و یا عضوی از گیاه مانند ریشه ، ساقه ، برگ و غیره و قراردادن آنها بمدت ۱۵ دقیقه تا یک ساعت بهمان حالت بدست می‌آیند . با این روش مقداری از مواد موثره و ترکیبات مختلف جسم داروئی و یا اعضاء گیاهان‌تحت اثر حرارت در آب حل میشوند و محلولی بدست میآید که تحت نام دم‌کرده به مصارف درمانی مختلف میرسد .

دوش‌ها : محلول مائی که برسطح بدن یا یکی از حفرات آن جریان میدهند . از دوش‌ها بعنوان آنتی‌سپتیک یا جهت‌شستشو استفاده میکنند .

دوش چشمی : برای بیرون آوردن اجسام خارجی یا ترشحات چشم بکار میرود .

از دوش حلقی برای آماده‌کردن داخل گلو جهت عمل جراحی و تمیزکردن آن استفاده میشود. دوش بینی و دوش مهبلی نیز وجود دارد.

رزین‌ها: گروهی از فراورده‌های گیاهی و دارای ترکیب شیمیائی درهم‌اند. از مشخصات آنها این است که عموما" به استثناء تعداد کمی بیشکل هستند. همه رزین‌ها جامداند و ظاهری کم و بیش‌رنگی سخت و شکننده دارند. انواعی از آنهاکه در خود مقداری اسانس دارند، درموقع لمس‌کردن، نسبتا" نرم‌اند وبعلاوه بوی اسانس مخصوص خود را میدهند.

رزین‌ها اگر تحت اثر گرما قرار گیرند، تدریجا نرم و سپس ذوب میشوند. از اختصاصات آنها این است که فرار نیستند و در موقع سوختن نیز شعله زیاد و دود سیاه ایجاد میکنند. رزین‌ها درآب غیر محلول‌اند ولی در الکل، اتر و روغنها بخوبی حل میشوند.

رزین‌ها از نظر شیمیائی دارای کربن، هیدروژن زیاد ولی اکسیژن کم‌اند. بنظر میرسد که رزین‌های طبیعی حاصل اکسیداسیون اسانس‌ها در اندامهای‌گیاهان مختلف باشند. در رزین‌ها مواد مختلف عطری، الکل‌های مخصوص اسیدهای رزینیک مواد خنثی و غیره یافت میشود.

روغنهای پزشکی: روغنهای پزشکی حاصل انحلال مواد مختلف داروئی در روغنهای ثابت مثل روغن بادام و روغن زیتون‌اند. برای تهیه روغنهای پزشکی که در چشم مصرف میشوند و یا بصورت تزریق بکار میروند روغن آن باید خنثی باشد، مانند روغن کافور و سوسپانسیون روغنی ید و بیسموتات‌ـ کینین و روغن کافوری قابل تزریق.

ژل‌ها: سوسپانسیون‌هائی که از ملکولهای غیرآلی کوچک یا ملکولهای آلی‌بزرگ در یک‌مایع تشکیل یافته‌اند.

سراها: سراها داروهای نرمی هستند شبیه پمادها که از موم، روغن بادام‌و پارافین که بآن یک یا چندماده داروئی و اسانس‌افزوده شده است

سرکه‌های پزشکی: سرکه‌های پزشکی از اثر سرکه بر روی مواد داروئی حاصل میشوند. سرکه‌ای که برای تهیه سرکه‌های داروئی بکار میرود باید از شراب سفید تهیه شود و بصورت مایع زلال و زردرنگ باشد، بوی عنبر بدهد و نافذ و مطبوع باشد. مزه آن ترش واضح و بدون هیچ طعم بدی باشد. این سرکه دارای ۶ درصد اسید استیک‌است.

سیگارت‌ها: سیگارت‌ها از بریدن برگ گیاهان و واردکردن آنها توسط دستگاه‌ـ های مخصوص در لوله‌های استوانه‌ای کاغذی و بیرون‌آوردن آنها بشکل سیگارت

حاصل میشوند. برای سهولت اشتعال آن میتوان قبلا" برگ گیاه را با محلول ضعیف نیترات پتاسیم نم‌زد و بعدا" خشک کرد. هر سیگارت دارای یک گرم برگ است برگ گیاهانی را که بدین‌طریق استعمال میکنند عبارتند از بلادن و استراموآن.

شرابهای پزشکی: شرابهای پزشکی از اثر شراب بر روی یک یا چند ماده‌ء داروئی بدست میآیند و بدودسته شراب ساده و شراب مرکب تقسیم میشوند. شرابهای پزشکی برای اینکه بهتر حفاظت شوند باید دارای مقدار کافی الکل باشند.

غالبا" برای تهیه شرابها مواد اولیه گیاهی را بکار میبرند دراثر انحلال ساده یا در اثر ماسراسیون در ظروف سربسته شرابهای پزشکی را تهیه میکنند.

شربت‌ها: شربتها ساکاروله‌های مایعی هستند که در ترکیب خود به مقدارزیاد قند دارندوجود قند در شربت‌ها موجب میشود که شربت محافظت گردد و مزه بد دارو حس نشود.

شربت‌ها معمولا" از ۸۵ درصد سوکروز درآب تشکیل یافته‌اندشربت کدکس دارای وزن مخصوص ۱/۲۶ در حالت جوش و ۱/۳۲ در حرارت متعارفی است.

شیاف‌ها: شیافها، اشکال داروئی مخروطی یا بیضوی شکل و دارای حالت جامداند. در تهیهء آنها مواد مختلفی نظیر بوردو کاکائو، صابون،گلیسرین ژلاتین و غیره بکار میرود ولی بهترین اکسیپیان‌برای تهیه آنها همان بوردو کاکائو است که گاهی همراه با موادی مانند موم، لانولین و غیره بکار میرود. قطر شیاف‌ها بتفاوت باندازه انگشت کوچک تا انگشت شست دست‌است.وزن آنها در انواع مورد استفاده برای اشخاص بزرگ و بالغ معادل ۳ گرم ولی در انواع مخصوص اطفال ۲گرم است.

شیرها: سوسپانسیون‌هائی از داروهای نامحلول و غیرآلی هستند و فرقشان با ژل‌ها در اینست که اندازه ذرات سوسپانسیون ژلها بزرگتر است.

صابونها: صابونها حاصل ترکیب و اثر اکسیدهای فلزی و بخصوص اکسیدهای قلیائی بر روی چربیهاست اصولا" صابون‌ها بدوقسمت صابون نرم (صابون پتاس) و صابون سخت (صابون سود) تقسیم‌بندی میشوند عموما" آنها را از اثر قلیائیها بر روی مواد چرب بدست میآورند. حاصل فعل‌و انفعال پیدایش گلیسرین وملح جدیدی است.

عصاره‌ها: اشکال داروئی متنوعی را گویندکه از تاثیر حلالهای مختلف برروی مواد داروئی گیاهی یا حیوانی و تبخیر و تغلیظ محلول حاصل، نتیجه میگردند حلالهای مورد استفاده در تهیه عصاره‌ها عبارت از آب الکل، اتر و غیره است

عصاره‌ها به صور مختلف روان، نرم، سفت و خشک‌اند. با اینکه امروزه به ترکیبات داخل گیاهان کم‌وبیش پی‌برده‌اند و مواد موثرآنها را استخراج و یا از راه سنتز تهیه کرده‌اند معذالک هنوز مصرف عصاره‌ها معمول‌است و مورد توجه میباشد.

عصاره‌های آبی: دراینگونه عصاره‌ها آب بعنوان حلال انتخاب میشود وبروش‌های خیساندن و دم‌کردن محلول استخراجی را بدست میآورند. بعلت اینکه آب حلال خوبی برای مواد موثر نیست تعداد عصاره‌های آبی نسبتا "محدود است مانند عصاره کنکینای قرمز، عصاره تریاک و عصاره موگه.

عصاره‌های الکلی: حلال این دسته از عصاره‌ها الکل است. استعمال الکل در عصاره‌های الکلی موجب میشود که بسیاری از مواد غیرموثر مانند صمغ و موسیلاژ و مواد پکتیک درآن واردنشود. بعلت اینکه الکل یک حلال‌گران قیمت است از این لحاظ قبل از تغلیظ عصاره آنرا توسط عمل تقطیر از محلول استخراجی جدا میکنند و سپس عمل تغلیظ را انجام میدهند.

معمولا " عصاره‌های الکی را بدودسته عصاره‌های سمی‌وغیرسمی تقسیم میکنند. مانند عصاره بلادن که یک عصاره الکلی سمی و عصاره کلا که یک عصاره الکلی غیرسمی است."

عصاره‌های آبی ـ الکلی. در تهیه این دسته عصاره‌ها هم‌آب وهم‌الکل بکار میرود. مانند عصاره صفرا

عصاره‌های روان. عصاره‌های روان با قسمتهای مختلف گیاهان و باآب‌والکل تهیه میشوند. عصاره‌های روان بعلت سهولت استعمال و نگاهداری و بعلت تساوی مقدار ماده موثر در عصاره‌وگیاه مربوط بدان بسیار مورد توجه‌اند و از نظر داروساز کار کردن با آن هم سهل‌تر است.

عصاره‌های اتری. حلال این عصاره‌ها اتر میباشد. تهیه محلول استخراجی بطریق لیکسیویاسیون صورت میگیرد و عصاره از تقطیر اتر حاصل میشود.

غرغره‌ها. محلول‌هائی که برای درمان حلق و بینی بکار میرود. بدین‌ترتیب که هوای ریه را از درون محلول غرغره که در گلو نگهداشته شده است میدمند. اگر چه دهان‌شویه‌ها را داروهای مجزا از غرغره‌ها میدانند اما بسیاری آنها را بصورت غرغره مصرف میکنند.

کاشه‌های داروئی. اشکال گردی هستند که از دو قابلمه تشکیل میابند و آنها

را ازفطیر (Pain Azyme) تهیه میکنند ، معمولا " از آنها برای قراردادن گردها در درون آنها استفاده میکنند فطیر از نشاسته خالص تهیه میشود .

گنجایش کاشه برحسب وزن مخصوص گردها و برحسب اینکه آنرابکمک یابدون کمک فشار ریخته باشند از ۰/۲۵ گرم تا ۳/۵۰ گرم متغیر است .

کپسولهای دارویی . کپسولها و پرلها اشکال بیضی و کروی هستند که‌دردرون آنها میتوان مواد دارویی را قرار داد و برحسب بزرگی و کوچکی بنامهای کپسول ، کپسولین و پرل خوانده میشوند . این ترکیبات در معده حل میشوند و موادداروئی خود را وارد بدن میکنند .

کلوتوارها . کلوتوارها داروهای نیم مایعی هستند که برای شستشو و مالیدن روی لثه‌ها و داخل دهان بکار میروند ترکیبات آنها بسیار متغیر است . غالبا " از برات سدیم و کلرات پتاسیم همراه با عسل و گلیسرین و غیره تشکیل یافته‌اند .

مجاورت‌گلیسرین وبرات‌سدیم خاصیت اسیدی دارد در این مخلوط نمیتوان بیکربنات‌سدیم واردکرد زیرا دراثر واکنش شیمیایی‌گازکربنیک ازآن‌متصاعدمیشود .

کلیرها . کلیرهاداروهایی هستندکه برای‌درمان بیماریهای چشمی‌بکارمیروند کلیرها بسه‌دسته کلیرهای گازی جامد و کلیرهای مایع تقسیم‌بندی میشوند ، نوعی که بیشترمصرف میشود کلیرهای مایع است که آنهارا باقطره‌چکان وارد چشم‌میکنند حلال کلیرهای مایع ممکن است آب یا روغن باشند . برای اینکه کلیرها بهترتحمل شوند باید ایزوتونیک با اشک چشم باشند برای این‌کار باید محلول کلیرها دارای همان نقطه انجماد اشک چشم باشند . معمولا " کلیرها را با کلرور سدیم یاسولفات سدیم ایزوتونیک میکنند یعنی آنقدر از این نمکها به‌آن می‌افزایند تانقطه انجماد کلیر ۰/۴۷ ــ تا ۰/۸۰ درجه برسد و این نقاط انجماد با محلول‌کلرور سدیم ۰/۸ تا ۱/۴ اگرم درصدتطبیق‌میکند . محلول‌کلرورسدیم ۱/۲ گرم درصد کاملا "ایزوتونیک با اشک چشم است .

کمپریمه‌ها . کمپریمه‌هااشکال مدوری هستندکه دراثر فشردن داروهای مختلف در ماشین قرص‌سازی بدست می‌آیند . کمپریمه‌ها دارای اشکال مختلف‌اند ولی‌غالبا بصورت استوانه مسطح یا بصورت عدس و دیسک میباشند در حقیقت کمپریمه‌هاحد فاصل حب‌ها و تابلت‌ها هستند . کمپریمه‌ها از نظراینکه امروزه بیشتر تابلتها را با

ماشین قرص‌سازی تهیه میکنند به آنها شبیه‌اند و از طرف دیگر بعضی دیگر از آنها چون بصورت دراژه تهیه میشوند به حب‌ها شباهت دارند .

تابلوئیدها . این نام بعضی اوقات به کمپریمه‌های بسیار کوچک اطلاق میشود که دارای مواد تند اثر میباشند در زبان فارسی به **کمپریمه** و **تابلت** و **تابلوئید** کلمه قرص اطلاق میشود .

گازها . زیر اسم گازها بافتهای پنبه‌ای سبکی را نام میبرند که از پارچه‌های درشت‌بافت مانند شیفون و غیره تهیه میشوند . معمولا " آنها را سترون میکنند و بعنوان حفاظت‌وپوشانیدن روی زخم‌ها بکارمیبرند و گاهی نیز آنهارا با مواد داروئی آغشته میکنند و بآنها گازهای داروئی میگویند .

گرانول‌ها . گرانول‌ها ، حب‌های بسیارکوچک محتوی مواد موثره خیلی قوی هستند . وزن آنها عموما" از حب کمتر و در حدود ۰/۵ تا ۰/۰۶ گرم است . مواد بی‌اثری که در تهیه گرانول‌ها بکار میرود ، عبارت از گرد لاکتوز ،صمغ عربی‌وشربت ساده است .

گرانوله‌ها . گرانوله‌ها را بنام ساکاروزگرانوله نیزمی‌خوانند این ترکیبات حاصل اختلاط مواد داروئی و قند میباشند که با اضافه کردن شربت قند و گذراندن از ماشینهای مخصوص آنها را بصورت دانه‌های کم و بیش مساوی و یا نامساوی تبدیل میکنند .هرگاه ماشین مخصوص برای تهیه گرانوله دردسترس نباشد میتوان ازگذراندن خمیر روی یک الک گرانوله را بدست آورد .

گلیسره و گلیسروله . داروهائی هستندکه دارای گلیسرین ونشاسته بوده حالت نیمه‌جامد دارند . با حرارت دادن ملایم مخلوط مواد مذکور ماده نیمه جامدی با غلظت لعاب نشاسته بدست می‌آید که در استعمال خارجی مورد استفاده قرار میگیرد .

نام گلیسره بتفاوت به فرآورده‌های دارای گلیسرین که در آنها موادجامد یا مایعی جانشین نشاسته گردیده است و همچنین به بعضی محلول‌های داروئی و مخلوط مواد مختلف نیز اطلاق شده است .

گم‌ها یا صمغ‌ها ، ترکیبات درهم گلوسیدی هستند که بحالت طبیعی و یا بر اثر ایجاد شکاف ، از اعضای مختلف بعضی از گیاهان به خارج ترشح میشود .

صمغ ها . مواد غیرقابل تبلور و فاقد بو میباشند .اگر در آب قرار گیرند درآن

حل میشوند و یا مانند کتیرا با آن بصورت توده ژلاتینی درمیآیند . با قرار دادن انواع مختلف صمغ در آب تمام مراحل حد واسط بین دو حالت مذکور را میتوان‌در آنها دید . صمغ ها اگر هیدرولیز شوند ،به‌حسب نوع صمغ آرابینوز ،گالاکتوزوگاهی گزیلوز ایجاد میکنند .

گم رزین‌ها . مخلوط طبیعی موادصمغی و رزینی‌هستندکه به‌نسبت‌های‌متفاوت، توام با موادآلی دیگر درگیاهان تیره‌های‌مختلف بوجود میآیند . گم رزین‌هابیشتر در اعضاء گیاهان مناطق گرم کره زمین متعلق به تیره های جعفری بوجود میآید .

این مواد گاهی بطور خودبخود از گیاهان بخارج ترشح میشود ولی معمولا " با ایجاد شکاف در اعضاء گیاهان اقدام به استخراج آنها میکنند . گم رزین‌ها پس از خروج از اعضاء گیاهان می‌بندند و برای خشک کردن آنها نیز از گرمای خورشید استفاده میکنند .

در گم رزین‌ها معمولا " مقدار نسبی ماده رزینی همیشه بیشتر از ماده صمغی است . بعضی از گم رزین‌ها نیز مقدار زیادی اسانس همراه دارند . از گم رزین‌های مهم آنغوزه و باریجه را میتوان مثال زد .

با قرار دادن گم رزین‌ها در آب ماده صمغی آنها حل میشود ، ولی با تاثیر دادن الکل مواد رزینی گم رزین‌ها حل میشود .

لوسیون‌ها . مایعات داروئی را گویند که معمولا " از آب و بندرت از آب الکل دار ، همراه با مواد داروئی ، تهیه‌میگردند .مواد داروئی لوسیونهاممکن است‌حالت محلول و یا معلق در مایع داشته باشد . لوسیونها به مصارف شستشوی قسمتهای مختلف پوست بدن و زخمها میرسد .

لیمونادها . لیمونادها یاهیدروله‌های اسید شامل مشروبات‌شیرین وترش‌مزه‌ای هستندکه بعنوان مفرح وخنک‌کننده مایعات‌داروئی و مسهلی مصرف میشوند .ترشی لیمونادها مربوط به اسیدهای معدنی ، آلی و گاهی نیز اسید کربنیک است .

لینیمان‌ها . لینیمان‌ها ترکیباتی هستند که بر روی پوست مالیده‌میشوند .در ترکیب لینیمان‌ها انواع مواد داروئی را بکار میبرند . حامل مواد داروئی غالبا " روغن ،موادچرب الکلی وصابونی است وآنها را بصورت مایع و گاهی اوقات پمادی شکل درمیآورند .

محلول‌ها . مایعاتی هستند که درآنهامواد شیمیائی یا مواد استخراجی‌وغیره وجود دارد . در مورد اول **انحلال را کامل** میدانند و در مورد دوم **انحلال غیر کامل** است .

در انحلال کامل کافی است که بطور ساده و یا با کمک حرارت و غیره جسم‌را در حلال حل کرد ولی در انحلال ناقص حلال را با جسم مجاورت میدهند تاازمواد موثر آن به یکی از روش‌های ماسراسیون ، انفوزسیون ، دیژسیون ، دکوکسیون و پرکولاسیون قسمتی از مواد وارد درحلال شود . **ازانحلال ناقص یااستحراجی** برای تهیه تنتورها عصاره‌ها وغیره استفاده میشود . غالب محلول‌های دیگر از راه‌انحلال کامل بدست میآیند . محلول‌ها معمولا " غیرفرارند .

مشمع ها . باندهایی ازپارچه‌پنبه‌ای و یاابریشمی‌که برای بکار بردن‌واستعمال امپلاترها برروی پوست‌بدن بکارمیروند . مشمع ها باید نرم باشند بطوریکه‌بسهولت قابلیت تا خوردن داشته باشند و در اثر تا خوردن نباید موادی که روی یک طرف آنها پوشانیده است خرد شود و بریزد . بعلاوه باید چسبناک باشند یا بسهولت‌به پوست بدن بچسبند .

برای‌تهیه مشمع ها پارچه‌هارابصورت باند از دستگاههای مخصوص‌می‌گذرانند تا یک طرف آن از ماده داروئی آغشته شود .

موسیلاژها . در داروسازی نام موسیلاژ به فرآورده‌هایی اطلاق میشود که از اختلاط موسیلاژ گیاهی و گم‌های محلول و یا نامحلول با آب بدست میآیند .

موسیلاژها مایعاتی هستند کم و بیش غلیظ که غالبا " کلوئیدی هستند این محلول‌ها اغلب بعنوان کمک در تهیه فرآورده‌های جالینوسی مانند قرص سازی و امولسیون کردن بکار میروند .

ملیت‌ها . ملیت‌ها عبارتند از مایعاتی که در ترکیب آنها عسل ، آب ، مواد داروئی و یا محلول‌های استحراجی وارد می‌شوند . اگر در ترکیب ملیت سرکه هم وجود داشته باشد به‌آن اکسی ملیت میگویند . عسلی که برای استعمال‌درملیت‌ها بکار میرود باید خالص و عاری از تقلب باشد ، زیرا غالبا " آنرا بطریق تقلبی با شربت گلوکوزود کسترین و یا با قند احیا شده صنعتی تهیه میکنند .

هیدرولاها . هیدرولاها یا آبهای مقطر داروئی مایعاتی هستند که از تقطیر آب‌محتوی اعضاءمفیدگیاهان و یاعبوربخارآب از آنها ،بدست میآیند ، هیدرولاها

شامل مواد فرار گیاهان بوده ممکن است از یک یا چند گیاه، بدست آمده باشند. آبهای مقطر داروئی، به سهولت تحت اثر عوامل فیزیکی و شیمیائی و یاموجودات زنده ذره‌بینی مانند میکربها قرار گرفته فاسد میشوند. از این جهت طبق آنچه‌که در کدکس ذکر گردیده باید ظروف شیشه‌ای محتوی آبهای مقطر داروئی، کاملا " پر و سربسته باشد و بعلاوه در محل تاریک و خنک نگهداری شود.

(۱۴)

شیوه‌های استفاده از اشکال دارویی

اثر بخشی داروها علاوه بر آن که به مقدار مصرف کافی دارو و زمان مناسب آن بستگی دارد، به شیوه‌های استفاده از آن نیز وابسته است.

بسیاری گمان می‌کنند که مصرف اشکال داروئی مانند قطره‌های چشم و گوش و بینی، احتیاج به دقتی همانند تزریق دارو به‌وسیله‌ی سرنگ دررگ ندارد اما حتی همین اشکال داروئی نیز دارای شیوه‌های استفاده‌ایست که در صورت رعایت آنها، جذب و تاثیردار و بسیار بهتر خواهد بود.

آنچه می‌خوانید، شیوه‌های صحیح استفاده از اشکال داروئی مختلف است.

*

شیاف‌ها (مقعدی)

بیمار باید به پهلو بخوابد. پوشش آلومینومی شیاف را باید باز کرده و آنرا وارد مقعد کرد. اگر شیاف نرم است فرو بردن آن در زیر آب سرد برداشتن پوشش آلومینیومی و استفاده از آن را آسان میکند.

شیاف‌ها را باید در جای خنک و خشک نگهداری کرد. شیاف را میتوان در یخچال نگهداری‌کرد، اما نمیتوان‌آنرا بطورمستقیم در روی یخ یا داخل جای یخی آن گذاشت.

پمادهای مقعدی یا هموروئیدی

اپلیکاتور را باید به لوله متصل کرد و در عمق رکتوم فرو برداگر شقاق مقعد

یا هموروئید وجود دارد ، نوک اپلیکاتور را میتوان به پماد یا وازلین آغشته کردتا اپلیکاتور بسهولت وارد شود .

پس از هربار مصرف ، اپلیکاتور را کاملا " تمیز کنید .

لوسیون‌ها

پیش از مصرف آنها را خوب تکان دهید .

لوسیون‌ها فقط برای مصرف خارجی است . با قطعه‌ای پنبه آنرا برروی نواحی سطحی بمالید ..

مخلوط ها ، امولسیون‌ها ، سوسپانسیون‌ها ، ماگماها

پیش از مصرف آنها را خوب تکان دهید .

برای یک دوزاج یکدست از یک وسیله اندازه‌گیری استاندارد استفاده کنید ، نظیر قاشق چایخوری یا غذاخوری .

پانسمان بسته

پلی اتیلن یا هرگونه کیسه‌های پلاستیکی نرم و انعطاف پذیر را میتوان برای پانسمان بسته بکار برد . مثلا " از کلاه شنا یا کلاه حمام که موهارامیپوشاند میتوان برای درمان سطح جمجمه استفاده کرد . دستکش‌های نازک پلی‌اتیلن رامیتوان‌برای پانسمان بسته انگشتان دست و پا ، دستها و پاها بکاربرد . کیسه‌های پلاستیکی را میتوان باندازه لازم برید تا اعضاء بزرگتری مثل ساقها ، ران یا شکم را بپوشاند . باید لایه نازکی از داروها را بر روی ضایعه قرارداد اگر فرآورده داروئی بشکل‌کرم لوسیون یا محلول است باید بآرامی آنرا مالید تا اینکه محو شود . پماد را باید بصورت لایه نازکی بدون مالش دادن روی موضع گذاشت . ضایعه را باید با هر یک از مواد فوق پوشاند و آنرا با نوار چسب یا باند و گاز در محل ثابت‌نگاهداشت .

قرص‌های زیرزبانی

این قرص‌هارا نجوید و فرو ندهید ، بلکه در زیر زبان بگذارید و صبر کنیدتا در بزاق حل شود . بزاق دهان را فورا " فرو ندهید و صبر کنید تا اینکه‌مواد فعال

آن جذب شود . آغاز اثر دارو معمولا " در ظرف ۱ ــ ۳ دقیقه ظاهر میشود .

قطره‌های چشمی


قطره‌های چشمی پیش از آنکه مصرف شوند باید تقریبا "درگرمای اطاق باشند .

قطره‌چکان را باید همیشه روبه‌پائین نگاهداشت تا اینکه دارو بداخل لاستیکه قطره چکان وارد نشود .

بیمار باید سر را کمی به عقب و به خارج بگرداند تا قطره‌ها با فاصله کافی از بینی در چشم بچکند وداخل مجرای اشکی نزدیک بینی نشوند .

پلکها را باید با کشیدن پلک زیرین بسمت پائین و پلک بالائی به سمت بالا از هم جدا کرد . بیمار باید به سقف نگاه کند . اکنون میتوان دارو را به مقداری‌که تجویز شده ، درحالیکه قطره‌چکان تقریبا "یک اینچ (۲/۵سانتیمتر) از چشم فاصله دارد در پلک پائین چکاند .هیچگاه دارو را نباید مستقیما "برروی کره‌چشم چکاند . پلکها را باید بآرامی بمدت تقریبا" یک یا دو دقیقه بست تا از بیرون ریختن‌دارو جلوگیری شود و دارو امکان یابد تا جذب چشم شود .

روش استفاده از قطره چشمی



پمادهای چشمی

پلک زیرین را باید بآرامی بپائین کشید. در حالیکه دقت میشود که نوک

اپلیکاتور یا لوله پماد با پلک تماس پیدا نکند. لایه نازکی از پماد را باید بداخل پلک تحتانی قرار داد.

پلک‌ها را باید بمدت تقریبا " یک یا دو دقیقه بست تا اینکه داروجذب شود.

پس از هربار مصرف، نوک اپلیکاتور یا لوله پماد را باید بادستمال کاغذی پاک کرد و در آنرا محکم بست.

روش استفاده ازپماد چشمی



قطره‌های گوشی

قطره‌های گوشی پیش از آنکه مصرف شوند بایدگرمائی معادل گرمای اطاق داشته باشندیا کمی گرمتر باشند. اگر دارو بیش از حد گرم باشد ممکن است به گوش صدمه بزند.

در حالیکه گوش بیمار رو ببالاست باید به پهلو دراز بکشد. نرمه گوش‌را باید بآرامی بالا و پائین کشید تا مجرای گوش در وضع مستقیم قرار گیرد. از تماس قطره چکان با گوش خودداری کنید. اکنون دارو رامیتوان به مقدار لازم درگوش چکاند بیمار باید تقریبا " یک یا دو دقیقه در وضعیت درازکش بماند تا دارو جذب شود. برای جلوگیری از نشت دارو به خارج از گوش، از یک تکه پنبه استفاده کنید.

روش استفاده از قطره گوشی



اسپری بینی

پیش از استفاده از اسپری، بینی را باید تمیز کرد.

بیمار باید سر را مستقیم نگهدارد، و نوک اسپری را در سوراخ بینی واردکند. ظرف اسپری را باید بسرعت و محکم فشار داد تا مقدار داروی لازم را بیرون‌دهد.

وجود هوا دردرون ظرف اسپری برای‌خروج یک اسپری‌یکنواخت به‌سوراخهای بینی ضروری است. هر بار پس از استفاده باید نوک اسپری را با آب شست تا از آلودگی جلوگیری شود.

روش استفاده از اسپری بینی




قطره‌های بینی

پیش از استفاده از قطره بینی باید بینی را تمیز کرد .

بیمار باید دراز کشیده و سر را کمی بعقب برگرداند . اکنون دارو را میتوان در داخل سوراخ بینی چکاند . بیمار باید تقریبا " یک یا دو دقیقه در حالت درازکش بماند تا دارو به حفره‌های بینی نفوذ کند .

قطره‌چکان را باید هربار پس از استفاده با آب شست تا از آلودگی جلوگیری بعمل آید .

روش استفاده از قطره بینی



تب دارویی (۱۰)

بسیاری از داروها میتوانند تب ایجاد کنند . این تب ممکن‌است باتظاهرات بالینی‌مربوطه همراه‌باشد یاهیچ‌علامت بالینی نداشته باشد . علل احتمالی ایجاد تب عبارتند از عمل‌فارما کولوژیک دارو ،اثر برسیستم تنظیم حرارت بدن ، عوارض موضعی (درصورتیکه‌بصورت تزریقی مصرف‌شده باشد) و یا یک واکنش ایدیوسنکرازی (حساسیت بدون دلیل مشخص و منحصر بفرد) . شایع ترین مکانیسم آن احتمالا " یک‌واکنش‌ایمیونولوژیک‌است‌که‌بیاری‌آنتی‌بادی‌های دارو-انگیخته (Drug Induced) صورت می‌پذیرد . تب داروئی ممکن‌است بصورتهای مختلف تظاهر کند ، ولی بطور مشخص معمولا " پس از ۷ تا ۱۰ روز مداوا شروع شده و ۴۸ ساعت پس از قطع دارو فروکش میکند . اگرتب داروئی شناخته نشود ، ممکن است به‌تشخیص نادرست‌وبالقوه زیانبخش منجرشده وبه‌تداخل درمانی‌بیانجامد . در صورت مواجهه با تب داروئی باید مصرف تمامی داروهائی که میتوانندتب‌ایجاد کنند - همه با هم یا یکی پس از دیگری - قطع شود . مصرف‌مجدد عامل ایجاد تب ، معمولا " در عرض چندساعت تب را به بیمار بازمیگرداند واین تشخیص‌را تایید خواهد کرد .

داروهائیکه تقریبا " هیچوقت تب ایجاد نمی‌کنند		
دیژیتال	کلرامفنیکل	تتراسیکلین‌ها

شایع‌ترین داروهای ایجاد کننده تب	مکانیسم احتمالی	داروهائیکه گاه‌وبیگاه ایجاد تب میکند	مکانیسم احتمالی
آمفوتریسین	تب‌زا	آللوپورینول	حساسیت
آنتی‌هیستامین‌ها	ناشناخته	آزاتیوپرین	حساسیت
آسپاراژیناز	ناشناخته	سفالوسپورین‌ها	حساسیت
باربیتوراتها	ناشناخته	سایمتیدین	اثرروی‌تنظیم‌حرارت
بلئومایسین	تب‌زا	مشتقات کوکائین	اثرروی‌تنظیم‌حرارت
متیل دوپا	حساسیت	هیدرالازین	حساسیت
پنی‌سیلین	حساسیت	یدورها	حساسیت
فنیتوئین سدیم	ناشناخته	ایزونیازید	حساسیت
پروکائینامید	حساسیت	نیتروفورانتوئین سدیم	حساسیت
کوئینیدین سولفات	حساسیت	پاراآمینوسالیسیلیک اسید	حساسیت
سالیسیلات‌ها	ناشناخته	پروپیل تیواوراسیل	ناشناخته
سولفونامیدها	حساسیت	ریفامپی سین	حساسیت
		استرپتوکیناز	تب‌زا
		استرپتومایسین سولفات	حساسیت
		وانکومایسین هیدروکلراید	ناشناخته

(۱۴)

تداخل داروها با غذا

Acetaminophen

این دارو را با کربوهیدرات‌ها (بیسکویت ، خرما ، مربا) نخورید زیرا کمپلکس‌هائی ایجاد میکند که ممکن است میزان اولیه جذب (اما نه مقدار داروی جذب شده) را بتاخیر اندازند .

Anticoagulants (داروهای ضد انعقاد)

آنرا با عصاره مرکبات ، زرده تخم مرغ ، ماهی یا روغن ماهی ، سیب زمینی سرخ کرده یا روغن‌های گیاهی نخورید زیرا ممکن است با افزایش زمان پروترومبین مانع اثر ضد انعقادی آنها شود .

Antihypertensives (داروهای ضد فشارخون)

این داروها را با غذاهائی که مقدار زیادی آمین‌های موثر بر فشار خون دارند مصرف نکنید (عنوان MAOI را نگاه کنید .)

Bisacodyl

با شیر یا غذاهای قلیائی نخورید زیرا افزایش PH ممکن است سبب تجزیه لایه مخصوصی از دارو که در روده باز میشود گردد .

Cardiac Glycosides (گلیکوزیدهای قلبی)

همراه با شیر یا فرآورده‌های لبنیات یا غذاهائی که کلسیم فراوان دارند نخورید زیرا ممکن است اثر دارو کاهش یابد که منجر به آریتمی قلبی میشود .

Diphenylhydantoin

دارو را با غذاهائی که مقدار زیادی منوسدیم – L – گلوتامات دارند (مانند موادی که طعم غذا را تشدید میکنند) نخورید زیرا دارو جذب سریع منوسدیم – L – گلوتامات را افزایش داده و منجر به بروز عوارض سمی میشود که ممکن است به شکل ضعف عمومی، بی‌حسی پشت گردن و تپش قلب تظاهر کند.

Disulfiram

همراه با فرآورده‌های حاوی الکل مصرف نکنید زیرا ممکن است الکل علایم ناخوشآیندی ایجاد کند (۱).

Erythromycin

همراه با آب‌میوه یا مایعات اسیدی مصرف نکنید زیرا ممکن است تجزیه دارو را تسهیل کند.

Griseofulvin

غذاهای چرب جذب این دارو را افزایش میدهند.

Iron Salts

همراه باحبوبات، تخم‌مرغ، شیر یالبنیات مصرف نکنید زیرا برخی از ترکیبات این فرآورده‌ها ممکن است با ایجاد کمپلکس‌های نامحلول جذب آهن راکاهش دهند.

Levodopa

همراه با لوبیا، جگرگاو، شیرخشک کم‌چربی، جو دوسر و مخمر مصرف نکنید زیرا ممکن است اثربخشی دارو را کاهش دهند، هنگام مصرف این دارو یک رژیم غذائی که حاوی مقدار کمی پیریدوکسین (ویتامین B_6) است توصیه میشود.

Lincomycin

همراه با غذا یا با معده پر مصرف نکنید زیرا ممکن است سبب اسهال شود.

Lithium Carbonate

اگر بیمار رژیم غذائی کم نمک دارد یامقدار کافی املاح و مایعات دریافت نمیدارد از این دارو نباید استفاده کند. برای جلوگیری ازافزایش سمیت دارو هم آب و هم نمک مورد نیاز است.

Monoamine Oxide (MAO) Inhibitors (۲)

همراه با الکل یا نوشابه‌های الکلی، موز، لوبیا، مقدار زیاد کافئین، جوجه،

شکلات ، پنیر ، انجیر ، شیرین‌بیان ، جگر ، گوشت عمل آمده با مواد نرم کننـــده ، ماهی ، ترشی ، آناناس ، مخمر ، ماست مصرف نکنید زیرا ممکن است سبب افزایـش فشارخون شود .

Penicillins

همراه با آب میوه یا مایعات اسیدی مصرف نکنید زیرا ممکن است تجزیه دارو را تسهیل کند .

Quinidine

همراه با آنتی اسیدها یا غذاهای قلیائی مصرف نکنید زیرا خاصیت قلیائی ممکن است دفع کینیدین را کاهش دهد .

Tetracyclines

همراه با شیر ، لبنیات یا غذاهای غنی از آهن مصرف نکنید زیرا یون‌های فلزی Fe, Mg,Ca این فرآورده‌ها با دارو وترکیب شده وکمپلکس‌هائی (شلات‌هائی) میسازند که جذب‌شان بسیار کم است .

Thyroid

همراه با کلم تکمه‌ای ، کلم ، هویج ، گل کلم ، گلابی ، هلو ، اسفناج یا شلغم مصرف نکنید زیرا بعلت وجود تیواوکسازولیدون در آنها ممکن است سبب کاهش فعالیت تیروئید شوند (۳)

---

۱ ــ این علائم ناخوش‌آیند عبارتند از . تاری دید ، درد در سینه ،اشکال در تنفس ،گیجی ، برافروخته شده چهره ،زق زق شدید سر وگردن ، تهوع ،استفراغ ، ضعف .

۲ ــ Marplan, Furoxone, Eutron, Eutonyl, Parnate, Niamid Matulane, Nardil

۳ ــ درشرایط معمولی ممکن‌است مقدار یُد موجود درغذای روزانه برای‌مقابله باچنین‌عوارضی باندازه‌کافی باشد . بعلاوه پختن غذاها آنزیمهائی را که‌گواتروژن goiterogen را فعال میکنند معمولا " نابود میکند .

برچسب روی داروهای خوراکی (۱۵)

امروزه معلوم شده است که اگر مصرف برخی داروها را به ناگهان قطع کنند ممکن است عوارض نامطلوبی ایجاد کنند. از این گروه داروها میتوان وقفه‌دهنده‌های بتا آدرنرژیک، بنزودیازپین‌ها، داروهای آنتی‌کلی‌نرژیک و آنتی پارکینسونیسم و داروهای ضدفشارخون نظیر کلونیدین را نام برد. برای این گروه داروها برچسب شماره ۲۰ تهیه شده است. برطبق یک اصل درمانی همین برچسب برای داروهای پائین آورنده قند خون، ضدانعقادها و ضد تشنج‌ها توصیه شده است. گزارش شده است که پس از قطع با کلوفن هالوسیناسیون پیش‌میآید گو اینکه ممکن است این عارضه نتیجه مصرف خود دارو باشد. دیفلونیسال Diflunisal با هیدروکسید آلومینیم اثر متقابل دارد و بدینجهت جذب دیفلونیسال کاهش می‌یابد. این دارو ممکن است با سایر آنتی‌اسیدها واکنش بدهد و نیز ممکن است واکنش ندهد. از آنجائی که بیمار نمی‌داند که کدام آنتی‌اسید هیدروکسید آلومینیم دارد، بنابراین هنگام مصرف دیفلونیسال باید بیمار را از مصرف آن با کلیه آنتی‌اسیدها بازداشت. بر روی برخی داروها برچسب‌های زیادتری باید چسباند و این برچسب‌ها نه‌تنها بیمار را ازدارو گریزان میکنند بلکه چسباندن همه‌آنها بر روی یک شیشه نیز امکان ندارد.

جدول شماره ۱ ــ داروهای خوراکی که به برچسب نیاز دارند . شماره مقـابـل‌نام داروها نشانه نوع برچسب‌های لازم است که در جدول شماره۲ آمده است .

Acebutolol	1,20
Acetazolamide	1
Acetazolamide SR	1,4
Acetohexamide	2,7,20
Alcin	9
Allbee with C	10 (Yellow urine)
Allopurinol	3,20
Aloxiprin	"Contains an aspirin derivative"
Altacite tablets	9 Between meals
Aluminium hydroxide tablets	9
Aminophylline	3
Aminophylline SR or CR	4
Amitriptyline	1,2,10 (Blue-green urine)
Amitriptyline SR	1,2,4,10 (Blue-green urine)
Amoxycillin	17
Amphotericin	17
Ampicillin	6,17
Amylobarbitone	1,2
Antacid tablets	(See data sheets)
Antazoline	1,2
Aspergum	18
Aspirin	3
Atenolol	1,20
Azapropazone	3
Azathioprine	3
Azatadine	1,2
Baclofen	1,3,8
Barbiturates	1,2
Belladenal retard	1,2,4
Bellergal retard	1,2,4
Benorylate	3 (Do not take medicines containing aspirin or paracetamol with this medicine unless advised by your doctor)
Benoxaprofen	3,21
Benperidol	1,2
Benylin	1,2
Benylin with codeine	1,2
Benzhexol	20 See data sheet re administration times
Benzoctamine	1,2
Benztropine	1,2,20
Benzylpenicillin	6,17
Bephenium	6
Betahistine	3
Betamethasone	Steroid card
Bethanechol	6
Bethanidine	3
Biperiden	1,2,3,20
Bisacodyl	3,4,11
Bromocriptine	2,3
Brompheniramine	1,2
Buclizine	1,2
Butobarbitone	1,2
Butriptyline	1,2
Calcium and vitamin D	9
Carbamazepine	1,2
Carbenoxolone sodium (Biogastrone)	3
Carbenoxolone sodium (Duogastrone)	4,5 (Take with liquid)
Carbinoxamine	1,2
Carfecillin	17
Caved-S	9
Ceduran	Broken into pieces and swallowed with water
Cefaclor	17
Cephalexin	17
Cephradine	17
Chloral hydrate	1,2,15
Chlorambucil	6
Chloramphenicol	17
Chlorcyclizine	1,2
Chlordiazepoxide	1,2,20
Chlormezanone	1,2
Chlormethiazole tablets/capsules	1,2
Chlormethiazole syrup	1,2 (With water or fruit juice)
Chloroquine	3,10 (Yellow-brown urine)
Chlorpheniramine	1,2
Chlorpromazine	1,2,4,10 (Urine pink/red/brown)
Chlorpropamide	2,3,7,20 (With breakfast if only one dose daily)

Chlorprothixene	1,2
Chlortetracycline	6,12,17
Chlorthalidone	With breakfast
Cholestyramine	See data sheet
Choline theophyllinate	3
Chymoral	4,5
Cimetidine	3
Cinnarizine	1,2
Cinoxacin	17
Citrated calcium carbimide	1
Clemastine	1,2
Clindamycin	8,17
Clobazam	1,2
Clofibrate	3
Clomipramine	1,2
Clomocycline	6,12,17
Clonazepam	1,2
Clonidine (as hypotensive)	20
Cloxacillin	6,17
Codeine	2
Codis	14,18
Colistin	17
Cortisone	Steroid card
Cotrimazine	8,17
Cotrimoxazole (dispersible)	14,17
	(May be swallowed whole)
Cotrimoxazole (non-dispersible)	8,17
Cyanocobalamin	Between meals
Cyclizine	1,2
Cycloserine	1,2,17
Cyproheptadine	1,2,3
Cyproterone	1,2,3

Dantrolene sodium	1,8
Debendox	1,2
Dehydrocholic acid	3
Demeclocycline	6,12,17,21
De-Nol	5 See data sheet
Deptropine	1,2
Desipramine	1,2
Dexamethasone	Steroid card
	(Long term treatment only)
Dextromoramide	1,2
Dextroproxyphene	1,2
Diazepam	1,2,20
Dibenzepin	1,2
Dichloralphenazone	1,4,8
Dichlorofen	6
Dichlorphenamide	1
Diclofenac	3
Dicoumarol	7,19,20
Dicyclomine	1,2
Diethylpropion	6
Diflunisal	3
	(Do not take with Aluminium hydroxide preparations)
Dihydrocodeine	3
Dimenhydrinate	1,2
Dimethicone (activated tablets)	9
Dimethindene	1,2
Dimethothiazine	1,2
Diphenhydramine	1,2
Diphenhydramine capsules	1,2,3
Diphenylpyralline	1,2
Dipipanone	1,2
Dipyridamole	5
Distigmine	5
Diuretic preparations containing potassium	4
Dorbanex	10
	(Pink urine)
Dothiepin	1,2
Doxepin	1,2
Doxycycline	3,17
	(Do not take with antacids or iron preparations)
Doxylamine	1,2
Droperidol	1,2

Emepronium bromide	With food
	(As a slurry in water if swallowing is difficult)
Enteric coated preparations	4
Equagesic	18
Equivert	1,2,5
Erythromycin (not stearate)	6,17
Erythromycin stearate	3,17
Estramustine	3
Etamiphylline	3
Ethacrynic acid	3
Ethambutol	17
Ethamsylate	3
Ethionamide	3
Ethosuximide	1,3,20
Ethotoin	1,3,20
Ethylbiscoumacetate	6,7,19,20

Fefol	4,10
	(Black urine and stools)
Fenclofenac	3
Fenfluramine	1,2,5
Fenoprofen	3
Feospan	4,10
	(Black urine and stools)
Feprazone	3
Ferrograd preparations	4,5,10
	(Black urine and stools)
Ferrous fumarate	3,10,11
	(Black urine and stools)
Ferrous gluconate	3,10,11
	(Black urine and stools)
Ferrous succinate	3,10,11
	(Black urine and stools)
Ferrous sulphate	3,10,11
	(Black urine and stools)
Flucloxacillin	6,17
Fludrocortisone	Steroid card
Flufenamic acid	3
Flupenthixol	2
	(Last dose no later than 4pm)
Fluphenazine	1,2
Flurazepam	2,20
Flurbiprofen	3
Furazolidone	10,13,17
	(Rust yellow to brown urine)
Fybogel	14
Fybranta	9

Gastrocote	8,9
	(After meals)
Gaviscon	8,9
	(After meals)
Gefarnate	5
Glibenclamide	2,7,20
	(With breakfast)
Glibornuride	2,7,20
Glipizide	2,7,20
	(With food)
Gliquidone	2,7,20
Glutethimide	1,2
Glyceryl trinitrate (not SA preparations)	2,16
Glymidine	2,7,20
	(With breakfast)
Griseofulvin	2,3,17
Guanethidine	2,20

Haloperidol	1,2
Hexamine salts	3,17
Hydrocortisone	3 Steroid card
Hydroxychloroquine	3
Hydroxyzine	1,2
Hyoscine	1,2

Ibuprofen	3

	(First daily dose may be taken on an empty stomach)
Imipramine	1,2
Indomethacin	3
Iprindole	2
Iproniazid	1,13
Isocarboxazid	1,13
Isogel	3 See data sheet
Isoniazid	2,3
Isoprenaline SR	4
Isosorbide dinitrate sublings	16
Kanamycin	17
Ketazolam	1,2,20
Ketoprofen	3
Labetolol	1,20 after food
Levodopa	3,10
	(Red tinged/dark urine)
Levorphanol	1,2
Libraxin	1,2,5,20
Limbitrol	1,2,20
Lincomycin	6,17
Lipotriad	3
Lithium carbonate SR	4
Lorazepam	1,2,20
Lymecycline	6,12,17
Magnapen	6,17
Magnesium trisilicate tablets	9
Maprotiline	1,2
Mazindol	after breakfast
	(or 6 if tds) May affect ability to drive or operate machinery
Mebeverine	5
Mebhydrolin	1,2
Mecamylamine	2,3,20
Meclofenoxate	6,8
Meclozine	1,2
Medazepam	1,2,20
Mefenamic acid	3
Mefruside	Take with small amount of water
Mepacrine	3,17
Mephenesin	3
Meprobamate	1,2
Mepyramine	1,2,3
Mequitazine	1,2
Metamucil	See data sheet
Metformin	2,3,20
Methacycline	6,12,17
Methadone	1,2
Methaqualone	1,2
Methdilazine	1,2
Methenamine salts	3,17
Methoin	1,20
Methotrexate	2,5,7
Methotrimeprazine	2
Methoxyphenamine	1
Methycellulose tablets	9
Methyldopa	1,10,20
	(Urine may darken)
Methylphenidate	5
Methylprednisolone	3 Steroid card
Methyprylone	1,2
Methysergide	3
Metoprolol	1,20
Metronidazole	2,3,4,10,17
	(Dark urine)
Metyrapone	3,4
Mianserin	1,2,4
Minocycline	6,12,17
Motipress	1,2
Motival	1,2
Mysteclin	6,12,17

Nadolol	1,20
Nalidixic acid	1,3,17,21
Naproxen	3
Nefopam	1,2
Neomycin	17
Neutrolactis	To be chewed or sucked
Niclosamide	9
Nicotinic acid	3
Nicoumalone	7,19,20
Nifedepine	See data sheet
Nimorazole	2,17
Niridazole	10,17
	(Brown urine)
Nitrazepam	2,20
Nitrofurantoin	3,10,17
	(Brown urine)
Nomifensine	1,2
Normacol preparations	See data sheet
Nortriptyline	1,2
Novobiocin	17
Nulacin	To be chewed or sucked
Nutrizym	3,4
Nystatin	17
Opipramol	1,2
Optimax	1,9
Orphenadrine salts	20
Oxazepam	1,2,20
Oxpentifylline	3
Oxprenolol	1,20
Oxypertine	1,2,3
Oxyphenbutazone	3
Oxytetracycline	6,12,17
Pancreatin capsules	Sprinkle contents on food
Papaveretum	1,2
Paramethadione	1,2,20,21
Pargyline	1,13
Penamecillin	6,17
Penicillamine	6
	(Do not take with iron preparations)
Pentaerythritol tetranitrate	2,5
Pentazocine	1,2,3
Pentobarbitone	1,2
Perhexilene	1
Pericyazine	1,2
Perphenazine	1,2
Pethidine	1,2
Phenazocine	1,2
Phenazopyridine	5,10
	(Red/orange urine)
Phenelzine	1,13
Phenethicillin	6,17
Phenformin	2,3,20
Phenindamine	1,2
	(Last dose no later than 4pm)
Phenindione	7,19,20
Pheniramine	1,2
Phenmetrazine	6
Phenobarbitone	1,2
Phenoxymethylpenicillin	6,17
Phenylbutazone	3
Phenytoin	2,3,8,10,20
	(Urine pink/red/brown)
Phthalylsulphathiazole	17,19
Pimozide	2
Pindolol	1,20
Piptalin elixir	15 minutes before meals
Pivmecillinam	3,17
Pizotifen	1
Polymethylsiloxane	5,9
Polythiazide	3
Potassium chloride	3,11
Potassium chloride SR	3,4
Potassium clorazepate	1,2,20
Prazosin	1,3,20
Prednisolone	3 Steroid card

Prednisone	3 Steroid card
Prenylamine	4
Primaquine	3,17
Primidone	1,2,20
Probenecid	7,8
Procarbazine	2
Prochlorperazine	1,2
Procyclidine	3,20
Proguanil	3 With water
Promazine	1,2
Promethazine	1,2,3
Propantheline	5
Propicillin	6,17
Propranolol	1,20
Protriptyline	1,2
Prothionamide	3,20
Quinalbarbitone	1,2
Quinidine	3,20
Reserpine	1,2,3
Rifampicin	6,10
	(Urine, sputum, lachrymal secretions—red)
Rifinah	6,10
	(Urine,sputum, lachrymal secretions—red)
Rimactazid	6,10
	(Urine, sputum, lachrymal secretions—red)
Salsalate	3
Senna	10
	(Urine and faeces yellow)
Slow release preparations	4
Sodium cellulose phosphate	See data sheet
Sodium chloride tablets	14
Sodium cromoglycate	See data sheet
Sodium fluoride	11
Sodium fusidate	3,17
Sodium aminosalicylate	3,7,17
Sodium valproate	3,4,20
Sotolol	1,6,20
Spiramycin	17
Spironolactone	3 and 1,2
	if dose is more than 400mg/day
Streptotriad	8
Succinylsulphathiazole	17,19
Sulindac	3
Sulphadiazine	8,17
Sulphadimethoxine	8,17
Sulphametapyrazine	14
Sulphamethoxypyridazine	8,17

Sulphasalazine	8,10,17
	(Urine reddish-yellow)
Sulphathiazole	8,17
Sulphinpyrazone	3,7,8
Talampicillin	17
Tedral	3
Temazepam	2,20
Tetracycline	6,12,17
Tetracycline SR	4,12,17
Thenyldiamine	1,2
Theophylline	3
Thiabendazole	1,3
Thiethylperazine	1,2
Thiopropazate	1,2
Thioproperazine	1,2
Thioridazine	1,2
Thiothixene	1,2
Thyroxine	Before breakfast
Tigloidine	3
Timolol	1,20
Tofenacin	1,2
Tolazamide	2,3,7,20
	With breakfast
Tolazoline	3
Tolbutamide	2,3,7,20
Tolmetin	3
Tranylcypromine	1,13
Treosulphan	4
Triamcinolone	Steroid card
Triampterene	3,10
	(Urine blue)
Triazolam	2,20
Triclofos	1,2,4
Trifluoperazine	1,2
Trifluperidol	1,2
Trimeprazine	1,2
Trimethoprim	17
Trimipramine	1,2
Triominic	1,2,4
Triprolidine	1,2,3
Troxidone	1,2,20,21
L-tryptophan	1 (and 3 if nausea occurs)
Viloxazine	3
Viprynium	4,10
	(Faeces red)
Warfarin	7,19,20

جدول شمارهٔ ۲ ــ راهنمای برچسب‌ها

۱ ــ احتیاط. این دارو ممکن سبب خواب آلودگی شود در صورت بروزخواب آلودگی از رانندگی یا کار با ماشین‌ها خودداری کنید.

۲ ــ احتیاط. هنگام مصرف این دارو از نوشیدن الکل خودداری کنید

۳ ــ این دارو را همراه یا پس از غذا میل کنید.

۴ ــ احتیاط. دارو را نجوید. همراه با کمی آب فرو برید.

۵ ــ این دارو را نیمساعت پیش از غذا مصرف کنید.

۶ ــ دارو را یکساعت پیش از غذا یا با معده خالی مصرف کنید.

۷ ــ همزمان با این دارو ازآسپیرین‌استفاده نکنید مگر اینکه پزشک توصیه کرده باشد.

۸ ــ این دارو را با یک لیوان آب میل کنید.

۹ ــ دارو را بجوید سپس فروبرید.

۱۰ ــ این دارو ممکن است ادرار یا مدفوع را رنگین کند.

۱۱ ــ همزمان بااین‌دارو از شیر یاداروهای‌مخصوص سوءهضم استفاده‌نکنید.

۱۲ ــ همزمان با این دارو از شیر، داروهای مخصوص سوءهضم یافرآورده‌های حاوی آهن استفاده نکنید.

۱۳ ــ احتیاط. حاوی‌وقفه‌دهنده‌های‌منوآمین‌اکسیداز MAOI. دستورالعمل استفاده از دارو را بدقت بخوانید.

۱۴ ــ پیش از مصرف دارو آنرا در آب حل کنید.

۱۵ ــ خوب با آب رقیق کنید.

۱۶ ــ بگذارید در دهان حل شود.

۱۷ ــ از این دارو در فواصل منظم استفاده کنید. دوره زمانی توصیه شده‌را بپایان برسانید.

۱۸ ــ این فرآورده حاوی آسپیرین است.

۱۹ ــ همراه با این دارو از پارافین مایع (مانند MILPAR) استفاده‌نکنید.

۲۰ ــ استفاده از این دارو را متوقف نکنید مگر طبق توصیه پزشک.

۲۱ ــ این دارو ممکن است نسبت به نور حساسیت ایجاد کند.

(۱۳)
غلظت‌خونی داروها

اعداد این جدول از منابع مختلف علمی گردآوری شده و یا حاصل تجارب شخصی نویسنده است . به این اعداد نباید همچون اعداد ثابت و مطلقی نگریست بلکه باید همچون یک راهنما هنگام ارزیابی یک‌مورد بخصوص‌مورد استفاده‌قرار گیرند .

این ارقام ممکن است در اثر مقدارمصرف دارو ، راه تجویز ، اختلاف درجذب ، سن و جنس ، تحمل داروئی ، روش اندازه‌گیری ، حالت بیماری‌وغیره‌تغییرپیداکند. استفاده کنندگان از این جدول باید برای کسب اطلاعات‌بیشتر درمورد این‌ارقام ، مراجع و منابع آنها و نیز عواملی که برغلظت‌خونی داروها اثرمیگذارد به دومرجع زیر رجوع کنند .

1– Wecht's Legal Medicine Annual 1973

2– Winek's Toxicology Annual 1974

تعریف غلظت‌های خونی

غلظت خونی درمانی . وینک و فاکتمن Fochtman غلظت‌خونی درمانی‌راچنین تعریف کرده‌اند : غلظت داروی موجود در خون (سرم یا پلاسما) پس‌ازمصرف مقدار موثر آن از نظر درمانی در انسان .

غلظت خونی سمی . غلظت دارو یاماده شیمیائی موجود در خون (سرم یا پلاسما) که با علایم شدید سمیت در انسان همراه است .

غلظت خونی کشنده. غلظت دارو یا ماده شیمیائی موجود در خون (سرم یا پلاسما) که مرگ ناشی از مصرف آن گزارش شده است ، یا بحدی بالاتر از غلظت درمانی یا سمی آن بوده است که میتوان پیش‌بینی کرد که سبب مرگ انسان شود .

ترکیب	غلظت درمانی یا عادی	غلظت سمی	غلظت کشنده
Acetaminophen (Tylenol)	1 - 2 mg%	40 mg%	150 mg%
Acetazolamide (Diamox)	1 - 1.5 mg%	...	...
Acetohexamide (Dymelor)	2.1 - 5.6 mg%	...	...
Acetone	...	20 - 30 mg%	55 mg%
Aluminum	0.013 mg%	...	...
Aminophylline (Theophylline)	1 - 2 mg%	...	...
Amitriptyline (Elavil)	5 - 20 mcg%	40 mcg%	1.0 - 2.0 mg%
Ammonia	50 - 170 mcg%	...	...
Amobarbital (Amytal)	0.1 mg%	0.7 mg%	2 mg%
Amphetamine	2 - 3 mcg%	...	0.2 mg%
Arsenic	0.0 - 0.002 mg%	0.1 mg%	1.5 mg%
Barbiturates			
short acting	0.1 mg%	0.7 mg%	1 mg%
intermediate acting	0.1 - 0.5 mg%	1 - 3 mg%	3 mg% & >
phenobarbital	ca. 1.0 mg%	4 - 6 mg%	8 - 15 mg% &
barbital	ca. 1.0 mg%	6 - 8 mg%	10 mg% & >
Benzene	...	any measurable	0.094 mg%
Beryllium	tissue levels generally used (lung & lymph)	...	...
Boron (Boric acid)	0.08 mg%	4 mg%	5 mg%
Bromide	5.0 mg%	50 - 150 mg% (17 mEq./L)	200 mg%
Brompheniramine (Dimetane)	0.8 - 1.5 mcg%	...	...
Butabarbital (Butisol)	0.1 - 0.5 mg%	1 - 3 mg%	> 3 mg%
Cadmium	0.01 - 0.02 mcg%	0.005 mg%	...
Caffeine	0.5 - 1 mg%	...	...
Carbamazepine (Tegretol)	0.2 mg%	0.8 - 1.0 mg%	...
Carbon monoxide	1 %	15 - 35%	50%
Carbon tetrachloride	....	2 - 5 mg%	...
Carisoprodol (Rela, Soma)	1.0 - 4.0 mg%	...	...
Chloral hydrate (Noctec)	1.0 mg%	10 mg%	25 mg%
Chlordiazepoxide (Librium)	0.1 - 0.3 mg%	0.55 mg%	2 mg%
Chloroform	...	7 - 25 mg%	39 mg%
Chlorpheniramine	...	2 - 3 mg%	...
Chlorpromazine (Thorazine)	0.05 mg%	0.1 - 0.2 mg%	0.3 - 1.2 mg%
Chlorpropamide (Diabinese)	3.0 - 14.0 mg%	...	...
Chlorprothixine (Taractan)	0.004 - 0.03 mg%	...	...
Codeine	2.5 mcg%	...	20 - 60 mcg%
Copper	100 - 150 mcg%	540 mcg%	...
Cyanide	0.015 mg%	...	0.5 mg% & >
DDT	1.3 mcg%	...	...
Desipramine (Norpramin)	.059 - 0.14 mg%	...	1 - 2 mg%
Dextropropoxyphene (Darvon)†	5 - 20 mcg%	0.5 - 1 mg%	5.7 mg%
Diazepam (Valium)	0.05 - 0.25 mg%	0.5 - 2.0 mg%	2.0 mg% & >
Dieldrin	0.15 mcg%	...	...
Digitoxin	2 - 3.5 mcg%	...	32 mcg%
Digoxin	0.06 - 0.13 mcg%	0.20 - 0.90 mcg%	...
Dinitro-o-Cresol	...	3 - 4 mg%	7.5 mg%
Diphenhydramine (Benadryl)	0.5 mg%	1 mg%	...
Diphenylhydantoin (Dilantin)	0.5 - 2.2 mg%	5 mg%	10 mg% & >
Diphenoxylate (Lomotil)	1.0 mcg%	...	...

ترکیب	غلظت درمانی یا عادی	غلظت سمی	غلظت کشنده
Disopyramide (Norpace)	0.3 - 0.8 mg%	...	...
Disulfiram (Antabuse)	0.25 mg%	...	...
Divinyl Oxide		...	70 mg%
Doxepin	15 mcg%	...	1.5 mg%
Ephedrine	10.0 mcg%	...	...
Ethanol	...	150 mg%	350 mg% & >
Ethchlorvynol (Placidyl)	ca. 0.5 mg%	2 mg%	15 mg%
Ethinamate (Valmid)	0.5 - 1.0 mg%	...	...
Ethosuximide (Zarontin)	2.5 - 7.5 mg%	...	...
Ethyl chloride	...	...	40 mg%
Ethyl ether	90 - 100 mg%	...	140 - 189 mg%
Ethylene glycol	...	150 mg%	200 - 400 mg%
Fluoride	0 - 0.05 mg%	...	0.2 mg%
Flurazepam (Dalmane)	0.05 - 0.15 mg%	0.25 mg%	...
Glutethimide (Doriden)	0.02 mg%	1 - 8 mg%	3 - 10 mg%
Gold (Sodium aurothiomalate)	300 - 600 mcg%	...	...
Haloperidol (Haldol)	0.05 - 0.9 mcg%	1 - 4 mg%	
Halothane (Fluothane)	0.18 mg%	...	20 mg%
Hydrogen sulfide	...	...	0.092 mg%
Hydromorphone (Dilaudid)	...	...	0.01 - 0.03 mg%
Imipramine (Tofranil)	0.005 - 0.016 mg%	> 0.07 mg%	0.2 mg%
Iron	50 mg% (RBC)	0.6 mg% (serum)	...
Isopropanol	...	340 mg%	...
Lead	0.005 - 0.07 mg%	0.13 mg%	...
Lidocaine	0.2 - 0.6 mg%	0.90 mg%	2.5 mg%
Lithium	0.42 - 0.83 mg% (0.6 - 1.2 mEq./L)	1.39 mg% 2.0 mEq./L)	1.39 - 3.47 mg% (2.0 - 5.0 mEq./L)
Lorazepam (Antivan)	2.0 mcg%	...	...
L.S.D.	...	0. 0.4 mcg%	...
Magnesium	1.5 - 2.5 mg%	...	5 mg%
Manganese	0.015 mg%	0.46 mg%	...
Meperidine (Demerol)	60 - 65 mcg%	0.5 mg%	ca. 3 mg%
Meprobamate	1 mg%	10 mg%	20 mg%
Mercury	0.006 - 0.012 mg%	...	...
Methadone	48 - 86 mcg%	0.2 mg%	0.4 mg% & >
Methamphetamine	...	0.5 mg%	4 mg%
Methanol	...	20 mg%	89 mg% & >
Methapyrilene	0.2 - 0.4 mg%	3 - 5 mg%	5 mg% & >
Methaqualone (Quaalude)	0.5 mg%	1 - 3 mg%	3 mg% & >
Methsuximide (Celontin)	0.25 - 0.75 mg%	...	...
Methylene chloride	...	...	28 mg%
Methylenedioxyamphetamine (MDA)	...	...	0.4 - 1.0 mg%
Methyprylon (Noludar)	1.0 mg%	3 - 6 mg%	10 mg%
Morphine	0.01 mg%	...	0.005 - 0.4 mg% (free morphine from heroin)
Nickel	0.041 mg%	...	...
Nicotine	...	1 mg%	0.5 - 5.2 mg%
Nitrofurantoin (Furadantin)	0.18 mg%	...	...
Nortriptyline (Aventyl)	12 - 16 mcg%	0.5 mg%	1.3 mg%
Orphenadrine	0.2 mg%	...	0.4 - 0.8 mg%
Oxalate	0.2 mg%	...	1.0 mg%

ترکیب	غلظت درمانی یا عادی	غلظت سمی	غلظت کشنده
Oxazepam (Serax)	0.1 mg%	...	...
Papaverine	0.1 mg%	...	...
Para-methoxyamphetamine (PMA)	...	...	0.2 - 0.4 mg%
Paraldehyde	ca. 5.0 mg%	20 - 40 mg%	50 mg%
Pentazocine (Talwin)	0.014 - 0.016 mg%	0.2 - 0.5 mg%	1 - 2 mg%
Perphenazine (Trilafon)		0.1 mg%	
Phencyclidine	...	...	0.1 mg%
Phensuximide (Milontin)	1 - 1.9 mg%	...	...
Phenylbutazone (Butazolidin)	ca. 10 mg%	...	...
Phosphorus	tissue levels usually used		
Primidone (Mysoline)	1.0 mg%	5 - 8 mg%	ca. 10 mg%
Probenecid (Benemid)	10 - 20 mg%	...	...
Procainamide	0.6 mg%	1 mg%	...
Prochlorperazine (Compazine)	...	0.1 mg%	...
Promazine (Sparine)	...	0.1 mg%	...
Propoxyphene	5 - 20 mcg%	0.5 - 2 mg%	5.7 mg%
Propranolol (Inderal)	0.0025 - 0.02 mg%	...	0.8 - 1.2 mg%
Propylhexedrine (Benzedrex)	...	...	0.2 - 0.3 mg%
Quinidine	0.3 - 0.6 mg%	ca. 1.0 mg%	3 - 5 mg%
Quinine	...	...	1.2 mg%
Salicylate (acetylsalicylic acid)	2 - 10 mg%	15 - 30 mg%	50 mg%
Sulfadiazine	8 - 15 mg%	...	...
Sulfadimethoxine (Madribon)	8 - 10 mg%	...	...
Sulfaguanidine	3 - 5 mg%	...	...
Sulfanilamide	10 - 15 mg%	...	...
Sulfisoxazole (Gantrisin)	9 - 10 mg%	...	...
Strychnine	...	0.2 mg%	0.9 - 1.2 mg%
Theophylline	1 - 2 mg%	...	...
Thiocyanate	8 - 14 mg%	...	...
Thiothixene (Navane)	1.0 mcg%	...	...
Thioridazine (Mellaril)	0.10 - 0.15 mg%	1.0 mg%	2 - 8 mg%
Tin	0.012 mg%	...	...
Tolbutamide (Orinase)	5.3 - 9.6 mg%	...	...
Toluene	...	...	1.0 mg%
Tribromoethanol	...	...	9 mg%
Trichloroethane	...	...	10 - 100 mg%
Trimethadione (Tridione)	1.2 mg%	...	...
Trimethobenzamide (Tigan)	0.1 - 0.2 mg%	...	...
Uric Acid	3 - 7 mg%	...	...
Valproic Acid/Sodium Valproate (Depakene)	1 - 10 mg%	20 mg%	...
Warfarin	0.1 - 1.0 mg%	...	...
Zinc	68 - 136 mcg%	...	...
Zoxazolamine (Flexin)	0.3 - 1.3 mg%	...	...

† غلظت کبدی بیست برابر بیشتر از غلظت خونی است.

راهنمای دفع داروها از شیر (۴)

در این راهنما ۱۰۰ داروی پرمصرف و دفع آنها از شیر مادر و جذبشان توسط کودک آورده شده است.

البته این راهنما را باید در پرتو تحقیقات و بررسیهای جدید پیوسته تکمیل و در آن تجدیدنظر کرد. داروهای این راهنما به سه دسته تقسیم شده‌اند.

بمنظور سادگی و سهولت رجوع به این راهنما، فقط داروهایی که بیشتر برای مادران شیرده تجویز میشود، آورده شده است. این فهرست شامل همه‌داروها نیست.

داروها برحسب خاصیت فارماکولوژیک فهرست شده‌اند و درجائی که مدارک موجود نشان میدهد که داروهای متعلق به یک گروه ژنریک خواص مشابهی دارندنام ژنریک آورده شده است (مانندفنوتیازین‌ها، آمینوگلوکوزیدها، داروهای‌ضدافسردگی تری‌سیکلیک).

این داروها در پرتو اطلاعات و مدارک موجود تقسیم‌بندی شده‌اند و درجائی که اطلاعات لازمه کافی نبوده است، داروها جزو آنهایی آمده است‌که هنگام مصرف آن نوزاد باید تحت مراقبت و پی‌گیری دقیق قرار گیرد. فهرست الفبائی داروهای این جدول در صفحات بعد آمده است.

دفع داروها از شیر

تقسیم بندی	۱ ــ آنهائی که برای مادران شیرده نامناسب‌اند.	۲ــ آنهائی که درصورت مصرف نوزاد باید تحت مراقبت و پیگیری دقیق قرار گیرد.	۳ ــ آنهائی که تجویزشان برای مادران شیرده مناسب است.
داروهای ضد درد و ضد التهاب	اندومتاسین فنیل‌بوتازون	سالیسیلات‌ها**	کدئین دکستروپروپوکسی‌فن اسید فلوفنامیک ایبوپروفن کتوپروفن اسید مفنامیک پاراستامل پنتازوسین پتیدین سالیسلات‌ها*
داروهای ضد عفونت و آنتی‌بیوتیک‌ها	کلرامفنیکل ایزونیازید اسید نالیدیکسیک تتراسیکلین‌ها	آمینوگلیکوزیدها کوتریموکسازول اتامبوتال سولفونامیدها	سفالوسپورین‌ها کلیندامیسین اریترومیسین لینکومیسین مترونیدازول نیروفورانتوئین* پنی سیلین‌ها ریفامپیسین
داروهای ضد انعقاد و داروهائی که بردستگاه قلبی عروقی اثرمیکنند	فنیندیون رزرپین	مسددهای بتا نیکومالون وارفارین مدرهای‌تیاریدی	کلونیدین دیگوکسین هپارین متیل‌دوپا
داروهای موثر بردستگاه اعصاب مرکزی	لیتیم میروبامات	باربیتورات‌ها** بنزودیازپین‌ها** کاربامازپین فنوتیازین‌ها** فنیتوئین پریمیدون والپروات سدیم	باربیتورات‌ها* بنزودیازپین‌ها* کلرال دی کلرال فنازون وقفه دهنده‌های‌منوآمین‌اکسیداز فنوتیازین‌ها* داروهای ضد افسردگی تری سیکلیک
هورمون‌ها و داروهایی که بردستگاه اندوکرین اثر میکنند.	کاربیمازول یدورها استروژن‌ها	کورتیکوستروئیدها* داروهای‌خوراکی پائین آورنده قند خون پروژستوژن‌ها تیروکسین	کورتیکوستروئیدها*

متفرقه	آنتراکیتون آنتی‌نئوپلاستیک‌ها آروس ویامس سا ویتامین A + D	پروبانتلین	ضد اسیدها آنتی هیستامین‌ها بیساکودیل مسهل‌های حجم‌افزا اسیدفولیک آهن ویتامین C + B
توضیح	این داروها برای تجویز جهت مادران شیرده نامناسب‌اند زیرا: - اثر سمی داشته‌اند. - برمبنای اطلاعات تئوریک اثر سمی پیش‌بینی میشود. - ترشح شیر را کاهش میدهد.	این داروها را فقط هنگامی میتوان برای مادران شیرده تجویز کرد که نوزاد جهت بررسی عوارض جانبی دقیقا تحت مراقبت و پی‌گیری باشد. - این داروها ممکن است از شیر مادر دفع شده و توسط کودک جذب شود. - برای طبقه‌بندی کردن دارو، جز داروهای بی‌خطر اطلاعات کافی در دست نیست. ** با مقدار مصرف زیاد.	این داروها را میتوان برای مادران شیرده تجویز کرد زیرا: - از شیر دفع نمیشود. - کودک آنها را جذب نمیکند. - با مقادیر مصرف کم اثر آشکاری بر روی نوزاد ندارد. * با مقادیر مصرف کم * بجز افراد مبتلا به کمبود گلوکز - ۶ فسفات دهیدروژناز

(۴)

فهرست الفبائی دفع داروها از شیر

تجویز این داروها برای مادران شیرده نامناسب است

ANTHRAQUINONE
ANTINEOPLASTICS
ATROPINE
CARBIMAZOLE
CHLORAMPHENICOL
ERGOTAMINE
INDOMETHACIN
IODIDES
ISONIAZID
LITHIUM
MEPROBAMATE
NALIDIXIC ACID
OESTROGENS
PHENINDIONE
PHENYLBUTAZONE
RESERPINE
SENNA
TETRACYCLINES
VITAMINS A+D

این داروها را فقط هنگامی میتوان برای مادران سیرده تجویز کرد که نوزاد جهت بررسی عوارض جانبی دقیقا " تحت مراقبت و پی‌گیری باشد .

AMINOGLYCOSIDES
BARBITURATES
BENZODIAZEPINES
BETA BLOCKERS
CARBAMAZEPINE
CORTICOSTEROIDS
COTRIMOXAZOLE
ETHAMBUTOL

HYPOGLYCAEMICS, ORAL
NICOUMALONE
PHENOTHIAZINES
PHENYTOIN
PRIMIDONE
PROGESTOGENS
PROPANTHELINE
SALICYLATES
SODIUM VALPROATE
SULPHONAMIDES
THIAZIDE DIURETICS
THYROXINE
WARFARIN

این داروها را میتوان برای مادران شیرده تجویز کرد .

ANTACIDS
ANTIHISTAMINES
BARBITURATES
BENZODIAZEPINES
BISACODYL
BULK LAXATIVES
CEPHALOSPORINS
CHLORAL
CLINDAMYCIN
CLONIDINE
CODEINE
CORTICOSTEROIDS
DEXTROPROPOXYPHENE
DICHLORALPHENAZONE
DIGOXIN
ERYTHROMYCIN
FLUFENAMIC ACID
FOLIC ACID
HEPARIN
IBUPROFEN
IRON
KETOPROFEN
LINCOMYCIN
MAOI
MEFENAMIC ACID
METHYLDOPA
METRONIDAZOLE
NITROFURANTOIN
PARACETAMOL
PENICILLINS
PENTAZOCINE
PETHIDINE
PHENOTHIAZINES
RIFAMPICIN
SALICYLATES
TRICYCLICS
VITAMINS B + C

داروها در آبستنی (۵)

داروهای زیر داروهائی هستند که اگر برای زنان آبستن تجویز شوند اثرهای زیانبخشی بر روی جنین و نوزاد دارند. بجز ملکولهای بزرگ و دارای بارالکتریکی دائمی (مانند هپارین) داروهای تجویز شده برای زنان آبستن از جفت گذشته و وارد جریان خون نوزاد میشوند. " سد جفت " از جنین بسیار کم حفاظت میکنـد. از آنجائیکه مطالعات کنترول شده در این زمینه بسیار کم است رابطه بین داروها و اثر تراتوژنیک آنها با استفاده از گزارش‌ها و تجزیه‌وتحلیل آنهاانجام‌گرفته‌است که در نتیجه تعیین یک دارو را بعنوان تراتوژن بسیار مشکل میسازد.

غالبا " برای تحقیق در مورد اثر تراتوژنیک داروها بر روی حیوانات مطالعه شده است. در حالیکه این بررسی‌ها اطلاعات گرانبهائی را درمورد مکانیسم وزمان اثر تراتوژنیک آنها ارائه میدهد، اما برای تشخیص تراتوژن‌های احتمالی انسان یا پـذیـرش ایـمـنـی مصـرف داروها بهنگام آبستنی نباید بآنها اعتماد کرد.

اختلاف زیادی در شیوه پاسخ گونه‌های مختلف حیوانات نسبت به یک دارو وجود دارد. مثلا " تالیدومید که یک تراتوژن انسانی معروف است مرحله اول آزمایشهای حیوانی را گذراند، در حالیکه برعکس آن مکلیزین که میزان عوارض نامطلوب آن در جانوران بسیار زیاد بود ظاهرا " برای انسان بیخطر است.

حساس‌ترین مرحله ناهنجاری‌های جنینی ناشی ازداروها زمانی‌است‌که‌اعضاء جنین در حال شکل گرفتن هستند (مرحلهٔ ارگانوژنز) که تقریبا " در سه ماهه اول

آبستنی است . در این دوران مادر نباید هیچ داروئی را مصرف کند . مگر اینکه مطلقا " برای سلامتی او ضروری باشد . زمان دیگری که داروهانباید مصرف شوندمگر اینکه ضروری باشد هنگام نزدیک شدن زایمان است . داروهائی که مادر میخورد و سپس به جریان خون جنین وارد میشود اثر فارماکولوژیک خود را بر روی هر دونفر ظاهر میکنند . اما این بافت‌های مادر است که بیشترین مقدار دارو را تجزیه و دفع میکنند . هنگامیکه جنین از مادر جدا میشود برای تجزیه و دفع داروها باید بر فرآیندهای متابولیک خود تکیه کند . از آنجائیکه راههای متابولیک وترشحی نوزاد کاملا " رشد نکرده است بنابراین اثر داروها غالبا " طولانی و شدید است .

دارو یا داروهائی که تصور میشود بیشترین خطرها را دارند با حروف **سیاهتر** چاپ شده‌اند .

مراجع	عوارض جانبی	دارو
۴ — ۷	عوارض جمجمه‌ای ـ چهره‌ای ، عضلانی وقلبی باضافه وقفه دررشد داخل‌رحمی ،تاخیردر رشدجنین وتاخیر بموقع عقلی در اثر "سندروم الکل بر جنین" ناشی ازمجاورت طولانی داخل رحم باغلظت‌های‌زیاد الکل آنچنانکه درمادران‌الکلی دیده میشود . افزایش میزان سقط جنین و مرگ و میر در نزدیکی تولد نیز مربوط به الکلیسم است . برخی از نوزادان علایم تحریک‌پذیری و برخی دیگر علایم قطع الکل‌را نشان میدهند . مصرف کم و گهگاه الکل هیچگونه مشکل عمده‌ای را پیش نمی‌آورد و استعمال آن منع نمیشود.	Alcohol
	رجوع کنید به Streptomycin	Aminoglycoside Antibiotics
۱و۴—۶	افزایش خطر بد شکل‌های جنینی مادرزاری به تعداد بیشمارگزارش‌شده است . دستگاه قلبی ـ عروقی و مجرای صفراوی بیشترین ناهنجاریها را دارند . کیفیت این‌گزارشهاپائین است بااینحال رعایت زیاد احتیاط باز هم قابل توصیه است .	Amphetamines
۱و۲و۴ — ۶	مردانه شدن جنین موءنث و بهم پیوستن‌لبهای فرج (بزرگ شدن کلیتوریس) پس از مصرف زیادو طولانی تستوسترون ، متیل تستوسترون و ترکیبات مشابه دیده است .	Androgens
۱و۲ر۴ — ۶	علاوه بر احتمال کاهش فعالیت دستگاه‌اعصاب مرکزی و تنفس در نوزادانی که مادرانشان بیهوشی	Anesthetics, Inhalation

مراجع	عوارض جانبی	دارو
	عمومی دریافت کرده‌اند ، بهنگامیکه دردوران آبستنی مادر در معرض استنشاق مکرر بیهوشداروهای عمومی قرار گرفته است وقوع سقط و ناهنجاریهای جنینی افزایش می‌یابد ، زیانبخش‌ترین بیهوشدارو مشخص نشده است .	
۲و۴و۵	استفاده از مقادیر زیاد بیحس‌کننده‌های موضعی بهنگام زایمان سبب دپرسیون و کند شدن ضربان‌قلب جنین‌ونوزاد ونیز وقفه وتشنج وی می‌گردد .کند شدن ضربان قلب ممکن است پس از ۲۵ درصد بلوک پاراسرویکال مشاهده شود .	Anesthetics, Local
۲و۴–۶	برخی از محققین معتقدند که در سه ماههٔ اول آبستنی نباید از فنیندیون استفاده شود زیرا احتمال بد شکلی‌جنین درمیان‌است (ماندرشدناقص بینی) ، اما این رابطه زیاد مستند نیست ، زیرا هم مشتقات ایندان‌دیون و هم مشتقات کومارین جنین و نوزادرا مستعد به‌خونریزی‌میکنند و درماه‌آخرآبستنی درصورت امکان باید با هپارین جایگزین شوند .	Anticoagulants, Oral
۱و۳ – ۶و۸	اختلالات‌روانی‌وجسمی درجنین ، ناهنجاریهای جمجمه‌ای – چهره‌ای و عضلانی (بویژه ناخن و یا کم رشدی بندهای انتهائی انگشتان) ایجاد " سند روم هیدانتوئین درجنین "میکند که تا ۳۰ درصدنوزادان زنانی راکه در دوران آبستنی مشتقات هیدانتوئین (مانند فنیتوئین) مصرف میکردند مبتلا میسازد .	Anticonvulsants

مراجع	عوارض جانبی	دارو
	داروهای ضد تشنج دیگر نیزممکن است ناهنجاریهای جنینی ایجاد کنند ، اما مدارک کافی برای نمایش اثر آشکار آنها وجودندارد . این داروها را فقط درمواردی که مطلقا" ضروری است باید برای زنان آبستن تجویز کرد .	
۱و۴–۶	استفاده از داروهای پائین‌آورنده قند خون بویژه کلرپروپامید میتواند درنوزادان هیپوگلیسمی درازمدت ایجاد کنــد . در صورت امکان زنان دیابتی آبستــن باید بجای داروهای خوراکی پائین آورنده قند خون با انسولین درمان شوند .	Antidiabetic Agents
۱ – ۶	این ترکیبات برای کاهش رشد بافت‌های نئو– پلاستیک که بسرعت تکثیر می‌یابند بکار برده‌میشود . جنین انسان نیز بسرعت رشد می‌کند و انتظار میرود که این داروها اثر زیان‌آوری بر روی آن داشته‌باشند، با اینحال در مورد این گروه داروهابجزآمینوپترین ، عوارض سوءکمی برروی‌جنین گزارش‌شده است . علیرغم فقدان مدارک دراین‌مورد ،داروهای آنتی‌نئوپلاستیک را باید بعنوان ترکیبات بالقوه تراتوژن محسوب کرد و مصرف آنها را در بیماران آبستن بویژه سه‌ماهه‌اول باید به حداقل رساند .	Antineoplastic Agents
	به Salicylates رجوع کنید .	Aspirin
	به Propranolol رجوع کنید .	Beta-Adrenergic Blockers

دارو	عوارض جانبـــی	مراجع
Chloroquine	ممکن است که اوتوتوکسیک ototoxic باشد ، اما تعداد واقعی موارد گزارش شده باندازه‌کافی نیست تا دقیقا" به دارو نسبت داده شود .	۱و۲و۴ — ۶
Chlorpropamide	به Antidiabetic Agents رجوع کنید .	
Corticosteroids	بااینکه استفاده ازآنها دردوران‌آبستنی بیخطر است ، احتمال سقط جنین و نقایص مادرزای (مانند بازماندن سقف‌دهان) افزایش می‌یابد .کاهش فعالیت غشاء غده کلیوی در جنین حتی با درمان درازمدت نادر است ، از استفاده غیراساسی از این داروها بهنگام آبستنی باید خودداری شود .	۱و۲و۴ ۵
Diethylstilbestrol	به Estrogens رجوع کنید .	
Estrogens	نوزادان دختر در زنانی که در دوران آبستنی برای جلوگیری از سقط‌دی اتیل بسترول دریافت میکردند در سنین ۲۴ — ۱۳ سالگی به مقدارزیادی‌در معرض ابتلاء به آدنوز مهبل و آدنوکارسینوم مهبل و دهانه‌گردن زهدان قراردارند و باید بطور منظم برای بررسی علایم این ناراحتی‌ها معاینه شوند . ظاهرا" در سه ماهه اول آبستنی بیش از هر موقع دیگر آسیب پذیر است . پس از ۱۸ هفته از آغاز آبستنی‌کسانی‌که از این ترکیبات استفاده میکردند هیچگونه علایمی نشان ندادند . درحالیکد اثر استروژن‌های سنتتیک‌یا	۱و۴ — ۶و۹

مراجع	عوارض جانبی	دارو
	طبیعی دیگر بطور آشکاری مشخص نشده‌اند ، احتمال بروز خطر در نوزادان و فقدان تاثیر درمانی استفاده از استروژن‌ها را بهنگام آبستنی اگر چه ممنوع نسازد، قابل توصیه نمیکند .	
	رجوع کنید به Progestogens	Ethisterone
۲و۴و۵	تصور میشود که هگزامتونیم تجویز شده در نزدیکی زایمان عامل چندین مورد ایلئوس فلجی نوزادان باشد . از مصرف سایر مسددهای گانگلیونی (مانند مکامیل آمین ،تری متاپان) نیز بعلت احتمال بروز عوارضی مشابه ، باید خودداری کرد .	Ganglionic Blocking Agents
	رجوع کنید به Ganglionic Blocking Agents	Hexamethonium
۲ — ۶	خوردن مداوم یدورها ممکن است سبب بروز گواتر و هیپوتیروئیدیسم درنوزادان شود .گواترممکن است بقدری بزرگ باشد که بطور مکانیکی نای یا مری را مسدود سازد .تیروئیدجنین تقریبا "درچهاردهمین هفته آبستنی شروع بکار میکند ، بنابراین استفاده از یدورها تا پیش از این زمان نباید سبب گواتر شود .	Iodide
۱ — ۶	ید رادیواکتیو در تیروئید جنین و نیز تیروئید مادر تجمع پیدامیکند . هنگامی‌که پس‌از چهاردهمین هفته آبستنی مصرف شود ممکن است سبب هیپو —	Iodine, Radio active (^{131}I)

مراجع	عوارض جانبـــی	دارو
	تیروئیدیسم دایمی یا موقتی شود . از مصرف ید ۱۳۱ در دوران آبستنی ، حتی برای مقاصد تشخیصی باید خودداری کرد .	
۱و۴ــ۶	ممکن است سبب افزایش احتمال ناهنجاریهای جنینی شود (بویژه دردستگاه‌قلبی عروقی) . بیمارانی که تحت درمان با لیتیم قرار دارند در مدت درمان باید از روش‌های مؤثر جلوگیری از آبستنی استفاده کنند . در صورت امکان استفاده از لیتیم در دوران آبستنی بویژه در سه ماهه اول باید متوقف شود .	Lithium Carbonate
	رجوع کنید به Ganglionic Blocking Agents	Mecamylamine
	رجوع کنید به Progestogens	Medroxyproge-sterone
۱و۴و۵	تصور میشود مقادیر زیاد (۷۲میلی‌گرم‌تزریقی) منادیون سدیم بیسولفات (ویتامین K_1) داده‌شده به مادران پیش از زایمان علت چندین مورد آنمی ـ همولیتیک ، هیپر بیلیــروبینمی و یرقان مغز باشد. فیتونادیون (ویتامین K1) که بطریق مشابهی مصرف شده است این عوارض سوء را بهمراه نداشته است .	Menadione
۳ ــ ۶	مصرف مقدار زیاد ترکیبات آلی جیوه (متیل مرکوری) توسط زنان آبستن منجربه افزایش میزان سقط جنین ، مرده بدنیا آمدن نوزاد و مرگ نوزاد پس از	**Mercury, Organic**

دارو	عوارض جانبـی	مراجع
	تولد میگرددونیزمیزان فلج‌مغزی‌کودکان وناراحتی‌های عصبی (بیماری میناماتا) افزایش می‌یابد . غذاهـای آلوده مانند گندم وماهی شایع ترین علت آسیب‌های کشنده همه‌گیر حاصل از جیوه هستند .	
Methimazole	تجویز درازمدت تیونامیدها پس‌ازچهاردهمین هفته آبستنی ممکن است سبب پیدایش‌گواتر درجنین و نوزاد شود . عوارض ناشی از آنها به اندازه عوارض ناشی ازیدورهامشخص نیست ولی‌اندازه‌گواتربه‌مقدار مصرف دارو وابسته است . اگر برای درمان هیپـر تیروئیدیسم مادر، استفاده از داروهای آنتی تیروئیـد ضرورت پیداکند . باید از کمترین مقدار آنهااستفاده شود .	۲ — ۶
Methyltestosterone	رجوع کنید به Androgens	
Norethindrone	استفاده از مخدرها در نزدیکی زمان زایمـان ممکن است سبب دپرسیون تنفسی نوزادگردد .اعتیاد مادر در زمان آبستنی با افزایش موارد سقط جنین و کمبودوزن نوزادهمراه است وممکن است منجر به بروز علایم قطع مخدر (مانندتحریک‌پذیری) درنوزادگردد .	۱و۲و۴ —۶
	رجوع کنید به Progestogens	
	رجوع کنید به Progestogens	

مراجع	عوارض جانبی	دارو
۱و۲و۴ و۵	افزایش بروز یرقان در نوزادان ، استفاده از اکسی توسین بدون رعایت احتیاط ممکن است به انقباضات شدید و حتی تتانیک رحم، کاهش جریان خون به جفت وافزایش احتمال خطر برای جنین شود .	Oxytocin
	رجوع کنید به Anticoagulants, Oral	Phenindione
۵	در نوزادانی که مادرانشان در هنگام آبستنی مقادیر زیاد فنوتیازین دریافت کرده بودند مشاهده شده است .	Phenothiazines
	رجوع کنید به Anticonvulsants	Phenytoin
	رجوع کنید به Menadione	Phytonadione
۱–۴و۶	درجنین مادرانی‌که مدت زیادی نوراتیندرون، نوراتینودرل یا اتیسترون مصرف کرده بودند علایم و صفات‌مردی مشاهده‌شده است . بنظر می‌آیداستفاده ازپروژستوژن‌های‌طبیعی (مانندپروژسترون)یاترکیباتی که شباهت زیادی با آنها دارند (مانند مدروکسی پروژسترون) این خطر را کاهش میدهد .	Progestogens
۱۰	استفاده از پروپرانولول در دوران آبستنی با کاهش اندازه جفت تاخیردررشدجنین و کندی‌ضربان	Propranolol

مراجع	عوارض جانبی	دارو
	قلب و هیپوگلیسمی نوزاد همراه بوده است . عوارض مشابه دراثرمصرف‌سایر وقفه دهنده‌های بتا آدرنرژیک گزارش نشده است اما باید انتظار آنها راداشت .	
	رجوع کنید به Methimazole	Propylthiouracil
	با اینکه اثر تراتوژنیکی‌این دارو درانسان‌ثابت نشده است ،امامطالعه اثرآن درحیوانات نشان‌میدهد که این آنتاگونیست اسیدفولیک یک تراتوژن احتمالی است و مصرف، توام با لوکوورین ، بویژه در سه ماهه اول آبستنی ، توصیه شده است .	Pyrimethamine
۲ ـ ۶	استفاده زیاد آن در زنان آبستن‌بااتوتوکسی‌ـ سیته و کری همراه بوده است . ظاهرا "مرحله آبستنی اهمیتی ندارد .	Quinine
۴	با اینکه عموما "بیخطرمحسوب‌میشوند .افزایش میزان سرطان در زنانی که رحم آنها در معرض آهن ۵۹ قرارگرفته است نشان میدهد که در دوران‌آبستنی نبایداز رادیـوایزوتوپهـا استفـاده شـود. رجوع کنید به **Iodine, Radioactive**	Radiopharma-ceuticals
۲و۴ـ۶	گزارش شده است‌که استفاده اززرپین درنزدیکی زایمان سبب احتقان بینی ، چرت ، هیپوترمی وکندی ضربان قلب شده است .	Reserpine

مراجع	عوارض جانبـــی	دارو
۴ ـ ۶	اگر ازآسپیرین در نزدیکی زایمان استفاده شود ممکن است کارپلاکت‌ها را درجنین ونوزادکاهش دهد. استفاده درازمدت از سالیسیلات‌ها دردوران آبستنی (معمولا " بشکل فرآورده‌های ضددرد مرکب) یاطولانی شدن زمان آبستنی و افزایش میزان زایمان کودک‌مرده همراه بوده است. ناهنجاریهای متعدد مادرزادی به سالیسیلات‌ها نسبت داده شده است،اما ثابت نشده است که هیچکدام از آنها ناشی از این داروهاباشد. استفاده گسترده از سالیسیلات‌ها ممکن است هرگونـه اثرهائی را که‌احتمالا " بر روی جنین دارند مشکوک سازد.	Salicylate
۵و۶	مقادیر زیاد این داروها بهنگام زایمان ممکـن است منجربه وقفه‌طولانی فعالیت سیستم‌اعصاب‌مرکزی و دستگاه تنفس نوزاد گردد. استفاده درازمدت یـا اعتیاد باین داروها دردوران آبستنی ممکن‌است‌منجر به علایم مربوط به قطع دارو گردد.	Sedatives and Hypnotics
	موارد کمی در باره از دست رفتن شنوائی که از دست دادن تون‌های بالا تا کری کامل در نوزادان زنانی که بهنگام‌آبستنی استرپتومیسین دریافت‌کرده بودند (معمولا " برای درمان سل) گزارش شده‌است. این یک‌تاثیرمستقیم است و بامرحله آبستنی‌رابطه‌ای ندارد. منطقی است اگر تصور شود که سایر آنتی ـ بیوتیک‌های آمینوگلیکوزید میتوانند دردوران‌آبستنی	Streptomycin

مراجع	عوارض جانبی	دارو
	برروی‌گوش عوارض سوء داشته باشند . درمورد بیمارانی که کار کلیوی آنها کاهش یافته‌است احتیاط های‌ویژه‌ای باید در پیش گرفته شود .	
	سولفونامیدهای‌طویل‌الاثر (مانند سولفامتوکسی پیریدازین)گر نزدیک زایمان برای مادر تجویزشود واردجریان خون‌جنین شده وبرای پیوندباگیرنده‌های پروتئینی با بیلیروبین رقابت کرده و ممکن است در نوزادان سبب هیپربیلیروبینمی و احتمالا " یرقان‌مغز گردند . درحالیکدرابطه بایرقان‌مغزدر سولفونامیدهای کوتاه اثر (مانند سولفی سوکسازول ، سولفامتوکسازول) نشان‌داده نشده است ازتجویز مقادیرزیاد درنزدیکی زایمان ، دست‌کم برمبنای‌تئوریک ،بایدخودداری‌شود .	Sulfonamides, Antibacterial
	رجوع کنید به Androgens	Tetracycline
۱و۲و۴ ـ ۶	در اثر مصرف تتراسیکلین‌ها بهنگام سه ماهه دوم‌وسوم‌آبستنی رنگین‌شدن دندانها ،فلوئورسانس، پوسیدگی و هیپوپلازی مینای دندانهای افتاده پیش آمده است . تتراسیکلین‌ها در استخوان‌های‌درحال تشکیل نیز تجمع می‌یابند ، اما عوارض آنها بخوبی مشخص نشده است . این عوارض وهپاتوتوکسی سیته تتراسیکلین‌ها در زنان آبستن با همدیگر توام شده‌و مصرف آنها را بهنگام آبستنی ممنوع می‌سازد .	Tetracycline

مراجع	عوارض جانبی	داروها
۴	ایجاد ترومبوسیتوپنی در نوزادان گزارش شده است ، اما خطر مطلق بسیار کم است و مصرف آنهارا منع نمی‌سازد .	Thiazide Diuretics
۲و۴ـ۶	استعمال دخانیات بوضوح با کاهش وزن نوزاد وافزایش‌میزان سقط جنین ونارسی نوزاد همراه است . برخی محققین اظهار میدارند که استعمال دخانیات ممکن است میزان بروز ناهنجاریهای‌عمده را افزایش دهد ،اما برای اثبات این‌نظربه اطلاعات‌بیشتری‌نیاز است .	Tobacco
	رجوع کنید به Ganglionic Blocking Agents	Trimethaphan
۱و۲و۴ ـ ۶	ویروس زنده و ضعیف شده سرخجه از بافت‌های جفت و جنین بدست میآید و برخی علایم سند روم سرخجه مادرزادی درفرزندان زنانی‌که‌بهنگام‌آبستنی واکسینه شده‌اند دیده شده است . اگرچه خطر مطلق واکسن سرخجه کم است امااین واکسن‌را نبایددرزنان آبستن مصرف کرد .زنانی‌که آبستن نیستند و ازلحاظ جنسی فعال هستند در سه ماه اول واکسیناسیون باید از وسایل ضدآبستنی موءثری استفاده کنند .	Vaccine, Rubella
۱و۲و۴ ـ ۶	واکسیناسیون درسه‌ماهه اول آبستنی با افزایش عمده‌ای در میزان سقط جنین (تا ۲۵ درصد) همراه بوده است . ابتلاء آبله به جنین بسیار نادر است‌اما	Vaccine, - Smallpox

مراجع	عوارض جانبی	دارو
	عوارض شدید واکسیناسیون در مراحل آخر آبستنی پیش میآید . غالبا " ،ولی نه در تمام موارد عوارض‌پس از اولین واکسیناسیون انجام میشود . (این امر بویژه درمورد ابتلاء جنین به‌آبله‌صادق‌است) واکسیناسیون زنان‌آبستن‌بایدفقط منحصربه‌کسانی‌شودکه‌عازم‌مسافرت به مناطقی هستند که این بیماری در آنجا شایع‌است. توام کردن واکسن‌آبله باایمینوگلوبین‌های ضدویروس آبله ممکن است به‌کاهش‌خطرهای‌ناشی ازواکسیناسیون کمک کند .	
۱و۴و۵	مصرف زیاد ویتامین A با ویتامین D بهنگام آبستنی با انواع نقایص مادرزادی همراه بوده است ، اما بین آنهاهیچگونه رابطهٔ‌قاطعی‌اثبات نشده‌است . شرط احتیاط‌آن است که بیش از مقادیر توصیه شده روزانه این ویتامین‌ها (بویژه ویتامین D مصرف نشود مگراینکه برای درمان‌یک اختلال‌متابولیکی لازم باشد .	Vitamin A, Vitamin D
	رجوع کنید به Menadion	Vitamin K
	رجوع کنید به Anticoagulants, Oral	Warfarin
	مراجع در صفحهٔ بعد	

REFERENCES

(مربوط به داروها در آبستنی)

1. Dukes, M.N.G. (Ed.): Meyler's Side Effects of Drugs, Vol. 8, Excerpta Medica, Amsterdam, 1975.
2. Hawkins, D.F. (Ed.): Obstetric Therapeutics, Williams and Wilkins Company, Baltimore, 1974.
3. Nishimura, H.: The Clinical Aspects of the Relationship of Drugs to Malformations, in Meyler, L. and Peck, H.M. (Eds.): Drug-Induced Diseases, Vol.4, Excerpta Medica Amsterdam, pp. 81-90, 1972 .
4. Nishimura, H. and Tanimura, T.: Clinical Aspects of the Teratogenicity of Drugs, Excerpta Medica, Amsterdam, pp. 99-288, 1976.
5. Shirkey, H.C. (Ed.): Pediatric Therapy, 5th Ed., The C.V. Mosby Company, St. Louis, pp. 157-211, 1975.
6. Tuchman-Duplessis, H.: Drug Effects on the Fetus, Publishing Sciences Group, Acton, MA, 1975.
7. Hanson, J.W. et al.: Fetal Alcohol Syndrome: Experience with 41 Patients, J. Am. Med. Assoc. 235: 1458-1460, 1976.
8. Hanson, J.W. et al.: Risks to the Offspring of Women Treated with Hydantion Syndrome, J. Peditar, 89: 662-688, 1976.
9. Herbst, J.W. et al.: Prenatal Exposure to Stilbestrol: A Prospective Comparison of Exposed Female Offspring with Unexposed Controls, J. Engl. J. Med. 292: 334-339, 1975.
10. Gladstone, G.R. et al.: Propranolol Administration During Pregnancy: Effects on the Fetus, J. Pediatr. 86: 962-964, 1975.

علائم اختصاری مورد استفاده در نسخه نویسی

aa	(ana)	از هر کدام
ac	(ante çibum)	پیش از غذا
ad	(ad)	تا ، به
ad	(auris dextral)	گوش راست
ad lib	(ad lib)	به دلخواه ، به مقدار مطلوب
aq	(aqua)	آب
as	(auris sinistra)	گوش چپ
au	(auris utro)	در هر گوش
bid	(bis in die)	دوبار در روز
c	(cum)	با
dos	(dosis)	خوراک دارو ، مقدار ، روز
dtd	(dentur tales doses)	همین مقدار دارو را بدهید
et	(et)	و
ft	(fiat, fiant)	درست کنید ، بسازید
gtt(s)	(gutta)	قطره ، قطره‌ها
h or hr	(hora)	ساعت
hs	(hora somni)	هنگام خواب
M	(misce)	مخلوط کنید
mt	(mitte talis)	از همین بفرستید
nr	(non repetatur)	تکرار نکنید
od	(oculus dexter)	چشم راست
os	(oculus sinister)	چشم چپ
ou	(oculus uterque)	هر چشم
pc	(post cibum)	پس از غذا
po	(per os)	از راه دهان

prn	(pro re nata)	به مقدار احتیاج
q	(quaque)	هر
qd	(quaque die)	هرروز
qh یا q hr	(quaque hora)	هرساعت
qid	(quarter in die)	چهاربار در روز
qod	(quaque alium die)	یک روز در میان
qs	(quantum sufficat)	مقدار کافی
qs ad	(quantum sufficat ad)	مقدار کافی برای ساختن
repet	(repetatur)	تکرار شود
s	(sine)	بدون
ss	(semis)	نیم ، نصف
sig	(signa)	بنویسید ، علامت بزنید
stat	(statim)	فورا" ،
tid	(ter in die)	سه بار در روز
ud, ut dict	(ut dictum)	آنچنانکه توصیه شده

UNIVERSITY
Acc.
259657
10.2.88

در چهار بخش :
۱ـ چگونه یک بیمار را معاینه کنیم
۲ـ کمکهای اولیه
۳ـ روش تزریق و احتیاط های لازم
۴ـ امداد در جنگ

کمک های اولیه

دکتر دیوید ورنر ترجمه: **دکتر توکلی صابری**



28 Dec 1976

Call No. ________ Date ________

Acc. No. ________

CENTRAL LIBRARY
THE UNIVERSITY OF KASHMIR

This book should be returned on or before the last date stamped above. An over-due charge of 10 Paise will be levied for each day, if the book is kept beyond that date.

28 DEC 1976

Call No. ____________ Date ____________

Acc. No. ____________

CENTRAL LIBRARY
THE UNIVERSITY OF KASHMIR

This book should be returned on or before the last date stamped above. An over-due charge of 10 Paise will be levied for each day, if the book is kept beyond that date.

آنچه در فرهنگ داروئی میخوانید :

۱ـ فرهنگ داروئی

سخن نـگارنده ـ راهنمای استفاده از فرهنگ داروئی ـ فهرست منابع کتاب ـ فهرست الفبائی داروها ـ علامت اختصاری کارخانه‌های داروسازی ـ طبقه‌بندی درمانی ـ متن اصلی کتاب فرهنگ داروئی ـ شیر خشك و غذای کودك ـ فهرست درمانـی داروهـا بر حسب نام تجارتی ـ فهرست کارخانه‌ای ـ فهرست الفبائی نام ژنریك داروها بر حسب نام تجارتی ـ فهرست درمانـی فارماکولوژیکی داروها بر حسب نام ژنریك.

۲ـ اطلاعات داروئی

چه هنگام وچگونه برخی ازداروهارا مصرف کنیم ـ اصطلاحات و اشکال داروئی ـ اشکال تجارتی داروها ـ اشکال جالینوسی داروها ـ شیوه‌های استفاده ازاشکال داروئی ـ تب داروئی ـ تداخل داروها با غذا ـ برچسب روی داروهای خوراکی ـ غلظت خونی داروها ـ راهنمای دفع داروها از شیر ـ فهرست الفبائی دفع داروها از شیر ـ داروها در آبستنی ـ علائم اختصاری مورد استفاده در نسخه‌نویسی.